



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

E. CZUBER
VORLESUNGEN ÜBER
DIFFERENTIAL- UND INTEGRAL-
RECHNUNG

I



[The page contains a large, dense block of text that is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast. The text appears to be a continuous paragraph or a list of items, but the individual words and sentences cannot be discerned.]

the first of these is the fact that the system is not in a steady state.

The second of these is the fact that the system is not in a steady state.

The third of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fourth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fifth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The sixth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The seventh of these is the fact that the system is not in a steady state.

The eighth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The ninth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The tenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The eleventh of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twelfth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The thirteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fourteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fifteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The sixteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The seventeenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The eighteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The nineteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twentieth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-first of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-second of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-third of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-fourth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-fifth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-sixth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-seventh of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-eighth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-ninth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The thirtieth of these is the fact that the system is not in a steady state.

PA 303
C95
V.1
C.2
TIMOSHENKO
COLLECTION

2.6.30/

18

VORLESUNGEN ÜBER DIFFERENTIAL- UND INTEGRALRECHNUNG

VON

EMANUEL CZUBER

O. Ö. PROFESSOR AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN WIEN

ERSTER BAND

MIT 125 FIGUREN IM TEXT

DRITTE, SORGFÄLTIG DURCHGESEHENE AUFLAGE



Ed.

LEIPZIG UND BERLIN

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1912

0/2

COPYRIGHT 1912 BY B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

**ALLE RECHTE,
EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN.**

Vorwort zur ersten Auflage.

Die „Vorlesungen über Differential- und Integral-Rechnung“, welche ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, sind in erster Linie für Studierende an Technischen Hochschulen bestimmt; ich darf jedoch hoffen, daß sie auch von Studierenden der Mathematik im engeren Sinne mit Nutzen werden gebraucht werden.

Bei Abfassung derselben war es mein Bestreben, mich auf den Boden der modernen Forschung zu stellen und in bezug auf die Auswahl des Stoffes und seine Verfolgung ins Einzelne jene Grenzen einzuhalten, welche mir durch den Zweck des Buches geboten erscheinen. Für den Studierenden der technischen Disziplinen bildet die Differential- und Integral-Rechnung in der Regel den Abschluß der mathematischen Vorbildung; er soll in den betreffenden Vorlesungen neben einer tüchtigen Schulung des Geistes jene Kenntnisse erwerben, die zu einer wissenschaftlichen Erfassung und Behandlung der Probleme der Technik, zum Verständnis der reichen Literatur auf diesem Gebiete erforderlich sind. Für denjenigen, welcher die Mathematik zu seinem Berufsstudium erwählt hat, ist eine gründliche Einführung in die Methoden und den Formelapparat der Infinitesimal-Rechnung die unerläßliche Voraussetzung eines erfolgreichen Betriebes spezieller Fachstudien. Rücksichtlich beider Kategorien empfiehlt es sich, den theoretischen Aufbau auf jenes Maß zu beschränken, das mit den vorhandenen mathematischen Kenntnissen und dem unmittelbaren Bedürfnisse in richtigem Einklange steht.

Was bei dem Techniker durch das spezielle Ziel des Studiums der Infinitesimal-Rechnung bedingt ist, das erfordern bei dem angehenden Mathematiker didaktische Rücksichten:

ich meine die organische Verbindung der Theorie mit ihrer Anwendung. Der Techniker studiert die Mathematik, um davon bei der Lösung wichtiger Probleme der großen Praxis Gebrauch zu machen; dem Mathematiker dienen die Anwendungen nicht so sehr, das Studium zu beleben, als vielmehr es zu vertiefen, die klare Erfassung der theoretischen Sätze zu vermitteln. Daß es vornehmlich die geometrischen Anwendungen der Analysis sind, welche sich für diesen Zweck empfehlen, bedarf kaum der Begründung; um in sie einzutreten, ist eine spezielle Vorbereitung nicht erforderlich, und die Probleme der Mechanik, Physik und Geodäsie schließen sich ihnen eng an.

Bei der Auswahl der Beispiele hielt ich mir vor Augen, daß es sich nicht darum handeln darf, zum alleinigen Zwecke der Einübung die Formeln auf eine Reihe mehr oder weniger gleichartiger Fälle anzuwenden. Vor allem kam es mir darauf an, überall dasjenige klar hervortreten zu lassen, was jeweilen beleuchtet werden sollte; außerdem aber suchte ich durch die Beispiele den zugeführten Wissenstoff zu vermehren.

Daß die geometrische Interpretation der analytischen Sätze ausgiebig herangezogen wurde, versteht sich bei den Zielen des Buches von selbst.

Wie weit die getroffene Auswahl des Stoffes und seine Darstellung im Einzelnen mit den eben gekennzeichneten Intentionen sich decken, darüber hat das fachmännische Urteil anderer zu entscheiden.

Noch liegt es mir ob, der Verlagsbuchhandlung für die gediegene Ausstattung und meinem Assistenten, Privatdozenten Dr. Karl Zsigmondy, für seine freundliche Hilfe bei der Druckrevision zu danken.

Wien, Neujahr 1898.

E. Czuber.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Bei der Bearbeitung der zweiten Auflage hat die Gesamtanlage des Werkes eine Änderung nicht erfahren, da mir weder die Urteile der Kritik noch die eigenen seither gemachten Erfahrungen eine solche als notwendig erscheinen ließen. Hingegen ist alle Sorgfalt darauf verwendet worden, den Inhalt abzurunden und den Zwecken, für welche das Buch bestimmt ist, vollkommener anzupassen; wo es angezeigt schien, die Darstellung präziser zu gestalten und die Ergebnisse schärfer zu formulieren. Von größeren Erweiterungen des Inhaltes seien erwähnt im I. Bande die hyperbolischen Funktionen, der Begriff der Funktion einer komplexen Variablen; im II. Bande die Eulerschen Integrale, die Fourierschen Reihen, Moment- und Schwerpunktsbestimmungen, die Sätze von Green. Die Einfügung historischer und literarischer Notizen wird manchem willkommen sein; auch die ziemlich zahlreichen, an passenden Stellen vorgelegten Probleme dürften zur Verwendbarkeit des Buches beitragen. So hoffe ich, die Absichten, welche mir bei der Anlage des Werkes vorschwebten, der Verwirklichung näher gebracht zu haben.

Meinem früheren Assistenten, Prof. Dr. Karl Carda, habe ich für die freundliche Mitwirkung beim Korrekturenlesen zu danken.

Wien, Dezember 1905.

E. Czuber.

Vorwort zur dritten Auflage.

Bei der Bearbeitung dieser Auflage war meine Aufmerksamkeit hauptsächlich darauf gerichtet, den Text in allen Einzelheiten sorgfältig zu revidieren, den gesammelten Erfahrungen gemäß zu vervollständigen, durch Einbeziehung wichtiger Begriffe zu bereichern und von Unebenheiten zu befreien. Was den ersten Band betrifft, hebe ich hervor die Behandlung der Rollkurven und Brennnlinien, die Einführung in die Flächentheorie, die Darstellung der Rotationsflächen von konstanter mittlerer Krümmung, die Erweiterung des Abschnittes über Flächenkurven durch Aufnahme der Loxodromen. Im zweiten Bande hat der Abschnitt über Differentialgleichungen nach verschiedenen Richtungen Ergänzung und Abrundung erfahren, die Theorie der singulären Lösungen und die Elemente der Variationsrechnung sind vollständig umgearbeitet worden. Die Einführung in die Kurvenintegrale und in die Hauptsätze über die Integrale von Funktionen einer komplexen Variablen dürften mit Rücksicht auf die Anwendungen nicht für unangebracht befunden werden.

Meinem lieben Freunde Hofrat Prof. Dr. J. Finger bin ich für das Interesse, das er an dem Buche genommen, und für die Mitwirkung bei der Korrektur dieser Auflage zu besonderem Danke verbunden.

Gnigl bei Salzburg, Weihnachten 1911.

E. Czuber.

Inhaltsverzeichnis.

Erster Teil.

Differential-Rechnung.

Erster Abschnitt.

Variable und Funktionen.

§ 1. Entwicklung des Zahlbegriffs.

Seite

1.—3. Rationale Zahlen	1
4. Irrationale Zahlen	5
5. Reelle Zahlen	9
6. Imaginäre und komplexe Zahlen	11

§ 2. Variable.

7. Die reelle Variable und ihr Bereich	13
8. Bereich zweier Variablen	14
9. Bereich dreier und mehrerer Variablen	15

§ 3. Funktionen.

10. Funktionen einer reellen Variablen	16
11. Funktionen zweier und mehrerer Variablen	17
12. Explizite und implizite Darstellung einer Funktion einer Variablen. Inverse Funktionen	18
13. Übersicht der elementaren Funktionen einer Variablen	19
14. Grenzwert der Variablen	22
15. Grenzwerte von Funktionen einer Variablen	24
16. Das Unendlichkleine und das Unendlichgroße	27
17. Definition und analytische Merkmale stetiger Funktionen	32
18. Verschiedene Arten der Unstetigkeit (Diskontinuität)	38
19. Beispiele	41

Zweiter Abschnitt.

Differentiation von Funktionen einer Variablen.

§ 1. Der Differentialquotient und das Differential.

20. Begriff des Differentialquotienten	44
21. Abgeleitete Funktion	46
22. Phoronomische und geometrische Bedeutung des Differential- quotienten	48
23. Begriff des Differentials	51

§ 2. Allgemeine Sätze über Differentiation.

24. Differentiation eines Aggregates	53
25. Differentiation eines Produktes	54
26. Differentiation eines Quotienten	56
27. Differentiation inverser Funktionen	57
28. Differentiation zusammengesetzter Funktionen	59

§ 3. Differentialquotienten der elementaren Funktionen.

29. Die Potenz	60
30. Der Logarithmus.	62
31. Die Exponentialfunktion	67
32. Die trigonometrischen Funktionen	68
33. Die zyklometrischen Funktionen.	70
34. Die Hyperbelfunktionen.	73
35. Beispiele	77

§ 4. Allgemeine Sätze über den Zusammenhang einer Funktion mit ihrem Differentialquotienten.

36. Vorzeichen des Differentialquotienten	81
37. Satz von Rolle.	82
38. Der Mittelwertsatz. — Folgerungen	84
39. Der verallgemeinerte Mittelwertsatz	87

§ 5. Die höheren Differentialquotienten und Differentiale.

40. Begriff des n -ten Differentialquotienten	87
41. Bildung höherer Differentialquotienten	89
42. Die höheren Differentiale	93

§ 6. Transformation der unabhängigen Variablen.

43. Die Differentialquotienten in bezug auf eine neue Variable . .	97
44. Beispiele	100

Dritter Abschnitt.

Differentiation von Funktionen mehrerer Variablen.

§ 1. Partielle Differentialquotienten und Differentiale.
Das totale Differential.

45. Stetigkeit der Funktionen mehrerer Variablen	103
46. Partielle Differentialquotienten und Differentiale	106
47. Der totale Differentialquotient und das totale Differential . .	107
48. Geometrische Deutung des totalen Differentials.	110
49. Ausdehnung auf drei und mehr Variable	112
50. Anwendungen	113

§ 2. Die höheren Differentialquotienten und Differentiale.

51. Wiederholte Differentiation nach derselben Variablen	115
52. Wiederholte Differentiation nach verschiedenen Variablen . .	116

	Seite
53. Beispiele	120
54. Totale Differentialquotienten und Differentiale verschiedener Ordnungen	121
§ 3. Differentiation zusammengesetzter und impliziter Funktionen.	
55. Zusammengesetzte Funktionen einer Variablen	125
56. Eulers Satz über homogene Funktionen	127
57. Implizite Funktionen einer Variablen	129
58. Beispiele	132
59. Zusammengesetzte Funktionen zweier Variablen.	134
60. Implizite Funktionen zweier Variablen	136
61. Beispiele	138
62. Implizite Funktionen, gegeben durch simultane Gleichungen . .	140
63. Beispiele	142
§ 4. Transformation der Variablen.	
64. Simultane Transformation zweier voneinander abhängigen Variablen	143
65. Beispiele	151
66. Transformation der unabhängigen Variablen in Funktionen zweier und mehrerer Veränderlichen	152
67. Beispiele	155
68. Simultane Transformation dreier voneinander abhängigen Variablen. — Projektive Transformation des Raumes	159

Vierter Abschnitt.

Reihen.

§ 1. Reihen mit konstanten Gliedern.	
69. Begriff der Konvergenz und Divergenz	163
70. Allgemeine Konvergenzbedingung. — Folgerungen aus derselben	166
71. Allgemeine Sätze über Reihen	168
72. Reihen mit positiven Gliedern. — Allgemeine Sätze . . .	169
73. Konvergenzkriterien der Reihen mit positiven Gliedern . . .	172
74. Reihen mit positiven und negativen Gliedern. — Absolute Konvergenz	180
75. Bedingt konvergente Reihen. Multiplikationstheorem absolut konvergenter Reihen	181
76. Alternierende Reihen	186
77. Beispiele	188
78. Unendliche Produkte	190
79. Beispiele	195
80. Reihen mit komplexen Gliedern	197
§ 2. Reihen mit variablen Gliedern.	
81. Gleichmäßige Konvergenz einer Reihe mit variablen Gliedern .	200
82. Beispiele	203

	Seite
83. Stetigkeit des Grenzwertes einer gleichmäßig konvergenten Reihe	205
84. Potenzreihen. — Konvergenzintervall.	206
85. Erster Abelscher Satz. Gleichmäßige Konvergenz innerhalb des Konvergenzintervalls.	208
86. Zweiter Abelscher Satz. Gleichmäßige Konvergenz bis zur Grenze des Konvergenzintervalls	211
87. Abgeleitete Reihen	214
88. Differentialquotienten einer konvergenten Potenzreihe. Taylorsche Reihe	216
89. Identische Gleichheit zweier Potenzreihen	219
90. Rechnen mit Potenzreihen	221
§ 3. Die Formeln und Reihen von Taylor und Maclaurin.	
91. Die Taylorsche Formel	223
92. Die Taylorsche Reihe	227
93. Die Maclaurinsche Formel.	230
94. Die Maclaurinsche Reihe	231
95. Exponentialreihen. — Natur der Zahl e	232
96. Trigonometrische Reihen.	234
97. Logarithmische Reihen	236
98. Die Binomialreihe.	239
99. Zyklometrische Reihen. — Berechnung der Zahl π	244
100. Die Formeln von Taylor und Maclaurin für Funktionen mehrerer Variablen	249
§ 4. Die elementaren Funktionen einer komplexen Variablen.	
101. Begriff der Funktion einer komplexen Variablen.	252
102. Konforme Abbildung	255
103. Die Potenz. — Moivres Binomialformel für ganze Exponenten.	258
104. Die Wurzel. — Moivres Binomialformel für rationale Exponenten	259
105. Die natürliche Potenz	261
106. Der natürliche Logarithmus	263
107. Trigonometrische Funktionen.	265
108. Zyklometrische Funktionen.	267
§ 5. Die unbestimmten Formen.	
109. Die Form $\frac{0}{0}$	269
110. Die Form $\frac{\infty}{\infty}$	276
111. Die Form $0 \cdot \infty$	281
112. Die Form $\infty - \infty$	282
113. Die Formen 0^0 , ∞^0 , 1^∞	285

Fünfter Abschnitt.

Maxima und Minima der Funktionen.

§ 1. Maxima und Minima der Funktionen einer Variablen.

114. Begriff der extremen Werte einer Funktion	287
115. Notwendige Bedingung für ein Extrem bei stetigem Verlauf des ersten Differentialquotienten	288
116. Unterscheidung zwischen Maximum und Minimum	290
117. Allgemeines Kriterium	291
118. Beispiele	292
119. Extreme Werte bei singulärem Verhalten des Differentialquotienten	304
120. Extreme Werte einer implizite gegebenen Funktion	306

§ 2. Maxima und Minima der Funktionen mehrerer unabhängigen Variablen.

121. Kriterien für die extremen Werte einer Funktion zweier Variablen	308
122. Kriterien für die extremen Werte einer Funktion beliebig vieler Variablen	313
123. Beispiele	315
124. Extreme Werte bei singulärem Verhalten der Differentialquotienten	324

§ 3. Maxima und Minima von Funktionen mehrerer abhängigen Variablen.

125. Begriff der relativen Extreme und ihre Bestimmung	324
126. Beispiele	328

Sechster Abschnitt.

Anwendung der Differential-Rechnung auf die Untersuchung von Kurven und Flächen.**A. Ebene Kurven.**

§ 1. Die Tangente und die Normale.

127. Analytische Darstellung der ebenen Kurven und ihre Einteilung	338
128. Die Tangente in rechtwinkligen Koordinaten	340
129. Beispiele. 1) Strophoide. 2) Zissoide. 3) Cartesisches Blatt.	342
130. Fortsetzung. 4) Rollkurven	347
131. Fortsetzung. 5) Tangenten aus einem Punkte. 6) Berührung zweier Kurven. 7) Orthogonaler Durchschnitt zweier Kurven .	352
132. Fußpunktkurven. — Beispiele	355
133. Die Normale. — Beispiele	358
134. Tangente, Normale, Subtangente und Subnormale. — Beispiele	360
135. Die Tangente im Polarkoordinatensystem	363

	Seite
136. Beispiele. Die archimedische Spirale. Die hyperbolische Spirale. Die logarithmische Spirale. Die Sinusspiralen	365
137. Tangente, Normale, Subtangente und Subnormale im Polarsystem. — Beispiele	369
§ 2. Asymptoten.	
138. Erste Definition.	371
139. Zweite Definition	373
140. Zusammenhang beider Definitionen	374
141. Zurückführung der Untersuchung der unendlich fernen Punkte auf Punkte im Endlichen	376
142. Aufsuchung zu den Koordinatenachsen paralleler Asymptoten .	377
143. Aufsuchung zu den Koordinatenachsen geneigter Asymptoten .	380
144. Krumme Asymptoten	384
145. Asymptoten im Polarsystem	385
§ 3. Gestaltung einer Kurve in der Umgebung eines Punktes.	
146. Konkavität, Konvexität und Wendepunkte (in rechtwinkligen Koordinaten) — Beispiele	387
147. Konkavität, Konvexität und Wendepunkte (in Polarkoordinaten). — Beispiele	394
§ 4. Verhalten zweier Kurven in der Umgebung eines gemeinsamen Punktes.	
148. Begriff und Bedingungen einer Berührung n -ter Ordnung . .	397
149. Geometrische Interpretation einer Berührung n -ter Ordnung .	401
150. Oskulation	402
151. Die oskulierende Gerade.	403
152. Der Oskulationskreis. — Beispiel.	404
§ 5. Länge eines Kurvenbogens. Bogendifferential.	
153. Definition der Länge eines Kurvenbogens	406
154. Das Bogendifferential in rechtwinkligen Koordinaten. . . .	407
155. Das Bogendifferential in Polarkoordinaten	410
§ 6. Krümmung ebener Kurven.	
156. Begriff der Krümmung, des Krümmungshalbmessers, Krümmungsmittelpunktes und Krümmungskreises	412
157. Darstellung in rechtwinkligen Koordinaten	414
158. Der Krümmungsmittelpunkt als letzter Schnitt zweier benachbarten Normalen	418
159. Die Evolute einer Kurve. Evolventen.	419
160. Beispiele, betreffend die Bestimmung von Krümmungsradien, Krümmungsmittelpunkten und Evoluten	422
161. Fortsetzung. Krümmungsmittelpunkte von Rollkurven	428
162. Darstellung in Polarkoordinaten	431
163. Beispiele. Krümmungsmittelpunktakonstruktion bei den Kegelschnitten	432

§ 7. Die singulären Punkte ebener Kurven.

164. Die einfachen Singularitäten algebraischer Kurven	435
165. Analytische Charakteristik der singulären Punkte	440
166. Beispiele	447
167. Endpunkt und Eckpunkt	448

§ 8. Einhüllende Kurven.

168. Begriff und analytische Bestimmung der Einhüllenden	450
169. Beziehung zwischen der Einhüllenden und den Eingehüllten .	453
170. Fall zweier voneinander abhängigen Parameter	455
171. Beispiele	456
172. Fortsetzung. Brennpunkte	461

B. Raumkurven und krumme Flächen.

§ 1. Tangente und Normalebene einer Raumkurve.

Die erste Krümmung oder Flexion.

173. Analytische Darstellung der Raumkurven	466
174. Die Tangente. — Beispiele.	469
175. Bogendifferential einer Raumkurve. — Beispiel	473
176. Die Normalebene. — Beispiel	475
177. Die erste Krümmung oder Flexion. — Beispiel	476

§ 2. Oskulationsebenen einer Raumkurve.

Die zweite Krümmung oder Torsion.

178. Die Oskulationsebene	479
179. Superoskulierende Ebenen. — Geometrische Definitionen der Oskulationsebene	481
180. Beispiele.	483
181. Die Hauptnormale und die Binormale.	485
182. Die zweite Krümmung oder Torsion	489
183. Die Formeln von Frenet	491
184. Das Vorzeichen der Torsion	494
185. Beispiele. — Zylindrische Schraubenlinien.	496

§ 3. Tangenten und Tangentialebenen, Normalen
und Normalebene einer krummen Fläche.

186. Analytische Darstellung krummer Flächen.	499
187. Einige Flächengattungen und ihre analytische Darstellung .	501
188. Die Tangentialebene als Ort der Tangenten	507
189. Die Tangentialebene als oskulierende Ebene. Ihr Verhalten zur Fläche in der Umgebung des Berührungspunktes	510
190. Beispiele	512
191. Normale und Normalebene	518
192. Beispiele	519

§ 4. Einhüllende Flächen.

193. Einhüllende einer einfach unendlichen Flächenschar	521
194. Die Rückkehrkante der Einhüllenden	523
195. Beispiele	525
196. Abwickelbare Flächen	529
197. Kategorien abwickelbarer Flächen	532
198. Differentialgleichungen der abwickelbaren Flächen	533
199. Die Abwicklung.	534
200. Einhüllende einer zweifach unendlichen Flächenschar. — Beispiele	536

§ 5. Die Polarfläche einer Raumkurve.

201. Analytische Bestimmung der Polarfläche	539
202. Die oskulierende Kugel	542
203. Der Krümmungskreis	545
204. Spezielle Raumkurven	547
205. Beispiel	549
206. Evoluten und Evolventen einer Raumkurve	550

§ 6. Krümmung von Kurven auf krummen Flächen.

207. Flexion einer Kurve auf einer krummen Fläche	555
208. Der Satz von Meusnier	557
209. Die Krümmung der Normalschnitte. Der Satz von Euler	559
210. Die Dupinsche Indikatrix	563
211. Eine andere Auffassung der Indikatrix. Tangentialschnitt einer Fläche	566
212. Bestimmung der Hauptnormalschnitte und der Hauptkrümmungsradien	568
213. Analytische Charakterisierung der Nabelpunkte	571
214. Beispiele	572
215. Sphärische Abbildung und Krümmungsmaße einer Fläche	576
216. Flächen mit besonderen Krümmungseigenschaften	579
I. Flächen von konstanter Krümmung	580
II. Flächen mit konstanter mittlerer Krümmung. — Minimalflächen	582

§ 7. Spezielle Kurven auf krummen Flächen.

217. Schichtenlinien und Fall-Linien. — Beispiele	584
218. Krümmungslinien	586
219. Krümmungslinien der Rotationsflächen und der abwickelbaren Flächen	590
220. Asymptotische Linien. — Beispiel	591
221. Geodätische Linien	596
222. Kürzeste Linien	598
223. Geodätische Linien auf Rotationsflächen.	601
224. Loxodromen	602

Erster Teil.

Differential-Rechnung.

Erster Abschnitt.

Variable und Funktionen.

§ 1. Entwicklung des Zahlbegriffs.

1. Rationale Zahlen. Grundlage der Arithmetik ist die *natürliche Zahlenreihe*. Werden mit ihren Gliedern die Operationen des *Addierens*, *Multiplizierens* (Bilden einer Summe aus mehreren gleichen Summanden) und *Potenzierens* (Bilden eines Produkts aus mehreren gleichen Faktoren) vorgenommen, so führt dies über jene Zahlenreihe nicht hinaus, d. h. das Resultat ist immer wieder eine natürliche Zahl.

2. Die der Multiplikation *inverse* Operation, die *Division*, welche verlangt, zu gegebenem Produkt und einem gegebenen Faktor den andern Faktor zu finden, hat ihre Lösung in der Zahlenreihe nur dann, wenn das Produkt, der Dividend, ein *Vielfaches* des bekannten Faktors, des Divisors, ist. Um sie auch im andern Falle ausführbar zu machen, ist die Schaffung *neuer* Zahlen notwendig. Von der Voraussetzung ausgehend, daß die *natürliche Einheit* 1 in jede beliebige Anzahl gleicher Teile teilbar sei, zerlegt man, um die Division $a : b$ zu vollziehen, jede der a Einheiten des Dividends in b gleiche Teile — ein solcher sei mit $\frac{1}{b}$ bezeichnet — und vermag nun die ab neuen Einheiten des Dividends, von der Größe $\frac{1}{b}$, als Summe von b gleichen Summanden darzustellen, deren jeder a solcher neuen Einheiten umfaßt; ein solcher Summand stellt nun, der

Definition der Multiplikation gemäß, das Resultat der vorgelegten Division, den Quotienten, dar und wird mit $\frac{a}{b}$ bezeichnet. Eine Zahl dieses Bildungsgesetzes wird ein *Bruch* genannt; während die natürliche Zahl a ein Aggregat natürlicher Einheiten vertritt, bedeutet der Bruch $\frac{a}{b}$ ein Aggregat ebensovieler Brucheinheiten, deren b eine natürliche Einheit ausmachen.

Die Vergleichung der Brüche untereinander und mit ganzen Zahlen, also auch ihre *Anordnung nach der Größe*, beruht auf der Möglichkeit, sie auf gleichen Nenner zu bringen, d. i. als Aggregat gleicher Brucheinheiten darzustellen; als gemeinsamer Nenner ist jedes gemeinschaftliche Vielfache der vorhandenen Nenner verwendbar; die Vergleichung erfolgt dann an natürlichen Zahlen, den Zählern der transformierten Brüche. Auf denselben Umstand gründet sich die Tatsache, daß man zwischen zwei ungleiche Brüche immer wieder Brüche einschalten kann; man wähle als gemeinsamen Nenner ein so großes Vielfache der beiden Nenner, daß die neuen Zähler um mehr als eine Einheit sich unterscheiden, so daß zwischen sie andere Zahlen eingeschaltet werden können.

Die Vergleichung der Brüche und ihre Anordnung nach der Größe wird auch erreicht durch eine Darstellung derselben, welche jener der natürlichen Zahlen im dekadischen Zahlensystem nachgebildet ist; man verwandelt die Brüche in Aggregate von Bruchteilen nach dem Nenner 10 und seinen aufeinander folgenden Potenzen und bezeichnet diese Form als *Desimalbruch*. Ist $\frac{a}{b}$ ein auf seine kleinste Benennung reduzierter Bruch, so lehrt die Arithmetik ein Verfahren, durch welches man ihm die Gestalt

$$\frac{a}{b} = \alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \frac{\alpha_3}{10^3} + \dots$$

verleiht, wobei α_0 eine natürliche Zahl bedeutet oder entfällt, je nachdem $\frac{a}{b}$ unecht oder echt ist, während unter $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ je eine der zehn Ziffern 0, 1, 2, \dots 9 zu verstehen ist. Das betreffende Verfahren schließt von selbst, wenn b Teiler

einer Potenz von 10, also nur aus den Faktoren 2 und 5 zusammengesetzt ist; im anderen Falle bietet hier die Arithmetik das erste Beispiel eines *unbegrenzt fortsetzbaren Rechenprozesses* dar, aber eines solchen von besonderer Art. Nach einer beschränkten Anzahl von Rechnungsoperationen ist nämlich der ganze weitere Ablauf des Prozesses festgestellt, indem von einer bestimmten, z. B. der $r+1$ ten Stelle an eine gewisse Gruppe von Ziffern $\alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots, \alpha_{r+p}$ beständig sich wiederholt. Auf Grund dieses *periodischen* Verlaufes ist es möglich, den unbegrenzt fortsetzbaren oder *unendlichen Dezimalbruch* mit Hilfe einer beschränkten Anzahl von Zeichen *erschöpfend* darzustellen.

Bildet man aus dem unendlichen Dezimalbruche, der in dem letztgedachten Falle entsteht, der Reihe nach die *abgekürzten* Dezimalbrüche

$$(1) \quad \begin{cases} a_0 = \alpha_0 \\ a_1 = \alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} \\ a_2 = \alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} \\ \dots \dots \dots \\ a_n = \alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{10^n}, \end{cases}$$

so liegt es in der Natur des Rechenprozesses, durch welchen diese gewonnen werden, daß sie niemals abnehmen, sondern im allgemeinen wachsend fortschreiten, und daß für jedes n aus der Reihe 0, 1, 2, ...

$$(2) \quad a_n < \frac{a}{b} < a_n + \frac{1}{10^n} = a'_n,$$

so zwar, daß der Unterschied

$$(3) \quad \frac{a}{b} - a_n < \frac{1}{10^n}$$

und daß er also durch Wahl von n kleiner gemacht werden kann als ein beliebig kleiner Bruchteil ε der Einheit. Und da *jeder* später folgende abgekürzte Dezimalbruch a_{n+v} , im allgemeinen größer ist als a_n und doch unter $\frac{a}{b}$ bleibt, so ist auch der Unterschied

$$(4) \quad a_{n+v} - a_n < \frac{1}{10^n},$$

welche der Zahlen 1, 2, 3, . . . man für ν setzen mag, und somit kann auch dieser Unterschied durch Wahl von n unter die Größe ε gebracht werden.

Man hat also in der unbegrenzt fortsetzbaren Folge der abgekürzten Dezimalbrüche

$$(5) \quad a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$$

eine Reihe von Brüchen, welcher folgende Eigenschaften zukommen: 1) Keines ihrer Glieder kommt dem Bruche $\frac{a}{b}$ gleich; 2) man kann n so groß wählen, daß der Unterschied $a_{n+\nu} - a_n$ bei jedem ν kleiner ausfällt als der beliebig klein festgesetzte Bruchteil ε der Einheit; 3) der Unterschied $\frac{a}{b} - a_n$ kann gleichfalls durch entsprechende Wahl von n kleiner gemacht werden als ein beliebig klein festgesetztes ε . Dieser Sachverhalt wird in Kürze dadurch ausgedrückt, daß man die *Zahlenreihe* (5) als *konvergent* und den Bruch $\frac{a}{b}$ als ihren *Grenzwert* bezeichnet.

Man kann sich von der Sache noch eine andere Auffassung bilden, wenn man auch die Zahlen a'_n hinzunimmt, welche unter (2) definiert worden sind und aus den Zahlen der Reihe (5) dadurch hervorgehen, daß man an jeder derselben die niedrigste Stelle um eine Einheit erhöht; diese Zahlen bilden gleichfalls eine unbegrenzt fortsetzbare Folge von endlichen Dezimalbrüchen

$$(5') \quad a'_0, a'_1, a'_2, a'_3, \dots,$$

welche mit der Reihe (5) analoge Eigenschaften besitzt mit dem Unterschiede jedoch, daß alle ihre Glieder größer sind als $\frac{a}{b}$.

Die Zahl $\frac{a}{b}$ scheidet nun die Zahlen der Reihen (5) und (5') nach folgenden Gesetzen voneinander: 1) Jede Zahl in (5') ist größer als jede Zahl in (5); 2) es lassen sich, wie klein auch ε sein mag, zwei Zahlen finden, die eine aus (5'), die andere aus (5), derart, daß ihr Unterschied kleiner ist als ε . Diesen Sachverhalt drückt man dadurch aus, daß man sagt, die Zahl $\frac{a}{b}$ bringe einen *Schnitt**) zwischen den Zahlen der

*) R. Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig 1872, 1892.

Reihen (5) und (5') hervor; diesem Schnitte entspricht die Lösung der Aufgabe, den Quotienten der Division $a : b$ zu bestimmen.

3. Die der Addition inverse Operation, die *Subtraktion*, welche verlangt, zu gegebener Summe und einem gegebenen Summanden den andern Summanden zu finden, auf natürliche Zahlen oder Brüche angewendet, gestattet nur dann eine Lösung in eben diesen Zahlen, wenn die Summe, der Minuend, *größer* ist als der gegebene Summand, der Subtrahend. Um sie auch im andern Falle ausführbar zu machen, ist die Schaffung *neuer* Zahlen notwendig; diese besteht darin, daß man zunächst eine Differenz, in welcher Minuend und Subtrahend einander gleich sind, als *Zahl* einführt — Null, 0 — und in weiterer Folge jede *Differenz mit dem Minuend* 0 als *Zahl* betrachtet. Die solchergestalt geschaffenen Zahlen, welche sich unter Weglassung der Null formal als die bisher betrachteten Zahlen mit dem vorgesetzten Subtraktionszeichen „—“ darstellen, werden *negative* Zahlen und die erstgedachten zum Unterschiede von ihnen *positive* Zahlen genannt. So gehört denn zu jeder positiven ganzen Zahl und zu jedem positiven Bruche eine dem *Betrage* nach gleiche negative ganze Zahl, beziehungsweise ein negativer Bruch; die Null hat an dieser Gegenüberstellung nicht teil.

Will man von einer Zahl a , welche positiv wie negativ sein kann, bloß den *absoluten Betrag* andeuten, so schreibt man $|a|$.

Solange nur der absolute Betrag in Betracht kommt, spricht man auch von *absoluten Zahlen* zum Unterschiede von den *relativen Zahlen*, bei denen auch das *Vorzeichen* unterschieden wird. Die Benennung „*algebraische Zahlen*“ für die letzteren ist nicht zweckmäßig, weil sie in neuerer Zeit eine andere Bedeutung erlangt hat.

Das System der positiven und negativen ganzen Zahlen und Brüche mit Einschluß der Null bezeichnet man als das System der *rationalen Zahlen*. Die Arithmetik dehnt die für die natürlichen Zahlen geltenden Gesetze und Regeln der bisher erwähnten Operationen auf alle Zahlen dieses Systems aus.

4. Irrationale Zahlen. Aus dem Potenzieren entspringt durch diejenige Umkehrung, welche zu gegebener Potenz und

gegebenem Exponenten die Basis verlangt, eine neue Rechnungsoperation, das *Radizieren* oder Wurzelziehen. Die gegebene Potenz, der Radikand, werde als positive rationale, der Exponent, Wurzelexponent genannt, als positive ganze Zahl vorausgesetzt. Die Arithmetik weist nach, daß diese Aufgabe nur dann im System der rationalen Zahlen eine Lösung findet, wenn der Radikand eine Potenz zum Wurzelexponenten ist. Um sie auch im anderen Falle lösbar zu machen, ist die Schaffung *neuer* Zahlen notwendig. Der hierzu führende Gedankengang läßt sich an das Verfahren anknüpfen, welches die Arithmetik zur Ausziehung der Quadrat- oder der Kubikwurzel aus einer Zahl angibt.

Es handle sich um $\sqrt[n]{A}$, wobei A eine positive rationale Zahl bedeutet, die keine Quadratzahl ist. Die Arithmetik lehrt einen Rechenprozeß, durch welchen eine Folge abgekürzter Dezimalbrüche

$$(6) \quad a_0, a_1, a_2, \dots$$

mit 0, 1, 2, ... Dezimalstellen gefunden wird, deren Quadrate sämtlich kleiner sind als A , so daß für jedes n

$$a_n^2 < A;$$

erhöht man dagegen jede der Zahlen (6) um eine Einheit ihrer niedrigsten Stelle und setzt

$$(7) \quad a_n + \frac{1}{10^n} = a'_n,$$

so entsteht eine zweite Folge abgekürzter Dezimalbrüche

$$(6') \quad a'_0, a'_1, a'_2, \dots$$

mit höchstens 0, 1, 2, ... Dezimalstellen, deren Quadrate sämtlich größer sind als die Zahl A , so daß für jedes n

$$a_n'^2 > A.$$

Der Rechenprozeß, der zu den beiden Folgen (6) und (6') führt, ist ein unbegrenzt fortsetzbarer; denn er könnte nur dann schließen, wenn das Quadrat einer der Zahlen (6) oder (6') gleich würde der Zahl A , was jedoch der Voraussetzung widerspricht. Er unterscheidet sich aber von dem in 2 besprochenen Prozesse wesentlich dadurch, daß, wo man ihn auch abbricht, über seinen weiteren Ablauf ohne Fortsetzung

der Rechnung nichts ausgesagt werden kann; periodische Wiederholung einer Stellengruppe kann nicht eintreten, weil eine solche, wie die Arithmetik nachweist, nur bei der Verwandlung einer rationalen Zahl sich einstellen kann. Es ist daher unmöglich, den unbegrenzt fortsetzbaren oder unendlichen Dezimalbruch, welcher durch den obigen Rechenprozeß definiert ist, mittels einer beschränkten Anzahl von Zahlzeichen *erschöpfend* darzustellen.

Die Zahlenreihen (6) und (6') haben analoge Eigenschaften wie die Zahlenreihen (5) und (5') in 2. Weil a_n sich von a'_n vermöge (7) um $\frac{1}{10^n}$ unterscheidet und jede später folgende Zahl a_{n+v} zwischen a_n und a'_n fällt, so ist für jedes v

$$(8) \quad a_{n+v} - a_n < \frac{1}{10^n}$$

und kann dies durch Wahl von n kleiner gemacht werden als die beliebig kleine festgesetzte positive Zahl ε . Jede Zahl in (6') ist größer als jede Zahl in (6); wie klein aber auch ε angenommen wird, es lassen sich auf Grund von (7) immer zwei Zahlen, je eine aus den Reihen (6) und (6'), derart auswählen, daß ihr Unterschied kleiner ist als ε .

Die durch das Zeichen \sqrt{A} vorgestellte Aufgabe bewirkt also eine Scheidung der rationalen Zahlen a_n und a'_n , oder sie führt einen *Schnitt* zwischen den Zahlenreihen (6) und (6') herbei, und diesem Schnitt ordnet man die Lösung der obigen Aufgabe zu, nennt diese Lösung eine *Zahl*, jedoch zum Unterschiede von den rationalen Zahlen eine *irrationale Zahl*.

In allgemeiner Fassung kann gesagt werden: Lassen sich auf Grund einer arithmetischen oder algebraischen Forderung, der durch eine rationale Zahl nicht entsprochen werden kann, die rationalen Zahlen überhaupt oder die eines Intervalls nach einem aus der Forderung entspringenden Prinzip in zwei Klassen \mathfrak{R} , \mathfrak{R}' derart zerlegen, daß jede Zahl einer Klasse angehört und daß jede Zahl der Klasse \mathfrak{R} kleiner ist als jede Zahl der Klasse \mathfrak{R}' , so sagt man, durch die Forderung sei ein *Schnitt* bestimmt, ordnet ihm eine Zahl zu, die man als *irrational* bezeichnet und von der man erklärt, daß sie die Forderung erfülle.

Wir kehren nun zu dem obigen Beispiel zurück, bei dem nicht die Gesamtheit der rationalen Zahlen, sondern bestimmte unbegrenzt fortsetzbare Folgen rationaler Zahlen in Betracht kommen. Jede der Zahlenreihen (6) und (6') kann als *Definition* für die Zahl angesehen werden, welche die Lösung der Aufgabe bildet, und zwar in dem Sinne, daß zwar keine der Zahlen a_n , beziehungsweise a'_n die Forderung erfüllt, zum Quadrat erhoben die Zahl A zu geben, daß sie dieser Forderung jedoch um so genauer nachkommen, je weiter man in den Reihen fortschreitet, so daß schließlich der Unterschied zwischen A und a_n^2 , beziehungsweise zwischen $a_n'^2$ und A , kleiner wird und bei weiter zunehmendem n kleiner bleibt als eine beliebig kleine festgesetzte positive Zahl ε . In diesem Sinne kann man auch sagen, die Zahl, welche die Lösung der Aufgabe \sqrt{A} gibt, sei der *Grenzwert* der Zahlenreihe (6) oder der Reihe (6').

Von dem besonderen hier betrachteten Falle abstrahierend sagt man von einer Aufgabe, welche zwei Folgen von rationalen Zahlen

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

$$a'_0, a'_1, a'_2, \dots$$

derart voneinander scheidet, daß jede Zahl der einen Folge kleiner ist als jede Zahl der andern Folge, daß ferner zu einer beliebig kleinen im voraus gewählten positiven Zahl ε zwei Zahlen aus den beiden Folgen sich bestimmen lassen derart, daß ihr Unterschied kleiner ist als ε , sie bestimme einen *Schnitt* und diesem Schnitte entspreche eine Zahl. Jeder der beiden Folgen kommt die Eigenschaft zu, daß bei beliebig kleinem ε sich n derart bestimmen läßt, daß der Unterschied $a_{n+\nu} - a_n$, beziehungsweise $a'_{n+\nu} - a'_n$ dem Betrage nach kleiner ist als ε für jedes ν ($= 1, 2, \dots$). Eine Folge von Zahlen dieser Eigenschaft bezeichnet man als *Zahlenreihe* oder *Fundamentalreihe**) und betrachtet sie als Definition eben derselben Zahl, welche vorhin dem Schnitt zugeordnet war. Gehört diese Zahl nicht dem System der rationalen Zahlen an,

*) E. Heine, Elemente der Funktionentheorie. Journ. f. Math. 74 (1872). — G. Cantor, Mathemat. Annalen 5 (1872) und 21 (1883).

so wird sie eine *irrational*e Zahl genannt. Eine Zahlenreihe, welche die Null definiert, wird *Elementarreihe* genannt.

Zwei durch Fundamentalreihen a_0, a_1, a_2, \dots und b_0, b_1, b_2, \dots definierte Zahlen werden für gleich erklärt, wenn $a_0 - b_0, a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots$ eine Elementarreihe ist.

Wenn die durch a_0, a_1, a_2, \dots definierte Zahl α heißt, so soll die zu $-a_0, -a_1, -a_2, \dots$ gehörige Zahl $-\alpha$ heißen; durch diese Festsetzung ist jeder positiven irrationalen Zahl eine dem Betrage nach gleiche negative Zahl zugeordnet.

Die Summe, Differenz, das Produkt und der Quotient der beiden durch die Fundamentalreihen a_0, a_1, a_2, \dots und b_0, b_1, b_2, \dots definierten Zahlen werden der Reihe nach durch die Zahlenfolgen

$$a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots$$

$$a_0 - b_0, a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots$$

$$a_0 b_0, a_1 b_1, a_2 b_2, \dots$$

$$\frac{a_0}{b_0}, \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots$$

erklärt, von welchen sich nachweisen läßt, daß sie ebenfalls Fundamentalreihen sind, bei dem Quotienten jedoch den Fall ausgenommen, wo b_0, b_1, b_2, \dots eine Elementarreihe ist. Hierdurch ist jede Rechnung mit irrationalen Zahlen zurückgeführt auf die entsprechende Rechnung mit rationalen Zahlen, nämlich mit genügend späten Gliedern der die irrationalen Zahlen definierenden Fundamentalreihen.

5. Reelle Zahlen. Das aus den rationalen und irrationalen Zahlen zusammengesetzte System wird das System der *reellen* Zahlen genannt. Dasselbe läßt eine bemerkenswerte geometrische Versinnlichung zu, an welcher eine wichtige Eigenschaft dieses Systems aufgezeigt werden soll.

In einer geraden Linie nehme man einen Punkt an, ordne ihm die Null zu und bezeichne den einen der beiden Halbstrahlen, in welche die Gerade hierdurch zerlegt ist, als den positiven, den andern als den negativen; ferner setze man eine Strecke als Vertreter der natürlichen Einheit 1 fest. Um die (positive oder negative) ganze Zahl a darzustellen, trage man eine Strecke von $|a|$ Einheiten vom Nullpunkte aus (auf dem

positiven, respektive negativen Halbstrahl) auf; der Endpunkt dieser Strecke sei das Bild von a . Um den (positiven oder negativen) Bruch $\frac{a}{b}$ darzustellen, trage man eine Strecke, welche das a -fache des b -ten Teils der Einheitsstrecke ist, vom Nullpunkte aus (auf dem positiven, respektive negativen Halbstrahl) auf; der Endpunkt dieser Strecke sei das Bild von $\frac{a}{b}$. In solcher Weise ist *jeder* rationalen Zahl ein bestimmter Punkt der Geraden zugeordnet. Aber die Punkte der Geraden sind dadurch nicht erschöpft; so befinden sich darunter die Punkte nicht, welche man erhält, wenn man die Diagonale des Quadrates über der Einheitsstrecke vom Nullpunkte aus auf den beiden Strahlen abträgt, weil sie den beiden Werten von $\sqrt{2}$ entsprechen, die dem System der rationalen Zahlen nicht angehören.

Dagegen läßt sich *jedem* Punkte der Geraden eine bestimmte Zahl zuordnen. Zunächst schließe man den Punkt durch wiederholtes Abtragen der Einheitsstrecke vom Nullpunkte aus in ein *Intervall* von der Größe 1 ein; durch Zehnteilung dieses Intervalls in ein solches von der Größe $\frac{1}{10}$ durch Zehnteilung dieses letzteren in ein Intervall von der Größe $\frac{1}{10^2}$, usw. Vorausgesetzt, daß niemals, wie weit man dies auch fortsetzt, ein Teilpunkt mit dem gegebenen Punkte zusammenfällt — in welchem Falle man schon nach einer beschränkten Anzahl von Wiederholungen des Prozesses eine Zahl, und zwar eine rationale, gefunden hätte, die dem Punkte zugehört —, entspricht den dem Nullpunkte näherliegenden Enden der aufeinanderfolgenden Intervalle eine unbegrenzt fortsetzbare Folge von Dezimalbrüchen

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

ebenso den vom Nullpunkte weiter entfernten Endpunkten eine solche Folge

$$a'_0, a'_1, a'_2, \dots,$$

von welchen sich leicht erkennen läßt, daß ihnen der Charakter von Fundamentalreihen und jene Eigenschaft zukommt, durch welche ein Schnitt bestimmt ist. Diesem Schnitt entspricht

geometrisch der gegebene Punkt, und diesem wie jenem ist die durch die beiden Fundamentalreihen definierte Zahl zugeordnet. Dieselbe kann ebensowohl rational wie irrational sein; so würde z. B. der Punkt, welcher die rationale Zahl $\frac{1}{2}$ darstellt, bei dem beschriebenen Prozesse niemals erreicht werden gerade so, wie es mit dem Punkte der Fall ist, welcher der Zahl $\sqrt{2}$ entspricht.

Der geraden Linie kommt nun in bezug auf die in ihr liegenden Punkte eine Eigenschaft zu, deren Wesen Dedekind*) in dem Axiom ausdrückt, daß eine Teilung der Punkte in zwei Klassen derart, daß jeder Punkt der einen Klasse links von jedem Punkt der andern Klasse liegt, jedesmal nur durch einen einzigen Punkt möglich ist; diese Eigenschaft nennt man die *Stetigkeit* oder *Kontinuität* und die Gerade in bezug auf die in ihr liegenden Punkte ein *Kontinuum*.

Da jedem Punkte der Geraden nach den gemachten Ausführungen eine reelle Zahl entspricht, so bezeichnet man das System der reellen Zahlen als ein *stetiges* oder als ein *Zahlenkontinuum*.

6. Imaginäre und komplexe Zahlen. Dieselbe Umkehrung des Potenzierens, welche uns Anlaß geboten hat zur Schaffung der irrationalen Zahlen, das Wurzelziehen, führt in einer Klasse von Fällen über das System der reellen Zahlen hinaus. Wenn nämlich der Radikand eine negative reelle Zahl der Wurzelexponent eine *gerade* Zahl ist, so findet die Aufgabe im System der reellen Zahlen keine Lösung, weil nach den Regeln, welche die Arithmetik für die Multiplikation positiver und negativer Zahlen angibt, sowohl eine positive wie auch eine negative Zahl zu einer geraden Potenz erhoben auf eine positive Zahl führt. Um auch in diesem Falle die Schranke aufzuheben und die Lösung zu ermöglichen, führt man das Ausziehen der $2n$ -ten Wurzel aus der negativen Zahl $-B$ zunächst auf das Ausziehen der Quadratwurzel aus der Zahl -1 zurück, indem man die für die andern Fälle geltenden Rechengesetze fortbestehen läßt und schließt:

$$\sqrt[n]{-B} = \sqrt[n]{\sqrt{-B}} = \sqrt[n]{\sqrt{B} \cdot \sqrt{-1}};$$

*) l. c.

die positive dem Zeichen \sqrt{B} entsprechende reelle Zahl heie β ; $\sqrt{-1}$ dagegen fhrt man als eine neue Recheneinheit mit dem Zeichen*) i ein, der mit dieser Einfhrung die wesentliche Eigenschaft

$$(9) \quad i^2 = -1$$

erteilt wird, nennt sie die *imaginre Einheit* und βi eine *imaginre Zahl*.

Die additive Verbindung einer reellen Zahl α mit der imaginren Zahl βi , also $\alpha + \beta i$, heit eine *komplexe Zahl*. Die Arithmetik lehrt, wie die fr die reellen Zahlen geltenden Rechengesetze auf die komplexen Zahlen auszudehnen sind; dabei kommt die in (9) ausgesprochene Grundeigenschaft der imaginren Einheit als neues Rechengesetz hinzu.

Zur Bestimmung einer komplexen Zahl sind zwei reelle Zahlen α, β erforderlich. Wrde man diese auf die in 5 errterte Weise in einer oder in zwei geraden Linien darstellen, so htte jede komplexe Zahl ein Punktepaa zum geometrischen Bilde. Man kann jedoch, wenn man sich statt der Geraden der *Ebene* bedient, jeder komplexen Zahl *einen* Punkt zuzuordnen, jenen Punkt nmlich, welcher in bezug auf ein in der Ebene angenommenes rechtwinkliges Koordinatensystem $O(XY)$ α zur Abszisse, β zur Ordinate hat. Es kommt dies im Grunde auf die bereits eingefhrte geometrische Darstellung reeller Zahlen wieder zurck. Wenn man nmlich eine Strecke als natrliche Einheit, den Ursprung O als gemeinsamen Nullpunkt und in jeder der Koordinatenachsen einen Halbstrahl als positiv festsetzt, so gehrt zu der Zahl α ein bestimmter Punkt der Abszissenachse, zu β ein bestimmter Punkt der Ordinatenachse und beide Punkte fhren durch eine eindeutige Konstruktion zu einem Punkte M der Ebene.

Der *Abstand* dieses Punktes vom Nullpunkt mit der Einheitsstrecke gemessen gibt die positive reelle Zahl $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, und die Quotienten $\frac{\alpha}{r}, \frac{\beta}{r}$ sind der Kosinus und Sinus jenes Winkels, um welchen der Strahl OX gegen oder ber OY gedreht werden mu, um mit OM zur Koinzidenz zu kommen.

*) Von L. Euler (1794) stammend.

Ist φ das absolute oder das *Bogenmaß**) dieses Winkels, so erscheint durch diese geometrische Betrachtung die Bestimmung der komplexen Zahl $\alpha + \beta i$ auf zwei neue reelle Zahlen r, φ zurückgeführt, indem

$$\alpha = r \cos \varphi, \quad \beta = r \sin \varphi$$

und demzufolge

$$(10) \quad \alpha + \beta i = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

ist. Die Zahl r nennt man den *absoluten Betrag* oder den *Modul* der komplexen Zahl $\alpha + \beta i$ und schreibt dafür einer bei den reellen Zahlen eingeführten Bezeichnung gemäß auch $|\alpha + \beta i|$; die Zahl φ heißt die *Amplitude* von $\alpha + \beta i$. Die Umformung von α, β auf r, φ ist für das Rechnen mit komplexen Zahlen von der größten Bedeutung.

§ 2. Variable.

7. Die reelle Variable und ihr Bereich. Unter einer *reellen Variablen* oder Veränderlichen versteht man ein *Zeichen* für eine veränderliche Größe, dem vermöge des Problems, in welchem die veränderliche Größe auftritt, mehrere oder unbeschränkt viele reelle Zahlenwerte beigelegt werden können. Die Gesamtheit dieser Werte wird eine Wertmenge und insbesondere der *Bereich* oder das Gebiet der Variablen genannt. Als Zeichen wird gewöhnlich einer der letzten Buchstaben des Alphabets benutzt. Die Variable x gilt als definiert, wenn von jeder reellen Zahl, die man bezeichnet, festgestellt werden kann, ob sie dem Bereich angehört oder nicht.

Im Gegensatze hierzu nennt man ein *Zeichen*, das eine im Laufe der Untersuchung unveränderliche Größe vertritt und dem daher in jedem besonderen Falle nur ein Zahlenwert zukommt, eine *Konstante*.

Wenn der Bereich der Variablen x durch *alle* reellen Zahlen zwischen zwei bestimmten α, β ($\alpha < \beta$) mit Einschluß

*) Unter dem Bogenmaß eines Winkels, das in analytischen Untersuchungen ausschließlich angewendet wird, versteht man das Verhältnis der Länge des Kreisbogens, den ein beliebiger Punkt des beweglichen Schenkels bei Entstehung des Winkels beschreibt, zum Halbmesser dieses Bogens. Hiernach ist π das Bogenmaß des flachen, $\frac{\pi}{2}$ das Bogenmaß des rechten Winkels usw.

dieser gebildet wird, so heißt x eine *stetige* Variable in dem (abgeschlossenen) *Intervall* (α, β) ; die letztere Ausdrucksweise knüpft an die Vorstellung an, wonach der Bereich dieser Variablen in dem geometrischen Bilde durch die Strecke ver-sinnlicht ist, deren Endpunkte den Zahlen α, β entsprechen; α heißt die untere, β die obere Grenze (Schranke) des Intervalls oder auch der Variablen. Die unbeschränkt große Menge der Werte einer stetigen Variablen bezeichnet man durch ∞^1 .

Kann die stetige Variable *jeden* Wert annehmen, der algebraisch größer ist als α , so bezeichnet man ihre obere Grenze mit $+\infty$, ihr Intervall also mit $(\alpha, +\infty)$. Vermag sie *jeden* Wert anzunehmen, der algebraisch kleiner ist als β , so gibt man ihrer untern Grenze das Zeichen $-\infty$, so daß $(-\infty, \beta)$ ihr Intervall (im uneigentlichen Sinne) ist. Kann die stetige Variable überhaupt *jeden* Wert annehmen, so ist $(-\infty, +\infty)$ ihr Intervall und sie heißt *unbeschränkt*.

Nimmt die Variable x nicht alle Werte eines Intervalls an, so heißt sie *unstetig*. Durch die Aussage z. B., x sei eine ganze Zahl, ist x als unstetige Variable definiert; desgleichen durch die Aussage, x sei eine rationale Zahl.

Einen besonderen Wert der Variablen x , dessen sie nach ihrer Definition fähig ist, nennt man, an die geometrische Darstellung der reellen Zahlen denkend, eine *Stelle* oder einen *Punkt* ihres Bereichs.

Von einer Stelle *innerhalb* des Bereichs einer Variablen x kann man sich *nach zwei Richtungen bewegen*, d. h. von dem besondern Wert zu den größeren oder *vorwärts*, oder zu den kleineren oder *rückwärts* fortschreiten.

8. Bereich zweier Variablen. Es seien x, y zwei stetige reelle Variable; ein Wert von x und ein Wert von y bilden zusammen ein Wertsystem oder eine *Wertverbindung* x/y . Die Gesamtheit der Wertverbindungen bildet den *Bereich* oder das Gebiet der beiden Variablen x, y ; der Bereich ist definiert, wenn von jeder bezeichneten Wertverbindung festgestellt werden kann, ob sie dem Bereiche angehört oder nicht.

Wenn man den Wert von x als Abszisse, den von y als Ordinate eines Punktes in bezug auf ein (rechtwinkliges) Koordinatensystem $O(XY)$ betrachtet, so gehört zu jeder Wert-

Verbindung ein Punkt der Ebene, und der Bereich ist durch die Gesamtheit der Punkte eines bestimmten Teils der Ebene dargestellt. Ist, um den einfachsten Fall zu erwähnen, x auf das Intervall (α, β) , y auf das Intervall (γ, δ) beschränkt, beide Intervalle als abgeschlossen gedacht, so ist der Bereich der Variablen x, y durch die Punkte im Innern und auf dem Umfange jenes Rechteckes veranschaulicht, dessen Ecken die Koordinaten $\alpha/\gamma, \beta/\gamma, \beta/\delta, \alpha/\delta$ besitzen. Sind x und y unbeschränkt, so ist ihr Bereich durch die unbegrenzte Ebene repräsentiert. Die Menge der Wertverbindungen zweier stetigen Variablen ist sinngemäß mit ∞^2 zu bezeichnen.

Von einer *Stelle* innerhalb des Bereiches zweier Variablen kann man in unbeschränkt vielen Richtungen fortschreiten; die Menge dieser Richtungen ist äquivalent der Wertmenge einer stetigen Variablen*) und daher mit ∞^1 zu bezeichnen. An der Grenze des Gebiets ist jedoch ein Teil der Fortschreitungsrichtungen ausgeschlossen.

9. Bereich dreier und mehrerer Variablen. Sind x, y, z drei stetige reelle Variable, so kann jedem Wertsystem oder jeder Wertverbindung $x/y/z$ derselben ein Punkt im Raume zugeordnet werden, wenn die Werte von x, y, z als Koordinaten in einem (rechtwinkligen) Raumkoordinatensystem angesehen werden. Der Bereich der drei Variablen x, y, z ist dann durch die Gesamtheit der Punkte eines bestimmten Raumteils dargestellt; er ist insbesondere durch das Innere und die Begrenzung eines Parallelepipeds versinnlicht, wenn x, y, z einzeln der Reihe nach an bestimmte abgeschlossene Intervalle gebunden sind. Die Menge der Wertverbindungen dreier stetigen Variablen ist mit ∞^3 , die Menge der von einem Punkte des Bereichs ausgehenden Fortschreitungsrichtungen durch ∞^3 zu bezeichnen.

Bei mehr als drei Variablen hört die Möglichkeit geometrischer Veranschaulichung auf. Um sich aber auch dann der Vorteile nicht entschlagen zu müssen, welche sie bei Durchführung analytischer Betrachtungen und bei Formulierung von

*) Das Bogenmaß des Winkels, den die veränderliche Richtung mit einer festen bildet.

Sätzen gewährt, führt man sie formal weiter und ordnet einer Wertverbindung $x_1/x_2/\dots/x_n$ der n Variablen x_1, x_2, \dots, x_n einen Punkt in dem (idealen) n -fach ausgedehnten Raume zu, nachdem in demselben ein Koordinatensystem $O(X_1, X_2, \dots, X_n)$ mit n gegenseitig zueinander senkrechten Achsen angenommen worden ist. Der Bereich der Variablen ist durch einen bestimmten Teil dieses n -dimensionalen Raumes dargestellt, die Menge der Wertverbindungen oder Punkte ist durch ∞^n , die Menge der Fortschreitungsrichtungen von einem Punkte aus durch ∞^{n-1} zu bezeichnen.

Es ist lediglich eine Weiterführung der Analogie des Ausdrucks, welche in den Fällen von ein, zwei, drei Variablen uns entgegengetreten ist; ihr Zweck ist, an die anschaulichen Verhältnisse dieser Fälle zu erinnern und der Betrachtung dadurch eine Stütze zu bieten.

§ 3. Funktionen.

10. Funktionen einer reellen Variablen. Wenn jedem Werte der reellen Variablen x , welcher ihrem Bereiche angehört, ein bestimmter Wert von y zugeordnet ist, so ist damit y im allgemeinen auch als Variable definiert und wird eine Funktion der reellen Variablen x genannt. Man drückt diesen Sachverhalt durch eine Gleichung von der Form $y = f(x)$ aus. Die Variable x wird auch das Argument der Funktion genannt; ihr Bereich heißt auch der Definitionsbereich der Funktion.

Von der Variablen x setzen wir, wenn nicht eine hiervon abweichende Bestimmung getroffen ist, voraus, daß sie stetig ist. Weil der Wert des y von dem Werte des x abhängt, so wird y auch die abhängige Variable genannt in bezug auf x als unabhängige Veränderliche.

Über das Gesetz der Zuordnung, das in allgemeinsten Weise durch die Charakteristik f angedeutet ist, enthält die obige Definition keine Aussage; es kann in der mannigfachsten Art festgesetzt sein. Der wichtigste Fall besteht darin, daß eine Rechenvorschrift gegeben ist, nach welcher aus einem gegebenen Werte von x der zugehörige Wert von y zu berechnen ist; mit andern Worten, daß y durch einen analytischen Ausdruck,

in welchen die Variable x als Rechenelement eingeht, definiert erscheint.

Das Gesetz der Zuordnung kann auch durch verbale Festsetzungen ganz willkürlicher Art gegeben sein; wenn man beispielsweise jedem rationalen Werte von x den Wert 1 und jedem irrationalen den Wert 0 von y zuweist, so ist dadurch im Sinne obiger Definition y auch als Funktion von x bestimmt; indessen bieten derartige Funktionen kaum ein ernstliches Interesse.

In den naturwissenschaftlichen Anwendungen werden häufig zusammengehörige Werte von x und y durch *Messung* gewisser Größen gewonnen; man spricht dann von *empirischer* Zuordnung.

Zwischen der analytischen und der empirischen Definition, durch eine gezeichnete Kurve etwa, die auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem bezogen ist, wobei die Abszisse x , die zugehörige Ordinate y vorstellt, besteht ein wesentlicher Unterschied: während dort die Berechnung des y genau oder mit jedem gewünschten Grade der Genauigkeit geschehen kann, ist sie hier nur *approximativ* mit einer von verschiedenen Umständen abhängigen Genauigkeit möglich.

Es gibt Fälle, wo jedem Werte der unabhängigen Variablen x mehrere oder selbst unbegrenzt viele Werte von y zugeordnet sind; auch dann bezeichnet man y als Funktion von x , jedoch als eine *mehrdeutige*, beziehungsweise unendlich vieldeutige. Lassen sich dann von einem Gesichtspunkte aus die Werte von y derart ordnen, daß an *jeder* Stelle in bestimmter Weise von einem *ersten* Werte y_1 , von einem *zweiten* y_2 , usw. gesprochen werden kann, so ist y_1 eine Funktion von x in dem ursprünglichen Sinne oder eine *eindeutige* Funktion, ebenso y_2 usw.; die mehrdeutige Funktion erscheint hiernach in mehrere eindeutige Funktionen aufgelöst, die man auch ihre *Zweige* nennt. Diese Bemerkung ist wichtig, weil hierdurch die Beschränkung auf eindeutige Funktionen statthaft ist.

11. Funktionen zweier und mehrerer Variablen. Wenn jeder Wertverbindung x/y , welche einem definierten Bereich der beiden reellen Variablen x, y angehört, eine bestimmte Zahl z zugeordnet ist, so heißt z eine *Funktion der beiden Variablen* x, y . Man bringt dies in einem Ansätze von

der Gestalt $z = F(x, y)$ zum Ausdruck. Der Bereich von x, y kann in einfachster Weise dadurch bestimmt sein, daß x auf ein Intervall (a, b) , y auf ein Intervall (c, d) angewiesen ist; es bilden dann die Verbindungen eines jeden Wertes aus (a, b) mit einem jeden Werte aus (c, d) den Bereich von x, y .

Diese Definition kann auf beliebig viele Variablen ausgedehnt werden; man nennt u eine Funktion der Variablen x_1, x_2, \dots, x_n , wenn jeder Wertverbindung $x_1/x_2/\dots/x_n$ dieser Variablen aus einem vorgeschriebenen Bereich ein bestimmter Wert von u zugeordnet ist. Die allgemeine Bezeichnung hierfür ist $u = \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Im übrigen gelten über die Funktionen zweier und mehrerer Variablen zunächst die nämlichen Bemerkungen, wie sie für Funktionen einer Variablen gemacht worden sind.

12. Implizite, explizite, inverse Funktionen. Es sei $z = F(x, y)$ eine analytisch definierte Funktion der beiden reellen Variablen x, y . Gibt es solche reelle Wertverbindungen x/y der letzteren, welchen der Wert 0 von z zugehört, so ist ihre Gesamtheit durch die Gleichung

$$(1) \quad F(x, y) = 0$$

bestimmt. Vermöge dieser Gleichung ist eine Zuordnung der Werte von x und y oder eine *gegenseitige Abhängigkeit* dieser Variablen gegeben, und man kann ebensowohl y als Funktion von x wie auch x als Funktion von y betrachten; in jedem Falle setzt die Bestimmung zusammengehöriger Werte die *Auflösung einer Gleichung* voraus. Man sagt in einem solchen Falle, jede der beiden Variablen x, y sei *implicit* als Funktion der andern gegeben.

Dem steht die *explizite* gegebene Funktion gegenüber, deren Wert aus dem jeweiligen Werte der Variablen durch einen vorgeschriebenen Komplex von Rechenoperationen zu gewinnen ist; man schreibt eine solche in der Form $y = f(x)$ an und hat sich unter $f(x)$ einen analytischen Ausdruck vorzustellen, in welchem x als Rechenelement erscheint (10).

Wenn es möglich ist, die Gleichung (1) allgemein, d. i. für unbestimmte Werte von x und y nach diesen aufzulösen, so daß einmal $y = \varphi(x)$, ein zweitesmal $x = \psi(y)$ erhalten

wird, so heißen die durch φ, ψ charakterisierten Funktionen *inverse* oder *umgekehrte Funktionen*.

13. Die elementaren Funktionen einer Variablen. Um eine Übersicht über die Funktionen zu erlangen, welche Gegenstand unserer Untersuchungen sein werden, schlagen wir den folgenden Weg ein.

I. Die einfachste Funktion zweier Variablen x, y ist ein Polynom, dessen Glieder die allgemeine Form $A_{\mu, \nu} x^\mu y^\nu$ haben, wobei μ, ν positive ganze Zahlen oder Null und $A_{\mu, \nu}$ (reelle) Konstanten bedeuten; man nennt sie eine *rationale ganze* oder kurzweg eine *ganze Funktion* der Variablen x, y . Die größte unter den Summen $\mu + \nu$ bezeichnet den *Grad* der Funktion, die größte der Zahlen μ ihren Grad *in bezug auf* x , die größte der Zahlen ν den Grad *in bezug auf* y . Ist die Summe $\mu + \nu$ in allen Gliedern dieselbe, etwa n , so heißt die Funktion *homogen* vom Grade oder von der Dimension n .

Setzt man eine ganze Funktion der Null gleich, so ist durch diese Gleichung y als eine *algebraische Funktion* von x definiert (und auch umgekehrt x als algebraische Funktion von y ; wir fassen den ersten Fall ins Auge). Die oben unterschiedenen drei Grade bezieht man auch auf die Gleichung, welche man als *algebraische Gleichung* bezeichnet.

Ist diese in bezug auf y vom *ersten* Grade, so ist y als *rationale* Funktion von x bestimmt; dabei können noch zwei Fälle unterschieden werden. Ist nämlich der Koeffizient von y eine Konstante, so hat die Auflösung nach y die Form

$$y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

mit ganzem positiven n ; y heißt jetzt eine *rationale ganze Funktion* von x vom Grade n . Hat hingegen y einen von x abhängigen Koeffizienten, so wird die Auflösung nach y in der Gestalt

$$y = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m}$$

mit ganzem positiven n und m sich ergeben; dann nennt man y eine *rationale gebrochene Funktion* von x , und zwar eine *echt* gebrochene, wenn $n < m$; eine *unecht* gebrochene, wenn $n \geq m$. Die unecht gebrochene Funktion läßt sich nach den Regeln

der Arithmetik in eine ganze und eine echt gebrochene zerlegen, indem man die durch den Bruch angezeigte Division so weit vollzieht, als im Quotienten nicht negative Potenzen von x auftreten.

Ist die in Rede stehende Gleichung in bezug auf y vom *zweiten* oder *höheren* Grade, so wird das durch sie definierte y als eine *irrationale Funktion* von x bezeichnet. Die Art der Irrationalität richtet sich nach der Höhe des Grades; ist der Grad zwei, drei oder vier, so läßt sich y mit Hilfe von *Wurzel-aussiehungen* durch x darstellen; übersteigt der Grad die Zahl vier, so ist (von besonderen Fällen abgesehen) die Darstellung durch Wurzelgrößen *nicht möglich*.

Man kann hiernach die *algebraischen* Funktionen einer Variablen unterscheiden in rationale, ganze und gebrochene, und in irrationale, durch Wurzelgrößen darstellbare und solche, welche die Darstellung durch Wurzelgrößen nicht zulassen.

Einige Beispiele mögen das Angeführte erläutern. Die Gleichung zweiten Grades

$$Ax^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

bestimmt y als rationale ganze Funktion von x des zweiten Grades:

$$y = a_0x^2 + a_1x + a_2,$$

wobei $a_0 = -\frac{A}{2E}$, $a_1 = -\frac{D}{E}$, $a_2 = -\frac{F}{2E}$ ist. Dagegen ist durch die Gleichung

$$Ax^2 + 2Bxy + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

y zunächst als unecht gebrochene Funktion von x gegeben: nämlich

$$y = -\frac{Ax^2 + 2Dx + F}{2(Bx + E)};$$

diese läßt sich in eine ganze und eine echt gebrochene zerlegen:

$$y = a_0x + a_1 + \frac{a_2}{2(Bx + E)},$$

wobei

$$a_0 = -\frac{A}{2B}, \quad a_1 = \frac{AE - 2BD}{2B^2}, \quad a_2 = \frac{(2BD - AE)E - B^2F}{B^2}.$$

Die Gleichung

$$Ax^3 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

bestimmt y als zweideutige irrationale Funktion von x :

$$y = \frac{-(Bx + E) \pm \sqrt{Lx^2 + 2Mx + N}}{C},$$

wo $L = B^2 - AC$, $M = BE - CD$, $N = E^2 - CF$; der eine Zweig faßt die mit dem oberen, der andere die mit dem unteren Vorzeichen der absolut genommenen Quadratwurzel gebildeten Werte von y zusammen.

II. Alle Funktionen, welche nicht unter das Bildungsgesetz der algebraischen fallen, faßt man unter der Bezeichnung *transzendenter Funktionen* zusammen.

Die einfachsten davon, aus Begriffen und Vorstellungen der elementaren Mathematik hervorgegangen, werden als *elementare transzendente Funktionen* bezeichnet.

Zunächst ist es der Begriff der Potenz, welcher in der Verallgemeinerung, die ihm die Arithmetik für negative und gebrochene Exponenten gibt, zur Bildung transzendenter Funktionen führt.

Wenn man in der Gleichung $c = a^b$ die Basis a als variabel betrachtet, so ist hierdurch c als Funktion dieser Variablen definiert: $y = x^b$, und diese Funktion wird die *Potens* genannt. Für ein rationales b fällt sie unter den Begriff der algebraischen Funktion, für ein irrationales b ist sie transzendent. Der Bereich von x muß, wenn b ein Bruch mit geradem Nenner oder irrational ist, auf das Intervall $(0, +\infty)$ beschränkt werden, soll jedem Werte von x ein reeller Wert von y zugeordnet sein.

Die Umkehrung der Potenz führt nicht zu einer neuen Funktion; denn aus $y = x^b$ folgt $x = y^{\frac{1}{b}}$ und $\frac{1}{b}$ ist mit b zugleich rational, beziehungsweise irrational.

Faßt man den Exponenten b als variabel auf, so ist c als transzendente Funktion dieser Veränderlichen definiert: $y = a^x$, welche den Namen *Exponentialfunktion* führt. Die Basis a muß *positiv* sein, soll jedem Werte von x ein reeller Wert von y zugeordnet sein; dort, wo mehrere reelle Werte von y vorhanden sind (wie dies geschieht, so oft x einem Bruch mit geradem Nenner gleich wird), soll jedesmal der positive ver-

standen sein; bei diesen Festsetzungen ist $y = a^x$ eine einwertige Funktion.

Aus der Umkehrung der Exponentialfunktion geht x als neue transzendente Funktion von y hervor, welche den Namen *Logarithmus* von y in bezug auf die *Basis* a führt und durch $x = \log_a y$ dargestellt wird. Vermöge der bei $y = a^x$ gemachten Festsetzungen muß in der Definitionsgleichung $x = \log_a y$ a als positiv vorausgesetzt und y auf das Intervall $(0, +\infty)$ beschränkt werden.

In der Trigonometrie werden einem Winkel (in allgemeiner Auffassung, also durch eine *beliebige* Drehung des beweglichen Schenkels entstanden) die Verhältniszahlen je zweier von drei in bestimmter Weise konstruierten Strecken zugeordnet; faßt man in dieser Zuordnung das Bogenmaß x des Winkels als unabhängige Veränderliche, die Werte der genannten Verhältnisse als Funktionen auf, so kommt man zu den *trigonometrischen* Funktionen oder Kreisfunktionen

$$y = \sin x, y = \cos x, y = \operatorname{tg} x, y = \operatorname{cotg} x, y = \sec x, \dots;$$

wird hingegen jede der Verhältniszahlen als unabhängige Veränderliche und das Bogenmaß des Winkels als deren Funktion angesehen, so entstehen die *zyklometrischen* Funktionen oder die inversen Kreisfunktionen

$$x = \operatorname{Arcsin} y, x = \operatorname{Arccos} y, x = \operatorname{Arctg} y, x = \operatorname{Arccotg} y, \dots$$

als Umkehrungen der trigonometrischen.

Zwischen den eben vorgeführten Definitionen der elementaren transzendenten Funktionen, als: der Potenz mit irrationalen Exponenten, der Exponential- und der logarithmischen Funktion, der trigonometrischen und zyklometrischen Funktionen, und den Definitionen der algebraischen Funktionen, besteht ein wesentlicher Unterschied: diese sind analytisch definiert worden, jene nicht; erst im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen werden sich auch für die Transzendenten analytische Definitionen ergeben.

14. Grenzwert der Variablen. Eine Variable x , deren Bereich unbegrenzt viele Zahlen umfaßt, hat den *Grenzwert* a oder *konvergiert* gegen a , wenn sie in *beständiger* Änderung begriffen schließlich Werte annimmt, deren Unterschied gegen

a dem absoluten Werte nach *fortan* kleiner *bleibt* als eine beliebig kleine festgesetzte positive Zahl ε , ohne jemals zu verschwinden.

Wie klein also auch ε gewählt wird, so ist und bleibt von einem gewissen Momente im Verlauf der Änderung des x

$$0 < |x - a| < \varepsilon;$$

man drückt diesen Sachverhalt in Kürze durch den Ansatz

$$\lim x = a$$

aus (limes = Grenze).

Besteht beispielsweise der Bereich der Variablen x aus den Zahlen einer Fundamentalreihe

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

und schreibt man der Variablen vor, der Reihe nach die Werte a_0, a_1, a_2, \dots anzunehmen, so ist die durch die Fundamentalreihe definierte Zahl ihr Grenzwert; hiernach ist der Grenzwert einer Variablen, welche die Fundamentalreihe

$$\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots$$

durchläuft, $= 1$; ebenso der Grenzwert einer Variablen, welche die Reihe der Werte

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$$

zu durchlaufen hat, $= 1$.

Ist x eine *stetige* Variable und stellt man sich vor, daß sie bei der Konvergenz gegen den Grenzwert a *alle* Werte innerhalb eines übrigens beliebig engen Intervalls $(a - \delta, a)$ oder $(a, a + \delta)$ oder $(a - \delta, a + \delta)$ mit alleiniger Ausnahme von a selbst annehmen kann, so sagt man, x nähere sich dem Grenzwerte a auf *stetige* Weise.

Wenn x bei der Konvergenz gegen den Grenzwert a nur kleinere Werte als a annimmt, also zunehmend dem a sich nähert, so soll dies durch die Zeichen $\lim x = a - 0$ ausgedrückt werden; hingegen wird unter $\lim x = a + 0$ ein Grenzübergang zu verstehen sein, bei welchem x nur Werte über a annimmt, sich dem a also abnehmend nähert. Mit Rücksicht auf die geometrische Versinnlichung der reellen Zahlen kann auch von einer linksseitigen und einer rechtsseitigen Konvergenz gesprochen werden. Darf x Werte sowohl unter wie Werte

über a annehmen, so wird dies durch $\lim x = a \mp 0$ oder kurz $\lim x = a$ angezeigt werden.

Ist der Bereich der (stetigen) Variablen x unbeschränkt, und nimmt sie in beständiger Änderung begriffen schließlich Werte an, welche dem absoluten Betrage nach fortan größer bleiben als eine beliebig groß festgesetzte positive Zahl K , so sagt man, die Variable konvergiere gegen den (uneigentlichen) Grenzwert ∞ (Unendlich). Wie groß also auch K ist, von einem gewissen Augenblicke im Verlaufe der Änderung des x ist und bleibt

$$|x| > K.$$

Behält dabei x , wenigstens von einem Momente an, das positive Vorzeichen, so wird dies durch $\lim x = +\infty$ ausgedrückt, und bleibt es von einem Momente an fortwährend negativ, so schreibt man $\lim x = -\infty$. Der Ansatz $\lim x = \infty$ soll gelten, wenn x während des Verlaufs seiner Änderung das Vorzeichen immer wechseln kann.

15. Grenzwerte von Funktionen einer Variablen. Die Funktion $y = f(x)$ ist in dem ganzen Intervall (α, β) definiert heißt so viel, daß zu jeder Stelle a des Intervalls ($\alpha \leq a \leq \beta$) ein bestimmter Wert der Funktion, $f(a)$, gehört, den wir als den *Definitionswert* an dieser Stelle bezeichnen wollen. Wesentlich verschieden davon ist die Frage nach dem *Grenzwerte* der Funktion bei einem Grenzübergange $\lim x = a$. Während im ersten Fall nur der Funktionswert an der Stelle a in Betracht kommt, kommt es im zweiten Falle gerade auf diesen nicht, sondern nur auf die Nachbarwerte an, welche die Funktion bei dem Grenzübergange annimmt. Die zweite Frage hat also auch dann Berechtigung, wenn $f(x)$ an der Stelle a nicht definiert ist.

Wenn bei dem Grenzübergange die Werte von y derart verlaufen, daß der Unterschied $y - b$ dem Betrage nach kleiner wird und bleibt als eine beliebig klein festgesetzte positive Zahl ε , so sagt man, die Funktion habe bei dem Grenzübergange den *Grenzwert* b .

Um die Erscheinungen, die hierbei auftreten können, näher ins Auge zu fassen, wollen wir den Grenzübergang des x genauer präzisieren.

Nähert sich x der Grenze a wachsend, so konvergiere y gegen den Grenzwert b ; man schreibt dies in der Form

$$\lim_{x=a-0} y = b \quad \text{oder kürzer} \quad \lim_{x=a-0} y = b$$

an; nähert sich x der Grenze a abnehmend, so konvergiere y gegen den Grenzwert b' , in Zeichen:

$$\lim_{x=a+0} y = b'.$$

Wenn nun $b \neq b'$, so sagt man, y besitze an der Stelle a zwei verschiedene Grenzwerte, einen links und einen andern rechts. Ist dagegen $b = b'$, so spricht man von einem Grenzwert an der Stelle a schlechtweg, schreibt dies wie folgt an:

$$\lim_{x=a} y = b$$

und hat hiermit folgenden Sinn zu verbinden: Zu einem beliebig klein vorgeschriebenen positiven ε gibt es immer ein ebenfalls positives δ derart, daß $|y - b| < \varepsilon$ bleibt, sobald x in seiner Annäherung an die Grenze a so weit vorgeschritten ist, daß es fortan in dem Intervall $(a - \delta, a + \delta)$, also $|x - a| < \delta$ verbleibt.

Wenn der absolute Betrag von y , während x der Grenze a sich nähert, schließlich größer bleibt als eine beliebig groß festgesetzte positive Zahl K , so spricht man (im uneigentlichen Sinne) von einem unendlichen Grenzwert des y , der wieder $+\infty$, $-\infty$ oder unendlich von unbestimmtem Vorzeichen (bestimmt unendlich oder unbestimmt unendlich) sein kann. Der Ansatz

$$\lim_{x=a-0} y = +\infty$$

bringt also die Tatsache zum Ausdruck, daß bei wachsendem und der Grenze a unaufhörlich sich näherndem x dessen Funktion y schließlich fortan positiv bleibt und jeden noch so großen Betrag überschreitet. Der Ansatz

$$\lim_{x=a} y = -\infty$$

würde den Sinn haben, daß, von welcher Seite sich x der Grenze a auch nähert, y von einem Momente angefangen fortan negativ bleibt und dem Betrage nach über jede angebbare Zahl hinaus wächst.

Ist der Bereich der Variablen x unbeschränkt, so kann man sie in dem im vorigen Artikel erläuterten Sinne gegen eine der Grenzen $+\infty$, $-\infty$ konvergieren lassen; y kann dabei jede der Erscheinungen aufweisen, die bei der Konvergenz von x gegen einen endlichen Grenzwert a beobachtet worden sind. Insbesondere kann y sich dabei einer bestimmten Grenze b nähern und man wird dies in einer der Gleichungen

$$\lim_{x=+\infty} y = b \qquad \lim_{x=-\infty} y = b$$

zum Ausdruck bringen, während

$$\lim_{x=\infty} y = b$$

andeuten würde, daß b die Grenze von y ist, ob x positive oder negative Werte von beständig wachsendem Betrage annimmt.

Es ist jedoch möglich, daß y bei der Konvergenz des x gegen einen endlichen oder unendlichen Grenzwert weder einer bestimmten Grenze sich nähert, noch auch in der einen oder andern Weise ins Unendliche wächst; man sagt dann, es existiere kein Grenzwert für y oder er sei unbestimmt.

Zur Erläuterung mögen die folgenden *Beispiele* dienen.

1) Die Funktion $y = \frac{1}{x-a}$ ist an der Stelle $x = a$ nicht definiert*); wenn sich x dieser Stelle wachsend nähert, so nimmt der Betrag der beständig negativ bleibenden Funktion über jede angebbare Zahl hinaus zu; nähert sich x der Stelle a abnehmend, so bleibt die Funktion positiv und wächst über jeden Betrag hinaus, so daß

$$\lim_{x=a-0} \frac{1}{x-a} = -\infty, \qquad \lim_{x=a+0} \frac{1}{x-a} = +\infty.$$

2) Mit der Funktion $\frac{1}{(x-a)^2}$ verhält es sich ebenso, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei dem Grenzübergange links wie rechts positiv bleibt, weshalb

$$\lim_{x=a} \frac{1}{(x-a)^2} = +\infty.$$

*) Weil eine Division, deren Divisor Null ist, keinen Sinn hat.

3) Die Exponentialfunktion $y = a^x$ ($a > 0$) zeigt für $\lim x = -\infty$ und $\lim x = +\infty$ verschiedenes Verhalten, je nachdem $a < 1$ oder $a > 1$ ist, und zwar ist

$$\text{bei } a < 1 \quad \lim_{x=-\infty} a^x = +\infty, \quad \lim_{x=+\infty} a^x = 0;$$

$$\text{bei } a > 1 \quad \lim_{x=-\infty} a^x = 0, \quad \lim_{x=+\infty} a^x = +\infty.$$

4) Die logarithmische Funktion $y = \log_a x$ ($a > 0$) ist an der Stelle $x = 0$ nicht definiert; auf Grund von 3) findet man

$$\text{bei } a < 1 \quad \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty;$$

$$\text{bei } a > 1 \quad \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty.$$

5) Die Funktion $y = a^{\frac{1}{x-a}}$ ($a > 0$) ist an der Stelle $x = a$ nicht definiert; durch Zusammenhalten der Fälle 1) und 3) ergibt sich

$$\text{für } a < 1 \quad \lim_{x \rightarrow a-0} a^{\frac{1}{x-a}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} a^{\frac{1}{x-a}} = 0;$$

$$\text{für } a > 1 \quad \lim_{x \rightarrow a-0} a^{\frac{1}{x-a}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} a^{\frac{1}{x-a}} = +\infty;$$

dagegen wäre mit Rücksicht auf 2)

$$\text{für } a < 1 \quad \lim_{x \rightarrow a} a^{\frac{1}{(x-a)^2}} = 0,$$

$$\text{für } a > 1 \quad \lim_{x \rightarrow a} a^{\frac{1}{(x-a)^2}} = +\infty.$$

6) Für die Funktion $y = \sin x$ (und auch für die übrigen trigonometrischen Funktionen) existiert bei $\lim x = \pm \infty$ kein Grenzwert; denn bei stetigem Wachsen von x in der einen wie in der andern Richtung hört die Funktion niemals auf, zwischen -1 und $+1$ zu schwanken.

7) Die Funktion $y = \sin \frac{1}{x}$ ist für den Wert $x = 0$ nicht definiert; bei der Konvergenz von x gegen diese Stelle von der einen oder andern Seite existiert vermöge der Fälle 1) und 6) für sie kein Grenzwert.

16. Das Unendlichkleine und Unendlichgroße. Von einer Variablen x oder einer Funktion y derselben (bei einem

gewissen Grenzübergange des x) sagt man, sie *werde unendlich klein* oder sei *ein Unendlichkleines*, wenn sie gegen die Grenze Null konvergiert.

Man sagt von x , beziehungsweise y , es *werde unendlich groß* oder sei *ein Unendlichgroßes*, wenn es sich der (uneigentlichen) Grenze ∞ (mit bestimmtem oder unbestimmtem Vorzeichen) nähert.

Unter einem Unendlichkleinen hat man sich also eine *Variable* im Zustande ihrer Konvergenz gegen den Grenzwert Null, unter einem Unendlichgroßen eine *Variable* im Zustande ihres unaufhörlichen numerischen Wachsens vorzustellen. Beide Begriffsbildungen beziehen sich auf einen Werdeprozeß, der sich im Endlichen abspielt.

Es seien y, y_1 zwei Funktionen von x , welche bei einem näher qualifizierten Grenzübergange $\lim x = a$ zugleich unendlich klein werden. Dasselbe gilt dann von ihrer Summe, ihrer Differenz und ihrem Produkt; von dem letzteren läßt sich aussagen, daß es *rascher* gegen Null konvergiert als die einzelnen Faktoren, indem von einem gewissen Momente der Konvergenz angefangen der zu einem Werte von x gehörige Wert von yy_1 dem absoluten Betrage nach beständig kleiner sein wird als die zu dem gleichen Werte des x gehörigen Beträge von y und y_1 ; es kann hiernach in bezug auf yy_1 einerseits und y, y_1 andererseits von einem verschiedenen Grade des Unendlichkleinwerdens gesprochen werden.

Zu bestimmteren Vorstellungen hierüber führt die Betrachtung des Quotienten $\frac{y}{y_1}$; derselbe kann bei einem Grenzübergange $x = a$, bei welchem $\lim y = 0$ und $\lim y_1 = 0$, sich einer bestimmten von Null verschiedenen Grenze b oder der Grenze 0 oder der Grenze ∞ nähern oder ein unbestimmtes Verhalten zeigen.

In dem ersten der aufgezählten Fälle, wo also $\lim \frac{y}{y_1} = b$ und $b \neq 0$ ist, sagt man, y und y_1 seien unendlich kleine Größen *gleicher Ordnung*.

In dem zweiten Falle, wo $\lim \frac{y}{y_1} = 0$, ist $\frac{y}{y_1}$ selbst ein Unendlichkleines, läßt sich also y als Produkt von zwei un-

endlich kleinen Größen darstellen, deren eine y_1 ist; y konvergiert daher zufolge einer oben gemachten Bemerkung rascher gegen Null als y_1 , und man drückt dies dadurch aus, daß man y als ein Unendlichkleines *höherer Ordnung* im Vergleich zu y_1 bezeichnet.

In dem dritten Falle, wo $\lim \frac{y}{y_1} = \infty$, ist $\lim \frac{y_1}{y} = 0$, also y_1 von höherer Ordnung in bezug auf y , dieses daher von *niederer Ordnung* in bezug auf y_1 .

In dem letzten Falle ist eine Beurteilung der Ordnung ausgeschlossen.

Wenn y, y_1 unendlich kleine Größen ungleicher Ordnung sind, so läßt sich in vielen Fällen eine positive Zahl n derart bestimmen, daß der Quotient $\frac{y}{y_1^n}$ gegen eine bestimmte von Null verschiedene Grenze b konvergiert, so daß y und y_1^n als unendlich kleine Größen gleicher Ordnung zu bezeichnen wären; dann präzisiert man die Ordnung näher und bezeichnet y als *von der Ordnung n in bezug auf y_1* , oder schlechtweg von der Ordnung n , wenn man übereingekommen ist, y_1 als ein Unendlichkleines der *ersten Ordnung* aufzufassen. Da $\frac{y}{y_1^n} - b$ bei dem Grenzübergange $\lim x = a$ gegen Null konvergiert, so ist es selbst ein Unendlichkleines und möge mit η bezeichnet werden; aus dem Ansatz $\frac{y}{y_1^n} - b = \eta$ folgt dann $y = by_1^n + \eta y_1^n$; das Produkt ηy_1^n ist selbst wieder unendlich klein, und zwar höherer als der n -ten Ordnung; wird es durch ε bezeichnet, so hat man in

$$y = by_1^n + \varepsilon$$

den allgemeinen Ausdruck für ein Unendlichkleines, das in bezug auf y_1 von der n -ten Ordnung ist; dabei bedeutet b eine von Null verschiedene bestimmte Zahl und ε ein Unendlichkleines von höherer als der n -ten Ordnung. Das Glied by_1^n nennt man den *Hauptteil*, ε den sekundären Teil von y .

Betrachtet man neben y eine zweite unendlich kleine Größe Y der n -ten Ordnung, so hat sie den Ausdruck

$$Y = By_1^n + E$$

und der Quotient $\frac{y}{Y}$ konvergiert für $\lim x = a$, da $\frac{z}{y_1^n}$ und $\frac{E}{y_1^n}$ hierbei unendlich klein werden, gegen den Grenzwert $\frac{b}{B}$; denn

$$\lim \frac{y}{Y} = \lim \frac{b + \frac{z}{y_1^n}}{B + \frac{E}{y_1^n}} = \frac{b}{B}.$$

Hiernach ist der Grenzwert des Quotienten zweier unendlich kleinen Größen derselben Ordnung gleich dem Quotienten ihrer Hauptteile.

Sind y, y_1 Funktionen von x , welche bei einem näher bestimmten Grenzübergange des x unendlich groß werden, so werden die Funktionen $\frac{1}{y}, \frac{1}{y_1}$ bei demselben Grenzübergange unendlich klein, und es ist $\frac{1}{y}$ in bezug auf $\frac{1}{y_1}$ von der Ordnung n , wenn

$$\lim \frac{\frac{1}{y}}{\left(\frac{1}{y_1}\right)^n} = b$$

und $b \neq 0$; es ist aber

$$\frac{\frac{1}{y}}{\left(\frac{1}{y_1}\right)^n} = \frac{y_1^n}{y},$$

folglich

$$\lim \frac{y}{y_1^n} = \frac{1}{b}$$

und $\frac{1}{b} \neq 0$; man bezeichnet dann während des Grenzüberganges y als unendlich groß von der Ordnung n in bezug auf y_1 . Es gilt also für die Beurteilung der Ordnung unendlich groß werdender Variablen dieselbe Regel wie bei unendlich klein werdenden Variablen.

Folgende *Beispiele* mögen dies erläutern.

1) Die Funktionen $y = \sqrt{x+x^2} - \sqrt{x}$ und $y_1 = x\sqrt{x}$ werden für $\lim x = +0$ unendlich klein, und zwar von gleicher Ordnung; man kann nämlich den Quotienten $\frac{y}{y_1}$, da $x=0$

ausgeschlossen ist, wie folgt transformieren:

$$\frac{\sqrt{x+x^3}-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}} = \frac{x^3}{x\sqrt{x}(\sqrt{x+x^3}+\sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$$

und erkennt nun, daß

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{y_1} = \frac{1}{2}.$$

2) Die Funktionen $y = \sin x$ und $y_1 = x$ werden für $\lim x = 0$ unendlich klein von gleicher Ordnung. Denn aus Fig. 1, in welcher der Kreisbogen aus O mit dem Halbmesser 1 beschrieben ist, folgt die Ungleichheit

$\triangle OCA < \text{Sektor } OBA < \triangle ODA$,
die immer besteht, wenn nur der Winkel x spitz ist; arithmetisch ausgedrückt heißt dies, daß

$$\sin x \cos x < x < \operatorname{tg} x,$$

also auch

$$\cos x < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

und

$$\frac{1}{\cos x} > \frac{\sin x}{x} > \cos x;$$

nun kann x so klein gewählt werden, daß der Unterschied $\frac{1}{\cos x} - \cos x$ kleiner wird als eine beliebig klein festgesetzte Zahl; um so mehr gilt dies dann für $\frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{x}$; da nun $\cos x$ mit abnehmendem x sich der Grenze 1 nähert, so ist, wie auch x gegen Null konvergiert,


$$\lim \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Dabei ist vorausgesetzt, daß x im Bogenmaß ausgedrückt sei; wäre es in Graden gemessen, so hätte man

$$\lim \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{180}.$$

Schon bei 3° und Anwendung von Bogenmaß ist $\frac{\sin x}{x} = 0,9995427$ von 1 wenig verschieden, und bei $10'$ bereits $= 0,9999940$.

Fig. 1.



3) Die Funktionen $y = 1 - \cos x$ und $y_1 = x$ werden unendlich klein für $\lim x = 0$; die erste aber ist von der zweiten Ordnung in bezug auf die zweite, denn (bei Ausschluß von $x = 0$) ist

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2,$$

daher zufolge 2)

$$\lim_{x=0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

4) Die Funktionen $y = \operatorname{tg} x - \sin x$ und $y_1 = x$ werden für $\lim x = 0$ unendlich klein, die erste aber von der dritten Ordnung in bezug auf die zweite, weil bei Ausschluß von $x = 0$

$$\frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3} = \frac{\operatorname{tg} x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}$$



und somit auf Grund von 2) und 3)

$$\lim_{x=0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}.$$


17. Definition und analytische Merkmale stetiger Funktionen. Von einer Variablen x , deren Bereich das *Kontinuum* der reellen Zahlen zwischen α und β ist, sagt man, sie durchlaufe dieses Kontinuum oder das Intervall (α, β) *stetig*, wenn sie jeden Wert aus dem Intervall und jeden nur einmal annimmt; sie kann dabei mit dem Werte α oder mit β beginnen, das Intervall also in zwei entgegengesetzten *Richtungen* durchlaufen. Wir nehmen, wo nichts anderes bemerkt wird, an, daß x mit dem algebraisch kleinsten Werte beginnt und allmählich bis zum algebraisch größten fortschreitet; es entspreche dies der Ordnung α, β .

Nun sei $y = f(x)$ eine in dem abgeschlossenen Intervall (α, β) definierte einwertige Funktion. Wenn der Bereich von y ebenfalls ein Kontinuum (A, B) ist und von y stetig durchlaufen wird, während x das Kontinuum (α, β) stetig durchläuft, so heißt y eine in dem Intervall (α, β) *monotone* Funktion, und zwar eine wachsende oder abnehmende, je nachdem $A < B$ oder $A > B$. Ordnet man jedem Paar zusammengehöriger Werte von x und y einen Punkt M der Ebene zu,

nachdem in derselben ein (rechtwinkliges) Koordinatensystem angenommen worden, so ergibt sich als einfachstes *Bild* der wachsenden Funktion ein von links nach rechts steigender *Kurvenbogen* (Fig. 2), als Bild einer abnehmenden Funktion ein in derselben Richtung fallender Kurvenbogen (Fig. 3).



Besteht der Bereich von y aus mehreren Kontinuen, welche sich derart aneinanderreihen, daß der Anfangswert jedes folgenden zugleich Endwert des vorhergehenden ist, und die von y in *abwechselnder* Richtung durchlaufen werden, so ist y eine abwechselnd wachsende und abnehmende Funktion und ihr einfachstes Bild wird sich aus einem zusammenhängenden System von Kurvenbögen der Formen Fig. 2 und Fig. 3 zusammensetzen, wie etwa in Fig. 4, welche einer Funktion entspricht, die der Reihe nach die Kontinua (A, K) , (K, L) , (L, B) durchläuft, während x von α bis β stetig sich ändert.



Funktionen von der beschriebenen Art bezeichnet man als in dem Intervalle (α, β) stetige oder kontinuierliche Funktionen.

Der ursprüngliche Begriff der Stetigkeit beruht auf räumlichen Anschauungen. Um ihn zu arithmetisieren, d. i. um die Eigenschaft der Stetigkeit von Funktionen für arithmetische Untersuchungen verwertbar zu machen, seien die folgenden Sätze vorgeführt.

1) Wenn die Funktion $f(x)$ in dem Intervall (α, β) stetig ist, so läßt sich zu einem beliebig klein festgesetzten positiven ε

an jeder Stelle $x = a$ innerhalb des Intervalls ein hinreichend kleines positives η festsetzen derart, daß für jedes x' aus dem Intervall $(a - \eta, a + \eta)$ die Beziehung besteht

$$|f(x') - f(a)| < \varepsilon.$$

Der Wert $f(a)$ gehöre dem Kontinuum (A, B) an; ε sei klein genug festgesetzt, daß auch $f(a) - \varepsilon$ und $f(a) + \varepsilon$ dem Kontinuum angehören; diesen Funktionswerten entsprechen Werte der Variablen aus dem Intervall (α, β) , die sich in der Form $a - h$, $a + h'$ oder $a + h$, $a - h'$ darstellen lassen, je nachdem die Funktion in dem Kontinuum (A, B) wachsend oder abnehmend ist; ist h die kleinere der beiden positiven Zahlen h, h' , so genügt jedes η , das zwischen 0 und h liegt, der obigen Forderung.

An den Endstellen $x = \alpha$, $x = \beta$ ist nur zu einer Seite ein Intervall von der gedachten Eigenschaft feststellbar $(\alpha, \alpha + \eta)$ links, $(\beta - \eta, \beta)$ rechts.

Diese Eigenschaft der stetigen Funktion wird als „Stetigkeit an der Stelle $x = a$ “ bezeichnet und häufig zum Ausgangspunkt für die analytische Definition der Stetigkeit genommen, indem man erklärt, eine Funktion, welche an jeder Stelle des Intervalls (α, β) die erwähnte Eigenschaft besitzt, sei stetig in dem ganzen Intervall.

Bezeichnet x'' einen zweiten Wert von x aus dem Intervall $(a - \eta, a + \eta)$, so ist neben

$$|f(x') - f(a)| < \varepsilon$$

auch

$$|f(x'') - f(a)| < \varepsilon,$$

somit

$$|f(x'') - f(x')| < 2\varepsilon;$$

es ist also eine Folge der Stetigkeit, daß sich zu jeder Stelle a des Intervalls (α, β) eine hinreichend enge Umgebung $(a - \eta, a + \eta)$ bestimmen läßt derart, daß irgend zwei Funktionswerte aus dieser Umgebung eine Differenz geben, deren Betrag unter einer beliebig klein festgesetzten positiven Zahl 2ε liegt. Dieses Verhalten pflegt man auch so auszudrücken, daß bei einer stetigen Funktion an jeder Stelle zu einer unendlich kleinen Änderung der Variablen eine unendlich kleine Änderung der Funktion gehöre.

Man kann die Eigenschaft 1) auch dahin aussprechen, es sei für jedes a aus (α, β) $f(a)$ der Grenzwert, gegen welchen die Funktion $f(x)$ bei dem stetigen Grenzübergange $\lim x = a \mp 0$ konvergiert.*)

Als *Beispiel* einer Stetigkeitsprüfung diene die Funktion $f(x) = x^m$, die Potenz mit *gansem positiven* Exponenten m .

Hier ist

$$f(x') - f(a) = x'^m - a^m,$$

und wenn $x' = a + h$ gesetzt wird,

$$f(a+h) - f(a) = h \left[m a^{m-1} + \binom{m}{2} a^{m-2} h + \binom{m}{3} a^{m-3} h^2 + \dots + h^{m-1} \right];$$

ist μ der größte unter den absoluten Werten der Koeffizienten der Potenzen von h in der Klammer und H der absolute Wert von h , so besteht die Ungleichung:

$$|f(a+h) - f(a)| < \mu H (1 + H + \dots + H^{m-1}) = \mu H \frac{1 - H^m}{1 - H},$$

und wenn H ein echter Bruch, so gilt um so mehr:

$$|f(a+h) - f(a)| < \frac{\mu H}{1 - H}.$$

Ist nun ε eine beliebig klein angenommene positive Zahl und wird H so gewählt, daß

$$\frac{\mu H}{1 - H} < \varepsilon,$$

so ist auch

$$|f(a+h) - f(a)| < \varepsilon.$$

Aus der vorangehenden Ungleichung ergibt sich aber

$$H < \frac{\varepsilon}{\mu + \varepsilon}.$$

Wird also der absolute Wert von h gleich oder kleiner genommen als $\frac{\varepsilon}{\mu + \varepsilon}$, so ist

$$|f(x') - f(a)| < \varepsilon$$

für jedes x' aus dem Intervall $(a - h, a + h)$.

*) Ansätze von der Form

$$\lim_{x=a} f(x) = f(a) \quad \text{oder} \quad \lim_{h=0} f(x+h) = f(x),$$

die auf den ersten Blick selbstverständlich scheinen, sind nur dann legal, wenn die Funktion $f(x)$ in der Umgebung von a , beziehungsweise x , stetig ist.

Damit ist die Stetigkeit von x^m an der beliebigen Stelle a , also die durchgehende Stetigkeit dieser Funktion erwiesen. Es folgt daraus auch die Stetigkeit jeder ganzen Funktion von x .

Zu beachten ist, daß die obere Grenze von H abhängt von ε und a .

2) Wenn die Funktion $f(x)$ stetig ist in dem abgeschlossenen Intervall (α, β) , so läßt sich zu einem beliebig klein festgesetzten positiven ε ein hinreichend kleines positives η bestimmen derart, daß für jede zwei Werte x, x' aus (α, β) , für welche $|x - x'| < \eta$, die Beziehung besteht

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Es werde zunächst vorausgesetzt, die Funktion sei monoton, z. B. wachsend, und (A, B) ihr Bereich. Man teile denselben in so viele gleiche Teile, daß jeder Teil kleiner ist als $\frac{\varepsilon}{2}$; die Anzahl der Teile sei n , so daß $\frac{B-A}{n} = k < \frac{\varepsilon}{2}$. Zu den Funktionswerten

$$f(\alpha), f(\alpha) + k, f(\alpha) + 2k, \dots, f(\alpha) + (n-1)k, f(\beta)$$

sollen der Reihe nach die (ebenfalls steigend geordneten) Werte

$$x_0 = \alpha, \quad x_1, \quad x_2, \quad \dots, \quad x_{n-1}, \quad x_n = \beta$$

der Variablen x gehören; je zwei benachbarte dieser Werte bestimmen ein Intervall und das kleinste unter diesen n Intervallen sei gleich h ; dann genügt jedes η , das zwischen 0 und h liegt und $\eta = h$ selbst der obigen Forderung. Denn nimmt man irgend zwei Werte x, x' an, für welche $|x - x'| \leq h$, so fallen sie entweder in ein und dasselbe Teilintervall (x_i, x_{i+1}) oder in zwei benachbarte (x_{i-1}, x_i) und (x_i, x_{i+1}) ; im ersten Falle ist unmittelbar

$$|f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2};$$

im zweiten Falle hat man zunächst

$$|f(x) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|f(x') - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

daher schließlich

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon;$$

in jedem Falle ist also $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$, sobald $|x - x'| \leq h$.

Ist die Funktion abwechselnd wachsend und abnehmend, so führe man die beschriebene Operation für jeden ihrer monotonen Abschnitte aus; das kleinste unter den gefundenen h genügt für den ganzen Verlauf der gestellten Forderung.

Man bezeichnet diese Eigenschaft gewöhnlich als *gleichmäßige Stetigkeit*; wie die vorstehende Betrachtung zeigt, ist sie eine notwendige Folge der Stetigkeit in dem abgeschlossenen Intervall (α, β) .

Die gleichmäßige Stetigkeit besteht also darin, daß sich zu einem beliebigen klein angenommenen ε ein hinreichend kleines h bestimmen läßt derart, daß, wo man auch zwei Stellen in (α, β) bezeichnen möge, deren Abstand unter h liegt, der Unterschied der zugehörigen Funktionswerte immer kleiner als ε ist.

Als *Beispiel* einer Funktion, bei der sich unmittelbar die gleichmäßige Stetigkeit erweisen läßt, betrachten wir $f(x) = \sin x$. Es ist

$$f(x) - f(x') = \sin x - \sin x' = 2 \cos \frac{x+x'}{2} \sin \frac{x-x'}{2};$$

da nun 1 der größte absolute Wert des Kosinus ist und der Sinus, wie klein auch der Bogen, immer kleiner bleibt als dieser so hat man im vorliegenden Falle:

$$|f(x) - f(x')| < |x - x'|;$$

wählt man also $|x - x'| < \varepsilon$, so ist auch, und zwar im *ganzen* Verlauf der Funktion,

$$|\sin x - \sin x'| < \varepsilon,$$

und dadurch ist die gleichmäßige Stetigkeit dargetan.

3) Wenn die Funktion $f(x)$ in dem abgeschlossenen Intervall (α, β) stetig ist und an den Endstellen desselben verschiedene Werte besitzt, so gibt es zu jeder Zahl M zwischen $f(\alpha) = A$ und $f(\beta) = B$ mindestens eine Stelle x in (α, β) derart, daß

$$f(x) = M.$$

Ist zunächst die Funktion monoton, so ist (A, B) ihr Bereich und sie nimmt jeden Wert aus (A, B) und jeden nur einmal an, folglich auch den Wert M , der nach Voraussetzung zwischen A und B liegt; zu ihm gehört ein Wert x aus (α, β) , und es ist in der Tat einmal $f(x) = M$.

Wechseln dagegen Wachstum und Abnahme miteinander ab, und durchläuft die Funktion der Reihe nach die Kontinua (A, C) , (C, D) , ... (K, B) , so muß M mindestens in *einem* derselben vorkommen; denn ist $A < B$ und wären die Werte aus allen Kontinuen unter M , so könnte der über M liegende Wert B nicht erreicht werden; wären die Werte aus den Kontinuen durchwegs über M , so käme der unter M liegende Wert A nicht zustande; ähnliche Erwägungen galten für $A > B$. Kommt aber der Wert M in einem der Kontinuen vor, so nimmt die Funktion ihn auch für einen bestimmten Wert der Variablen aus (α, β) an, so daß auch jetzt, und zwar mindestens einmal, die Gleichung $f(x) = M$ stattfindet.

4) Wenn die Funktion $f(x)$ in dem Intervall (α, β) stetig ist und ihre Endwerte $f(\alpha) = A$, $f(\beta) = B$ ungleich bezeichnet sind, so gibt es wenigstens einen Wert x zwischen α und β , für welchen die Gleichung besteht:

$$f(x) = 0.$$

Dieser Satz ist eine Folge des vorangehenden; denn $f(x)$ nimmt jeden Wert zwischen A und B mindestens an einer Stelle des Intervalls (α, β) an, hier also auch den Wert Null, weil er dem Kontinuum (A, B) angehört.

18. Verschiedene Arten der Unstetigkeit (Diskontinuität). Wenn eine Funktion $f(x)$ in der (ein- oder beiderseitigen) beliebig engen Umgebung einer Stelle $x = a$ definiert ist, die Stetigkeitsbedingung aber nicht erfüllt, so heißt sie an dieser Stelle *unstetig* oder *diskontinuierlich*. An der Stelle selbst versagt in solchen Fällen in der Regel die analytische Definition; es kann aber die Funktion auch hier definiert sein. Immer kommt es auf die Untersuchung der Funktion in der Umgebung an, auf ihr Verhalten bei unbegrenzter Annäherung an die Unstetigkeitsstelle. Auf eine Klassifikation der zahlreichen Möglichkeiten soll nicht eingegangen werden; einige Beispiele werden genügen, um die Art solcher Untersuchungen zu kennzeichnen.

1) Ist a innerhalb des Intervalls (α, β) gelegen, $f(a)$ nicht bestimmt, jedoch

$$\lim_{x=a-0} f(x) = \lim_{x=a+0} f(x) = b,$$

d. h. konvergiert $f(x)$ zu beiden Seiten von a gegen eine und dieselbe bestimmte Grenze b , so kann man die Definition der Funktion, die an der Stelle a eine Lücke aufweist, vervollständigen, indem man dieser Stelle jenen Grenzwert zuweist, also $f(a) = b$ setzt; die Funktion verhält sich dann in der Umgebung von a wie eine *stetige* Funktion.

Eine ähnliche Bestimmung kann getroffen werden, wenn a mit α oder β ($\alpha < \beta$) zusammenfällt und $f(x)$ für $\lim x = \alpha + 0$, beziehungsweise für $\lim x = \beta - 0$ gegen eine bestimmte Grenze konvergiert.

Die Funktion $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$ ist an der Stelle $x = 0$ nicht definiert, weil 0 als Nenner nicht zulässig ist; von welcher Seite sich aber x der Null nähern mag, konvergiert $f(x)$ gegen Null. Füllt man also die Lücke in der Definition durch die Festsetzung $f(0) = 0$ aus, so verhält sich die Funktion an dieser Stelle wie eine stetige Funktion; bei jeder anderen Festsetzung für $f(0)$ würde sie hier unstetig sein.

2) Wenn jedoch $\alpha < a < \beta$ und

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b'$$

und $b \neq b'$, so heißt die Funktion an der Stelle a *unstetig* oder *diskontinuierlich*, gleichgiltig ob $f(a)$ existiert oder nicht und welchen Wert es auch hat, und man sagt von ihr, sie springe von b auf b' über. Es läßt sich jetzt keine Umgebung von a konstruieren derart, daß für zwei ihr angehörende beliebige Werte x', x'' $|f(x') - f(x'')|$ beliebig klein würde.

Ein solches Verhalten zeigt beispielsweise die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \quad (a > 1)$$

an der Stelle $x = 0$, wo sie nicht definiert erscheint; denn es ist $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -1$, hingegen $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1$.

3) Wenn für den innerhalb (α, β) befindlichen Wert a bei dem einen oder dem andern der Grenzübergänge $\lim x = a - 0$ und $\lim x = a + 0$ ein bestimmter Grenzwert b , bei dem andern der Grenzwert ∞ (mit bestimmtem oder unbestimmtem Vorzeichen) zustande kommt, so verhält sich die Funktion auf

der erst gedachten Seite von a wie eine *stetige* Funktion; wäre z. B. $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b$, so kann $f(x)$ in dem Intervall (x, a) als stetige Funktion angesehen werden, sofern man $f(a) = b$ setzt. Man sagt, sie sei im Punkte a , und zwar zu einer Seite desselben, *unstetig*.

So besitzt die Funktion $f(x) = a^{\frac{1}{x}}$ ($a > 1$) zur linken Seite der Stelle 0, an der sie nicht definiert ist, den Grenzwert 0, zur rechten Seite den Grenzwert $+\infty$; ergänzt man also durch die Festsetzung $f(0) = 0$, so verhält sich $f(x)$ links von 0 wie eine stetige Funktion; wegen des rechtseitigen Verhaltens aber ist es bei $x = 0$ *unstetig*.

4) Wenn für den innerhalb (α, β) liegenden Wert a bei den beiden Grenzübergängen $a - 0$ und $a + 0$ für $f(x)$ der Grenzwert ∞ zustande kommt, so heißt $f(x)$ in a , und zwar zu beiden Seiten, *unstetig*.

Dieses Verhalten zeigen beispielsweise die Funktionen $f(x) = \frac{1}{x}$ und $\varphi(x) = \frac{1}{x^2}$ an der Stelle $x = 0$; nur ist das ∞ bei $f(x)$ zu beiden Seiten von 0 verschieden, bei $\varphi(x)$ gleich bezeichnet.

In den Fällen 3) und 4) wird $x = a$ ein *Unendlichkeitspunkt* der Funktion genannt.

5) *Unstetig* heißt $f(x)$ ferner an einer Stelle a , wenn bei einem der Grenzübergänge $a - 0$ und $a + 0$ oder bei beiden $f(x)$ keiner Grenze zustrebt, und es kann auch hier von einseitiger oder beiderseitiger Unstetigkeit gesprochen werden.

Ein Beispiel dieser Art bietet die Funktion $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ an der Stelle 0 dar; wie sehr man sich dieser Stelle von der linken oder der rechten Seite nähern mag, die Funktion hört niemals auf, zwischen -1 und $+1$ zu schwanken, es existiert weder $\lim_{x \rightarrow -0} f(x)$ noch $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$.


Einen Wert $x = a$, für welchen eine Funktion $f(x)$ eine der hier erörterten Eigenschaften aufweist, nennt man einen *singulären Punkt*, und von dem Falle 1) abgesehen, auch einen *Unstetigkeitspunkt*. Bei den analytischen Untersuchungen müssen solche Punkte von der Betrachtung zumeist ausgeschlossen

werden; man denkt sich dies dadurch erzielt, daß aus dem Intervall (α, β) eine beliebig enge endliche Umgebung des Unstetigkeitspunktes ausgeschieden wird.

Sind $f(x), g(x)$ zwei in dem Intervall (α, β) stetige Funktionen, so sind auch die Funktionen $f(x) + g(x), f(x) - g(x)$ und $f(x)g(x)$ in demselben Intervall stetig, wie sich mit Hilfe der unter 17 2) angegebenen analytischen Definition der Stetigkeit ohne Mühe und nicht bloß für zwei, sondern für jede endliche Anzahl von Funktionen erweisen läßt. Von der Funktion $\frac{f(x)}{g(x)}$ gilt dies jedoch nur dann, wenn im ganzen Intervall (α, β) $g(x) \neq 0$ ist; wird dagegen an einer oder an mehreren Stellen $g(x) = 0$, so ist an diesen die Funktion $\frac{f(x)}{g(x)}$ nicht definiert und muß ihr Verhalten in der Umgebung solcher Stellen näher untersucht werden.

19. Beispiele. Zur Erläuterung der Betrachtungen über die Stetigkeit oder Unstetigkeit der Funktionen mögen noch die folgenden Beispiele dienen.

1) Die Funktion $y = \sin x$ ist durchaus stetig; denn während (Fig. 5, wo der Kreis mit dem Halbmesser = Längeneinheit beschrieben ist) der Punkt M den Kreis von M_0 aus stetig durchläuft, die Variable x also das Kontinuum $(0, 2\pi)$ beschreibt, durchläuft der Punkt P oder der Wert von y die Kontinua $(0, 1), (1, -1), (-1, 0)$. Wegen der Periodizität zeigt die Funktion dasselbe Verhalten auf dem ganzen Bereich der unbeschränkten Variablen x . (Den analytischen Nachweis der gleichmäßigen Stetigkeit vgl. 17 2.)



Dasselbe gilt von der Funktion $y = \cos x$, welche die Kontinua $(1, -1), (-1, 1)$ beschreibt, während x das Intervall $(0, 2\pi)$ stetig durchläuft.

Die übrigen trigonometrischen Funktionen

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x},$$

da sie sich aus den vorgenannten mittels der Division bilden

lassen, sind überall dort nicht definiert, wo der jeweilige Nenner Null wird, und besitzen daselbst Unendlichkeitspunkte von der unter 18 4) beschriebenen Art. So ist $\operatorname{tg} x$ an den Stellen $(2n+1) \frac{\pi}{2}$ nicht definiert (n kann jede positive und negative ganze Zahl mit Einschluß der Null bedeuten), und es ist beispielsweise

$$\lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} \operatorname{tg} x = +\infty, \quad \lim_{x=\frac{\pi}{2}+0} \operatorname{tg} x = -\infty.$$

2) Die Funktion $y = \frac{\sin x}{x}$ setzt sich aus zwei durchaus stetigen Funktionen durch Division zusammen, ist daher auch durchgehends stetig mit vorläufigem Ausschluß der Stelle $x=0$, an welcher sie nicht definiert ist; da jedoch $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, so kann auch diese Stelle in den Stetigkeitsbereich einbezogen werden, wenn man dort der Funktion den Wert 1 beilegt.

3) Die Funktion $y = \frac{1}{1+a^x}$ ($a > 0$) ist für alle Werte

definiert und stetig, ausgenommen den Wert $x=0$; nun ist nach 15 5)

$$\begin{array}{ll} \text{für } a < 1 & \lim_{x \rightarrow -0} y = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +0} y = 1, \\ \text{für } a > 1 & \lim_{x \rightarrow -0} y = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +0} y = 0; \end{array}$$

in beiden Fällen weist also die Funktion an der Stelle $x=0$ eine Unstetigkeit von der in 18 2) beschriebenen Art auf.

4) Zuzufolge 15 5) ist für die Funktion $y = a^{\frac{1}{x-a}}$ ($a > 0$) der Punkt $x=a$ ein Unstetigkeitspunkt von der Art 18 3), für die Funktion $y = a^{\frac{1}{(x-a)^2}}$ derselbe Punkt ein Unstetigkeitspunkt von der Art 18 4).

5) Die Funktion $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ ist für $x=0$ nicht definiert, hat aber an dieser Stelle auch keinen Grenzwert; denn da der $\sin \frac{1}{x}$ bei beständig gegen Null konvergierendem x nie-

mals aufhört, zwischen -1 und $+1$ zu schwanken, schwankt $f(x)$ zwischen $-\frac{1}{x}$ und $\frac{1}{x}$, das dem Betrage nach beliebig groß wird; weil aber immer wieder der Wert 0 eintritt, kann auch von einem Grenzwert ∞ nicht die Rede sein.

6) Läßt man das Limes-Zeichen auch in der Definition einer Funktion zu, so ist $f(x) = \lim_{n=\infty} \frac{1}{1+x^{2n}}$ ($n = 1, 2, \dots$) eine eigenartige Funktion; ihr Wert ist, solange $|x| > 1$, beständig 0 , und beständig 1 , so lange $|x| < 1$; ferner hat man $f(-1) = f(1) = \frac{1}{2}$. Wenn also x wachsend die Stelle -1 durchschreitet, so springt der Funktionswert von 0 auf $\frac{1}{2}$ und gleich darnach auf 1 , um bei den Durchschreiten der Stelle $+1$ die umgekehrte Wandlung durchzumachen.

Zweiter Abschnitt.

Differentiation von Funktionen einer Variablen.

§ 1. Der Differentialquotient und das Differential.

20. Begriff des Differentialquotienten. Bei der Feststellung des Verlaufes einer gegebenen Funktion ist eine der ersten Fragen auf die Änderung gerichtet, welche der Wert der Funktion bei einer Änderung des Wertes der Variablen erfährt.

Es sei $f(x)$ eine in dem Intervalle (α, β) definierte *stetige* Funktion der (stetigen) Variablen x ; unter x sei zunächst ein Wert innerhalb des Bereichs (α, β) verstanden. Bei dem Übergange von x zu $x + h$, welcher letzterer Wert ebenfalls dem Bereich angehören soll, oder bei der Änderung

$$\Delta x = h$$

der Variablen geht der Wert der Funktion von $f(x)$ in $f(x + h)$ über und erfährt die Änderung

$$\Delta f(x) = f(x + h) - f(x).$$

Die *Stärke der Änderung der Funktion* bei dem beschriebenen Übergange wird um so größer sein, je größer bei einem festgesetzten Δx das $\Delta f(x)$ ausfällt, und je kleiner bei einem festgesetzten $\Delta f(x)$ das zugehörige Δx sich ergibt; ein Maß dafür wird daher in dem Quotienten

$$(1) \quad \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

zu erblicken sein. Da die Größen Δx , $\Delta f(x)$ Differenzen zweier Werte der Variablen und der zugehörigen Werte der Funktion sind, nennt man sie auch *Differenz der Variablen*, beziehungsweise *Differenz der Funktion* und den Quotienten (1) den *Differenzenquotienten* der Funktion.

Der Differenzenquotient erfordert zu seiner Bildung zwei Stellen aus dem Bereich der Funktion; läßt man die zweite Stelle $x + h$ unaufhörlich der ersten, h also dem Grenzwerte Null sich nähern, so nähert sich vermöge der Stetigkeit von $f(x)$ auch der Zähler der Grenze Null; man hat es dann mit dem Quotienten zweier unendlich klein werdenden Größen zu tun, welcher je nach der Ordnung dieser Größen entweder einer bestimmten von Null verschiedenen Grenze, oder der Grenze 0, oder der Grenze ∞ (mit bestimmtem oder unbestimmtem Vorzeichen) zustrebt oder auch unbestimmt bleibt. In den drei erstgedachten Fällen, wo ein Grenzwert im (weitesten Sinne des Wortes) existiert, nennt man diesen Grenzwert den *Differentialquotienten*, die *Ableitung* oder die *Derivierte* der Funktion $f(x)$ an der Stelle x ; er ist ein Maß für die *Stärke der Änderung der Funktion an dieser Stelle*.

Es sind jedoch drei verschiedene Arten des Grenzüberganges von h zu unterscheiden, nämlich

- I. $\lim h = +0$
- II. $\lim h = -0$
- III. $\lim h = \mp 0$.

Der Grenzwert, der bei dem Grenzübergange I. zustande kommt, wird der *rechte* Differentialquotient genannt; sein Wert sei X' ; der aus dem Grenzübergange II. resultierende heißt der *linke* Differentialquotient; sein Wert sei X'' . Ist nun $X' \neq X''$, so müssen diese beiden Differentialquotienten wohl voneinander unterschieden werden und der Grenzübergang III. wird illusorisch. Dieser Fall gehört jedoch zu den Ausnahmen; die Regel ist vielmehr, daß $X' = X''$; dann aber brauchen die beiden Grenzübergänge I. und II. nicht voneinander unterschieden zu werden; an ihre Stelle tritt der Grenzübergang III. und der durch denselben gewonnene Grenzwert X soll *vollständiger oder eigentlicher Differentialquotient* oder Differentialquotient schlechtweg genannt werden.

In der Folge wird also, wenn von dem Differentialquotienten einer Funktion an einer Stelle ihres Bereiches gesprochen wird, immer der durch den Grenzübergang III. gewonnene, also

$$(2) \quad \lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

gemeint sein.

Hiernach ist unter dem Differentialquotienten einer Funktion $f(x)$ an einer Stelle x der Grenzwert zu verstehen, gegen welchen der an dieser Stelle gebildete Differenzenquotient konvergiert, wenn die Änderung h der Variablen durch positive wie durch negative Werte der Grenze Null sich nähert.

Ist der Bereich der Variablen ein beschränkter, also ein endliches Intervall (α, β) , so kann an den Enden des Intervalls selbstverständlich nur von einseitigen Differentialquotienten die Rede sein, und zwar kann, wenn $\alpha < \beta$, für $x = \alpha$ nur der Grenzübergang I., für $x = \beta$ der Grenzübergang II. zur Anwendung kommen.

Es ist oben bemerkt worden, der Differentialquotient an einer Stelle x sei ein Maß für die Stärke der Änderung der Funktion daselbst; diese Ausdrucksweise wird erst dann völlig verständlich, wenn eine *Einheit* für das Maß angenommen ist; diese Einheit sei die Stärke der Änderung der Variablen selbst.

Ist nämlich $f(x) = x$, so ist der Differenzenquotient $\frac{x+h-x}{h} = 1$ und folglich auch der Differentialquotient von x an jeder Stelle x gleich 1. An einer Stelle also, wo der Differentialquotient von $f(x)$ größer ist als die Einheit, ändert sich die Funktion stärker als die Variable, an einer Stelle, wo er kleiner als 1 ist, ändert sie sich schwächer als die Variable; dabei kommt zunächst nur der absolute Wert des Differentialquotienten in Betracht.

21. Abgeleitete Funktion. Wenn für die Funktion $f(x)$ an jeder Stelle x des Bereiches (α, β) der Grenzwert (2) vorhanden ist, mit andern Worten, wenn sie an jeder Stelle einen Differentialquotienten besitzt, so ist hiermit eine *neue Funktion* für denselben Bereich von x definiert; man nennt sie die *abgeleitete* oder *derivierte Funktion* oder kurz die *Ableitung von $f(x)$* , aber auch — im übertragenen Sinne — den *Differentialquotienten von $f(x)$* und gebraucht dafür, je nachdem es in dem betreffenden Falle vorteilhafter ist, eines der Zeichen*)

*) Die drei Bezeichnungen stammen der Reihe nach von Leibniz

$$\frac{df(x)}{dx}, \quad f'(x), \quad D_x f(x)$$

oder kürzer, indem $f(x) = y$ gesetzt wird,

$$\frac{dy}{dx}, \quad y', \quad D_x y.$$

Die analytische Bedeutung dieser neuen Funktion ist also durch die Gleichung

$$(3) \quad \frac{df(x)}{dx} \equiv f'(x) \equiv D_x f(x) = \lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

gegeben, wenn der Grenzübergang bei unbestimmt gelassenem x ausgeführt wird.

Im allgemeinen gehören zu verschiedenen Werten von x auch verschiedene Werte von $f'(x)$; es gibt jedoch einen — und nur diesen einzigen — Fall, wo zu allen Werten von x derselbe Wert von $f'(x)$ gehört, die Funktion an allen Stellen sich gleich stark ändert; es ist dies die *rationale ganze Funktion ersten Grades* $f(x) = ax + b$; denn für sie ist der Differenzenquotient $\frac{a(x+h) + b - (ax + b)}{h} = a$, unabhängig von x , also auch

$$D_x(ax + b) = a;$$

das geometrische Bild dieser Funktion — eine Gerade — spricht dies in vollster Deutlichkeit aus.

Setzt man in der letzten Formel $a = 0$, so sagt sie, daß

$$(4) \quad D_x b = 0;$$

daß also *der Differentialquotient einer konstanten Funktion oder einer Konstanten kursweg Null ist*; mit $a = 1$ und $b = 0$ ergibt sich das oben schon gefundene Resultat

$$(5) \quad D_x x = 1,$$

daß *der Differentialquotient der Variablen x selbst die Einheit ist*.

Die Existenz eines endlichen Differentialquotienten an einer Stelle x setzt die Stetigkeit der Funktion in der Umgebung dieser Stelle notwendig voraus; denn der Quotient (1) kann bei gegen Null konvergierendem h nicht anders einem endlichen Grenzwerte sich nähern, als daß auch sein Zähler gegen Null

(in einem Manuskript von 1676), Lagrange (Théorie des fonctions analytiques 1797) und Arbogast (Calcul des Dérivations 1800).

abnimmt, und dies findet nur im Falle der Stetigkeit in der (übrigens beliebig engen) Umgebung von x statt. Dagegen ist diese Stetigkeit kein zureichendes Merkmal dafür, daß an der Stelle x ein Differentialquotient existiert. Als Beispiel diene die Funktion $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, die für alle Werte von x definiert ist mit Ausnahme von $x = 0$; sie verhält sich aber auch an dieser Stelle wie eine stetige Funktion, wenn man $f(0) = 0$ festsetzt, weil $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ist [18, 1]. Der Grenzwert des

Differenzenquotienten an der Stelle $x = 0$ ist aber

$$\lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{h \sin \frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow \pm 0} \sin \frac{1}{h},$$

also völlig unbestimmt [18, 5]; daher existiert an dieser Stelle kein Differentialquotient.

Es ist gelungen, Funktionen analytisch zu definieren, welche trotz ihrer Stetigkeit an unzählig vielen, ja selbst an allen Stellen keinen Differentialquotienten zulassen. Indessen genüge hier die bloße Anführung dieser Tatsache.*)

22. Phoronomische und geometrische Bedeutung des Differentialquotienten. Sobald man das Gebiet der Anwendungen der Analysis betritt, sind x und $f(x)$ die Maßzahlen für irgend welche voneinander abhängige Größen und je nach der Bedeutung dieser letzteren erlangt auch der Differentialquotient verschiedene sachliche Bedeutung. An dieser Stelle sollen jene zwei Fälle besprochen werden, von welchen die Differentialrechnung ihren Ausgang genommen und die für zwei große Gebiete von grundlegender Bedeutung sind: für die *Phoronomie****) und die *Geometrie*.

1) Es sei x die von einem bestimmten Augenblicke an verflossene Zeit, welche ein in gerader Linie sich bewegendes Punkt gebraucht hat, um den Weg $f(x)$ zurückzulegen; dann ist $f(x + h)$ der in der Zeit $x + h$ vollendete, somit

*) Literaturangaben über derartige Funktionen findet man in E. Pascals Repertorium der höheren Mathematik, deutsch von A. Schepp, I. T., S. 110—111, Leipzig 1900.

**) Reine Bewegungslehre, die die Bewegungsvorgänge nur nach Raum und Zeit betrachtet.

$f(x+h) - f(x)$ der in dem Zeitintervall $(x, x+h)$ zurückgelegte Weg. Wäre die Bewegung eine *gleichmäßige*, d. h. eine solche, bei welcher in beliebig großen, jedoch gleichen Zeitabschnitten gleiche Wege zurückgelegt werden, so stellte der Quotient

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

die *Geschwindigkeit*, d. i. den in einer von den Zeiteinheiten, in welchen x und h ausgedrückt sind, beschriebenen Weg dar.

Auf eine *ungleichmäßige* Bewegung läßt sich dieser Begriff der Geschwindigkeit nicht unmittelbar übertragen; der angeschriebene Quotient bedeutet nunmehr die während des Zeitintervalls $(x, x+h)$ auf die Zeiteinheit *durchschnittlich* entfallende Weglänge; je kürzer das Zeitintervall, um so geringer die Ungleichmäßigkeit der Bewegung während desselben, um so näher entspricht die Bedeutung jenes Quotienten der einer Geschwindigkeit; und nähert sich der Quotient bei stetig gegen Null abnehmendem h einem Grenzwert, so wird dieser Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

als die im *Augenblicke* x herrschende *Geschwindigkeit* erklärt.

Wenn also $f(x)$ den bei geradliniger Bewegung in der Zeit x zurückgelegten Weg ausdrückt, so hat der Differentialquotient $f'(x)$ die Bedeutung der im letzten Augenblicke dieser Zeit herrschenden Geschwindigkeit.

Mit Hilfe des Bewegungsbegriffes kann dem Differentialquotienten eine bemerkenswerte Deutung gegeben werden. Stellt man sich vor, die Variable x durchlaufe ihr Intervall (α, β) gleichmäßig, so durchläuft die Funktion ihren Bereich im allgemeinen ungleichmäßig; bis zu dem Zeitpunkte, in welchem die Variable den Wert x , die Funktion den zugeordneten Wert $f(x)$ angenommen, sei die Zeit t verflossen, und in dem weiteren Zeitintervall τ mögen die Werte $x+h$ und $f(x+h)$ zustande kommen; dann ist $\frac{h}{\tau} = c$ die Geschwindigkeit, mit welcher x sein Intervall durchläuft und der Grenzwert von $\frac{f(x+h) - f(x)}{\tau}$ für $\lim \tau = 0$ die Geschwindigkeit, mit welcher sich $f(x)$ im


letzten Augenblicke der Zeit t in seinem Bereich bewegt; da nun

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{\frac{f(x+h)-f(x)}{\tau}}{\frac{\tau}{h}} = \frac{f(x+h)-f(x)}{c}$$

und h mit τ zugleich gegen die Null konvergiert, so ist der Differentialquotient das Verhältnis der Geschwindigkeiten, mit welchen x und $f(x)$ sich im gegebenen Augenblicke in ihren Gebieten bewegen. Man kann somit den Satz aufstellen: *Der Differentialquotient einer Funktion $f(x)$ an einer Stelle x ist die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Funktion an dieser Stelle ändert, wenn die Variable x sich gleichmäßig mit der Geschwindigkeit 1 ändert**.

2) Man betrachte x als Abszisse und $f(x) = y$ als Ordinate eines Punktes M in einem rechtwinkligen Koordinatensystem; dann beschreibt M , während x das Intervall (α, β) stetig durchläuft, eine Kurve AB (Fig. 6). Die den Abszissen $OP = x$

Fig. 6.



und $OP' = x + h$ entsprechenden Punkte M, M' besitzen die Ordinaten $PM = f(x)$ und $P'M' = f(x+h)$ und bestimmen eine Sekante, deren Richtung durch den Winkel $QMS = \varphi$ festgelegt werden möge; dann ist

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \operatorname{tg} \varphi.$$

Konvergiert h gegen die Grenze Null, so nähert sich M' längs der Kurve dem Punkte M , und die Gerade MS dreht sich um den Punkt M . Die Aussage, der Differenzenquotient konvergiere dabei gegen einen bestimmten Grenzwert, ist gleichbedeutend mit der Aussage, die Sekante nähere sich einer

*) Von Betrachtungen solcher Art ist Newton bei Begründung der Infinitesimalrechnung (erste Publikation 1687 in den *Philosophiae naturalis principia mathematica*) ausgegangen; an die Vorstellung des Verfließens der Zeit anknüpfend nannte er die Variablen *Fluents* und die Änderungsgeschwindigkeiten *Fluxionen*, die Infinitesimalrechnung *Fluxionskalkül*. Newtons Bezeichnung für den Differentialquotienten der Funktion $y = f(x)$ ist $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ und erklärt sich aus der obigen Darlegung.

Grenzlage; diese Grenzlage MT nennt man die *berührende Gerade* oder die *Tangente* an die Kurve im Punkte M ; wird ihre Richtung durch den Winkel $QMT = \alpha$ bestimmt, so ist

$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \operatorname{tg} \alpha.$$

Ist also $y = f(x)$ die auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem bezogene Gleichung einer Kurve, so hat der zu einem Werte x gehörige Differentialquotient $f'(x)$ die Bedeutung der trigonometrischen Tangente jenes Winkels, welchen die Tangente an die Kurve in dem zur Abszisse x gehörigen Punkte mit der positiven Richtung der Abszissenachse einschließt.*)

Die Existenz eines vollständigen Differentialquotienten an der Stelle x oder, was dasselbe bedeutet, die Übereinstimmung des vorwärts genommenen Differentialquotienten mit dem rückwärts genommenen hat die geometrische Bedeutung, daß sich die Sekanten, welche die Kurve rechts von M schneiden, derselben Grenzlage nähern wie die links von M schneidenden, daß also die Kurve im Punkte M nur eine Tangente besitzt.

Auf die eben ausgeführte Betrachtung gründet sich die Aussage, eine Tangente habe mit der Kurve zwei vereinigte Punkte, welche zusammen den *Berührungspunkt* ausmachen, gemein.

23. Begriff des Differentials. Der begriffliche Inhalt der Gleichung

$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x),$$

welche den Differentialquotienten von $f(x)$ an der Stelle x definiert, ist der, daß die Differenz

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x)$$

durch hinreichende Einschränkung von h unter einen beliebigen kleinen Betrag gebracht werden kann; bezeichnet man hier-

*) Das Problem der Tangentenbestimmung an eine ebene Kurve bildete bei Leibniz den Ausgangspunkt für die Erfindung der Differentialrechnung (erste Publikation 1684 in den Leipziger *Acta eruditorum*; der Titel der kurzen Notiz enthält in seinen ersten Worten: *Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus* . . . den Hinweis auf den Grundgedanken), der er auch den Namen gegeben.

nach diese von x und h zugleich abhängige Differenz mit ε , so ist ε eine mit h zugleich unendlich klein werdende Größe und

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \varepsilon h,$$

oder in andern, früher eingeführten Zeichen geschrieben:

$$(6) \quad \Delta f(x) = f'(x)\Delta x + \varepsilon \cdot \Delta x.$$

Von den beiden Teilen der rechten Seite wird der zweite unendlich klein von höherer Ordnung als der erste, sobald $f'(x)$ einen bestimmten von Null verschiedenen Wert hat, da

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\varepsilon \cdot \Delta x}{f'(x)\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\varepsilon}{f'(x)} = 0;$$

das erste Glied ist also der Hauptteil der Änderung $\Delta f(x)$ und wurde von Leibniz unter dem Namen *Differential* der Funktion eingeführt und mit $df(x)$ bezeichnet. Danach ist zunächst

$$(7) \quad df(x) = f'(x)\Delta x;$$

wendet man diese Gleichung auf die Funktion $f(x) = x$ an, so folgt

$$(8) \quad dx = \Delta x,$$

so daß für diese Funktion die Begriffe „Änderung“ und „Differential“ einander decken, wie ja für sie auch Differenzenquotient und Differentialquotient übereinstimmen; nach dieser Bemerkung kann

$$(9) \quad df(x) = f'(x)dx$$

geschrieben werden.

Formell ist also das Differential $df(x)$ einer Funktion das Produkt aus ihrem Differentialquotienten und dem Differential der Variablen; begrifflich stellt es eine Größe dar, deren Unterschied gegen die Änderung $\Delta f(x)$ der Funktion durch gehörige Einschränkung von dx im Verhältnis zu letzterer Größe dem Betrage nach beliebig klein gemacht werden kann, indem zufolge (6), (7) und (8)

$$\lim_{dx \rightarrow +0} \frac{\Delta f(x) - df(x)}{dx} = 0.$$

Aus der Definitionsgleichung (9) folgt:

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx};$$

dies hat zunächst den Sinn, daß $f'(x)$ der Grenzwert von $\frac{df(x)}{dx}$

bei gegen Null konvergierendem Δx (und $\Delta f(x)$) ist. Auf dieser Darstellung von $f'(x)$ beruht der Name „Differentialquotient“ (Quotient aus dem Differential der Funktion durch das Differential der Variablen) und die von Leibniz dafür eingeführte Bezeichnung $\frac{df(x)}{dx}$.

Aus der Gleichung (9) erklärt sich auch die für den Differentialquotienten von Lacroix*) eingeführte Bezeichnung „Differentialkoeffizient“ (= Koeffizient des Differentials dx), die heute noch in englischen Schriften üblich ist.

Die Bestimmung des Differentialquotienten einer Funktion und die ihres Differentials laufen hiernach im Wesen auf dasselbe hinaus; indessen ist ersteres die primäre Aufgabe, ihre Durchführung wird als *Differentiation der Funktion* bezeichnet.

In den beiden Fällen von 22 hat das Differential folgende Bedeutung.

Ist $f(x)$ der in der Zeit x zurückgelegte Weg, also $f'(x)$ die im letzten Augenblicke dieser Zeit herrschende Geschwindigkeit, so stellt das Differential $df(x) = f'(x)dx$ den in dem Zeitintervall $(x, x + dx)$ beschriebenen Weg um so genauer dar, je kleiner dx , und es läßt sich dx so klein wählen, daß der Unterschied zwischen dem wirklich zurückgelegten Weg $\Delta f(x)$ und diesem $df(x)$ im Verhältnis zu dx dem Betrage nach beliebig klein wird.

Wird $f(x)$ in den Ordinaten einer Kurve zur Darstellung gebracht, so ist $df(x) = f'(x) \cdot dx = dx \cdot \operatorname{tg} \alpha = QR$ (Fig. 6) die Änderung, welche die *Ordinate der Tangente* bei dem Übergange von x zu $x + dx$ erfährt; dies unterscheidet sich von der Änderung der *Ordinate der Kurve*, von $\Delta f(x) = QM'$, um so weniger, je kleiner dx , und wieder kann dx so eingeschränkt werden, daß das Verhältnis $\frac{\Delta f(x) - df(x)}{dx} = \frac{RM'}{MQ}$ dem Betrage nach beliebig klein wird.

§ 2. Allgemeine Sätze über Differentiation.

24. Differentiation eines Aggregats. Sind $f(x)$, $g(x)$ zwei in dem Intervall (α, β) stetige Funktionen, welche an

*) *Traité du Calcul Différentiel et du Calcul Intégral*, I. Band (1810), p. 240.

jeder Stelle dieses Intervalls einen Differentialquotienten besitzen, so haben auch die Aggregate

$$f(x) \pm g(x)$$

an jeder Stelle einen Differentialquotienten; denn der Differenzenquotient

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+h) \pm g(x+h) - \{f(x) \pm g(x)\}}{h} = \\ & = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \pm \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \end{aligned}$$

konvergiert unter den obigen Voraussetzungen mit gegen Null abnehmendem h gegen eine bestimmte Grenze, und es ist*)

$$(1) \quad D[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x).$$

Die Formel kann leicht auf Aggregate aus einer beliebigen endlichen Anzahl von Bestandteilen ausgedehnt werden und gibt den Satz: *Der Differentialquotient eines Aggregats ist das aus den Differentialquotienten der Bestandteile analog gebildete Aggregat.*

Ist die Funktion $g(x)$ konstant $= c$, so ist ihr Differentialquotient Null und Formel (1) gibt

$$(2) \quad D[f(x) \pm c] = f'(x).$$

Hiernach *verschwindet ein konstanter Summand beim Differenzieren*, mit anderen Worten: *Zwei Funktionen, welche sich nur um eine additive Konstante voneinander unterscheiden, stimmen im Differentialquotienten überein.*

25. Differentiation eines Produkts. Wenn jede der beiden in dem Intervalle (α, β) stetigen Funktionen $f_1(x), f_2(x)$ an jeder Stelle des Intervalls einen Differentialquotienten besitzt, so gilt das gleiche für ihr Produkt $f_1(x)f_2(x)$; denn der auf dieses Produkt bezügliche Differenzenquotient läßt folgende Umformung zu:

$$\begin{aligned} & \frac{f_1(x+h)f_2(x+h) - f_1(x)f_2(x)}{h} \\ & = \frac{f_1(x+h)f_2(x+h) - f_1(x)f_2(x+h) + f_1(x)f_2(x+h) - f_1(x)f_2(x)}{h} \\ & = \frac{f_1(x+h) - f_1(x)}{h} f_2(x+h) + f_1(x) \frac{f_2(x+h) - f_2(x)}{h}; \end{aligned}$$

*) Aus Gründen einfacherer Darstellung wird links D für D_x geschrieben und rechts von einer anderen Bezeichnung für die Ableitung Gebrauch gemacht.

bei gegen Null abnehmendem h ergibt sich auf Grund der gemachten Voraussetzungen folgende Regel:

$$(3) \quad D[f_1(x)f_2(x)] = f_1'(x)f_2(x) + f_1(x)f_2'(x).$$

Kommt zu dem Produkt noch ein dritter Faktor $f_3(x)$ hinzu, welcher dieselben Bedingungen erfüllt wie die beiden ersten, so ist zunächst

$$D[\{f_1(x)f_2(x)\}f_3(x)] = f_3(x) \cdot D\{f_1(x)f_2(x)\} \\ + f_1(x)f_2(x)f_3'(x)$$

und wenn man im ersten Gliede rechts aus (3) substituiert,

$$(4) \quad D_x\{f_1(x)f_2(x)f_3(x)\} = f_1'(x)f_2(x)f_3(x) + f_1(x)f_2'(x)f_3(x) \\ + f_1(x)f_2(x)f_3'(x).$$

Die Formel läßt sich auf dem angedeuteten Wege auf jede beliebige Anzahl von Faktoren ausdehnen und enthält den Satz: *Der Differentialquotient eines Produktes von n Funktionen wird gebildet, indem man jedesmal nur einen Faktor durch seinen Differentialquotienten ersetzt und alle so gebildeten n Produkte zu einer Summe vereinigt.*

Wenn in der Formel (3) die Funktion $f_2(x)$ konstant $= c$ angenommen wird, so ist $f_2'(x) = 0$ und die Formel verwandelt sich in

$$(5) \quad D\{cf_1(x)\} = cf_1'(x).$$

Hiernach geht ein konstanter Faktor unverändert als Faktor in den Differentialquotienten über.

Wird die Formel (4) auf n Funktionen $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ ausgedehnt und sodann durch das Produkt der Funktionen selbst dividiert, was nur dann gestattet ist, wenn dieses Produkt an der betreffenden Stelle x nicht verschwindet, so ergibt sich die Formel:

$$(6) \quad \frac{D\{f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)\}}{f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)} = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \frac{f_2'(x)}{f_2(x)} + \dots + \frac{f_n'(x)}{f_n(x)};$$

aus ihr folgt, wenn alle Faktoren $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ ein und dieselbe Funktion $f(x)$ bedeuten, die weitere Formel

$$\frac{D\{f(x)\}^n}{\{f(x)\}^n} = n \frac{f'(x)}{f(x)},$$

aus der nach Beseitigung der Nenner folgt:

$$(7) \quad D\{f(x)\}^n = n\{f(x)\}^{n-1}f'(x).$$

Ist $f(x) = x$, so gibt dies wegen $D_x x = 1$

$$(8) \quad Dx^n = nx^{n-1}.$$

Hierdurch erscheint der Differentialquotient einer Potenz der Variablen bestimmt, zunächst jedoch nur für den Fall eines positiven ganzen Exponenten.

26. Differentiation eines Quotienten. Der Quotient $\frac{f(x)}{g(x)}$ zweier in dem Intervalle (α, β) stetigen Funktionen ist unter der Voraussetzung, daß im ganzen Intervalle mit Einschluß seiner Grenzen $g(x) \neq 0$, ebenfalls eine stetige Funktion und besitzt überall einen Differentialquotienten, wenn dies für die Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ gilt. Würde jedoch an einer oder an mehreren Stellen des Intervalls $g(x) = 0$, so hört dort die gebrochene Funktion auf definiert und im allgemeinen auch stetig zu sein; die folgende Entwicklung gilt also mit Ausschluß solcher singulären Stellen.

Mit dem Differenzenquotienten von $\frac{f(x)}{g(x)}$ kann nachstehende Transformation ausgeführt werden:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+h)}{h g(x)g(x+h)} \\ &= \frac{\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{g(x)g(x+h)}; \end{aligned}$$

bei dem Übergange von h gegen die Grenze Null ergibt sich hieraus

$$(9) \quad D \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}.$$

Es ist also der Differentialquotient eines Quotienten gleich dem Produkte des Nenners mit dem Differentialquotienten des Zählers, vermindert um das Produkt des Zählers mit dem Differentialquotienten des Nenners, die Differenz durch das Quadrat des Nenners dividiert.

Eine erhebliche Vereinfachung erfährt die Formel, wenn die Zählerfunktion $f(x)$ konstant $= c$ ist: alsdann ist

$$(10) \quad D \frac{c}{g(x)} = - \frac{c g'(x)}{\{g(x)\}^2}.$$

Setzt man hier $c = 1$ und $g(x) = x^n$, wobei unter n eine positive ganze Zahl verstanden werden soll, so ist, weil $Dx^n = nx^{n-1}$,

$$(11) \quad Dx^{-n} = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1},$$

wodurch die Gültigkeit der Formel (8) auch für *negative ganze Exponenten* erwiesen ist.

27. Differentiation inverser Funktionen. Ist (A, B) das Gebiet einer in dem Intervall (α, β) monotonen stetigen Funktion $y = f(x)$ von x , so gehört zu jedem Werte von y aus dem Intervall (A, B) ein und nur ein Wert von x , so daß zugleich x als Funktion von y bestimmt ist: $x = \varphi(y)$, und zwar ist x ebenfalls monoton und stetig; denn x und y durchlaufen ihre bezüglichen Intervalle (α, β) und (A, B) gleichzeitig stetig. Man bezeichnet $f(x)$ und $\varphi(y)$ als *inverse Funktionen* oder $\varphi(y)$ als die Umkehrung von $f(x)$ (12); zwischen ihren Differentialquotienten besteht eine einfache Beziehung.

Sind nämlich x, y und ebenso $x + \Delta x, y + \Delta y$ zusammengehörige Werte, so ist $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ der Differenzenquotient der Funktion $f(x)$, $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ der Differenzenquotient von $\varphi(y)$; diese beiden Differenzenquotienten sind reziprok und bleiben es, wie klein auch Δx und Δy werden mögen; folglich sind auch ihre Grenzwerte, falls solche vorhanden und bestimmte von Null verschiedene Werte sind, also die Differentialquotienten von $f(x)$ in bezug auf x und von $\varphi(y)$ in bezug auf y , reziprok, d. h.


$$(12) \quad D_x f(x) \cdot D_y \varphi(y) = 1.$$

Die Differentialquotienten zweier inversen Funktionen sind also für jedes Paar zusammengehöriger Werte der Variablen x, y reziprok.

Konvergiert $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ an einer Stelle x gegen die Grenze Null, so hat $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ den Grenzwert ∞ und umgekehrt; ist also an einer Stelle $x: f'(x) = 0$, so hat $\varphi(y)$ an der entsprechenden Stelle y einen unendlichen Differentialquotienten und umgekehrt.

Die Ergebnisse erlangen anschauliche Bedeutung, wenn man $y = f(x)$ als Gleichung einer Kurve (Fig. 7) auffaßt; dieselbe Kurve ist auch durch die Gleichung $x = \varphi(y)$ dargestellt

Fig. 7.



und der Unterschied beider Darstellungen liegt lediglich darin, daß das erstemal x , das zweitemal y als die unabhängige Veränderliche aufgefaßt wird*). Der Differentialquotient $D_x f(x)$ ist die trigonometrische Tangente des Winkels a , welchen die Tangente MT mit der positiven Richtung der Abszissenachse bildet, $D_y \varphi(y)$ die trigonometrische Tangente des Winkels b , welchen dieselbe Tangente mit der positiven Richtung der Ordinatenachse einschließt, und da $a + b = \frac{\pi}{2}$, so ist $\operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b = 1$; dies also ist der geometrische Inhalt der Formel (12). Wird in einem Punkte, wie E , $D_x f(x) = 0$, so ist dort die Tangente parallel zur Abszissenachse, also normal zur Ordinatenachse, folglich $D_y \varphi(y) = \infty$ an dieser Stelle; und wird, wie in F , $D_x f(x) = \infty$, so ist die Tangente normal zur Abszissenachse, also parallel zur Ordinatenachse, daher $D_y \varphi(y) = 0$ an dieser Stelle.

Wendet man die Formel (12) auf den Fall $y = x^{\frac{1}{m}}$, $x = y^m$ an, wo unter m eine positive ganze Zahl, unter $x^{\frac{1}{m}}$ der positive reelle Wert von $\sqrt[m]{x}$ verstanden wird und x auf positive Werte beschränkt bleiben muß, wenn m eine gerade Zahl ist, so findet sich mit Benutzung von (8) nach Formel (12)

$$D x^{\frac{1}{m}} \cdot m y^{m-1} = 1,$$

woraus

$$D x^{\frac{1}{m}} = \frac{1}{m y^{m-1}} = \frac{1}{m x^{\frac{m-1}{m}}} = \frac{1}{m} x^{\frac{1}{m}-1};$$

*) Will man bei der umgekehrten Funktion $x = \varphi(y)$ die unabhängige Variable wieder x , die abhängige y nennen und sie hiernach in demselben Koordinatensystem darstellen, so hat man die Bildkurve EF an der Halbierungslinie des Winkels XOY zu spiegeln; die neue Kurve gehört zur Gleichung $y = \varphi(x)$.

und trägt man nun in die Formel (7) $f(x) = x^{\frac{1}{m}}$ ein, so kommt

$$(13) \quad Dx^{\frac{n}{m}} = nx^{\frac{n}{m}-1} \cdot \frac{1}{m} x^{\frac{1}{m}-1} = \frac{n}{m} x^{\frac{n}{m}-1};$$

dadurch ist die Gültigkeit der Formel (8) für *positive gebrochene* Exponenten dargetan. Wird schließlich in der Formel (10)

$c = 1$ und $g(x) = x^{\frac{n}{m}}$ gesetzt, so ergibt sich mit Benutzung von (13)

$$(14) \quad Dx^{-\frac{n}{m}} = -\frac{\frac{n}{m} x^{\frac{n}{m}-1}}{x^{\frac{n}{m}}} = -\frac{n}{m} x^{-\frac{n}{m}-1}$$

und Formel (8) ist nun auch auf *negative gebrochene* Exponenten erweitert. Sie gilt also für jeden rationalen Exponenten.

28. Differentiation zusammengesetzter Funktionen. Es sei $u = \varphi(x)$ eine eindeutige stetige Funktion von x , $y = f(u)$ eine eindeutige stetige Funktion von u , so ist mittelbar y auch eine eindeutige stetige Funktion von x : $y = f[\varphi(x)]$; man nennt in solchem Falle y eine *zusammengesetzte Funktion* von x oder auch eine *Funktion von einer Funktion* von x .

Ein bestimmter Wert von x hat einen bestimmten Wert von u und dieser einen bestimmten Wert von y zur Folge, und besitzt $\varphi(x)$ an der Stelle x und $f(u)$ an der Stelle u einen Differentialquotienten, so hat auch $f[\varphi(x)]$ an der Stelle x einen Differentialquotienten. Geht man nämlich von x zu $x + \Delta x$ über, so erfahren auch u , y gewisse Änderungen Δu , Δy , und es ist

$\frac{\Delta u}{\Delta x}$ der Differenzenquotient von u in bezug auf x ,

$\frac{\Delta y}{\Delta u}$ " " " y " " " u ,

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ " " " y " " " x ;

zwischen diesen drei Differenzenquotienten besteht aber die Beziehung

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

und bleibt bestehen, wie klein auch Δx werden möge; somit besteht auch zwischen den Grenzwerten die Beziehung

$$(15) \quad D_x y = D_u y \cdot D_x u.$$

Ist $v = \psi(x)$, $u = \varphi(v)$, $y = f(u)$, y also durch zweifache Vermittlung eine Funktion von x , so ergibt sich durch ähnliche Schlüsse

$$(16) \quad D_x y = D_u y \cdot D_v u \cdot D_x v.$$

Um also eine Variable y , welche durch mehrfache eindeutige Vermittlung von u, v, w, \dots, z mit der Variablen x zusammenhängt, nach dieser letzteren zu differenzieren, bilde man der Reihe nach die Differentialquotienten von y nach u , von u nach v , von v nach w, \dots schließlich von z nach x , die alle als vorhanden vorausgesetzt werden; dann ist der Differentialquotient von y nach x gleich dem Produkte aller dieser Differentialquotienten.

Die Formel (7) erweist sich als ein besonderer Fall der Formel (15), wenn man $u = f(x)$ und $y = u^n$ setzt.

Nimmt man in (15) $u = ax + b$, $y = u^n$, wo n nun jede rationale Zahl bedeuten kann, so ist (21)

$$D_x(ax + b)^n = na(ax + b)^{n-1}.$$

§ 3. Differentialquotienten der elementaren Funktionen.

29. Die Potenz. Im Verlaufe des letzten Paragraphen wurde für die Differentiation der Potenz $y = x^n$ die bei jedem rationalen Exponenten n geltende Formel:

$$(1) \quad D_x x^n = nx^{n-1}$$

abgeleitet. Bei negativem n ist der Wert $x = 0$ als Unstetigkeitspunkt auszuschließen.

Diese Formel in Verbindung mit den Sätzen des vorigen Paragraphen setzt uns in den Stand, alle expliziten algebraischen Funktionen zu differenzieren.

1) Für die ganze Funktion

$$y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

hat man unmittelbar (24, (1), (2); 25, (5))

$$Dy = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \dots + a_{n-1};$$

es gibt hiernach eine ganze Funktion zum Differentialquotienten eine ebensolche Funktion von nächst niedrigerem Grade.

2) Die gebrochene Funktion

$$y = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m}$$

läßt Differentiation zu an allen Stellen, an welchen der Nenner nicht verschwindet, und zwar ist dann (26, (9))

$$Dy = \frac{A - B}{(b_0 x^m + \dots + b_m)^2},$$

wo

$$A = (b_0 x^m + \dots + b_m) (n a_0 x^{m-1} + \dots + a_{n-1})$$

$$B = (a_0 x^m + \dots + a_n) (m b_0 x^{m-1} + \dots + b_{m-1}).$$

Z. B. $y = \frac{x^4 - 1}{x^4 + 1}$ gibt für jeden Wert von x einen Differentialquotienten, weil der Nenner für keinen reellen Wert von x Null wird, und es ist

$$Dy = \frac{8x^3}{(x^4 + 1)^2};$$

dagegen wird $y = \frac{x^4 + 1}{x^4 - 1}$ unstetig an den Stellen $x = -1$ und $x = +1$, für welche die Definition ihre Geltung verliert; in den Intervallen $(-\infty, -1)$, $(-1, +1)$, $(+1, +\infty)$, mit Ausschluß der Grenzen, ist

$$Dy = -\frac{8x^3}{(x^4 - 1)^2}.$$

3) Die Differentiation einer Wurzel aus einer rationalen Funktion erledigt sich durch Verbindung von 28, (15) mit den vorangehenden Fällen. Ist z. B. $y = \sqrt{\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}}$, so beachte man zunächst, daß x auf das Intervall $(1, +\infty)$ beschränkt werden muß; davon ist der Anfangswert 1 auszuschließen als Unstetigkeitspunkt; setzt man $u = \frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}$, so ist

$$D_u y = \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad D_x u = -\frac{x^4 + 3x^2 + 2x}{(x^3 - 1)^2},$$

folglich

$$D_x y = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}} \cdot \frac{x^4 + 3x^2 + 2x}{(x^3 - 1)^2}.$$

30. Der Logarithmus. Der mit der Funktion $y = \log_a x$, wo $a > 0$ und $x > 0$ ist, gebildete Differenzenquotient ist

$$\frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \frac{1}{h} \log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right);$$

setzt man $\frac{h}{x} = \varepsilon$, so vollführt ε mit h zugleich den Grenzübergang zu ± 0 , somit ist

$$(A) \quad D_x \log_a x = \frac{1}{x} \log_a \left[\lim_{\varepsilon \rightarrow \pm 0} (1 + \varepsilon)^{\frac{1}{\varepsilon}} \right].$$

Die Existenz und endgültige Bestimmung des Differentialquotienten hängt also davon ab, ob sich der Ausdruck $(1 + \varepsilon)^{\frac{1}{\varepsilon}}$ bei gegen Null abnehmendem Betrage von ε einem bestimmten Grenzwerte nähert und welches dieser Grenzwert ist.

Wir lassen ε zunächst die Reihe der reziproken natürlichen Zahlen durchlaufen, betrachten also den Ausdruck

$$(B) \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

für ein beständig wachsendes positives ganzes n . Dann ist

$$(C) \quad \left\{ \begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + \frac{n}{1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \frac{1}{n^3} + \\ &\quad \dots + \frac{n(n-1) \dots 1}{1 \cdot 2 \dots n} \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + \frac{1}{1} + \frac{1 - \frac{1}{n}}{1 \cdot 2} + \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \\ &\quad \dots + \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)}{1 \cdot 2 \dots n}; \end{aligned} \right.$$

mit wachsendem n nimmt jedes Glied der rechten Seite vom dritten angefangen zu und es wächst die Anzahl der durchwegs positiven Glieder, somit wächst der Wert des Ausdruckes (B) mit zunehmendem n unaufhörlich, bleibt aber doch, wie groß auch n werden möge, schon von $n = 2$ angefangen kleiner als

$$(D) \quad 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} = a_n.$$

Die Zahl a_n selbst, die mit wachsendem n immer größer und größer wird, bleibt doch beständig kleiner als 3; denn es ist

Es sind auf diese Weise zwei unbegrenzt fortsetzbare Folgen rationaler Zahlen

$$(G) \quad \begin{cases} a_1, a_2, a_3, \dots \\ b_1, b_2, b_3, \dots \end{cases}$$

bestimmt derart, daß von $n = 2$ angefangen fortan der Wert von

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

zwischen den entsprechenden Gliedern a_n, b_n eingeschlossen ist, so daß

$$b_n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < a_n;$$

da aber die Differenz $a_n - b_n$ durch Wahl von n kleiner gemacht werden kann als eine beliebig kleine positive Zahl, indem zufolge (F) und (E)

$$a_n - b_n = \frac{a_n}{2^n} < \frac{3}{2^n},$$

so bestimmen die beiden Zahlenreihen (G) einen *Schnitt* (2); diesem Schnitte entspricht eine Zahl, welche mit e bezeichnet wird*), und diese Zahl ist der Grenzwert, welchem sich der Ausdruck (B) mit beständig wachsendem n nähert; es ist also

$$(H) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Zur Bestimmung dieser Zahl e ist jede der beiden Zahlenreihen (G) gleich geeignet; wir benutzen dazu die einfachere

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

d. i.

$$1 + \frac{1}{1}, \quad 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2}, \quad 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \dots$$

deren zehntes Glied bereits 7 festbleibende Dezimalstellen gibt, so daß auf so viele Stellen genau**)

$$e = 2,718\,281\,8 \dots$$

Es bleibt nur noch zu zeigen, daß der Grenzwert des Ausdrucks (B) die Zahl e ist, wie auch n ins Unendliche

*) Die Bezeichnung ist von *L. Euler* eingeführt und seit 1735 konsequent gebraucht worden. Zu allgemeiner Anerkennung gelangte sie erst später. *Laplace* benutzt beispielsweise noch den Buchstaben e .

**) Auf 18 Dezimalstellen abgekürzt, ist

$$e = 2,718\,281\,828\,459\,045\,235 \dots$$

wachsen möge. Zunächst trete an die Stelle von n die positive *stetige* Variable s ; ihr Wert wird, wenn er nicht eine ganze Zahl ist, zwischen zwei aufeinanderfolgende ganze Zahlen, n und $n + 1$, zu liegen kommen, so daß

$$n < s < n + 1;$$

daraus folgt, daß

$$1 + \frac{1}{n} > 1 + \frac{1}{s} > 1 + \frac{1}{n+1}$$

und in verstärktem Grade

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{s}\right)^s > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n;$$

der erste Teil dieser Relation $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ konvergiert laut (H) mit wachsendem n gegen die Grenze e , weil der zweite Faktor den Grenzwert 1 hat; der dritte Teil $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} : \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$ konvergiert ebenfalls gegen e , weil der Divisor die Grenze 1 hat; folglich konvergiert auch der eingeschlossene Teil gegen die nämliche Grenze und es ist

$$(J) \quad \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{s}\right)^s = e.$$

Beachtet man noch, daß $\left(1 - \frac{1}{s}\right)^{-s} = \left(\frac{s}{s-1}\right)^s = \left(1 + \frac{1}{s-1}\right)^s = \left(1 + \frac{1}{s-1}\right)^{s-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{s-1}\right)$, und läßt nun s gegen $+\infty$ konvergieren, so hat der erste Faktor rechts den Grenzwert e , der zweite den Grenzwert 1, so daß auch

$$(K) \quad \lim_{s \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{s}\right)^s = e$$

Daraus ergibt sich endlich, daß

$$\lim_{s \rightarrow \pm 0} \left(1 + s\right)^{\frac{1}{s}} = e$$

ist; die Formel (A) lautet demnach *endgültig*

$$(2) \quad D_x \log_a x = \frac{\log_a e}{x}.$$

Dasjenige Logarithmensystem, welchem die Zahl e als Basis zugrunde liegt, wird das *natürliche Logarithmensystem* genannt; es ist das in der reinen Analysis ausschließlich an-

gewendete, während sich das praktische Rechnen des *gemeinen Logarithmensystems* bedient, dessen Basis die Grundzahl unseres Zahlensystems, die Zahl 10, ist. Den natürlichen Logarithmus einer Zahl x werden wir mit lx , den gemeinen mit $\log x$ bezeichnen.*) Zwischen beiden besteht eine Beziehung, die sich folgendermaßen ergibt. Die Ansätze

$$lx = \alpha, \quad \log x = \beta$$

sind gleichbedeutend mit

$$e^\alpha = x, \quad 10^\beta = x;$$

logarithmiert man aber die Gleichung

$$e^\alpha = 10^\beta$$

im natürlichen System, so erhält man

$$\alpha = \beta l 10;$$

also ist

$$lx = l 10 \cdot \log x$$

und

$$\log x = \frac{1}{l 10} lx.$$

Man hat demnach die natürlichen Logarithmen mit $M = \frac{1}{l 10} = 0,434\,294\,481\,903 \dots$ zu multiplizieren, um sie in gemeine überzuführen, und gemeine Logarithmen mit $\frac{1}{M} = l 10 = 2,302\,585\,092\,994 \dots$ zu multiplizieren, um sie in natürlichen zu verwandeln; M heißt der *Modul* des gemeinen, $\frac{1}{M}$ der Modul des natürlichen Logarithmensystems.

Läßt man in der letzten Gleichung an die Stelle von 10 eine beliebige Basis a treten, so lautet sie $\log_a x = \frac{lx}{la}$ und gibt für $x = e$: $\log_a e = \frac{1}{la}$; hiernach kann die Gleichung (2) auch in der Form

$$(2^*) \quad D_x \log_a x = \frac{1}{x la}$$

geschrieben werden. Um den Differentialquotienten des natürlichen Logarithmus x zu erhalten, hat man a durch e zu ersetzen und bekommt so

$$(3) \quad Dlx = \frac{1}{x}.$$

*) Auch die Bezeichnungen lg und log sind hierfür gebräuchlich.

Die Formel (3) in Verbindung mit 28 gestattet, den Differentialquotienten des natürlichen Logarithmus einer jeden expliziten algebraischen Funktion zu bestimmen. Ist z. B.

$$y = l(x + \sqrt{1+x^2}),$$

so setze man $x + \sqrt{1+x^2} = u$, und hat nun

$$D_u y = \frac{1}{u}, \quad D_x u = 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{u}{\sqrt{1+x^2}},$$

folglich

$$D_x y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Hat man weiter den Differentialquotienten von

$$y = l \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

zu bilden, einer Funktion, welche für alle Werte von x mit Ausschluß von -1 und 1 definiert ist, setze man $u = \frac{1+x}{1-x}$, $v = \sqrt{u}$ und rechne wie folgt:

$$D_u y = \frac{1}{v}, \quad D_u v = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad D_x u = \frac{2}{(1-x)^2},$$

daher

$$D_x y = \frac{1-x}{1+x} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x^2}.$$

Sind y_1, y_2, \dots, y_n Funktionen von x , deren keine an der betrachteten Stelle x Null ist, so ist auch $y = y_1 y_2 \dots y_n$ nicht Null und

$$ly = ly_1 + ly_2 + \dots + ly_n;$$

durch Differentiation dieser Gleichung ergibt sich

$$\frac{Dy}{y} = \frac{y'_1}{y_1} + \frac{y'_2}{y_2} + \dots + \frac{y'_n}{y_n};$$

die rechte Seite wird der *logarithmische Differentialquotient des Produktes* y genannt; durch Multiplikation desselben mit y ergibt sich der eigentliche Differentialquotient dieses Produktes (25 (6)).

31. Die Exponentialfunktion. Ist a eine positive Zahl, so ist durch die positiven reellen Werte von a^x eine eindeutige stetige Funktion definiert, $y = a^x$, welche als *Exponentialfunktion* bezeichnet wird. Aus ihr folgt durch Umkehrung $x = \log_a y$. Dem Satze 27 zufolge ist also

$$D_x a^x D_y \log_a y = 1$$

und mit Benutzung von 30 (2*)

$$\frac{1}{y l a} \cdot D_x a^x = 1;$$

mithin ist der Differentialquotient der Exponentialfunktion

$$(4) \quad D a^x = a^x l a.$$

Diejenige Exponentialgröße, deren Basis die Zahl e , die Basis des natürlichen Logarithmensystems ist, führt den Namen *natürliche Potenz*; man findet ihren Differentialquotienten aus der Formel (4) dadurch, daß man $a = e$ setzt; mithin ist

$$(5) \quad D e^x = e^x.$$

Die natürliche Potenz hat also an jeder Stelle einen ihrem eigenen Werte gleichen Differentialquotienten.

Ist der Exponent einer Exponentialfunktion eine explizite algebraische Funktion von x , so kann die Differentiation auf

Grund des Satzes 28 ausgeführt werden. Ist z. B. $y = e^{x-a}$, so hat man mit Ausschluß der Stelle $x = a$

$$Dy = - \frac{1}{(x-a)^2} e^{\frac{1}{x-a}}.$$

Nun sind wir auch imstande, jede Funktion zu differenzieren, welche die Form einer Potenz hat und deren Basis und Exponent algebraische Funktionen von x sind. Sind nämlich u, v zwei algebraische Funktionen von x und $y = u^v$, so kann dies wegen $e^u = u$ auch in der Form $y = e^{v l u}$ dargestellt werden, mithin ist

$$Dy = e^{v l u} \left\{ v' l u + \frac{v u'}{u} \right\} = u^v \left\{ v' l u + \frac{v u'}{u} \right\}.$$

In dem einfachsten Falle $u = x, v = x$ ist also

$$Dx^x = x^x \{ l x + 1 \}.$$

32. Die trigonometrischen Funktionen. Die geometrische Definition läßt eine Eigenschaft dieser Funktionen erkennen, welche ihnen unter den elementaren allein zukommt: die *Periodizität*. Es ändern nämlich die Funktionen $\sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}$ ihren Wert nicht, wenn man das Argument um 2π vermehrt oder vermindert, sie haben die *Periode* oder den Periodizitätsmodul 2π ; ein analoges Verhalten zeigen die

Funktionen tg , cotg in bezug auf die Zahl π , sie besitzen die Periode π . Da nun periodische Funktionen an Stellen, welche um ein Vielfaches der Periode voneinander verschieden sind, in allen Stücken übereinstimmen, so werden sie dort auch gleiche Differentialquotienten aufweisen; die Ableitungen der trigonometrischen Funktionen sind somit notwendig periodische Funktionen mit der nämlichen Periode.

Vermöge der Beziehungen, welche zwischen den trigonometrischen Funktionen eines Bogens bestehen, genügt es, den Differenzenquotienten einer derselben zu bestimmen. Wir wählen als solche

$$y = \sin x.$$

Der Differenzenquotient ist

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}}{h} = \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}};$$

konvergiert nun h gegen die Grenze Null, so hat $\cos\left(x + \frac{h}{2}\right)$ wegen der Stetigkeit dieser Funktion den Grenzwert $\cos x$, $\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$ aber laut 16, 2) den Grenzwert 1; somit ist

$$(6) \quad D \sin x = \cos x.$$

Da ferner $y = \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ und -1 der Differentialquotient von $\frac{\pi}{2} - x$ ist, so folgt aus (6)

$$D \cos x = D \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right),$$

also

$$(7) \quad D \cos x = -\sin x.$$

Für $y = \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ und $y = \operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$ erhält man nun mit Hilfe der Formeln (6), (7) auf Grund von 26, (9)

$$D \operatorname{tg} x = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}, \quad D \operatorname{cotg} x = -\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x}$$

d. i.

$$(8) \quad D \operatorname{tg} x = \sec^2 x,$$

$$(9) \quad D \operatorname{cotg} x = -\operatorname{cosec}^2 x.$$

Diese Formeln gelten jedoch nur mit Ausschluß jener Stellen, an welchen die betrachteten Funktionen nicht definiert sind, also für $\operatorname{tg} x$ mit Ausschluß der Stellen $(2n+1)\frac{\pi}{2}$, für $\operatorname{cotg} x$ mit Ausschluß der Stellen $n\pi$, wo n jede positive und negative ganze Zahl oder Null sein darf (vgl. 19, 1).

Schließlich erhält man mittels der Formeln (6), (7) auf Grund von 26, (10) für

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad \text{und} \quad y = \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$$

$$(10) \quad D \sec x = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \operatorname{tg} x$$

$$(11) \quad D \operatorname{cosec} x = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x,$$

wobei die Werte $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ bei (10) und $x = n\pi$ bei (11) auszuschließen sind.

33. Die zyklometrischen Funktionen. Die Umkehrung einer periodischen Funktion ist eine *unendlich vieldeutige* Funktion. Ist nämlich $x = f(y)$ periodisch mit der Periode p , so gibt es unendlich viele Werte des Arguments, zu welchen ein und derselbe Wert von x gehört; ist y einer dieser Werte, so sind die andern durch $y + np$ dargestellt, wobei n jede positive und negative ganze Zahl bedeuten kann; demnach hat die Gleichung $x = f(y)$ bei gegebenem x unendlich viele Lösungen in bezug auf y , jedoch so, daß, wenn eine derselben bekannt ist, alle übrigen angegeben werden können.

1) Es sei $x = \sin y$; wird x irgend ein Wert aus dem Intervall $(-1, +1)$ erteilt, so besitzt die Gleichung immer eine Wurzel in dem Intervall $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$; denn während y dieses letztere Intervall stetig durchläuft, bewegt sich $\sin y$ stetig in dem Intervall $(-1, +1)$, ist also eine monotone, und zwar eine wachsende Funktion. Diese Wurzel definiert demnach eine eindeutige Funktion, welche mit

$$(A) \quad y = \arcsin x$$

bezeichnet werden und der *Hauptwert* von $\operatorname{Arc} \sin x$ heißen soll, wobei unter letzterer Bezeichnung die *Gesamtheit* der Lösungen

von $x = \sin y$ zu verstehen ist. Weil $\sin y = \sin(\pi - y)$ ist, so ist

$$(B) \quad \text{Arc sin } x = \begin{cases} 2n\pi + \text{arc sin } x \\ (2n+1)\pi - \text{arc sin } x. \end{cases}$$

Der Differentialquotient der neuen Funktion ergibt sich nach 27, indem

$$D \text{ arc sin } x \cdot D \sin y = 1;$$

nach Formel 32 (6) ist aber $D \sin y = \cos y = \sqrt{1-x^2}$, die Wurzel mit positivem Zeichen genommen, weil $\cos y$ in dem Intervall $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$ positiv ist; demnach hat man endgültig

$$(12) \quad D \text{ arc sin } x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

2) Es sei $x = \cos y$; die Gleichung besitzt, wenn x ein Wert aus dem Intervall $(-1, +1)$ erteilt wird, immer eine Lösung in dem Intervall $(0, \pi)$, weil in diesem Intervall $\cos y$ eine monotone, und zwar abnehmende Funktion ist; diese Lösung definiert die eindeutige Funktion

$$(C) \quad y = \text{arc cos } x,$$

den Hauptwert von $\text{Arc cos } x$, während, vermöge der Beziehung $\cos y = \cos(-y)$,

$$(D) \quad \text{Arc cos } x = 2n\pi \pm \text{arc cos } x.$$

Läßt man in der allgemein gültigen Formel $x = \sin y = \cos(\frac{\pi}{2} - y)$ y das Intervall $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$ durchlaufen, so bewegt sich $\frac{\pi}{2} - y$ auf dem Intervall $(\pi, 0)$; infolgedessen besteht zwischen den Hauptwerten $\text{arc sin } x$ und $\text{arc cos } x$ die Beziehung

$$\text{arc sin } x + \text{arc cos } x = \frac{\pi}{2},$$

aus welcher $\text{arc cos } x = \frac{\pi}{2} - \text{arc sin } x$ und auf Grund von (12) und 24 (2)

$$(13) \quad D \text{ arc cos } x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

folgt.

3) Die Gleichung $x = \operatorname{tg} y$ besitzt für jedes x eine Lösung in dem Intervall $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$, weil $\operatorname{tg} y$ in diesem Intervall eine monotone wachsende Funktion ist, die das Intervall $(-\infty, +\infty)$ durchläuft; diese Wurzel, der Hauptwert von $\operatorname{Arc} \operatorname{tg} x$, definiert die eindeutige Funktion

$$(E) \quad y = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x,$$

während

$$(F) \quad \operatorname{Arc} \operatorname{tg} x = n\pi + \operatorname{arc} \operatorname{tg} x.$$

Aus der Beziehung

$$D \operatorname{arc} \operatorname{tg} x \cdot D \operatorname{tg} y = 1$$

folgt dann, weil nach Formel 32 (8) $D_y \operatorname{tg} y = \sec^2 y = 1 + x^2$ ist,

$$(14) \quad D \operatorname{arc} \operatorname{tg} x = \frac{1}{1+x^2}.$$

4) Diejenige Wurzel der Gleichung $x = \operatorname{cotg} y$, welche dem Intervall $(0, \pi)$ angehört — und eine solche ist immer vorhanden, weil $\operatorname{cotg} y$ in dem genannten Intervall abnehmend von $+\infty$ zu $-\infty$ sich bewegt —, bezeichnet man als Hauptwert von $\operatorname{Arc} \operatorname{cotg} x$ und definiert durch sie die eindeutige Funktion

$$(G) \quad y = \operatorname{arc} \operatorname{cotg} x,$$

während

$$(H) \quad \operatorname{Arc} \operatorname{cotg} x = n\pi + \operatorname{arc} \operatorname{cotg} x$$

ist.

Auf Grund der Relation $x = \operatorname{tg} y = \operatorname{cotg}(\frac{\pi}{2} - y)$ erkennt man wie in 2), daß

$$\operatorname{arc} \operatorname{tg} x + \operatorname{arc} \operatorname{cotg} x = \frac{\pi}{2},$$

woraus weiter folgt

$$(15) \quad D \operatorname{arc} \operatorname{cotg} x = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Auf die Umkehrungen der Funktionen $x = \sec y$, $x = \operatorname{cosec} y$ soll hier wegen ihres seltenen Gebrauchs nicht eingegangen werden; indessen kann ihre Erledigung nach dem vorangegangenen keine Schwierigkeit bieten.*)

Die Formeln (1) bis (14) dieses Paragraphen in Verbindung mit den Sätzen des vorigen geben die Mittel an die Hand,

*) Vgl. die Beisp. 19), 20) in 85.

jede aus den elementaren Funktionen irgendwie durch eine endliche Folge von Rechenoperationen zusammengesetzte explizite Funktion zu differenzieren. Sie sind die *Grundformeln* und *Grundregeln der Differentialrechnung*.

34. Die Hyperbelfunktionen. Zu den elementaren transzendenten Funktionen zählt man auch die *Hyperbelfunktionen*, so genannt, weil sie geometrisch mit der gleichseitigen Hyperbel in ähnlicher Weise zusammenhängen wie die trigonometrischen (Kreis-)Funktionen mit dem Kreise. Sie sind um die Mitte des 18. Jahrhunderts von V. Riccati mit den heute üblichen Bezeichnungen eingeführt und besonders von Lambert weiter ausgebildet worden.

Ihre *analytische* Definition kann mit Hilfe der natürlichen Exponentialfunktion wie folgt geschehen. Ist u die unbeschränkte reelle Variable, so wird

$$\frac{e^u + e^{-u}}{2} \text{ als hyperbolischer Kosinus (cosh } u)$$

$$\frac{e^u - e^{-u}}{2} \text{ als hyperbolischer Sinus (sinh } u)$$

von u erklärt; mit Hilfe dieser beiden Funktionen definiert man die hyperbolische Tangente, Kotangente, Sekante und Kosekante ganz nach Art der trigonometrischen Funktionen, indem man schreibt:*)

$$\begin{aligned} \operatorname{tgh} u &= \frac{\sinh u}{\cosh u}, & \operatorname{cotgh} u &= \frac{\cosh u}{\sinh u}, & \operatorname{sech} u &= \frac{1}{\cosh u}, \\ \operatorname{cosech} u &= \frac{1}{\sinh u}. \end{aligned}$$

Aus diesen Definitionen lassen sich Relationen zwischen den genannten Funktionen ableiten, ebenso zahlreiche wie die trigonometrischen Formeln und von ähnlicher Bauart. Einige derselben mögen hier zusammengestellt werden.

Aus

$$\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2}, \quad \sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2}$$

folgt mit Rücksicht auf die anderen Definitionen unmittelbar:

*) Neben den hier gebrauchten Bezeichnungen sind auch andere in Verwendung, so Sin, Cos, Tg, Cotg, Sec, Cosec.

$$\begin{aligned}
\cosh u + \sinh u &= e^u \\
\cosh u - \sinh u &= e^{-u} \\
\cosh^2 u - \sinh^2 u &= 1 \\
\operatorname{tgh}^2 u + \operatorname{sech}^2 u &= 1 \\
\cotgh^2 u - \operatorname{cosech}^2 u &= 1;
\end{aligned}$$

die leicht zu erweisenden Identitäten:

$$\begin{aligned}
e^{2u} - e^{-2u} &= (e^u - e^{-u})(e^u + e^{-u}), \\
2(e^{u+v} - e^{-u-v}) &= (e^u - e^{-u})(e^v + e^{-v}) + (e^v - e^{-v})(e^u + e^{-u}), \\
2(e^{u+v} + e^{-u-v}) &= (e^u + e^{-u})(e^v + e^{-v}) + (e^v - e^{-v})(e^u - e^{-u})
\end{aligned}$$

schreiben sich nunmehr:

$$\begin{aligned}
\sinh 2u &= 2 \sinh u \cosh u, \\
\sinh(u+v) &= \sinh u \cosh v + \sinh v \cosh u, \\
\cosh(u+v) &= \cosh u \cosh v + \sinh u \sinh v.
\end{aligned}$$

Die *Differentiation* der neuen Funktionen ist auf die der Exponentialfunktion zurückgeführt; es ergibt sich:

$$\begin{aligned}
D \cosh u &= \frac{e^u - e^{-u}}{2} = \sinh u, \\
D \sinh u &= \frac{e^u + e^{-u}}{2} = \cosh u; \\
D \operatorname{tgh} u &= \frac{\cosh^2 u - \sinh^2 u}{\cosh^2 u} = \operatorname{sech}^2 u, \\
D \cotgh u &= \frac{\sinh^2 u - \cosh^2 u}{\sinh^2 u} = -\operatorname{cosech}^2 u; \\
D \operatorname{sech} u &= -\frac{\sinh u}{\cosh^2 u} = -\operatorname{tgh} u \operatorname{sech} u, \\
D \operatorname{cosech} u &= -\frac{\cosh u}{\sinh^2 u} = -\cotgh u \operatorname{cosech} u.
\end{aligned}$$

Die *geometrische* Bedeutung der Hyperbelfunktionen erhält man durch folgende Betrachtung. Der Kreis in Fig. 8 sei um O mit dem Radius 1 beschrieben. Ist θ das Bogenmaß des Winkels AOM , RS die in M an den Kreis gelegte Tangente, so hat man:

$$\begin{aligned}
OP &= \cos \theta, & OR &= \sec \theta \\
MP &= \sin \theta, & OS &= \operatorname{cosec} \theta \\
MR &= \operatorname{tg} \theta, & MS &= \cotg \theta.
\end{aligned}$$

Die Analogie erstreckt sich auch auf die Bedeutung der Argumente: die trigonometrischen Funktionen können, da $\frac{1}{2}\theta$ auch die Fläche des Sektors OAM ist, auch als Funktionen dieses Doppelsektors aufgefaßt werden; in der Integralrechnung (§11, 2)) wird gezeigt werden, daß $\frac{1}{2}u$ die Fläche des Hyperbelsektors OAH ist.

Der Zusammenhang zwischen den beiden Argumenten u, θ ergibt sich in folgender Weise: Die Relation

$$\cosh u + \sinh u = e^u$$

verwandelt sich im Hinblick auf die letzten Relationen in

$$\sec \theta + \operatorname{tg} \theta = e^u;$$

die weitere Verfolgung dieses Ansatzes gibt:

$$\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} = \cotg \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) = e^u,$$

woraus

$$u = 2 \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right).$$

Diese Gleichung wurde bereits 1599, also lange vor der Einführung der Hyperbelfunktionen, von *E. Wright* gefunden als mathematischer Ausdruck der Skala, nach welcher in der *Merccator*-Projektion die Punkte eines Meridians je nach ihrer geographischen Breite θ in bezug auf das Bild des Äquators angeordnet sind. Man nennt θ die „hyperbolische Amplitude“ von u oder auch *Lambert's* transzendenten Winkel; durch seine Vermittlung werden die Hyperbelfunktionen berechnet und tabellarisiert. Der letzte Ansatz gibt für die Hyperbelamplitude die Darstellung

$$\theta = 2 \operatorname{arctg} e^u - \frac{\pi}{2};$$

es sind Tabellen berechnet worden, die zu gegebenem u das zugehörige θ angeben und so die Ermittlung der Hyperbelfunktion aus trigonometrischen Tafeln gestatten.*)

*) Bezüglich solcher Tafeln sei auf *W. Ligowski*, Tafeln der Hyperbelfunktionen, Berlin 1890; *A. Forti*, Nuove tavole delle funzioni iperboliche, Roma 1892 und *E. Jahnke - F. Emde*, Funktionentafeln, Leipzig 1909 hingewiesen.

Man kann auf die Hyperbelfunktionen den Prozeß der Umkehrung ebenso anwenden wie auf die Kreisfunktion und gelangt dadurch zu einer neuen Gruppe elementarer Funktionen, für die der Name *hyperbolische Areafunktionen* (mit Rücksicht auf die geometrische Bedeutung des Arguments u) und die Bezeichnungen arsinh , arcosh , usw. vorgeschlagen worden sind. Aber so wie sich die Hyperbelfunktionen durch die Exponentialfunktion, so lassen sich ihre Umkehrungen durch logarithmische Funktionen darstellen. Man braucht nur die jeweilige Definitionsgleichung, indem man gleichzeitig den Wert der Funktion mit einem Buchstaben z. B. x bezeichnet, nach u aufzulösen. So ergeben sich denn aus den Ansätzen

$$\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2} = x, \quad \cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2} = x$$

$$\operatorname{tgh} u = \frac{e^u - e^{-u}}{e^u + e^{-u}} = x, \quad \operatorname{cotgh} u = \frac{e^u + e^{-u}}{e^u - e^{-u}} = x$$

unter Beachtung der Realitätsforderung durch Umkehrung die folgenden Darstellungen:

$$\operatorname{arsinh} x = l(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{arcosh} x = l(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\operatorname{artgh} x = l \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

$$\operatorname{arcotgh} x = l \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.$$

35. Beispiele. In den nachstehenden Beispielen ist der Differentialquotient zunächst in der Form angegeben, wie er sich bei Anwendung der Regeln unmittelbar ergibt, an zweiter Stelle in seiner einfachsten Gestalt, mit Fortlassung der Zwischenrechnungen; in den späteren Beispielen ist nur das Endresultat mitgeteilt.

$$\begin{aligned} 1) \quad Dx^m(ax^n + b)^p &= mx^{m-1}(ax^n + b)^p \\ &\quad + px^m(ax^n + b)^{p-1} \cdot nax^{n-1} \\ &= x^{m-1}(ax^n + b)^{p-1}[(m+np)ax^n + mb]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad D \frac{x-a}{(x-b)(x-c)} &= \frac{(x-b)(x-c) - (x-a)(x-c+x-b)}{(x-b)^2(x-c)^2} \\ &= \frac{bc - ab - ac + 2ax - x^2}{(x-b)^2(x-c)^2}. \end{aligned}$$

$$3) D \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{-\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}}{2 \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}} = -\frac{1}{4x \sqrt{x + \sqrt{x}}}.$$

$$4) D(ax + b) \sqrt{ax^2 + 2bx + c} = a \sqrt{ax^2 + 2bx + c} + \frac{(ax + b)^2}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}} = \frac{2(ax + b)^2 + ac - b^2}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}}.$$

$$\begin{aligned} 5) D \frac{\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}}{\sqrt{a^2 + x^2} - \sqrt{a^2 - x^2}} \\ = \frac{(\sqrt{a^2 + x^2} - \sqrt{a^2 - x^2}) \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right) - (\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}) \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right)}{(\sqrt{a^2 + x^2} - \sqrt{a^2 - x^2})^2} \\ = -\frac{2a^2}{x^3} \left(1 + \frac{a^2}{\sqrt{a^4 - x^4}} \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) D \frac{\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}}{\sqrt{x+a} - \sqrt{x+b}} &= \frac{\sqrt{x+a} - \sqrt{x+b}}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}} \\ &\quad \left\{ \frac{(\sqrt{x+a} - \sqrt{x+b}) \left(\frac{1}{2\sqrt{x+a}} + \frac{1}{2\sqrt{x+b}} \right)}{-(\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}) \left(\frac{1}{2\sqrt{x+a}} - \frac{1}{2\sqrt{x+b}} \right)} \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(x+a)(x+b)}}. \end{aligned}$$

$$7) D e^{ax^2 + 2bx + c} = 2(ax + b) e^{ax^2 + 2bx + c}.$$

$$8) D x^m e^{-x^2} = m x^{m-1} e^{-x^2} - 2 x^{m+1} e^{-x^2} = x^{m-1} e^{-x^2} (m - 2x^2).$$

$$9) D \ln \sin ax = \frac{a \cos ax}{\sin ax} = a \cotg ax.$$

$$10) D \ln \cos ax = -\frac{a \sin ax}{\cos ax} = -a \tg ax.$$

$$11) D \ln \tg \frac{x}{2} = \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}}{\tg \frac{x}{2}} = \frac{1}{\sin x}.$$

$$12) D l \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) = \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)}{\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)} = \frac{1}{\cos x}.$$

$$\begin{aligned} 13) D \operatorname{tg} x^{\sin x} &= D e^{\sin x \cdot \operatorname{tg} x} \\ &= e^{\sin x \cdot \operatorname{tg} x} \left(\cos x \cdot l \operatorname{tg} x + \frac{\sin x \sec^2 x}{\operatorname{tg} x} \right) \\ &= \operatorname{tg} x^{\sin x} (l \operatorname{tg} x^{\cos x} + \sec x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14) D \arcsin \frac{1-x}{1+x} &= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2}} \cdot \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} \\ &= -\frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15) D \left(\frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + l \sqrt{1-x^2} \right) &= \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \\ &+ \frac{x}{1-x^2} + \frac{x^2 \arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}} *). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16) D (\arcsin (a \sin x) + \arccos (a \cos x)) \\ &= \frac{a \cos x}{\sqrt{1-a^2 \sin^2 x}} + \frac{a \sin x}{\sqrt{1-a^2 \cos^2 x}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 17) D \arcsin \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) \\ &= \frac{1}{1 + \frac{a-b}{a+b} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{2(a+b \cos x)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18) D \arccos \frac{b+a \cos x}{a+b \cos x} &= \frac{-1}{\sqrt{1 - \left(\frac{b+a \cos x}{a+b \cos x} \right)^2}} \\ &= \frac{-a(a+b \cos x) \sin x + b(b+a \cos x) \sin x}{(a+b \cos x)^2} \\ &= \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a+b \cos x}. \end{aligned}$$

*) Der Bruch $\frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ ist hier als Produkt der drei Faktoren x , $\arcsin x$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ behandelt worden.

$$19) D \operatorname{arc} \sec x = D \operatorname{arc} \cos \frac{1}{x} = \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \cdot \frac{-1}{x^2} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

$$20) D \operatorname{arccosec} x = D \operatorname{arcsin} \frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \cdot \frac{-1}{x^2} = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

$$21) y = x(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^3(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}; \quad y' = \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}.$$

$$22) y = \frac{1}{2}x^3(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^5(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}; \quad y' = \frac{x^3}{\sqrt{(1+x^2)^3}}.$$

$$23) y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\sin 2x; \quad y' = \cos^2 x.$$

$$24) y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sin 2x; \quad y' = \sin^2 x.$$

$$25) y = \sin x - \frac{1}{2}\sin^3 x; \quad y' = \cos^3 x.$$

$$26) y = \frac{1}{2}\cos^3 x - \cos x; \quad y' = \sin^3 x.$$

$$27) y = \frac{1}{2}\operatorname{tg}^3 x + \operatorname{tg} x; \quad y' = \sec^4 x.$$

$$28) y = \frac{1}{2}\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x; \quad y' = \operatorname{tg}^4 x.$$

$$29) y = 2 \sin \sqrt{x} - 2 \sqrt{x} \cos \sqrt{x}; \quad y' = \sin \sqrt{x}.$$

$$30) y = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \cos (-1 + 2x^2);$$

$$31) y = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \cos (-3x + 4x^3);$$

$$32) y = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \cos (1 - 8x^2 + 8x^4);$$

$$33) y = \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}; \quad y' = \frac{1}{1+x+x^2}.$$

$$34) y = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{2x}{1-x^2};$$

$$35) y = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \sin \frac{2x}{1+x^2};$$

$$36) y = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \cos \frac{1-x^2}{1+x^2};$$

$$\left. \begin{array}{l} 34) \\ 35) \\ 36) \end{array} \right\} y' = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$37) y = l \sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}}; \quad y' = \sec x.$$

$$38) y = e^x (x^2 - 2x + 2); \quad y' = e^x x^2.$$

$$39) y = x \operatorname{arctg} x - l \sqrt{1+x^2}; \quad y' = \operatorname{arctg} x.$$

$$40) y = \frac{1}{2} \sinh 2x + \frac{1}{2}x; \quad y' = \cosh^2 x.$$

$$41) y = \frac{1}{2} \sinh 2x - \frac{1}{2} x; \quad y' = \sinh^2 x.$$

$$42) y = l \cosh x; \quad y' = \operatorname{tgh} x.$$

$$43) y = l \sinh x; \quad y' = \operatorname{cotgh} x.$$

$$44) y = l \cosh x - \frac{1}{2} \operatorname{tgh}^2 x; \quad y' = \operatorname{tgh}^2 x.$$

§ 4. Allgemeine Sätze über den Zusammenhang einer Funktion mit ihrem Differentialquotienten.

36. Vorzeichen des Differentialquotienten. Von einer in dem Intervall (α, β) der stetigen Variablen x eindeutig definierten Funktion $f(x)$ sagt man, sie sei an der Stelle x *innerhalb* des Intervalls *wachsend*, wenn sich eine positive Zahl η so angeben läßt, daß für jedes $0 < h < \eta$

$$(1) \quad f(x-h) < f(x) < f(x+h).$$

Besitzt die Funktion an der Stelle x einen Differentialquotienten so kann derselbe nicht negativ sein; denn aus (1) folgt

$$\frac{f(x-h) - f(x)}{-h} > 0, \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} > 0;$$

mit gegen Null konvergierendem h nähern sich die beiden Quotienten nach Voraussetzung einer gemeinsamen Grenze und diese kann nicht negativ sein, weil die Quotienten, wie klein auch h werden mag, positiv bleiben.

Die Funktion $f(x)$ heißt hingegen an der Stelle x *abnehmend*, wenn sich ein positives η so angeben läßt, daß für alle $0 < h < \eta$

$$(2) \quad f(x-h) > f(x) > f(x+h).$$

In diesem Falle kann der Differentialquotient an der Stelle x , wenn er existiert, nicht positiv sein; denn aus (2) ergibt sich, daß

$$\frac{f(x-h) - f(x)}{-h} < 0, \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} < 0,$$

und da beide Quotienten für $\lim h = 0$ gegen eine gemeinsame Grenze konvergieren, so kann diese nicht positiv sein, weil die Quotienten selbst, wie klein auch h werden mag, negativ bleiben.

An den Stellen α, β kann nur von einseitigem Wachsen oder Abnehmen die Rede sein.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich der Satz: *Wenn die Funktion $f(x)$ in dem Intervall (α, β) beständig wächst oder beständig abnimmt und an jeder Stelle einen Differentialquotienten besitzt, so kann dieser niemals negativ, beziehungsweise niemals positiv sein.*

In beiden Fällen ist also nicht ausgeschlossen, daß der Differentialquotient an einzelnen Stellen Null werden kann.

Unter den elementaren Funktionen haben wir folgende Beispiele beständig wachsender und beständig abnehmender Funktionen.

Es ist $Da^x = a^x \ln a$, folglich a^x eine beständig wachsende Funktion, wenn $a > 1$, eine abnehmende, wenn $0 < a < 1$ ist; e^x ist also wachsend.

Aus $Dlx = \frac{1}{x}$ erkennt man, da $x > 0$, daß lx eine wachsende Funktion ist.

Da $D \operatorname{tg} x = \sec^2 x$, so ist $\operatorname{tg} x$ eine wachsende Funktion; in der Tat, indem x nacheinander die Intervalle $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$, $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ durchläuft, jedoch mit Ausschluß der Grenzen, geht $\operatorname{tg} x$ beidemal durch das Intervall $(-\infty, +\infty)$.

In gleicher Weise schließt man aus $D \cotg x = -\operatorname{cosec}^2 x$, daß $\cotg x$ eine beständig abnehmende Funktion ist.

Weil $D \arctg x = \frac{1}{1+x^2}$, so wächst $\arctg x$ fortwährend; tatsächlich durchläuft es das Intervall $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$, während x von $-\infty$ bis $+\infty$ wächst.

Aus $D \operatorname{arc} \cotg x = -\frac{1}{1+x^2}$ schließt man in ähnlicher Weise auf die ständige Abnahme von $\operatorname{arc} \cotg x$.

37. Der Satz von Rolle. *Wenn die Funktion $f(x)$ in dem Intervalle (α, β) einwertig und stetig ist und an jeder Stelle einen endlichen oder bestimmt unendlichen Differentialquotienten besitzt, wenn ferner $f(\alpha) = 0$ und $f(\beta) = 0$, so gibt es wenigstens eine Stelle zwischen α und β , an welcher der Differentialquotient $f'(x)$ verschwindet.*

Behielte die Funktion den Wert Null im ganzen Intervalle (oder auch nur in einem Teile desselben) bei, so wäre sie eine

konstante Funktion und der Satz bedürfte dann insofern keines Beweises, als der Differentialquotient beständig (eventuell in dem betreffenden Teile) Null wäre (21).

Wir müssen also annehmen, daß die Funktion von α aus entweder wächst oder abnimmt; aber weder das Wachsen noch das Abnehmen kann durch das ganze Intervall anhalten, soll $f(\beta) = 0$ eintreten; daher muß eine Stelle ξ zwischen α und β getroffen werden, wo das Wachsen (bzw. das Abnehmen) aufhört; diese Stelle wird dadurch charakterisiert sein, daß sich ein positives η derart angeben läßt, daß für jedes $0 < h < \eta$

$$f(\xi - h) < f(\xi) > f(\xi + h);$$

nach den Relationen (1), (2) des vorigen Artikels ist die Funktion an dieser Stelle weder wachsend noch abnehmend; ferner ist


$$\frac{f(\xi - h) - f(\xi)}{-h} > 0 \quad \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} < 0;$$

der erste Quotient kann für $\lim h = 0$ nur einen positiven oder den Grenzwert Null haben, der zweite nur einen negativen oder Null; da aber beide nach Voraussetzung einen gemeinsamen Grenzwert besitzen, so kann nur

$$f'(\xi) = 0$$

sein, womit der Satz erwiesen ist. Im Falle des Abnehmens von α an ergeben sich analoge Schlüsse.

Bei geometrischer Darstellung der Funktion hat der Satz von Rolle eine anschauliche Bedeutung; eine Kurve AB (Fig. 9), welche in den Punkten A und B die Abszissenachse schneidet und an jeder Stelle zwischen den genannten Punkten eine bestimmte Tangente hat, besitzt zwischen A und B mindestens einen Punkt M , in welchem die Tangente MT der Abszissenachse parallel läuft.



Die Voraussetzungen des obigen Satzes können auch dahin abgeändert werden, daß $f(\alpha) = f(\beta) = C$ ist; denn die Funktion $f(x) - C$ erfüllt dann die Bedingung, für $x = \alpha$ und $x = \beta$ zu verschwinden, ihr Differentialquotient ist aber wieder $f'(x)$.

Die Funktion $f(x) = (x - a)(x - b)$ hat, um Beispiele anzuführen, in dem Intervall (a, b) die Eigenschaften, welche oben vorausgesetzt wurden; ihr Differentialquotient $f'(x) = 2x - a - b$ wird denn auch gleich Null an der zwischen a, b liegenden Stelle $x = \frac{a+b}{2}$. Desgleichen entspricht die Funktion $f(x) = \sin x$ in dem Intervall $(0, \pi)$ den Voraussetzungen des Rolleschen Theorems, und in der Tat verschwindet ihr Differentialquotient $f'(x) = \cos x$ an der zwischenliegenden Stelle $x = \frac{\pi}{2}$.

38. Der Mittelwertsatz. *Wenn die Funktion $f(x)$ an jeder Stelle des abgeschlossenen Intervalls (α, β) einen endlichen oder bestimmt unendlichen Differentialquotienten besitzt, so gibt es wenigstens eine Stelle zwischen α und β , an welcher der Differentialquotient $f'(x)$ gleich ist dem Differenzenquotienten*

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}.$$

Dieser Satz, für die Analysis von großer Bedeutung, findet sich zuerst bei J. Lagrange und wird auch häufig nach ihm benannt.

Zum Zwecke des Beweises konstruieren wir mit Hilfe von $f(x)$ die neue Funktion

$$\varphi(x) = f(x) - f(\alpha) - (x - \alpha) \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha},$$

welche ebenfalls an jeder Stelle zwischen α und β einen Differentialquotienten besitzt, da

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha},$$

und die überdies die Eigenschaft hat, daß $\varphi(\alpha) = 0$ und $\varphi(\beta) = 0$ ist. Demnach erfüllt die Funktion $\varphi(x)$ die Voraussetzungen des Rolleschen Satzes und es gibt daher wenigstens eine Stelle ξ zwischen α und β , wo $\varphi'(\xi) = 0$, d. h. wo

$$(1) \quad \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = f'(\xi).$$

Der Satz kann nun auf irgend zwei Stellen x und $x + h$, die in (α, β) enthalten sind, zur Anwendung gebracht werden; an die Stelle von ξ kommt dann ein zwischen x und $x + h$

gelegener Wert und einen solchen kann man in der Form $x + \theta h$ darstellen, wobei $0 < \theta < 1$ ist; mithin gilt:


$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x + \theta h)$$

oder

$$(2) \quad f(x+h) - f(x) = hf'(x + \theta h).$$

Diese Darstellung der Differenz zweier Funktionswerte durch einen Zwischen- oder Mittelwert des Differentialquotienten findet vielseitige Anwendung. Einige Folgerungen mögen schon hier angeführt werden.

Vorher möge noch der geometrische Sinn der Formel (1) erwähnt werden in dem Falle, wo die Funktion $f(x)$ durch die Ordinaten einer Kurve dargestellt wird. Der Inhalt der Formel (1) ist dann der folgende. Besitzt die Kurve AB (Fig. 10) an jeder Stelle eine bestimmte Tangente, so gibt es zwischen A und B mindestens einen Punkt M , in welchem die Tangente MT der Sehne AB parallel ist.



An früherer Stelle (21) ist erwiesen worden, daß der Differentialquotient einer konstanten Funktion Null ist; nun kann auch die Umkehrung dieses Satzes bewiesen werden: *Wenn der Differentialquotient $f'(x)$ einer Funktion $f(x)$ an allen Stellen des Intervalls (α, β) Null ist, so ist die Funktion in diesem Intervall konstant.*

Sind nämlich x_1, x_2 zwei Stellen aus (α, β) so ist zufolge (1)

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(\xi),$$

wobei ξ zwischen x_1 und x_2 liegt; da aber für jedes ξ zwischen α und β $f'(\xi) = 0$ ist, so ist

$$f(x_2) - f(x_1) = 0,$$

also $f(x_1) = f(x_2)$; wenn aber jede zwei Werte von $f(x)$ aus dem Intervall (α, β) einander gleich sind, so hat die Funktion einen konstanten Wert.

Aus diesem Satze folgt der weitere: *Wenn zwei Funktionen $f(x), \varphi(x)$ in einem Intervall (α, β) gleiche Differentialquotienten*

haben, so können sie sich nur um eine additive Konstante voneinander unterscheiden.

Denn aus

$$f'(x) = \varphi'(x)$$

folgt auch

$$D[f(x) - \varphi(x)] = 0$$

und daraus

$$f(x) - \varphi(x) = C,$$

wobei C eine Konstante bedeutet.

In Artikel 36 ist gezeigt worden, daß der Differentialquotient einer in dem Intervall (α, β) beständig wachsenden (abnehmenden) Funktion niemals negativ (positiv) ist; auch die Umkehrung dieses Satzes kann jetzt bewiesen werden: *Wenn der Differentialquotient von $f(x)$ in dem Intervall (α, β) niemals negativ (positiv) und auch nicht in einem Teile des Intervalls beständig Null ist, so ist die Funktion wachsend (abnehmend) in dem Sinne, daß für irgend zwei Werte x_1, x_2 aus (α, β) , welche wachsend geordnet sind, die Relation $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$) stattfindet.*

Bedeutet x' einen Wert zwischen x_1 und x_2 , so daß x_1, x', x_2 wachsend geordnet sind, so ist auf Grund der (ersten) Voraussetzung laut (1)

$$f(x') - f(x_1) = (x' - x_1) f'(\xi_1) \geq 0$$

$$f(x_2) - f(x') = (x_2 - x') f'(\xi_2) \geq 0,$$

wobei ξ_1 einen Wert zwischen x_1, x' , ξ_2 einen Wert zwischen x', x_2 bedeutet; daraus folgt, daß

$$f(x_1) \leq f(x') \leq f(x_2);$$

aber nicht für alle x' können beide Gleichheitszeichen gelten, weil sonst für alle Werte x' zwischen x_1 und x_2 die Beziehung $f(x_1) = f(x') = f(x_2)$ stattfände, die zur Folge hätte, daß in diesem Teile von (α, β) $f'(x)$ beständig Null wäre, was gegen die Voraussetzung verstößt. Es gibt also sicher einen Wert x' , für den wenigstens eines der beiden Ungleichheitszeichen gilt, und darum ist notwendig

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Der zweite Teil des Beweises ist ebenso zu führen.

39. Der verallgemeinerte Mittelwertsatz. *Wenn die beiden Funktionen $f(x)$, $\varphi(x)$ in dem Intervalle (α, β) Differentialquotienten besitzen, von welchen der letztere, $\varphi'(x)$, an keiner Stelle Null ist, so gibt es mindestens einen Wert ξ zwischen α und β derart, daß $\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$.* Dieser Satz kommt zuerst bei Cauchy*) vor, wenn auch mit der speziellen Voraussetzung, daß $f(\alpha) = \varphi(\alpha) = 0$ sei.

Um ihn zu beweisen, konstruiere man aus $f(x)$ und $\varphi(x)$ die neue Funktion

$$\psi(x) = f(x) - f(\alpha) - (\varphi(x) - \varphi(\alpha)) \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)};$$

der Bruch, welcher im Ausdrucke dieser Funktion vorkommt, hat sicher eine bestimmte Bedeutung, da $\varphi(\alpha)$ nicht gleich sein kann $\varphi(\beta)$, indem sonst nach dem Satze von Rolle $\varphi'(x)$ an einer Stelle zwischen α und β verschwinden müßte, entgegen der Voraussetzung. Die Funktion $\psi(x)$ hat nun im Intervall (α, β) einen Differentialquotienten, nämlich

$$\psi'(x) = f'(x) - \varphi'(x) \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)},$$

und es ist $\psi(\alpha) = 0$, $\psi(\beta) = 0$; folglich existiert nach dem Satze von Rolle mindestens eine Stelle ξ zwischen α und β , wo $\psi'(\xi) = 0$, d. h. wo

$$(1) \quad \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}.$$

Die Formel kann wieder auf zwei beliebige Stellen x und $x + h$ aus (α, β) angewandt werden und lautet dann:

$$(2) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{\varphi(x+h) - \varphi(x)} = \frac{f'(x+\theta h)}{\varphi'(x+\theta h)}; \quad (0 < \theta < 1).$$

Setzt man $\varphi(x) = x$, wodurch den Voraussetzungen des Theorems Genüge geleistet ist, so gehen die Formeln (1) und (2) in die gleichbezeichneten des Art. 38 über.

§ 5. Die höheren Differentialquotienten und Differentiale.

40. Begriff des n -ten Differentialquotienten. Wenn die in dem Intervall (α, β) stetige Funktion $f(x)$ an allen Stellen des Intervalles einen Differentialquotienten besitzt, so

*) Leçons sur le calcul différentiel, Paris 1829, p. 33.

konstituieren die Werte dieses Differentialquotienten mit den zugehörigen Werten der Variablen eine neue Funktion im Intervall (α, β) , welche die *Ableitung* oder *Derivierte* oder auch der *Differentialquotient* von $f(x)$ genannt und mit

$$f'(x) \text{ oder } D_x f(x)$$

bezeichnet wird.

Ist $f'(x)$ wieder stetig im ganzen Intervall (α, β) oder in einem Teile desselben oder mit Ausschluß einzelner Stellen, und läßt es wie $f(x)$ eine Ableitung zu, so wird diese die *zweite Ableitung* oder der *zweite Differentialquotient* von $f(x)$ genannt und mit

$$f''(x) \text{ oder } D_x^2 f(x)$$

bezeichnet. Begrifflich stellt dies Zeichen also jene Funktion dar, welche an der Stelle x bestimmt ist durch

$$\lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}.$$

So fortschreitend gelangt man zu der dritten, vierten, ... n ten Ableitung oder zu dem dritten, vierten, ... n ten Differentialquotienten; die dafür gebrauchten Zeichen sind:

$$f'''(x), f^{IV}(x), \dots f^{(n)}(x)$$

oder

$$D_x^3 f(x), D_x^4 f(x), \dots D_x^n f(x).$$

Sofern die Voraussetzung der Stetigkeit und Differenzierbarkeit erfüllt bleibt, hat die Bildung der höheren Differentialquotienten keine Schranke.

Wenn man aus dem Gebiet der reinen Analysis auf dasjenige der Anwendungen sich begibt, wobei x und $f(x)$ die Maßzahlen für gewisse einander bedingende Größen bedeuten, können auch die höheren Differentialquotienten eine sachliche Bedeutung erlangen. Bei der phoronomischen Auffassung, bei welcher $f(x)$ den in der Zeit x zurückgelegten geradlinigen Weg eines in Bewegung begriffenen Punktes darstellt, kommt zunächst dem zweiten Differentialquotienten eine wichtige Bedeutung zu.

Es ist 22, 1) erklärt worden, daß der erste Differentialquotient $f'(x)$ die im letzten Augenblicke der Zeit x herrschende Geschwindigkeit ausdrückt. Ist die Bewegung so beschaffen,

daß die Geschwindigkeit innerhalb beliebiger, aber gleicher Zeitintervalle um Gleiches sich ändert, so nennt man die während der Zeiteinheit erfolgende Geschwindigkeitsänderung *Beschleunigung* und die Bewegung selbst eine *gleichförmig beschleunigte* (oder gleichförmig verzögerte, wenn die Beschleunigung negativ, die Geschwindigkeit also mit der Zeit abnehmend ist). Auf eine ungleichförmig beschleunigte Bewegung ist der Begriff der Beschleunigung nicht ohneweiters übertragbar; der Quotient

$$\frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

aus der während des Zeitintervalls $(x, x+h)$ erfolgten Geschwindigkeitsänderung durch die Größe h des Zeitintervalls bedeutet die während dieses Zeitintervalls *durchschnittlich* auf die Zeiteinheit entfallende Geschwindigkeitsänderung; je kleiner h , desto geringer die Ungleichförmigkeit in der Beschleunigung, desto mehr Berechtigung hat man, den angeschriebenen Quotienten als Maß der Beschleunigung während des erwähnten Zeitintervalls anzusehen, und konvergiert derselbe mit gegen die Grenze Null abnehmendem h gegen einen bestimmten Grenzwert, so wird dieser Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

als die im letzten Augenblicke der Zeit x herrschende Beschleunigung erklärt.

Drückt also $f(x)$ den bei geradliniger Bewegung in der Zeit x zurückgelegten Weg aus, so hat der zweite Differentialquotient $f''(x)$ die Bedeutung der im letzten Augenblicke der Zeit x herrschenden Beschleunigung.

41. Bildung höherer Differentialquotienten. Zur Bildung der höheren Differentialquotienten einer Funktion bedarf es neuer Regeln nicht, da es auf wiederholte Bildung des ersten Differentialquotienten ankommt. Wenn es sich jedoch darum handelt, für den allgemeinen oder n ten Differentialquotienten eine independente Formel aufzustellen, dann führt das direkte Verfahren nur in einigen wenigen Fällen zum Ziele. In einigen anderen Fällen kann man sich dadurch helfen, daß man die Funktion als *Summe* oder als *Produkt* einfacherer

Funktionen darstellt, deren allgemeine Differentialquotienten in independenter Form bekannt sind.

I. *Direktes Verfahren.* 1) Für $f(x) = x^m$ ergibt sich durch sukzessive Differentiation

$$Dx^m = mx^{m-1}, \quad D^2x^m = m(m-1)x^{m-2}, \dots$$

so daß

$$(1) \quad D^n x^m = m(m-1) \cdots (m-n+1)x^{m-n}.$$

Läßt man $ax+b$ an die Stelle von x treten, so ändert sich die Formel nur insoweit, daß rechts der Faktor a^n hinzukommt, weil bei jedesmaliger Differentiation mit dem Differentialquotienten von $ax+b$, d. h. mit a multipliziert werden muß (25 (7)); es ist also

$$(2) \quad D^n(ax+b)^m = m(m-1) \cdots (m-n+1)a^n(ax+b)^{m-n}.$$

Ist m eine positive ganze Zahl, so wird der m te Differentialquotient von x^m eine Konstante:

$$D^m x^m = m(m-1) \cdots 1$$

und alle höheren sind Null. In jedem andern Falle kann die Bildung der Differentialquotienten unbeschränkt fortgesetzt werden.

2) Für $f(x) = lx$ hat man $Dlx = \frac{1}{x} = x^{-1}$, somit

$$D^n lx = D^{n-1} x^{-1};$$

hier tritt nun die Formel (1) in Kraft, und zwar ist $m = -1$ und n durch $n-1$ zu ersetzen, so daß

$$(3) \quad D^n lx = \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{x^n};$$

auch diese Formel kann dadurch verallgemeinert werden, daß man $ax+b$ an die Stelle von x treten läßt, und es wird

$$(4) \quad D^n l(ax+b) = \frac{(-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 2 \cdots (n-1) a^n}{(ax+b)^n}.$$

3) Aus der Formel $De^x = e^x$ folgt unmittelbar

$$(5) \quad D^n e^x = e^x;$$

hingegen ist $De^{kx} = ke^{kx}$ und

$$D^n e^{kx} = k^n e^{kx};$$

und weil $a^x = e^{x \log a}$, so ergibt sich hieraus

$$(6) \quad D^n a^x = (\log a)^n a^x.$$

4) Die Formel $D \sin x = \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$ zeigt, daß die einmalige Differentiation des $\sin x$ der Vermehrung des Arguments um $\frac{\pi}{2}$ äquivalent ist; infolgedessen wird n -malige Differentiation einer Vermehrung des Arguments um $n \frac{\pi}{2}$ äquivalent sein; es ist also

$$(7) \quad D^n \sin x = \sin \left(x + n \frac{\pi}{2} \right).$$

Durch denselben Schluß ergibt sich aus $D \cos x = -\sin x = \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$:

$$(8) \quad D^n \cos x = \cos \left(x + n \frac{\pi}{2} \right).$$

Vermöge der Periodizität nehmen die rechten Seiten der Formeln (7) und (8) nur je vier verschiedene Werte an, nämlich die $n = 0, 1, 2, 3$ entsprechenden, und diese in zyklischer Wiederholung.

II. *Zerlegung in Teile.* Hat man $f(x)$ als Summe zweier oder mehrerer Funktionen dargestellt, etwa $f(x) = \varphi(x) + \psi(x)$, so ist (24, (1))

$$D^n f(x) = D^n \varphi(x) + D^n \psi(x).$$

1) Es ist $a^2 - b^2 x^2 = \frac{1}{2a} \left[\frac{1}{a+bx} + \frac{1}{a-bx} \right]$; mithin

$$D^n \frac{1}{a^2 - b^2 x^2} = \frac{1}{2a} [D^n (a+bx)^{-1} + D^n (a-bx)^{-1}];$$

auf die Ausdrücke der rechten Seite ist die Formel (2) anwendbar, und man findet

$$(9) \quad D^n \frac{1}{a^2 - b^2 x^2} = \frac{(-1)^n 1 \cdot 2 \cdots n \cdot b^n}{2a} \left[\frac{1}{(a+bx)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(a-bx)^{n+1}} \right].$$

Für $a = 1$ und $b = i$ ergibt sich hieraus

$$D^n \frac{1}{1+x^2} = \frac{(-1)^n 1 \cdot 2 \cdots n}{2i} \left[\frac{1}{(x-i)^{n+1}} - \frac{1}{(x+i)^{n+1}} \right].$$

Diese Formel kann dazu verwendet werden, den allgemeinen Differentialquotienten von $\arctg x$ zu bestimmen; da nämlich $D \arctg x = \frac{1}{1+x^2}$, so ist $D^n \arctg x = D^{n-1} \frac{1}{1+x^2}$, also auf Grund der letzten Formel:

$$(10) \quad D^n \arctg x = \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{2i} \left[\frac{1}{(x-i)^n} - \frac{1}{(x+i)^n} \right].$$

2) Es ist $\cos ax \cos bx = \frac{1}{2} \{ \cos (a+b)x + \cos (a-b)x \}$,
mithin

$$(11) \quad D^n \cos ax \cos bx = \frac{(a+b)^n}{2} \cos \left[(a+b)x + n \frac{\pi}{2} \right] \\ + \frac{(a-b)^n}{2} \cos \left[(a-b)x + n \frac{\pi}{2} \right].$$

III. *Zerlegung in Faktoren.* Die Funktion $y = f(x)$ sei in zwei Faktoren $u = \varphi(x)$ und $v = \psi(x)$ zerlegbar, für welche der allgemeine Ausdruck des n ten Differentialquotienten bekannt ist. Durch sukzessive Differentiation ergibt sich, wenn man die aufeinanderfolgenden Differentialquotienten von y, u, v mit $y', u', v'; y'', u'', v''; \dots$ bezeichnet:

$$y' = u' v + u v'$$

$$y'' = u'' v + 2u' v' + u v''$$

$$y''' = u''' v + 3u'' v' + 3u' v'' + u v''';$$

woraus der Schluß gezogen werden kann, daß

$$(12) \quad y^{(n)} = u^{(n)} v + \binom{n}{1} u^{(n-1)} v' + \binom{n}{2} u^{(n-2)} v'' + \dots + u v^{(n)};$$

in der Tat, gilt diese Formel bei irgendeinem n , so gilt sie auch bei $n+1$, denn eine neuerliche Differentiation gibt

$$y^{(n+1)} = u^{(n+1)} v + \binom{n}{1} u^{(n)} v' + \binom{n}{2} u^{(n-1)} v'' + \dots + u' v^{(n)} \\ + u^{(n)} v' + \binom{n}{1} u^{(n-1)} v'' + \dots + \binom{n}{1} u' v^{(n)} + u v^{(n+1)}$$

und weil allgemein $\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r}$, so ist

$$y^{(n+1)} = u^{(n+1)} v + \binom{n+1}{1} u^{(n)} v' + \binom{n+1}{2} u^{(n-1)} v'' + \dots + u v^{(n+1)};$$

da nun das Bildungsgesetz auf direktem Wege für $n=1, 2, 3$ erwiesen ist, so gilt es allgemein. Die Gleichung (12), unter dem Namen der Leibnizschen *Formel* bekannt, läßt eine kurze symbolische Darstellung zu; schreibt man nämlich

$$(12^*) \quad D^n(uv) = (u+v)^n,$$

so bleibt nur zu beachten, daß man in den Gliedern der Potenzentwicklung die Potenzexponenten in Ordnungsexponenten von Differentialquotienten zu verwandeln und die Endglieder $u^n v^0$ und $u^0 v^n$ durch $u^{(n)} v$, bzw. $u v^{(n)}$ zu ersetzen hat.

Als Beispiel der Anwendung der Formel (12) möge dieselbe Funktion gewählt werden, welche in II. 2) als Summe dargestellt worden ist, nämlich $\cos ax \cos bx$; man erhält unmittelbar

$$\begin{aligned} D^n(\cos ax \cos bx) &= a^n \cos\left(ax + n \frac{\pi}{2}\right) \cos bx \\ &+ \binom{n}{1} a^{n-1} b \cos\left(ax + n-1 \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(bx + \frac{\pi}{2}\right) + \\ &+ \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 \cos\left(ax + n-2 \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(bx + 2 \frac{\pi}{2}\right) + \dots \\ &\dots + b^n \cos ax \cos\left(bx + n \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

42. Die höheren Differentiale. Wir nehmen den in 23 entwickelten Begriff des Differentials einer Funktion $f(x)$ wieder auf, wonach

$$(1) \quad df(x) = f'(x)dx;$$

die begriffliche Bedeutung desselben geht dahin, daß es die Änderung, welche die Funktion bei dem Übergange von x zu $x + dx$ erleidet, um so genauer darstellt, je kleiner dx ist, ja daß man durch Einschränkung von dx den Unterschied zwischen der Änderung der Funktion und ihrem Differential nicht nur an sich, sondern auch im Verhältnis zu dx beliebig klein machen kann.

An dieser Stelle möge auf die Verschiedenheit der Bedeutung hingewiesen werden, welche den Zeichen dx und $df(x)$ in der Gleichung (1) einerseits und in dem Leibnizschen Symbol für den Differentialquotienten $\frac{df(x)}{dx}$ anderseits zukommt. Hier bedeuten dx und $df(x)$ zugleich gegen die Grenze Null konvergierende, also *unendlich klein werdende* Größen und das Symbol $\frac{df(x)}{dx}$ selbst den *Grenzwert* ihres Quotienten; dort bedeutet dx eine endliche und $df(x)$ eine dem dx proportionale ebenfalls endliche Größe, beide *sehr klein* in Ansehung der endlichen Rechnungsgrößen wie etwa x und $f(x)$ selbst; der Grad der Kleinheit ist dabei relativ und abhängig von der Schärfe, in welcher die bezügliche Rechnung ausgeführt werden soll. So ist z. B. (30)

$$d \log \sin x = \frac{\cotg x}{110} dx = M \cotg x dx;$$

für $x = \text{arc } 30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $dx = \text{arc } 1' = \frac{\pi}{180 \cdot 60} = 0,000\,290\,88 \dots$
ergibt sich bei Abkürzung auf 5 Dezimalen

$$\begin{aligned} d \log \sin 30^\circ &= 0,434\,291\,4 \cdot 1,732\,050\,6 \cdot 0,000\,290\,9 \\ &= 0,000\,22 \end{aligned}$$

und dies stimmt mit der in fünfstelligen Tafeln bei $\log \sin 30^\circ$ angegebenen Differenz pro Minute überein; selbst bei einer auf 7 Dezimalen angelegten Rechnung erhält man

$$d \log \sin 30^\circ = 0,000\,218\,8$$

nur in der siebenten Stelle abweichend von der in siebenstelligen Tafeln bei $\log \sin 30^\circ$ angegebenen Differenz 0,000 218 7.

Die mit einem feststehenden dx für verschiedene Werte von x gebildeten Werte von $df(x)$ definieren eine Funktion von x , und von dieser kann neuerdings das Differential gebildet werden; man bezeichnet es statt mit $d(df(x))$ kurz mit $d^2f(x)$ und hat

$$(2) \quad d^2f(x) = D\{f'(x)dx\}dx = f''(x)dx^2.$$

Hiernach ist das *zweite Differential* formell das Produkt aus dem zweiten Differentialquotienten mit dem Quadrat des Differentials der Variablen, begrifflich aber stellt es den Unterschied der ersten Differentiale an den Stellen x und $x + dx$ mit Außerachtlassung von Größen höherer Kleinheitsordnung als dx^2 dar.

Aus der Definitionsgleichung (2) ergibt sich als Folgerung


$$(3) \quad f''(x) = \frac{d^2f(x)}{dx^2};$$

die rechte Seite ist das von Leibniz für den zweiten Differentialquotienten gebrauchte Symbol, gleichbedeutend also mit $f''(x)$ und $D_x^2f(x)$.

Wird dx als gegen Null konvergierende, also als unendlich klein werdende Größe von der ersten Ordnung aufgefaßt, so ist das erste Differential $df(x) = f'(x)dx$, vorausgesetzt, daß $f'(x)$ einen bestimmten von Null verschiedenen Wert hat, ebenfalls eine unendlich klein werdende Größe der ersten, das zweite Differential $d^2f(x) = f''(x)dx^2$ unter einer analogen Voraussetzung über $f''(x)$ eine unendlich kleine Größe zweiter Ordnung.

Bei der Darstellung der Funktion $f(x)$ durch die Ordinaten einer Kurve kann auch das zweite Differential durch eine Liniengröße verdeutlicht werden; bezüglich des ersten Differentials ist es am Schlusse von 23 geschehen. Ist (Fig. 11) $OP = x$, $OP' = x + dx$, $OP'' = x + 2dx$, MR' die Tangente in M , $M'R''$ die Tangente in M' , MQ' sowie $M'Q''$ parallel zu OX , so hat $Q'R'$ die Bedeutung des Differentials an der Stelle x , $Q''R''$ die Bedeutung des mit dem nämlichen dx gebildeten Differentials an der Stelle $x + dx$; der Unterschied dieser zwei Strecken, welcher nach Konstruktion des Parallelogramms $Q'Q''S''R'$ in der Strecke $S''R''$ erhalten wird, ist mit Außerachtlassung von Größen höherer Kleinheitsordnung als dx^2 das zweite Differential.

Fig. 11.



Man kann in der Bildung der Differentiale fortschreiten und erhält — immer unter der Voraussetzung eines feststehenden dx — aus (2) das dritte Differential

$$d^3f(x) = D_x\{f''(x)dx^2\}dx = f'''(x)dx^3,$$

und so fortfahrend allgemein für das n te Differential den Ausdruck:

$$(4) \quad d^n f(x) = f^{(n)}(x)dx^n.$$

Daraus ergibt sich die von Leibniz eingeführte Bezeichnung für den n ten Differentialquotienten:

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

Jeder Formel zwischen den Differentialquotienten mehrerer Funktionen einer Variablen x läßt sich eine Formel zwischen den Differentialen zuordnen und es bedarf, um zu der letzteren zu gelangen, nur der Multiplikation der ersteren mit einer entsprechend hohen Potenz des Differentials dx der Variablen; so folgt aus

$$D\{\varphi(x)\psi(x)\} = \varphi'(x)\psi(x) + \varphi(x)\psi'(x)$$

$$D \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\psi(x)^2}$$

durch Multiplikation mit dx :

$$d\{\varphi(x)\psi(x)\} = \psi(x) \cdot d\varphi(x) + \varphi(x) \cdot d\psi(x)$$

$$d \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{\psi(x) \cdot d\varphi(x) - \varphi(x) \cdot d\psi(x)}{\psi(x)^2};$$

aus (41, III.)

$$D^n(uv) = u^{(n)}v + \binom{n}{1}u^{(n-1)}v' + \binom{n}{2}u^{(n-2)}v'' + \dots + uv^{(n)}$$

durch Multiplikation mit dx^n :

$$d^n(uv) = d^n u \cdot v + \binom{n}{1}d^{n-1}u \cdot dv + \binom{n}{2}d^{n-2}u \cdot d^2v + \dots + u d^n v.$$

Die in diesem Paragraphen getroffene Voraussetzung der *Konstanz von dx* , d. h. seiner Unabhängigkeit von x , ist von so fundamentaler Bedeutung für die Differentialrechnung, daß es notwendig erscheint, mit einigen Worten auf sie einzugehen.

Von vornherein stünde nichts im Wege, dx als eine Funktion von x zu wählen und ihm die Form $dx = \alpha \chi(x)$ zu geben, wobei α eine infinitesimale, d. h. bei Grenzprozessen gegen Null konvergierende Größe bedeutet. Auf die Bestimmung der Differentialquotienten hätte dies keinen Einfluß, weil es bei den hier betrachteten Funktionen auf die Art, wie dx gegen Null konvergiert, nicht ankommt. Aber für die Differentiale ergäbe sich bei solcher Wahl eine andere Rechnung, indem nämlich, $f(x) = y$ gesetzt:

$$dy' = y' dx$$

$$d^2y = y'' dx^2 + y' d^2x$$

$$d^3y = y''' dx^3 + 3y'' dx d^2x + y' d^3x$$

$$\dots \dots \dots$$

würde, worin dx , d^2x , d^3x , ... zu ersetzen sind durch die Ausdrücke

$$dx = \alpha \chi$$

$$d^2x = \alpha^2 \chi \chi'$$

$$d^3x = \alpha^3 [\chi \chi'^2 + \chi^2 \chi'']$$

$$\dots \dots \dots$$

Aus jeder Annahme über $\chi(x)$ würde eine besondere Differentialrechnung folgen. Die einfachste Annahme ist $\chi(x) = 1$; sie führt zu einem *konstanten* dx und weiter zu $d^2x = d^3x = 0$.

Es ist bemerkenswert und ein Beleg für den außerordentlichen Scharfsinn, daß Leibniz schon bei der Begründung der Differentialrechnung auf diese *einfachste Form* derselben verfallen ist.

§ 6. Transformation der unabhängigen Variablen.

43. Die Differentialquotienten in bezug auf eine neue Variable. Es ist eines der wichtigsten Hilfsmittel analytischer Untersuchungen, daß man an die Stelle der Variablen, welche in einem Problem auftreten, andere einführt, die mit ihnen in einem gegebenen Zusammenhange stehen. Man bezeichnet diesen Prozeß als *Transformation der Variablen*.

Hier soll zunächst der einfachste Fall behandelt werden, darin bestehend, daß in einem funktionalen Zusammenhange zwischen zwei Variablen y, x , in welchem x die Rolle der *unabhängigen* Veränderlichen spielt, an die Stelle von x eine neue unabhängige Variable treten soll. Er erscheint in zwei verschiedenen Formen, welche nachstehend getrennt behandelt werden.

I. *Irgend eine Funktion y der Variablen x ist mit x und ihren Differentialquotienten $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots$ zu einem Ausdruck oder zu einer Relation verbunden; an die Stelle von x wird u als neue unabhängige Variable eingeführt durch die Transformationsgleichung*

$$(1) \quad x = \varphi(u);$$

wie gestaltet sich der Ausdruck oder die Relation in den Variablen y, u und den neuen Differentialquotienten $\frac{dy}{du}, \frac{d^2y}{du^2}, \dots$?

Durch Vermittlung von (1) wird y zu einer zusammengesetzten Funktion von u , daher ist (28)

$$\frac{dy}{du} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{du};$$

bei neuerlicher Differentiation in bezug auf u ist darauf zu achten, daß auch $\frac{dy}{dx}$ durch Vermittlung von (1) Funktion von u ist; daher hat man weiter

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{du^2} &= \frac{d^2y}{dx^2} \left(\frac{dx}{du} \right)^2 + \frac{dy}{dx} \frac{d^2x}{du^2} \\ \frac{d^3y}{du^3} &= \frac{d^3y}{dx^3} \left(\frac{dx}{du} \right)^3 + 3 \frac{d^2y}{dx^2} \frac{dx}{du} \frac{d^2x}{du^2} + \frac{dy}{dx} \frac{d^3x}{du^3}; \\ &\dots \end{aligned}$$

Die in diesen Gleichungen auftretenden Differentialquotienten von x sind aus der Transformationsgleichung bestimmbar; wir bringen dies zum Ausdruck, indem wir schreiben:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{du} &= \varphi'(u) \frac{dy}{dx} \\ \frac{d^2y}{du^2} &= \varphi'(u)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + \varphi''(u) \frac{dy}{dx} \\ \frac{d^3y}{du^3} &= \varphi'(u)^3 \frac{d^3y}{dx^3} + 3\varphi'(u)\varphi''(u) \frac{d^2y}{dx^2} + \varphi'''(u) \frac{dy}{dx}; \\ &\dots\dots\dots\end{aligned}$$

daraus ergibt sich durch sukzessive Auflösung:

$$(2) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{du}}{\varphi'(u)} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\varphi'(u) \frac{d^2y}{du^2} - \varphi''(u) \frac{dy}{du}}{\varphi'(u)^3} \\ \frac{d^3y}{dx^3} &= \frac{\left[\varphi'(u) \frac{d^3y}{du^3} - \varphi'''(u) \frac{dy}{du} \right] \varphi'(u) - 3 \left[\varphi'(u) \frac{d^2y}{du^2} - \varphi''(u) \frac{dy}{du} \right] \varphi''(u)}{\varphi'(u)^5} \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \right.$$

Ersetzt man in dem vorgelegten Ausdruck oder in der zu transformierenden Relation x durch $\varphi(u)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, ... durch die eben gefundenen Ausdrücke, so ist die Aufgabe gelöst.

II. In einer *gegebenen Funktion*

$$(3) \quad y = f(x)$$

ist mittels der Transformationsgleichung (1) u als unabhängige Variable einzuführen; wie stellen sich die Differentialquotienten $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, ... in der neuen Variablen dar?

Die Einführung von u in (3) gibt

$$(4) \quad y = f[\varphi(u)] = \psi(u),$$

wo nunmehr ψ das Zeichen für eine *bekannte* Funktion ist; es können also jetzt in (2) auch die Differentialquotienten von y in bezug auf u bestimmt werden, und man erhält

$$(5) \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(u)}{\varphi'(u)} \\ \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\varphi'(u)\psi''(u) - \varphi''(u)\psi'(u)}{\varphi'(u)^3} \\ \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{[\varphi'(u)\psi'''(u) - \varphi'''(u)\psi'(u)]\varphi'(u) - 3[\varphi'(u)\psi''(u) - \varphi''(u)\psi'(u)]\varphi''(u)}{\varphi'(u)^5} \\ \dots \end{cases}$$

Damit wäre die vorgelegte Aufgabe gelöst; den Formeln (5) läßt sich aber eine bemerkenswerte Gestalt geben, an der in der Folge festgehalten werden soll. Multipliziert man in der ersten Gleichung Zähler und Nenner mit du , in der zweiten mit du^2 , in der dritten mit du^3 , ... und beachtet, daß $\varphi'(u)du = d\varphi(u) = dx$, $\varphi''(u)du^2 = d^2\varphi(u) = d^2x$, ..., so schreiben sich die Formeln (5) wie folgt:

$$(6) \quad \begin{cases} D_x y = \frac{dy}{dx} \\ D_x^2 y = \frac{dx d^2y - d^2x dy}{dx^3} \\ D_x^3 y = \frac{(dx d^3y - d^3x dy)dx - 3(dx d^2y - d^2x dy)d^2x}{dx^5} \end{cases}$$

Die rechten Seiten dieser Gleichungen sind als *wirkliche Quotienten aus Differentialen* anzusehen, und diese Differentiale beziehen sich auf eine *beliebige*, alle jedoch auf dieselbe unabhängige Variable. Diese Formeln (6) werden dann zur Anwendung kommen, wenn in dem funktionalen Zusammenhange zwischen y und x die unabhängige Variable noch der freien Wahl überlassen bleiben soll. Entscheidet man sich für x , so ist dx als *konstante* Größe zu behandeln, infolgedessen $d^2x = 0$, $d^3x = 0$, ... zu setzen; dann führen (6) auf die Gleichungen

$$D_x y = \frac{dy}{dx}, \quad D_x^2 y = \frac{d^2y}{dx^2}, \quad D_x^3 y = \frac{d^3y}{dx^3}, \quad \dots,$$

deren Inhalt ein bloß formaler ist. Wählt man dagegen y als unabhängige Variable, vertauscht also die Rollen zwischen y und x , so gilt dy als *konstant* und ist somit $d^2y = 0$, $d^3y = 0$, ...; führt man dies in den Formeln (6) ein und dividiert jedesmal Zähler und Nenner durch die entsprechende (1., 3., 5., ...) Potenz von dy , so kommt

$$(7) \quad \begin{cases} D_x y = \frac{1}{D_y x} \\ D_x^2 y = - \frac{D_y^2 x}{\{D_y x\}^3} \\ D_x^3 y = \frac{3 \{D_y^2 x\}^2 - D_y x \cdot D_y^3 x}{\{D_y x\}^5} \end{cases}$$

Die erste dieser Formeln ist die notwendige Wiederkehr des Satzes in 27.

Zu der Einführung einer neuen unabhängigen Variablen sei eine allgemeine Bemerkung hinzugefügt, die mit den Ausführungen am Schlusse von 42 im Zusammenhange steht. So lange x unabhängige Variable ist, stehen benachbarte Werte x und $x + dx$ an allen Stellen des Bereichs gleich weit von einander ab und es besteht die Vorstellung, daß sich der Punkt (x) auf der Zahlenachse gleichförmig im positiven Sinne bewege. Das alles überträgt sich nun auf die neue Variable u , gilt aber nicht mehr von x . Benachbarte Werte von x , die zu benachbarten Werten u und $u + du$ der neuen Variablen gehören, haben nun *variablen* Abstand, der sich nach der Gleichung $dx = \varphi'(u) du$ regelt, und während sich der Punkt (u) in seinem Gebiete gleichförmig bewegt, führt (x) seinerseits im allgemeinen eine andere Bewegung aus und kann unter Umständen auch die Bewegungsrichtung wechseln. So wird, bei festem du , dx umso größer sein, je größer der Betrag von $\varphi'(u)$ ist; ferner wird sich der Punkt (x) in gleichem oder in entgegengesetztem Sinne als (u) bewegen, jenachdem $\varphi'(u)$ positiv oder negativ ist, und wird (bei stetigem Verlaufe von $\varphi'(u)$) seine Bewegungsrichtung ändern, wenn $\varphi'(u)$ sein Vorzeichen wechselt, also durch Null geht.

44. Beispiele. Die Anwendung der gewonnenen Formeln mögen die folgenden Beispiele erläutern.

1) Zwischen y , x und den beiden ersten Differentialquotienten bestehe die Beziehung:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{x}{1-x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{y}{1-x^2} = 0;$$

wie gestaltet sich dieselbe, nachdem an die Stelle von x die unabhängige Variable u mittels der Gleichung

$$x = \cos u$$

eingeführt worden ist?

Aus den Formeln (2) ergibt sich

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{dy}{du}}{\sin u}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\sin u \cdot \frac{d^2y}{du^2} + \cos u \cdot \frac{dy}{du}}{-\sin^3 u}$$

und durch Eintragung dieser und des Wertes von x in die gegebene Gleichung verwandelt sich diese in

$$\frac{d^2y}{du^2} + y = 0.$$

2) Die zweideutige, in dem Intervall $(-a, +a)$ reelle Funktion

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

kann durch die Substitution

$$x = a \sin u$$

in eine eindeutige, nämlich

$$y = b \cos u$$

umgewandelt werden, und zwar ergibt sich der positive Zweig in dem Intervall $(-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2})$, der negative Zweig in dem Intervall $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ von u . Es sind die Differentialquotienten $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ in der Variablen u darzustellen.

Auf Grund der Formeln (5) erhält man

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a} \operatorname{tg} u, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{b}{a^2 \cos^3 u}.$$

3) Der Ausdruck

$$\varrho = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2y}{dx^2}},$$

unter der Voraussetzung gebildet, daß x als unabhängige Variable gilt, soll so umgestaltet werden, daß die Wahl der unabhängigen Variablen noch freisteht.

Zu diesem Zwecke setze man für $\frac{dy}{dx} = D_x y$ und $\frac{d^2y}{dx^2} = D_x^2 y$ die Werte aus (6) ein, und nach einfacher Umgestaltung ergibt sich:

$$\varrho = \frac{[dx^2 + dy^2]^{\frac{3}{2}}}{dx d^2y - d^2x dy}.$$

4) Durch die Gleichung

$$x = a \arccos \frac{a-y}{a} - \sqrt{y(2a-y)},$$

in welcher die zyklometrische Funktion mit ihrem Hauptwert und die Quadratwurzel positiv zu nehmen ist, ist x als eindeutige explizite Funktion von y gegeben. Es sollen die Differentialquotienten von y in bezug auf x , d. i. $D_x y$, $D_x^2 y$, ... berechnet werden.

Aus der gegebenen Gleichung können die Differentialquotienten von x in bezug auf y unmittelbar bestimmt werden, nämlich

$$D_y x = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a-y}{a}\right)^2}} - \frac{a-y}{\sqrt{y(2a-y)}} = \sqrt{\frac{y}{2a-y}}$$

$$D_y^2 x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2a-y}{y}} \cdot \frac{2a-y+y}{(2a-y)^2} = \frac{a}{(2a-y)^2} \sqrt{\frac{2a-y}{y}};$$

setzt man diese Werte in die Formeln (7) ein, so findet sich

$$D_x y = \sqrt{\frac{2a-y}{y}}$$

$$D_x^2 y = -\frac{a}{(2a-y)^2} \sqrt{\frac{2a-y}{y}} \cdot \left(\frac{2a-y}{y}\right)^{\frac{3}{2}} = -\frac{a}{y^2}.$$

Zu bemerken ist, daß hierbei $D_x y$, $D_x^2 y$ als Funktionen von y dargestellt sind im Gegensatze zu dem Falle, wo ursprünglich y als explizite Funktion von x gegeben ist.

5) Zu zeigen, daß die Gleichung

$$(a^2 + x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = 0$$

durch die Substitution $x = a \operatorname{tg} u$ transformiert wird in

$$\frac{d^2 y}{du^2} = 0.$$

6) Zu zeigen, daß sich die Gleichung

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + n^2 y = 0$$

durch die Substitution $x = e^u$ verwandelt in

$$\frac{d^2 y}{du^2} + n^2 y = 0.$$

Dritter Abschnitt.


Differentiation von Funktionen mehrerer Variablen.

§ 1. Partielle Differentialquotienten und Differentiale.

Das totale Differential.

45. Stetigkeit der Funktionen mehrerer Variablen.

Es sei ein Bereich P der beiden unabhängigen Variablen x, y gegeben (8) und auf diesem Bereiche s als eindeutige Funktion dieser Variablen definiert: $s = f(x, y)$ (11). Man kann den Bereich P durch einen Teil der auf ein rechtwinkliges Achsen-system bezogenen Ebene geometrisch darstellen so, daß jedem Punkte M (Fig. 12), welcher innerhalb oder auf der Begrenzung dieses Teiles liegt, eine Wertverbindung x/y entspricht, die dem Bereiche angehört. Durch Zuhilfenahme einer dritten Achse wird es möglich, auch den zu x/y gehörigen Funktionswert s in die Darstellung einzubeziehen; diese dritte Achse möge im Ursprung O



auf der Ebene XOY senkrecht stehen und ihre positive Richtung OZ nach oben, die negative OZ' nach unten wenden; aus M werde nun eine Parallele zu OZ oder OZ' geführt, je nachdem s positiv oder negativ ist, und auf ihr die Länge von $|s|$ Einheiten abgetragen; der Endpunkt F dieser Strecke, die man die *Applikate* von F nennt, kann dann zur Darstellung von s an der Stelle x/y dienen.

Läßt man x ein Intervall (α_0, β_0) stetig durchlaufen und ordnet ihm Werte y zu, welche eine stetige Funktion von x konstituieren, jedoch so, daß die Wertverbindung x/y oder der Punkt x/y beständig dem Bereiche angehört, so beschreibt der

Punkt eine den Bereich P durchsetzende Kurve KL . Da y dabei eine Funktion von x ist, so erscheint $z = f(x, y)$ bei dieser Auffassung als Funktion von x allein, und ist es eine stetige Funktion von x (17), so beschreibt der Punkt $x/y/z$ oder F eine Kurve im Raume; wir wollen dann sagen, $z = f(x, y)$ sei längs der Kurve KL stetig.

Ist $z = f(x, y)$ an jeder Stelle des Bereiches P eindeutig definiert, längs jeder ihn durchsetzenden Kurve stetig, so heißt $f(x, y)$ eine im Bereiche P stetige Funktion.

Von den Eigenschaften einer solchen Funktion heben wir die folgende hervor.

Wenn die Funktion $f(x, y)$ in dem Bereiche P stetig ist, so läßt sich an jeder Stelle x/y innerhalb des Bereichs zu einem beliebig klein festgesetzten positiven ε ein hinreichend kleines positives η bestimmen derart, daß für jede von x/y verschiedene Wertverbindung x'/y' , für welche $|x' - x| < \eta$ und $|y' - y| < \eta$,

$$(1) \quad |f(x', y') - f(x, y)| < \varepsilon.$$

In der geometrischen Darstellung hat dieser Satz die Bedeutung, daß zu dem Punkte $M(x/y)$ als Mittelpunkt eine Umgehung $\alpha\beta\gamma\delta$ in Form eines Quadrates von einer so kleinen Seite 2η sich konstruieren läßt, derart, daß der zu einem beliebigen Punkte M' dieser Umgehung gehörige Funktionswert sich von dem zu M gehörigen dem Betrage nach um weniger als ε unterscheidet.

Die Richtigkeit des Satzes geht aus der Definition der Stetigkeit im Bereiche P hervor. Auf jeder durch M geführten Geraden läßt sich zu jeder Seite von M ein Grenzpunkt, M_1 zur einen, M_2 zur anderen, angeben, derart, daß für jeden zwischen M_1, M_2 auf dieser Geraden liegenden Punkt die Beziehung (1) gilt (17 (1)). Denkt man sich dies für alle Geraden durch M ausgeführt, so wird es unter den Grenzpunkten einen geben, welcher M am nächsten liegt, und dieser bestimmt die verlangte Umgehung*).

Man bezeichnet die in dem Satze ausgesprochene Eigenschaft als Stetigkeit der Funktion $f(x, y)$ an der Stelle x/y ;

*) Man lege durch diesen Punkt einen Kreis vom Zentrum M und schreibe diesem ein nach den Achsen orientiertes Quadrat ein.

gewöhnlich nimmt man sie zum Ausgangspunkte und erklärt dann $f(x, y)$ als stetig im Bereiche P , wenn es an jeder Stelle desselben stetig ist. Übrigens kann man den Inhalt des Satzes auch in der Form ausdrücken, es sei der zu der Stelle x/y gehörige Funktionswert $f(x, y)$ der Grenzwert von $f(x', y')$ bei beliebiger unaufhörlicher Annäherung von x'/y' an x/y , in Zeichen

$$(2) \quad \lim_{x' \rightarrow x, y' \rightarrow y} f(x', y') = f(x, y).$$

Ist $f(x, y)$ eine in dem Bereiche P stetige Funktion, so ist der Ort der Punkte F , welche die Werte der Funktion in dem oben entwickelten Sinne darstellen, eine Fläche und $z = f(x, y)$ wird die Gleichung dieser Fläche genannt.

Zur Erläuterung der vorstehenden Ausführungen diene die Funktion $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$. Sie ist für alle Wertepaare x/y eindeutig bestimmt, mit alleiniger Ausnahme von $0/0$, wo ihr Ausdruck jede Bedeutung verliert. Verfolgt man sie längs der durch diese Stelle geführten Geraden $y = kx$, so nimmt sie den Ausdruck $f(x, kx) = \frac{2kx^2}{x^2(1+k^2)}$ an, der unabhängig ist von x und, wie klein auch dieses werden möge, den Wert $\frac{2k}{1+k^2}$ annimmt, so daß $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} f(x, y)$ auf jeder durch $0/0$ geführten Geraden einen bestimmten, auf jeder aber einen andern Grenzwert $\frac{2k}{1+k^2}$ annimmt. Die betrachtete Funktion ist stetig im Bereich der ganzen xy -Ebene mit Ausnahme der Stelle $0/0$; sie ist stetig, weil konstant, längs jeder durch diese Stelle geführten Geraden, und doch nicht stetig an dieser Stelle selbst. Daher ist in der oben aufgestellten Definition für die Stetigkeit im Bereiche P die Voraussetzung der eindeutigen Bestimmtheit an jeder Stelle des Bereichs unerlässlich.

Von einer Funktion $u = \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, welche für einen gewissen Bereich der n Variablen x_1, x_2, \dots, x_n eindeutig definiert ist, wird man in Analogie mit der für eine Funktion zweier Variablen hervorgehobenen Eigenschaft sagen, sie sei an der Stelle oder in dem Punkte $x_1/x_2/\dots/x_n$ stetig, wenn sich zu einem beliebig kleinen positiven ε ein hinreichend kleines

positives η so bestimmen läßt, daß für jede andere Wertverbindung $x_1'/x_2' \dots / x_n'$, für welche

$$|x_1' - x_1| < \eta, \quad |x_2' - x_2| < \eta, \dots, |x_n' - x_n| < \eta,$$

die Beziehung besteht:

$$|f(x_1', x_2', \dots, x_n') - f(x_1, x_2, \dots, x_n)| < \varepsilon;$$

und die Funktion wird weiter als stetig im *Bereiche* gelten, wenn sie es an allen Stellen ist.

46. Partielle Differentialquotienten und Differentiale. Es sei $z = f(x, y)$ eine im Gebiete P stetige Funktion; verfolgt man ihren Verlauf bei einem feststehenden Werte von y , also längs einer Geraden, welche das Gebiet P parallel zur x -Achse durchsetzt, so verhält sie sich wie eine Funktion von einer Variablen und läßt die Bildung der für solche Funktionen aufgestellten Begriffe und Größen zu.

Erteilt man, von einem bestimmten Werte x ausgehend, demselben eine Änderung

$$\Delta x = h,$$

so erfährt die Funktion die *partielle Änderung*:

$$(1) \quad \Delta_x z = f(x + h, y) - f(x, y);$$

konvergiert der aus beiden gebildete Differenzenquotient

$$\frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

während h den stetigen Grenzübergang $\lim h = \pm 0$ ausführt, gegen einen bestimmten Grenzwert, so heißt dieser der zur Stelle x/y gehörige *partielle Differentialquotient in bezug auf x* , wird mit $D_x f(x, y)$, oder, in einer von Jacobi eingeführten Abänderung des Leibnizschen Symbols*) für den Differentialquotienten einer Funktion einer Variablen, mit $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$, kürzer

$\frac{\partial z}{\partial x}$, bezeichnet, so daß

$$(2) \quad D_x f(x, y) = \lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}.$$

Besitzt die Funktion an *jeder* Stelle von P einen solchen Differentialquotienten, so ist hierdurch eine neue Funktion im

*) Die vor ihm schon *Legendre* vorgeschlagen hatte.

Bereiche P definiert, welche man als *partielle Ableitung* von $f(x, y)$ in bezug auf x oder auch wieder als partiellen Differentialquotienten nach x bezeichnet.

Durch Multiplikation des partiellen Differentialquotienten mit der Änderung Δx der Variablen, welche letztere begrifflich mit dem Differential dx derselben zusammenfällt (23), ergibt sich das *partielle Differential* $d_x s$ in bezug auf x , so daß

$$(3) \quad d_x s = \frac{\partial s}{\partial x} dx;$$

für die Beziehung desselben zur Änderung $\Delta_x s$ gelten die bei Funktionen einer Variablen gemachten Bemerkungen (23, 42).

Zu analogen Betrachtungen wird man geführt, wenn man den Verlauf von $s = f(x, y)$ bei feststehendem x , also längs einer das Gebiet P parallel zur y -Achse durchquerenden Geraden, verfolgt; aus der Änderung

$$\Delta y = k,$$

die man einem Ausgangswerte y erteilt, entspringt die *partielle Änderung*

$$(1^*) \quad \Delta_y s = f(x, y + k) - f(x, y),$$

dann der *partielle Differentialquotient* in bezug auf y :

$$(2^*) \quad \frac{\partial s}{\partial y} = \lim_{k \rightarrow \pm 0} \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k},$$

einerseits genommen an der bestimmten Stelle x/y , andererseits als Funktion im Gebiete P , und schließlich das *partielle Differential* in bezug auf y :

$$(3^*) \quad d_y s = \frac{\partial s}{\partial y} dy.$$

Es bedarf keiner näheren Erläuterung, wie sich diese Betrachtung fortsetzt, wenn es sich um eine Funktion von mehr als zwei Variablen handelt*).

47. Der totale Differentialquotient und das totale Differential. Man kann, auf die geometrische Darstellung beziehend, die partiellen Differentialquotienten in bezug

*) Lagrange benutzte für die Differentiation nach x obere, für die Differentiation nach y untere Indizes, schrieb also s'_x, s'_y . Andere Bezeichnungen sind $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$, auch f_x, f_y oder s'_x, s'_y u. a.

auf x, y auch als *Differentialquotienten in der Richtung X*, bzw. *Y* bezeichnen und kann ihnen den *Differentialquotienten in einer beliebigen Richtung* oder, sofern dabei beide Variablen zugleich abgeändert werden, den *totalen Differentialquotienten* gegenüberstellen.

Den von dem Punkte $M(x/y)$ (Fig. 13) ausgehenden Halbstrahl $M(S)$ und den entgegengesetzten $M(S')$ fassen wir in




Fig. 13.

eins zusammen, sprechen kurz von der „Richtung S “ und charakterisieren sie durch die hohlen Winkel φ und ψ , welche $M(S)$ mit den Richtungen $M(X)$ und $M(Y)$ einschließt. Der auf $M(S)$ liegende Punkt M_1 gehöre zur Wertverbindung $x + h/y + k$, wobei $MQ = h$, $QM_1 = k$ ist;

die Entfernung $MM_1 = \Delta s = \sqrt{h^2 + k^2}$ werde auf $M(S)$ *positiv* gezählt; dann ist

$$(4) \quad \frac{h}{\Delta s} = \cos \varphi \quad \frac{k}{\Delta s} = \cos \psi.$$

Den Unterschied der zu x/y und $x + h/y + k$ gehörigen Funktionswerte bezeichnet man als *totale Änderung* von s an der Stelle x/y und gebraucht dafür das Zeichen Δs , so daß

$$(5) \quad \Delta s = f(x + h, y + k) - f(x, y);$$

der entsprechende Differenzenquotient ist $\frac{\Delta s}{\Delta s}$ und läßt sich folgendermaßen umgestalten:

$$(6) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{\Delta s}{\Delta s} &= \frac{f(x + h, y + k) - f(x, y + k) + f(x, y + k) - f(x, y)}{\Delta s} \\ &= \frac{f(x + h, y + k) - f(x, y + k)}{h} \frac{h}{\Delta s} + \frac{f(x, y + k) - f(x, y)}{k} \frac{k}{\Delta s}. \end{aligned} \right.$$

Kommt der Punkt M_1 auf $M(S')$ zu liegen, nach M_1' , so ändern $h, k, \Delta s$ gleichzeitig ihre Vorzeichen, die Quotienten $\frac{h}{\Delta s}, \frac{k}{\Delta s}$ behalten also für beide Lagen, und wie nahe auch M_1 , beziehungsweise M_1' an M rückt, die in (4) angegebenen Werte bei; besitzt ferner die Funktion partielle Differentialquotienten in bezug auf x und y , so ist

$$\lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y+k)}{h} = f'_x(x, y+k),$$

$$\lim_{k \rightarrow \pm 0} \frac{f(x, y+k) - f(x, y)}{k} = f'_y(x, y) = \frac{\partial s}{\partial y};$$

wenn endlich der erste dieser Differentialquotienten eine stetige Funktion von y ist, so hat man weiter

$$\lim_{k \rightarrow \pm 0} \lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y+k)}{h} = f'_x(x, y) = \frac{\partial s}{\partial x}.$$

Man hätte den Zähler von $\frac{\Delta s}{\Delta s}$ auch erweitern können auf

$$f(x+h, y+k) - f(x+h, y) + f(x+h, y) - f(x, y),$$

und es hätte sich dann bei analog durchgeführter Betrachtung die Bedingung ergeben, daß f'_y eine stetige Funktion von x sein müsse, damit bei $\lim k = 0$ und $\lim h = 0$ der Quotient

$$\frac{f(x+h, y+k) - f(x+h, y)}{k}$$

gegen die Grenze $f'_y(x, y)$ konvergiere.

Bei stetigem beiderseitigen Grenzübergange von $x+h/y+k$ zu x/y in der Richtung S , wobei die Größen $h, k, \Delta s$ gleichzeitig der Null als Grenze sich nähern, konvergiert also der Quotient (6) gegen den Grenzwert

$$(7) \quad \frac{ds}{ds} = \frac{\partial s}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial s}{\partial y} \cos \psi,$$

wenn an der Stelle x/y entweder f'_x eine stetige Funktion von y oder f'_y eine stetige Funktion von x ist*). Man nennt dann diesen Grenzwert den *totalen Differentialquotienten* der Funktion $f(x, y)$ oder ihren Differentialquotienten *in der Richtung S* .

Für die Richtung $M(X)$

$$\varphi = 0, \quad \psi = \frac{\pi}{2}$$

fallen die Begriffe $\frac{ds}{ds}$ und $\frac{\partial s}{\partial x}$, für die Richtung $M(Y)$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}, \quad \psi = 0$$

$\frac{ds}{ds}$ und $\frac{\partial s}{\partial y}$ zusammen.

*) Beides ist erfüllt, wenn f'_x, f'_y stetige Funktionen von x, y sind.

Aus dem totalen Differentialquotienten ergibt sich in analoger Weise wie bei einer Funktion einer Variablen durch Multiplikation mit ds das *totale Differential* ds der Funktion; da nun aus (4)

$$\Delta s \cos \varphi = h = \Delta x, \quad \Delta s \cos \psi = k = \Delta y$$

folgt und bei den unabhängigen Variablen Δx und dx einerseits und Δy und dy andererseits gleichbedeutend sind, so ergibt sich für das totale Differential der Ausdruck

$$(8) \quad ds = \frac{\partial s}{\partial x} dx + \frac{\partial s}{\partial y} dy,$$

welcher mit Rücksicht auf (3) und (3*) auch in der Form

$$(8^*) \quad ds = d_x s + d_y s$$

geschrieben werden kann.

Das *totale Differential einer Funktion zweier Variablen* stellt sich demnach, wenn die Bedingungen für die Existenz des totalen Differentialquotienten vorhanden sind, als Summe der auf die einzelnen Variablen bezüglichen partiellen Differentiale dar und bedeutet begrifflich einen Wert, der sich von der totalen Änderung Δs (5) nur um Größen höherer Kleinheitsordnung in bezug auf dx und dy unterscheidet, welche letztere vermöge (4) für jeden von 0 , $\frac{\pi}{2}$ und π verschiedenen Wert von φ Größen gleicher Kleinheitsordnung sind.

Die Richtung, nach welcher das Differential (8) genommen ist, ergibt sich zufolge (4) aus den Gleichungen

$$\frac{dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = \cos \varphi, \quad \frac{dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = \cos \psi$$

eindeutig in dem Intervall $(0, 2\pi)$, weil für das Differential zwei entgegengesetzte Richtungen nicht äquivalent sind wie für den Differentialquotienten.

48. Geometrische Deutung des totalen Differentials. Bevor auf die Ausdehnung der eben entwickelten Begriffe auf Funktionen von mehr als zwei Variablen eingegangen wird, soll ihre geometrische Bedeutung erläutert werden für den Fall, daß die Werte der Funktion $s = f(x, y)$ durch die Applikaten einer Fläche dargestellt werden.

Es sei F (Fig. 14) der zu x/y gehörige Punkt der Fläche, FF' die Kurve, welche beschrieben wird, wenn M auf der zur x -Achse Parallelen MM' fortschreitet, FG' die Tangente an diese Kurve in F , FH' die Parallele zu OX ; dann ist (23)

$$MM' = h = dx, \quad H'F' = \Delta_x s, \quad H'G' = d_x s;$$

ferner sei FF'' die Kurve, welche bei der Bewegung von M auf der zur y -Achse Parallelen MM'' beschrieben wird, FG'' die Tangente an diese Kurve in F , FH'' die Parallele zur y -Achse; alsdann ist

$$MM'' = k = dy,$$

$$H''F'' = \Delta_y s,$$

$$H''G'' = d_y s.$$

Auf dem Wege $M''M_1$ werde die Kurve $F''F_1$, auf dem Wege $M'M_1$ die Kurve $F'F_1$ beschrieben; wird $H''H_1$ parallel zur x -Achse geführt, so ist $H'H_1$ parallel zur y -Achse und

$$H_1F_1 = \Delta s;$$

dagegen schneidet die Ebene, welche durch die Tangenten FG' und FG'' gelegt wird, auf der Geraden M_1F_1 einen Punkt G_1 , ein als vierte Ecke des durch $G'FG''$ bestimmten Parallelogramms, und führt man $G''J_1$ parallel zur x -Achse, so zerfällt die Strecke H_1G_1 in die Teile H_1J_1 und J_1G_1 , deren erster gleich $H''G''$, deren zweiter wegen der Kongruenz der Dreiecke $G''J_1G_1$ und $FH'G'$ gleich $H'G'$ ist; mithin ist


$$H_1G_1 = H'G' + H''G'' = d_x s + d_y s,$$

also

$$H_1G_1 = ds.$$

Die Ebene $FG'G_1G''$ der beiden Tangenten FG' , FG'' nennt man die *Tangentialebene* der Fläche im Punkte F . Hiernach ist das totale Differential bei dem Übergange von der Wertverbindung x/y zu jener $x + dx/y + dy$ dargestellt durch die Änderung, welche die Applikate der im Punkte $x/y/s$ an die Fläche gelegten Tangentialebene dabei erleidet.

Fig. 14.



49. Ausdehnung auf drei und mehr Variable. Handelt es sich um eine in dem Bereich R eindeutig definierte und stetige Funktion $u = f(x, y, z)$ der drei Variablen x, y, z , so läßt der Bereich auch noch eine geometrische Versinnlichung zu (9) und die Betrachtungen von 47 gestatten fast wörtliche Übertragung. Der von dem Punkte M des Raumes, welcher der Wertverbindung $x/y/z$ der Variablen zugeordnet ist, ausgehende Halbstrahl $M(S)$ sei durch die Winkel φ, ψ, χ charakterisiert, die er mit den positiven Halbachsen des (orthogonalen) räumlichen Koordinatensystems einschließt, und werde mit dem entgegengesetzten Halbstrahl $M(S')$ zusammen kurz als „Richtung S “ bezeichnet. Dann ergibt sich unter der (allerdings zu weit gefaßten) Voraussetzung der Existenz und Stetigkeit der partiellen Differentialquotienten $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ der totale Differentialquotient in der Richtung S :

$$(9) \quad \frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \psi + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \chi$$

und daraus das totale Differential:

$$(10) \quad du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz,$$

also

$$(10^*) \quad du = d_x u + d_y u + d_z u,$$

wobei die Richtung eindeutig bestimmt ist durch

$$\begin{aligned} \frac{dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}} &= \cos \varphi, & \frac{dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}} &= \cos \psi, \\ \frac{dz}{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}} &= \cos \chi. \end{aligned}$$

Bei einer Funktion $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ von n (> 3) Variablen hört auch die Möglichkeit der geometrischen Darstellung des Bereiches R auf; man behält aber die geometrische Ausdrucksweise bei, ordnet der Wertverbindung $x_1/x_2/\dots/x_n$ einen Punkt M im n -dimensionalen Raume zu, bezogen auf ein n -achsiges orthogonales Koordinatensystem; spricht ferner von der Richtung, welche den Punkt M mit dem Punkte

$$M_1 \dots x_1 + dx_1/x_2 + dx_2/\dots/x_n + dx_n$$

verbindet und bestimmt sie durch die Richtungskosinusse

$$\cos \varphi_1 = \frac{dx_1}{\sqrt{dx_1^2 + dx_2^2 + \dots + dx_n^2}}, \dots \cos \varphi_n = \frac{dx_n}{\sqrt{dx_1^2 + dx_2^2 + \dots + dx_n^2}},$$

deren Quadratsumme 1 ist; nennt weiter

$$ds = \sqrt{dx_1^2 + dx_2^2 + \dots + dx_n^2}$$

die *Entfernung* von M zu M_1 ; erklärt, die Stetigkeit der Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots$ vorausgesetzt,

$$(11) \quad \frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \cos \varphi_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} \cos \varphi_2 + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \cos \varphi_n$$

als den *totalen Differentialquotienten* von u in der bezeichneten Richtung (und der ihr entgegengesetzten) und

$$(12) \quad du = \frac{\partial u}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} dx_n$$

als das zu jener Richtung gehörige *totale Differential*. Der in 47 für zwei Variable formulierte Satz, daß das totale Differential der Summe der partiellen Differentiale gleichkommt, behält also für beliebig viele Variable seine Geltung.

Hat die Funktion u einen konstanten Wert im ganzen Bereiche R , so ist ihr totaler Differentialquotient $\frac{du}{ds}$ und daher auch ihr totales Differential du im ganzen Bereiche $= 0$ (21). Demnach folgt aus einer Gleichung von der Form

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$$

eine lineare homogene Beziehung zwischen den Differentialen der Variablen, nämlich:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n = 0.$$

50. Anwendungen. Die Bestimmung des totalen Differentials kommt häufig zur Anwendung, wenn es sich darum handelt, die Änderung einer Größe annähernd zu berechnen, welche sie bei verhältnismäßig sehr kleinen Änderungen der sie bestimmenden Größen erfährt, wobei von Größen höherer Kleinheitsordnung abgesehen werden kann.

Zur Erläuterung mögen die folgenden *Beispiele* dienen.

1) Welche Änderung erfährt die Fläche eines Rechtecks mit den Seiten x, y , wenn diese um die sehr kleinen Größen dx, dy sich ändern?

Die Fläche ist

$$u = xy;$$

daraus ergibt sich $\frac{\partial u}{\partial x} = y, \frac{\partial u}{\partial y} = x$, folglich ist

$$du = ydx + xdy.$$

Die Rechnung sowie eine einfache Figur belehren darüber, daß gegenüber der wirklichen Änderung bei diesem Ansatz das Produkt $dx dy$ vernachlässigt ist.

2) Es ist die Änderung zu bestimmen, welche das Volumen eines geraden Zylinders vom Grundhalbmesser x und der Höhe y erleidet, wenn die genannten Dimensionen um die kleinen Beträge dx, dy sich ändern.

Das Volumen ist

$$v = \pi x^2 y;$$

daraus berechnet sich $\frac{\partial v}{\partial x} = 2\pi xy, \frac{\partial v}{\partial y} = \pi x^2$, somit ist das verlangte

$$dv = 2\pi xy dx + \pi x^2 dy.$$

Die wirkliche Änderung ist

$$\begin{aligned} \pi(x + dx)^2(y + dy) - \pi x^2 y &= 2\pi xy dx + \pi x^2 dy + 2\pi x dx dy \\ &\quad + \pi y dx^2 + \pi dx^2 dy; \end{aligned}$$

unterdrückt werden also $2\pi x dx dy, \pi y dx^2$ und $\pi dx^2 dy$, Beträge, die in bezug auf dx, dy von zweiter, beziehungsweise dritter Kleinheitsordnung sind. Es ist nicht schwer, die beiden Teile von dv geometrisch zu interpretieren.

3) In einem ebenen Dreieck ändern sich eine Seite x und die beiden ihr anliegenden Winkel y, s um die Beträge dx, dy, ds beziehungsweise; es ist die daraus hervorgehende Änderung der Dreiecksfläche zu bestimmen.

Die Fläche des Dreiecks ist

$$u = \frac{x^2 \sin y \sin s}{2 \sin(y + s)};$$

daraus folgt

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x \sin y \sin z}{\sin(y+z)} = \frac{2u}{x},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{x^2 \cos y \sin z}{2 \sin(y+z)} - \frac{x^2 \sin y \sin z \cos(y+z)}{2 \sin^2(y+z)} \\ &= u \cotg y - u \cotg(y+z), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{x^2 \sin y \cos z}{2 \sin(y+z)} - \frac{x^2 \sin y \sin z \cos(y+z)}{2 \sin^2(y+z)} \\ &= u \cotg z - u \cotg(y+z); \end{aligned}$$

$$\text{also ist } du = u \left[\frac{2dx}{x} + \{ \cotg y - \cotg(y+z) \} dy + \{ \cotg z - \cotg(y+z) \} dz \right].$$

Es sei beispielsweise

$$x = 500 \text{ m}, \quad y = \frac{\pi}{6} (30^\circ), \quad z = \frac{\pi}{4} (45^\circ),$$

$$dx = 0,01 \text{ m}, \quad dy = \text{arc } 5'' = 0,00002424, \quad dz = \text{arc } 10'' = 0,00004848;$$

mit diesen Daten berechnet sich zunächst

$$u = 45\,753,17 \text{ m}^2$$

und weiter

$$du = 45\,753,17 [0,0000400 + 0,0000354 + 0,0000354] = 5,07 \text{ m}^2;$$

die direkte Rechnung der Fläche mit den geänderten Daten liefert

$$u' = 45\,758,26 \text{ m}^2,$$

woraus die wirkliche Änderung bei auf zwei Dezimalen angelegter Rechnung $u' - u = 5,09 \text{ m}^2$ sich ergibt.

4) Man zeige, daß aus

$$z = \frac{\sqrt{X} - \sqrt{Y}}{x - y},$$

worin $X = ax^2 + 2bx + c$, $Y = ay^2 + 2by + c$ ist, folgt:

$$\frac{2dz}{a - z^2} = \frac{dx}{\sqrt{X}} + \frac{dy}{\sqrt{Y}}.$$

§ 2. Die höheren Differentialquotienten und Differentiale.

51. Wiederholte Differentiation nach derselben Variablen. Wenn die Funktion $z = f(x, y)$ auf dem Gebiete P , auf welchem sie gegeben ist, einen partiellen Differentialquotienten in bezug auf x besitzt, der selbst wieder wie die ursprüngliche Funktion auf dem gedachten Gebiete stetig ist

und einen partiellen Differentialquotienten in bezug auf x zuläßt, so heißt dieser der *zweite partielle Differentialquotient* der Funktion $f(x, y)$ in bezug auf x und kann durch eines der Zeichen

$$D_x^2 f(x, y), \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

dargestellt werden; die beiden letzten Zeichen sind eine von Jacobi herrührende Nachbildung des entsprechenden Leibnizschen Symbols für Funktionen einer Variablen*).

Wie bei Funktionen einer Variablen (40) kann dieser Prozeß, solange die angeführten Voraussetzungen fortbestehen, wiederholt werden, und man gelangt so zum dritten, ... n -ten partiellen Differentialquotienten in bezug auf x , d. i.

$$\frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial x^3}, \dots, \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^n},$$

oder kürzer

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}, \dots, \frac{\partial^n z}{\partial x^n}.$$

Derselbe Gedankengang läßt sich auf die Variable y anwenden, wodurch die höheren partiellen Differentialquotienten in bezug auf y zustande kommen:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \dots, \frac{\partial^n z}{\partial y^n}.$$

Bei einer Funktion von mehr als zwei Variablen treten weitere Reihen derart gebildeter höherer partieller Differentialquotienten auf.

52. Wiederholte Differentiation nach verschiedenen Variablen. Da das Resultat der partiellen Differentiation von $z = f(x, y)$ nach x im allgemeinen wieder eine Funktion von x, y ist, die wir in der nun folgenden Untersuchung mit $f'_x(x, y)$ bezeichnen wollen, so daß

$$f'_x(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x},$$

so kann auf dasselbe ein zweitesmal die partielle Differentiation in bezug auf y angewendet werden; ihr Ergebnis bezeichnen

*) Vgl. dazu die erste Fußnote zu 46.

wir als *zweiten partiellen Differentialquotienten in bezug auf x und y* und schreiben es in einer der Formen $f''_{xy}(x, y)$, $\frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y}$, so daß

$$f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial f'_x(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y}.$$

Andererseits ist auch der partielle Differentialquotient nach y :

$$f'_y(x, y) = \frac{\partial s}{\partial y},$$

eine Funktion beider Variablen und kann als solche in bezug auf x differenziert werden, wodurch der *zweite partielle Differentialquotient in bezug auf y und x* entsteht:

$$f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial f'_y(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial^2 s}{\partial y \partial x}.$$

Es ist jetzt unsere Aufgabe, die Beziehung dieser zwei zweiten Differentialquotienten, welche sich formell durch die Reihenfolge der Operationen unterscheiden, durch die sie aus der ursprünglichen Funktion abgeleitet sind, für eine Stelle x/y des Gebietes P zu untersuchen.

Es sei*)

$$\varphi(x) = \frac{f(x, y+k) - f(x, y)}{k}, \quad \psi(y) = \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h};$$

dann ist

$$(1) \quad \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} = \frac{1}{hk} \{f(x+h, y+k) - f(x+h, y) - f(x, y+k) + f(x, y)\}$$

und

$$(2) \quad \frac{\psi(y+k) - \psi(y)}{k} = \frac{1}{hk} \{f(x+h, y+k) - f(x, y+k) - f(x+h, y) + f(x, y)\};$$

andererseits ist mit Benützung des Mittelwertsatzes (38)

$$\frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} = \varphi'(\xi) = \frac{f'_x(\xi, y+k) - f'_x(\xi, y)}{k} = f''_{xy}(\xi, \eta)$$

und

$$\frac{\psi(y+k) - \psi(y)}{k} = \psi'(\bar{\eta}) = \frac{f'_y(x+h, \bar{\eta}) - f'_y(x, \bar{\eta})}{h} = f''_{xy}(\bar{\xi}, \bar{\eta}).$$

*) Vgl. G. Kowalewski, Die klassischen Probleme der Analysis des Unendlichen, Leipzig 1910, p. 272.

Daraus folgt im Zusammenhalte mit (1) und (2), daß

$$(3) \quad f''_{xy}(\xi, \eta) = f''_{yx}(\xi, \eta),$$

Dabei bedeuten $\xi, \bar{\xi}$ Werte aus dem Intervall $(x, x + h)$, η und $\bar{\eta}$ Werte aus dem Intervall $(y, y + k)$; ferner ist die Voraussetzung gemacht, daß f''_{xy} und f''_{yx} in der durch h, k gekennzeichneten Umgebung von x/y existieren. Sind sie überdies stetig an dieser Stelle, so ergibt sich aus (3) durch den Grenzübergang $\lim h = 0, \lim k = 0$:

$$(4) \quad f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y),$$

in anderer Schreibweise:

$$(4^*) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

In zusammenfassender Wiederholung des eben Vorgeführten kann also der Satz ausgesprochen werden:

Besitzt die Funktion $z = f(x, y)$ an der Stelle x/y und in einer gewissen, übrigens beliebig engen Umgebung dieser Stelle die Differentialquotienten $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, und sind die beiden letztgenannten stetig an der genannten Stelle, so ist daselbst

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

Erfüllt die Funktion $f(x, y)$ in ihrem ganzen Gebiete die angeführten Bedingungen, so findet diese Beziehung an jeder Stelle statt. Ihr Inhalt läßt sich dahin formulieren, daß das Resultat der sukzessiven Differentiation einer Funktion nach zwei verschiedenen Variablen von der Reihenfolge, in welcher man die beiden Differentiationen ausführt, nicht abhängt.

Diese wichtige Tatsache läßt sich nun auch auf mehr als zwei Differentiationen und auch auf mehr als zwei Variable ausdehnen. Soll die Funktion $z = f(x, y)$ zweimal in bezug auf x und einmal in bezug auf y differenziert werden, so zeigt das für die Multiplikation dreier Faktoren gültige Schema

$$xxy = x(xy) = x(yx) = (xy)x = (yx)x = yxx,$$

in welchem immer nur zwei aufeinanderfolgende Buchstaben vertauscht worden sind, daß es gleichgültig ist, ob man die Differentiation in der Ordnung xxy oder xyx oder yxx

ausführt; man bezeichnet daher den betreffenden Differentialquotienten mit

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2 \partial y} \cdot *)$$

Ist die Funktion $u = f(x, y, s)$ m -mal in bezug auf x , n -mal in bezug auf y und p -mal in bezug auf s zu differenzieren, so darf man diese $m + n + p$ Differentiationen in beliebiger Reihenfolge zur Ausführung bringen; ihr Resultat drückt man durch das Symbol

$$\frac{\partial^{m+n+p} u}{\partial x^m \partial y^n \partial s^p}$$

aus.

Durch den Umstand, daß die Reihenfolge mehrerer Differentiationen nach verschiedenen Variablen keinen Einfluß auf das Endergebnis übt, vermindert sich die Anzahl der von einander verschiedenen Differentialquotienten einer bestimmten Ordnung gegenüber derjenigen, welche statthätte, wenn die Reihenfolge von Einfluß wäre. Im letztgedachten Falle hätte man nämlich bei einer Funktion von n Variablen

$$n^r$$

Differentialquotienten r -ter Ordnung zu unterscheiden entsprechend der Anzahl der Variationen mit Wiederholung von n Elementen in der r -ten Klasse; wogegen sich die Zahl in Wirklichkeit auf

$$\frac{n(n+1) \cdots (n+r-1)}{1 \cdot 2 \cdots r}$$

stellt, entsprechend der Anzahl der Kombinationen mit Wiederholung von n Elementen in der r -ten Klasse.

Man spricht bei Funktionen mehrerer Variablen von *reinen* und *gemischten* Differentialquotienten, je nachdem die Differentiation nur nach einer oder nach mehreren Variablen erfolgt.

*) Zur Bezeichnung der höheren partiellen Differentialquotienten von $f(x, y)$ sind auch die Zeichen

$$f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yy}; f'''_{x^2}, f'''_{x^2y}, \dots$$

oder einfacher

$$f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}; f_{x^2x}, f_{x^2y}, \dots$$

gebräuchlich.

53. Beispiele. Die Bildung der höheren partiellen Differentialquotienten werden die folgenden Beispiele zur Genüge dartun.

1) Die rationale ganze Funktion dritten Grades

$$f(x, y) = \alpha x^3 + 3\beta x^2 y + 3\gamma x y^2 + \delta y^3$$

ergibt bei einmaliger Differentiation:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3\alpha x^2 + 6\beta xy + 3\gamma y^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3\beta x^2 + 6\gamma xy + 3\delta y^2;$$

bei zweimaliger Differentiation:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6\alpha x + 6\beta y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6\beta x + 6\gamma y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6\gamma x + 6\delta y;$$

wobei man unmittelbar erkennt, daß sich für $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ aus $\frac{\partial f}{\partial x}$ und aus $\frac{\partial f}{\partial y}$ ein und derselbe Wert ergibt; bei dreimaliger Differentiation entstehen:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 6\alpha, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = 6\beta, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = 6\gamma, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = 6\delta$$

und wieder zeigt es sich, daß jeder der beiden gemischten Differentialquotienten aus der vorangehenden Gruppe auf zwei Arten übereinstimmend erhalten wird. Alle höheren Differentialquotienten haben den Wert Null.

2) Die Funktion

$$s = \arctg \frac{y}{x}$$

ist für alle Wertverbindungen mit Ausnahme von 0/0 definiert. Mit Ausschluß dieser Stelle hat man

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial s}{\partial y} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{x}{x^2 + y^2};$$

weiter

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

und

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

also tatsächlich $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3) Es ist zu zeigen, daß die Gleichung

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - q^2 z = \frac{y^2}{x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

durch die Funktion

$$z = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

befriedigt wird.

54. Totale Differentialquotienten und Differentiale höherer Ordnung. In 47 ist für den totalen Differentialquotienten in der Richtung $S(\varphi, \psi)$ einer Funktion $z = f(x, y)$, welche an der Stelle x/y die dort angeführten Bedingungen erfüllt, der Ausdruck

$$\frac{dz}{ds} = \frac{\partial z}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial z}{\partial y} \cos \psi$$

gefunden worden; seine Bildungsweise spricht sich darin aus, daß man die partiellen Differentialquotienten mit den zugeordneten Richtungskosinus zu multiplizieren und die Produkte zu addieren hat.

Sofern nun die Funktion z an der Stelle x/y auch alle partiellen Differentialquotienten 2., 3., ... n -ter Ordnung zuläßt, und sofern diese stetig sind, besitzt sie auch höhere totale Differentialquotienten in der Richtung S ; der zweite totale Differentialquotient ist:

$$\frac{d^2 z}{ds^2} = \frac{\partial \frac{dz}{ds}}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial \frac{dz}{ds}}{\partial y} \cos \psi;$$

führt man aber die rechts angedeuteten Differentiationen aus, wobei zu beachten ist, daß $\cos \varphi$, $\cos \psi$ konstant sind, so findet sich:

$$\frac{\partial \frac{ds}{ds}}{\partial x} = \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} \cos \varphi + \frac{\partial^2 s}{\partial y \partial x} \cos \psi$$

$$\frac{\partial \frac{ds}{ds}}{\partial y} = \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} \cos \varphi + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \cos \psi;$$

trägt man dies in den obigen Ausdruck ein, so ergibt sich mit Rücksicht auf 52, (4*):

$$(5) \quad \frac{d^2 s}{ds^2} = \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} \cos^2 \varphi + 2 \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} \cos \varphi \cos \psi + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \cos^2 \psi.$$

Durch Multiplikation dieses Differentialquotienten mit ds^2 erhält man das *zweite totale Differential*, welches mit Rücksicht darauf, daß 47

$$ds \cos \varphi = dx, \quad ds \cos \psi = dy$$

ist, folgendermaßen sich gestaltet:

$$(6) \quad d^2 s = \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} dy^2.$$

Seine Bildungsweise hat so viel Analogie mit dem Quadrat eines bestimmten Binoms, daß man sich zur Abkürzung der symbolischen Schreibweise

$$(6^*) \quad d^2 s = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 s$$

bedienen kann; nach ausgeführter Quadrierung lautet beispielsweise das erste Glied $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} dx^2$ und geht bei der symbolischen Multiplikation mit s in $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} dx^2$, d. h. tatsächlich in das erste Glied von (6) über usw.

Aus (5) ergibt sich zunächst wieder:

$$\frac{d^2 s}{ds^2} = \frac{\partial \frac{d^2 s}{ds^2}}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial \frac{d^2 s}{ds^2}}{\partial y} \cos \psi;$$

ferner ist

$$\frac{\partial \frac{d^2 s}{ds^2}}{\partial x} = \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} \cos^2 \varphi + 2 \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y \partial x} \cos \varphi \cos \psi + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2 \partial x} \cos^2 \psi$$

$$\frac{\partial \frac{d^2 s}{ds^2}}{\partial y} = \frac{\partial^2 s}{\partial x^2 \partial y} \cos^2 \varphi + 2 \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y^2} \cos \varphi \cos \psi + \frac{\partial^2 s}{\partial y^3} \cos^2 \psi,$$

mithin auf Grund der Ergebnisse in 52:

$$(7) \quad \frac{d^2 z}{ds^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cos^2 \varphi + 3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cos \varphi \cos \psi + 3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y^2} \cos \varphi \cos^2 \psi + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \cos^2 \psi.$$

Durch Multiplikation mit ds^3 entsteht das *dritte totale Differential*:

$$(8) \quad d^3 z = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} dy^3,$$

wofür wieder symbolisch geschrieben werden kann:

$$(8^*) \quad d^3 z = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^3 z.$$

Die Richtung, für welche das totale Differential gilt, ist jedesmal bestimmt durch

$$\frac{dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = \cos \varphi, \quad \frac{dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = \cos \psi.$$

Durch vollständige Induktion kann das Bildungsgesetz des n -ten totalen Differentialquotienten und des n -ten totalen Differentials erschlossen werden. Wäre nämlich erwiesen, daß

$$\begin{aligned} \frac{d^n z}{ds^n} &= \frac{\partial^n z}{\partial x^n} \cos^n \varphi + \binom{n}{1} \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-1} \partial y} \cos^{n-1} \varphi \cos \psi \\ &\quad + \binom{n}{2} \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-2} \partial y^2} \cos^{n-2} \varphi \cos^2 \psi + \dots + \frac{\partial^n z}{\partial y^n} \cos^n \psi, \end{aligned}$$

so folgte aus dem eben entwickelten Vorgange

$$\begin{aligned} \frac{d^{n+1} z}{ds^{n+1}} &= \left[\frac{\partial^{n+1} z}{\partial x^{n+1}} \cos^n \varphi \right. \\ &\quad + \binom{n}{1} \frac{\partial^{n+1} z}{\partial x^n \partial y} \cos^{n-1} \varphi \cos \psi + \binom{n}{2} \frac{\partial^{n+1} z}{\partial x^{n-1} \partial y^2} \cos^{n-2} \varphi \cos^2 \psi + \dots \\ &\quad \left. + \frac{\partial^{n+1} z}{\partial x \partial y^n} \cos^n \psi \right] \cos \varphi \\ &\quad + \left[\frac{\partial^{n+1} z}{\partial x^n \partial y} \cos^n \varphi \right. \\ &\quad \left. + \binom{n}{1} \frac{\partial^{n+1} z}{\partial x^{n-1} \partial y^2} \cos^{n-1} \varphi \cos \psi + \dots \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial^{n+1} z}{\partial y^{n+1}} \cos^n \psi \right] \cos \psi \end{aligned}$$

und mit Rücksicht auf die Eigenschaft $\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r}$ der Binomialkoeffizienten

$$\frac{d^{n+1}s}{ds^{n+1}} = \frac{\partial^{n+1}s}{\partial x^{n+1}} \cos^{n+1} \varphi + \binom{n+1}{1} \frac{\partial^{n+1}s}{\partial x^n \partial y} \cos^n \varphi \cos \psi \\ + \binom{n+1}{2} \frac{\partial^{n+1}s}{\partial x^{n-1} \partial y^2} \cos^{n-1} \varphi \cos^2 \psi + \dots \frac{\partial^{n+1}s}{\partial y^{n+1}} \cos^{n+1} \psi;$$

d. h. es bestünde dasselbe Bildungsgesetz auch für $\frac{d^{n+1}s}{\partial x^{n+1}}$; da es nun für $n = 2, 3$ direkt bewiesen worden, so gilt allgemein für den n -ten totalen Differentialquotienten der Ausdruck:

$$(9) \quad \frac{d^n s}{ds^n} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial}{\partial y} \cos \psi \right)^n s$$

und für das n -te totale Differential der Ausdruck:

$$(10) \quad d^n s = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n s.$$

Die Ausdehnung auf Funktionen von mehr als zwei Variablen unterliegt nach dem Vorgeführten keiner Schwierigkeit und ergibt ein analoges Resultat, so für $u = f(x, y, s)$:

$$\frac{d^n u}{ds^n} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial}{\partial y} \cos \psi + \frac{\partial}{\partial s} \cos \chi \right)^n u,$$

$$d^n u = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy + \frac{\partial}{\partial s} ds \right)^n u.$$

Auf Grund der in 53 gefundenen Resultate hat beispielsweise die Funktion

$$s = \alpha x^3 + 3\beta x^2 y + 3\gamma xy^2 + \delta y^3$$

das zweite und dritte totale Differential:

$$d^2 s = 6(\alpha x + \beta y) dx^2 + 12(\beta x + \gamma y) dx dy + 6(\gamma x + \delta y) dy^2$$

$$d^3 s = 6\{\alpha dx^3 + 3\beta dx^2 dy + 3\gamma dx dy^2 + \delta dy^3\},$$

und die Funktion

$$s = \arctg \frac{y}{x}$$

das zweite totale Differential:

$$d^2 s = 2 \frac{xy(dx^2 - dy^2) - (x^2 - y^2)dx dy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

§ 3. Differentiation zusammengesetzter und impliziter Funktionen.

55. Zusammengesetzte Funktionen einer Variablen.
Es seien u, v, \dots eindeutige und stetige Funktionen von x ; $y=f(u, v, \dots)$ eine eindeutige stetige Funktion von u, v, \dots ; dann ist y auch eindeutige stetige Funktion von x und wird eine *zusammengesetzte Funktion* von x genannt.

Um ihren Differentialquotienten in bezug auf x zu bestimmen, gehe man von einem Werte x aus und erteile demselben eine Änderung Δx ; dadurch ändern sich auch die zu x gehörigen Werte von u, v, \dots um $\Delta u, \Delta v, \dots$ und der zu diesen Werten u, v, \dots gehörige Wert von y um Δy ; auf Grund der gemachten Voraussetzungen konvergieren mit Δx zugleich auch $\Delta u, \Delta v, \dots$ und Δy gegen den Grenzwert Null. Nun besteht zwischen $\Delta u, \Delta v, \dots$ und Δy die Beziehung

$$\Delta y = f(u + \Delta u, v + \Delta v, \dots) - f(u, v, \dots);$$

die rechtsstehende totale Differenz unterscheidet sich von dem totalen Differential — und ein solches ist vorhanden, wenn $f(u, v, \dots)$ an der betrachteten Stelle partielle Differentialquotienten nach u, v, \dots besitzt und diese stetig sind an der betrachteten Stelle (47) — um Größen höherer Kleinheitsordnung als $\Delta u, \Delta v, \dots$, so daß

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial f}{\partial v} \Delta v + \dots + \varepsilon_1 \Delta u + \varepsilon_2 \Delta v + \dots,$$

wobei $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ Größen bedeuten, welche mit $\Delta u, \Delta v, \dots$ zugleich gegen Null konvergieren. Die Änderungen $\Delta u, \Delta v, \dots$ von u, v, \dots ihrerseits unterscheiden sich von den betreffenden Differentialen — und solche sind vorhanden, wenn u, v, \dots an der Stelle x bestimmte Differentialquotienten besitzen — um Größen höherer Kleinheitsordnung als Δx , so daß

$$\Delta u = \frac{du}{dx} \Delta x + \eta_1 \Delta x$$

$$\Delta v = \frac{dv}{dx} \Delta x + \eta_2 \Delta x,$$

$$\dots \dots \dots$$

wenn unter η_1, η_2, \dots mit Δx gleichzeitig gegen Null konvergierende Größen verstanden werden. Wird dies in die vorangehende Gleichung eingetragen, so kommt

$$\Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \dots \right) \Delta x + \left(\eta_1 \frac{\partial f}{\partial u} + \eta_2 \frac{\partial f}{\partial v} + \dots \right) \Delta x + \varepsilon_1 \Delta u + \varepsilon_2 \Delta v + \dots$$

und

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \dots + \left(\eta_1 \frac{\partial f}{\partial u} + \eta_2 \frac{\partial f}{\partial v} + \dots \right) + \left(\varepsilon_1 \frac{\Delta u}{\Delta x} + \varepsilon_2 \frac{\Delta v}{\Delta x} + \dots \right);$$

konvergiert nun Δx gegen den Grenzwert Null, so nähern sich die in Klammern eingeschlossenen Teile der rechten Seite auch dieser Grenze, infolgedessen ist

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dx} + \dots$$

Durch Multiplikation mit dx ergibt sich daraus das Differential von y , nämlich

$$(2) \quad dy = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv + \dots$$

Der Differentialquotient der zusammengesetzten Funktion wird also gefunden, indem man ihre partiellen Differentialquotienten in bezug auf u, v, \dots mit den entsprechenden Differentialquotienten von u, v, \dots in bezug auf x multipliziert und die Produkte addiert; das Differential gestaltet sich ebenso, als ob u, v, \dots unabhängige Variable wären.

Bevor wir zu weiteren Ausführungen schreiten, sei bemerkt, daß die Formel (1) bereits anderweitig abgeleitete Resultate als spezielle Fälle enthält. So fällt ihr Inhalt bei Beschränkung auf das erste Glied der rechten Seite mit dem Satze 28, (15) zusammen. Ist ferner $x = f(u, v, w, \dots) = uvw \dots$, also

$$\frac{\partial f}{\partial u} = vw \dots \quad \frac{\partial f}{\partial v} = uw \dots \quad \frac{\partial f}{\partial w} = uv \dots,$$

so gibt (1)

$$\frac{d(uvw \dots)}{dx} = \frac{du}{dx} vw \dots + u \frac{dv}{dx} w \dots + uv \frac{dw}{dx} \dots + \dots,$$

eine in 25 bereits abgeleitete Formel. Wenn weiter

$$y = f(u, v) = u^v,$$

so ist

$$\frac{\partial f}{\partial u} = v u^{v-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial v} = u^v \ln u,$$

daher

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= vu^{v-1} \frac{du}{dx} + u^v l_u \frac{dv}{dx} \\ &= u^v \left\{ \frac{v}{u} \frac{du}{dx} + l_u \frac{dv}{dx} \right\};\end{aligned}$$

diese Formel ist am Schlusse von 31 bereits entwickelt.

Um zu den höheren Differentialquotienten und Differentialen von y zu gelangen, hat man die Formel (1) neuerdings in bezug auf x zu differenzieren und dabei zu beachten, daß $\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}, \dots$ wieder zusammengesetzte Funktionen und daher in derselben Weise zu behandeln sind wie f selbst; es ist daher:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{dx^2} &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{du}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{dv}{dx} + \dots \right) \frac{du}{dx} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{dv}{dx} + \dots \right) \frac{dv}{dx} + \\ &\quad \dots + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{d^2 v}{dx^2} + \dots;\end{aligned}$$

der in der ersten Zeile angesetzte Teil rührt von der Differentiation der ersten Faktoren der rechten Seite in (1) her, der in der zweiten Zeile von der Differentiation der zweiten Faktoren. Nach vollzogener Reduktion (52) ergibt sich:

$$\begin{aligned}(3) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{d^2 v}{dx^2} + \dots\end{aligned}$$

und daraus durch Multiplikation mit dx^2 das zweite Differential

$$\begin{aligned}(4) \quad d^2 y &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} du dv + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} dv^2 + \dots \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial u} d^2 u + \frac{\partial f}{\partial v} d^2 v + \dots\end{aligned}$$

Der erste Hauptteil würde das zweite totale Differential in dem Falle darstellen, wenn u, v, \dots unabhängige Variable wären (54, (5)); der zweite Hauptteil verdankt also seine Entstehung dem Umstande, daß u, v Funktionen einer weiteren Variablen sind.

Das Aufsteigen zu höheren Differentialquotienten bedarf keiner Erläuterung mehr.

56. Eulers Satz über homogene Funktionen. Die Formel (1) soll dazu benutzt werden, um einen wichtigen Satz

der Analysis zu erweisen, der eine besondere Gattung von Funktionen betrifft und Eulers Namen führt.

Man versteht unter einer *homogenen Funktion n-ten Grades* mehrerer Variablen x, y, z, \dots eine solche Funktion $f = f(x, y, z, \dots)$, welche die Eigenschaft besitzt, daß

$$(5) \quad f(tx, ty, tz, \dots) = t^n f(x, y, z, \dots),$$

wobei t jede beliebige von Null verschiedene endliche Zahl bedeuten kann.

Solcher Art sind beispielsweise die Funktionen

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

$$\sqrt{x} + \sqrt{y}$$

$$\text{arc tg } \frac{y}{x},$$

und zwar die erste vom Grade 2, die zweite vom Grade $\frac{1}{2}$, die dritte vom Grade 0.

Betrachtet man in der Gleichung (5) t allein als variabel, setzt vorübergehend

$$tx = u, \quad ty = v, \quad tz = w, \dots$$

und differenziert beide Teile in bezug auf t , so hat man links die Formel (1) zur Anwendung zu bringen und erhält so:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(u, v, w, \dots)}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f(u, v, w, \dots)}{\partial v} \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f(u, v, w, \dots)}{\partial w} \frac{dw}{dt} + \dots \\ = nt^{n-1}f; \end{aligned}$$

nun ist aber $\frac{du}{dt} = x$, $\frac{dv}{dt} = y$, $\frac{dw}{dt} = z, \dots$ und setzt man, nachdem dies eingetragen worden, $t = 1$, wodurch $u = x$, $v = y$, $w = z, \dots$ wird, so kommt

$$(6) \quad \frac{\partial f}{\partial x} x + \frac{\partial f}{\partial y} y + \frac{\partial f}{\partial z} z + \dots = nf.$$

Multipliziert man also die partiellen Differentialquotienten einer homogenen Funktion nach den einzelnen Variablen mit diesen Variablen selbst, so ist die Summe der so gebildeten Produkte die mit dem Homogenitätsgrade vervielfachte Funktion.

In den oben zusammengestellten Beispielen hat man der Reihe nach

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2a_{11}x + 2a_{12}y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2a_{12}x + 2a_{22}y,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y = 2a_{11}x^2 + 4a_{12}xy + 2a_{22}y^2 = 2f;$$

dann

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}; \quad \frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{\sqrt{y}}{2} = \frac{1}{2}f;$$

endlich (53, 2)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y = 0 = 0 \cdot f.$$

57. Implizite Funktionen einer Variablen. Die Hilfsmittel zur Differentiation von Funktionen einer und mehrerer Variablen, soweit sie bisher entwickelt worden sind, bedürfen noch einer wichtigen Ergänzung. Sie reichen zunächst nur dann aus, wenn die betreffende Funktion durch einen Ausdruck dargestellt ist, in welchem die Variablen untereinander und mit konstanten Größen durch eine endliche Folge der bekannten elementaren, algebraischen oder transzendenten, Operationen verbunden sind; man sagt in solchem Falle, die Funktion sei *explizite* und in endlicher Form gegeben. Es wird sich nun darum handeln, die Differentiation auch dann zu vollziehen, wenn die Funktion mit den Variablen durch eine Gleichung verbunden erscheint, welche nicht die eben gedachte Form hat, mit anderen Worten, wenn die Funktion *implizite* gegeben ist (17).

Es gibt allerdings Fälle, wo man die zweite Form auf die erste durch Auflösung der Gleichung zurückführen kann; aber selbst da ist es nicht immer vorteilhaft, diesen Weg einzuschlagen.

Angenommen, $f(x, y)$ sei eine in dem Gebiete P stetige Funktion und besitze dort stetige partielle Differentialquotienten in bezug auf x und y , von welchen der letztere an keiner Stelle verschwindet; ferner erlange $f(x, y)$ im Gebiete P den Wert c , jedoch nicht an einer oder mehreren einzelnen Stellen, sondern für alle Wertverbindungen x/y , welche den Punkten

einer das Gebiet durchziehenden Kurve entsprechen; dann ist durch die Gleichung

$$(7) \quad f(x, y) = c$$

y implizite als stetige Funktion von x definiert, und zwar für ein gewisses Intervall (α, β) von x . Wäre $y = \varphi(x)$ diese Funktion in expliziter Form, so müßte die Einsetzung von $\varphi(x)$ an die Stelle von y die Gleichung (7) identisch, d. i. für jeden Wert von x aus (α, β) erfüllen.

In diesem Sinne ist die linke Seite von (7) als zusammengesetzte Funktion von x anzusehen, und ihr Differentialquotient ist einerseits nach 55, (1):

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx},$$

andererseits hat er den Wert Null, weil die Funktion konstant ist; mithin ist, da $\frac{dx}{dx} = 1$,

$$(8) \quad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$

und daraus ergibt sich

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}},$$

was nach den gemachten Voraussetzungen immer einen bestimmten Wert darstellt; die Voraussetzung, daß der partielle Differentialquotient $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$, ist nur von solchen Wertverbindungen einzuhalten, welche der Gleichung (7) genügen.




Fig. 15.

Auch aus dem Begriffe des totalen Differentialquotienten einer Funktion zweier Variablen läßt sich das obige Resultat ableiten. Ist KL (Fig. 15) die Kurve, längs welcher die Gleichung (7) gilt, M ein Punkt derselben, zur Wertverbindung x/y gehörig, M_1 ein anderer Punkt

$x + h/y + k$, so ist der Differenzenquotient

$$\frac{f(x + h, y + k) - f(x, y)}{\Delta s}$$

gleich Null und bleibt es, wenn sich M_1 statt in der Richtung $M(S)$ längs KL dem Punkte M nähert; dabei nähert sich die Richtung $M(S)$ der Richtung $M(T)$ der Tangente an KL im Punkte M , folglich ist auch

$$\frac{df}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \psi = 0,$$

wo φ, ψ die Winkel der Tangente mit $M(X)$ und $M(Y)$ bezeichnen; da nun

$$\frac{\cos \psi}{\cos \varphi} = \lim_{h \rightarrow \pm 0} \frac{k}{h} = \frac{dy}{dx},$$

so fällt die voranstehende Gleichung mit der Gleichung (8) zusammen.

Die Gleichung (8) bezeichnet man als das Ergebnis der Differentiation der Gleichung (7) in bezug auf x ; sie wird gebildet, indem man die linke Seite von (7) zuerst partiell nach x differenziert, dann den partiellen Differentialquotienten nach y mit dem Differentialquotienten von y nach x multipliziert und die Summe beider Ausdrücke gleich Null setzt.

Wendet man die gleiche Regel auf die Gleichung (8) an, so ergibt sich unter Voraussetzung der Existenz der zweiten partiellen Differentialquotienten von $f(x, y)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dx^2} + \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{dy}{dx} \right] \frac{dy}{dx} = 0$$

oder, wenn man reduziert:

$$(10) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d^2 y}{dx^2} = 0,$$

aus welcher Gleichung sich eine Bestimmung für $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ergibt, nachdem man für $\frac{dy}{dx}$ den Wert aus (9) eingesetzt hat.

Behufs Ermittlung des dritten Differentialquotienten $\frac{d^3 y}{dx^3}$ müßte die Gleichung (10) abermals in bezug auf x differenziert werden, usw.

Ist durch die Gleichung (7) y als mehrdeutige Funktion definiert, so setzen wir voraus, daß die Werte von y nach dem Prinzip der Stetigkeit in Zweige gesondert sind, d. h. so, daß y mit x stetig sich ändert (10). Die obige Rechnung erledigt die Frage nach den Differentialquotienten von y für alle Zweige

zugleich; die Trennung der Zweige erfolgt erst dann, wenn eine bestimmte Stelle ins Auge gefaßt wird, insofern dieselbe dann auch einem bestimmten Zweige angehören muß.

58. Beispiele. Die folgenden Beispiele dienen zur Erläuterung des Vorgeführten.

1) Durch die Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$$

ist y als zweideutige stetige Funktion von x in dem Intervalle $(-a, +a)$ gegeben; die explizite Darstellung lautet:

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

und läßt zwischen einem positiven und einem negativen Zweige unterscheiden. In dieser Form ergibt sich

$$y' = \mp \frac{bx}{a\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad y'' = \mp \frac{b}{a} \frac{\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}}{a^2 - x^2} = \mp \frac{ab}{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}},$$

wobei das obere Zeichen jedesmal dem positiven, das untere dem negativen Zweige entspricht.

Bewirkt man die Differentiation in impliziter Form, so ist zuerst

$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} y' = 0$$

und nach nochmaliger Differentiation

$$\frac{1}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} + \frac{y}{b^2} y'' = 0;$$

aus der ersten Gleichung folgt:

$$y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y},$$

aus der zweiten nach Einsetzung dieses Wertes bei Berücksichtigung der gegebenen Gleichung:

$$y'' = -\frac{b^4}{a^2 y^3}.$$

Die Wertverbindungen $\pm a/0$ sollten ausgeschlossen werden, weil für sie der partielle Differentialquotient der linken Seite der vorgelegten Gleichung nach y , d. i. $\frac{\partial y}{\partial y}$, verschwindet;

indessen zeigen beide Formen der Rechnung, daß für $\lim x = \pm a$ und $\lim y = 0$ sowohl y' als y'' unendlich wird.

2) Die Gleichung

$$x^3 - 3axy + y^3 = 0 \quad (a > 0)$$

bestimmt y im allgemeinen als dreideutige Funktion von x :

$$y = \sqrt[3]{-\frac{x^3}{2} + \sqrt{\frac{x^3}{4}(x^3 - 4a^3)}} + \sqrt[3]{-\frac{x^3}{2} - \sqrt{\frac{x^3}{4}(x^3 - 4a^3)}};$$

aber nur, wenn die Diskriminante $\frac{x^3}{4}(x^3 - 4a^3)$ negativ ist, sind alle drei Bestimmungen reell, und dies findet in dem Intervall $(0, +a\sqrt[3]{4})$ statt; außerhalb desselben, d. i. in den Intervallen $(-\infty, 0)$ und $(a\sqrt[3]{4}, +\infty)$, ist nur einer von den drei Werten reell, verhält sich die Funktion also wie eine eindeutige.

Einmalige Differentiation der vorgelegten Gleichung gibt:

$$x^3 - ay - (ax - y^2)y' = 0,$$

zweimalige Differentiation:

$$2x - ay' - (a - 2yy')y' - (ax - y^2)y'' = 0;$$

aus der ersten Gleichung folgt

$$y' = \frac{x^3 - ay}{ax - y^2},$$

aus der zweiten, wenn man diesen Wert für y' einsetzt und die gegebene Gleichung berücksichtigt,

$$y'' = \frac{2a^3xy}{(ax - y^2)^3}.$$

Hier muß jedoch ein Wertepaar von x, y , nämlich $x = 0, y = 0$, ausgeschlossen werden, weil für dasselbe der partielle Differentialquotient der linken Seite der vorgelegten Gleichung in bezug auf y : $-3ax + 3y^2$, verschwindet; dieses Wertepaar macht sich auch schon durch den Umstand bemerkbar, daß bei demselben die Scheidung der eindeutigen Funktion von der dreideutigen eintritt.

3) Durch die Gleichung

$$a \cos^2 x + b \cos^2 y = 0$$

ist y als unendlich vieldeutige Funktion von x definiert. Mit Ausschluß aller Stellen x/y , an welchen $-2b \cos y \sin y$

= $-b \sin 2y$, d. i. der partielle Differentialquotient der linken Seite nach y , verschwindet, gilt

$$a \sin 2x + b \sin 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0,$$

$$2a \cos 2x + 2b \cos 2y \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + b \sin 2y \cdot \frac{d^2y}{dx^2} = 0,$$

und daraus berechnet sich, wieder mit Rücksichtnahme auf die vorgelegte Gleichung:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\frac{a \sin 2x}{b \sin 2y} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{8a(a+b) \cos^2 x \cos^2 y}{b^2 \sin^2 2y}. \end{aligned}$$

4) Aus $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ die Differentialquotienten $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ zu bestimmen.

5) Zu zeigen, daß sich aus

$$\sqrt{ax^2 + 2bx + c} - \sqrt{ay^2 + 2by + c} = C(x - y)$$

ergibt:

$$\frac{dy}{dx} = -\sqrt{\frac{ay^2 + 2by + c}{ax^2 + 2bx + c}}.$$

59. Zusammengesetzte Funktionen zweier Variablen.
Wir nehmen den in 55 behandelten Fall einer zusammengesetzten Funktion mit folgender Abänderung wieder auf: Es seien u, v, \dots gegebene eindeutige und stetige Funktionen der unabhängigen Variablen x, y ; $z = f(u, v, \dots)$ eine gegebene eindeutige und stetige Funktion von u, v, \dots ; dann heißt z eine zusammengesetzte Funktion von x, y und ist auf demselben Gebiete dieser Variablen eindeutig und stetig, auf welchem dies von u, v, \dots gilt.

Wenn man, von einer Stelle x, y dieses Gebietes ausgehend, x allein ändert, so können die in 55 durchgeführten Betrachtungen Wort für Wort auf den gegenwärtigen Fall übertragen werden und besteht der einzige Unterschied darin, daß an die Stelle der gewöhnlichen Differentialquotienten durchgehend partielle treten; mithin ergibt sich für den partiellen Differentialquotienten von z nach x der Ausdruck (55, (1)):

$$(11) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \dots$$

In gleicher Weise erhält man

$$(12) \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \dots$$

Daraus leitet sich der Differentialquotient für eine Richtung $S(\varphi, \psi)$ und das totale Differential ab:

$$(13) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{dz}{ds} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial z}{\partial y} \cos \psi = \frac{\partial f}{\partial u} \left\{ \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \psi \right\} + \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial v} \left\{ \frac{\partial v}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial v}{\partial y} \cos \psi \right\} + \dots \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{ds} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{ds} + \dots \end{aligned} \right.$$

$$(14) \quad \left\{ \begin{aligned} dz &= \frac{\partial f}{\partial u} \left\{ \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right\} + \frac{\partial f}{\partial v} \left\{ \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right\} + \dots \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv + \dots \end{aligned} \right.$$

Diese Formeln zeigen, daß mit u, v, \dots genau so zu operieren ist, als ob es unabhängige Variable wären.

Sollen die zweiten Differentialquotienten von z bestimmt werden, so ist zu beachten, daß die rechten Seiten der Gleichungen (11), (12) in $\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}, \dots$ wieder zusammengesetzte Funktionen sind und in $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \dots, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots$ Funktionen von x und y aufweisen; demzufolge ist

$$(15) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \dots \right\} \frac{\partial u}{\partial x} \\ &\quad + \left\{ \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} + \dots \right\} \frac{\partial v}{\partial x} + \dots \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \dots \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \dots; \end{aligned} \right.$$

in gleicher Weise ergibt sich aus (12):

$$(16) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \dots; \end{aligned} \right.$$

ebensowohl aus (11) wie aus (12) erhält man:

$$(17) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \left\{ \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \right\} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} + \\ \dots + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} + \dots \end{cases}$$

Die Aufstellung des zweiten totalen Differentialquotienten und Differentials unterlassen wir; sie würde das unter (14) bemerkte bestätigen. Auch die Ausdehnung auf mehr als zwei unabhängige Variable unterliegt keiner Schwierigkeit.

Es sei beispielsweise $z = f\left(\frac{y}{x}\right)$; setzt man $\frac{y}{x} = u$, so ist:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2};$$

infolgedessen hat man auf Grund von (11), (12), (15)–(17):

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\partial f}{\partial u} \frac{y}{x^2}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{1}{x}; \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{y^2}{x^4} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{2y}{x^3}, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot \frac{1}{x^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{y}{x^3} - \frac{\partial f}{\partial u} \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Aus $z = f(ax + by, \alpha x - \beta y)$ ergibt sich, wenn man $ax + by = u$, $\alpha x - \beta y = v$ setzt:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= a \frac{\partial f}{\partial u} + \alpha \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= b \frac{\partial f}{\partial u} - \beta \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2a\alpha \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \alpha^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2b\beta \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \beta^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= ab \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (\alpha b - a\beta) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \alpha\beta \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}. \end{aligned}$$

60. Implizite Funktionen zweier Variablen. Es sei $f(x, y, z)$ eine in dem Gebiete R eindeutige und stetige Funktion der Variablen x, y, z mit stetigen partiellen Differentialquotienten. Die Funktion nehme ferner innerhalb des Gebietes den Wert c an, aber nicht an vereinzelter Stellen, sondern an einer unendlichen Menge von Stellen $x/y/z$ derart, daß die z dieser Stellen eine eindeutige stetige Funktion der

x, y bilden, in geometrischer Ausdrucksweise: sie nehme den Wert c längs einer das Gebiet R durchsetzenden Fläche an. Dann ist durch die Gleichung

$$(18) \quad f(x, y, z) = c$$

z implizit als eindeutige stetige Funktion von x, y definiert; wäre $z = \varphi(x, y)$ die explizite Darstellung dieser Funktion, so müßte die Einsetzung von $\varphi(x, y)$ an Stelle von z die Gleichung (18) identisch befriedigen, d. h. für jede Wertverbindung x/y des betreffenden Gebietes P .

Sonach erscheint die linke Seite von (18) als zusammengesetzte Funktion der Variablen x, y und hat zufolge (11) den partiellen Differentialquotienten

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}$$

in bezug auf x , und dieser muß, da es sich um eine konstante Funktion handelt, Null sein; beachtet man noch, daß $\frac{\partial x}{\partial x} = 1$ und $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$ (weil y von x unabhängig ist), so entsteht die Gleichung:

$$(19) \quad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0,$$

aus welcher, wenn $\frac{\partial f}{\partial z} \neq 0$ ist, folgt:

$$(20) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}};$$

in gleicher Weise ergibt sich, wenn man nach y differentiirt,

$$(21) \quad \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

und daraus unter der gleichen Bedingung:

$$(22) \quad \frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}}.$$

[Die Voraussetzung, daß $\frac{\partial f}{\partial z}$ nicht verschwindet, braucht nur für solche Wertverbindungen $x/y/z$ erfüllt zu sein, welche der Gleichung (18) genügen.]

Die Gleichungen (19), (21) sind das Resultat der partiellen Differentiation von (18) in bezug auf x , respektive y . Differentiiert man sie, von denselben Grundsätzen Gebrauch machend, die erste wieder nach x , die zweite nach y , endlich die erste nach y oder die zweite nach x , so kommt man zu den Gleichungen:

$$(23) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \end{cases}$$

die wieder unter der Bedingung $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$ und in Verbindung mit (20) und (22) die Differentialquotienten zweiter Ordnung $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ zu berechnen gestatten.

Die Werte x, y, z , die in den Gleichungen (20), (22), (23) auftreten, haben der Gleichung (18) zu genügen.

61. Beispiele. Die Durchführung des eben entwickelten Verfahrens soll an den folgenden Beispielen erklärt werden.

1) Die Gleichung

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = k$$

bestimmt z als zweideutige Funktion von x und y , die ohne weiteres auch in expliziter Form gegeben werden könnte; die Differentiation gestaltet sich jedoch in impliziter Form einfacher und übersichtlicher. Es lauten die Gleichungen (19), (21), (23) im vorliegenden Falle wie folgt:

$$ax + cz \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$by + cz \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$a + c \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + cz \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

$$b + c \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + cz \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$c \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + cz \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

und geben durch sukzessive Auflösung unter Berücksichtigung der vorgelegten Gleichung:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{ax}{cz}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{by}{cz},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{a(k-by^2)}{c^2 z^3}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{b(k-ax^2)}{c^2 z^3}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{abxy}{c^2 z^3}.$$

2) Durch die Gleichung

$$(a_1 x + b_1 y + c_1 z)^2 + (a_2 x + b_2 y + c_2 z)^2 + (a_3 x + b_3 y + c_3 z)^2 = h^2$$

ist z als zweideutige Funktion von x, y definiert. Setzt man zur Abkürzung:

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = u_1$$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = u_2$$

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = u_3$$

und bedient sich der Summenbezeichnung

$$m_1 + m_2 + m_3 = [m],$$

so lauten die Gleichungen (19), (21), (23) hier folgendermaßen:

$$[au] + [cu] \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$[bu] + [cu] \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$[aa] + 2[ac] \frac{\partial z}{\partial x} + [cc] \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + [cu] \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

$$[bb] + 2[bc] \frac{\partial z}{\partial y} + [cc] \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + [cu] \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$[ab] + [ac] \frac{\partial z}{\partial y} + [bc] \frac{\partial z}{\partial x} + [cc] \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + [cu] \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

und ihre sukzessive Auflösung liefert die Werte:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{[au]}{[cu]}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{[bu]}{[cu]}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{[aa][cu]^2 - 2[ac][au][cu] + [cc][au]^2}{[cu]^3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{[bb][cu]^2 - 2[bc][bu][cu] + [cc][bu]^2}{[cu]^3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{[ab][cu]^2 - ([ac][bu] + [bc][au])[cu] + [cc][au][bu]}{[cu]^3}.$$

3) Man bestimme aus der Gleichung

$$x^2 + y^2 + z^2 + yz + zx + xy = 2a^2$$

die ersten und zweiten Ableitungen von z .

62. Implizite Funktionen, gegeben durch simultane Gleichungen. Im Bereiche R seien $\varphi(x, y, z)$ und $\psi(x, y, z)$ als eindeutige stetige Funktionen von x, y, z gegeben; φ besitze längs einer das Gebiet R durchsetzenden Fläche den Wert α , ψ längs einer anderen Fläche durchwegs den Wert β ; beide Flächen mögen sich nach einer ebenfalls R durchsetzenden Linie schneiden; dann entspricht jedem Punkte dieser Linie eine Wertverbindung $x/y/z$, für welche $\varphi = \alpha$, $\psi = \beta$ ist; die y dieser Wertverbindungen konstituieren eine Funktion von x und ebenso bilden die z dieser Wertverbindungen eine Funktion von x für ein gewisses Intervall dieser letzten Variablen. Wir drücken diesen Sachverhalt dadurch aus, daß wir sagen, durch die *simultanen* Gleichungen

$$(24) \quad \begin{cases} \varphi(x, y, z) = \alpha \\ \psi(x, y, z) = \beta \end{cases}$$

seien y, z implizite als Funktionen von x gegeben. Um die Differentialquotienten dieser Funktionen zu bestimmen, differenziere man die linken Seiten als zusammengesetzte Funktionen von x und setze die Resultate der Null gleich, weil es sich um konstante Funktionen handelt; dadurch erhält man die Gleichungen:

$$(25) \quad \begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{dz}{dx} = 0 \\ \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

zur Bestimmung von $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$; die Lösbarkeit setzt aber voraus, daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial y} & \frac{\partial \varphi}{\partial z} \\ \frac{\partial \psi}{\partial y} & \frac{\partial \psi}{\partial z} \end{vmatrix} = X$$

von Null verschieden sei; ist dies der Fall und setzt man weiter zur Abkürzung

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial \varphi}{\partial z} & \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \psi}{\partial z} & \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{array} \right| = Y, \quad \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial \varphi}{\partial x} & \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi}{\partial x} & \frac{\partial \psi}{\partial y} \end{array} \right| = Z,$$

so lautet die Lösung

$$(26) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{Y}{X}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{Z}{X}.$$

Für die Differentiale von y, z ergibt sich daraus bei gegebenem dx die Darstellung

$$dy = \frac{Y}{X} dx, \quad dz = \frac{Z}{X} dx,$$

so daß

$$(26^*) \quad dx : dy : dz = X : Y : Z.$$

Sind auch die zweiten Differentialquotienten erforderlich, so hat man die Gleichungen (25) nochmals unter Rücksichtnahme darauf zu differenzieren, daß $\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}$ abermals zusammengesetzte Funktionen von derselben Art sind wie φ, ψ selbst; als Resultat ergibt sich das Gleichungspaar:

$$(27) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} + 2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial z} \frac{dz}{dx} + 2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial z} \frac{dy}{dx} \frac{dz}{dx} \\ \quad + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \frac{d^2 z}{dx^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial z} \frac{dz}{dx} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial z} \frac{dy}{dx} \frac{dz}{dx} \\ \quad + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{d^2 z}{dx^2} = 0, \end{array} \right.$$

das wieder nur unter der Bedingung

$$X \neq 0$$

zu einer Bestimmung von $\frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2 z}{dx^2}$ führt, nachdem die Werte (26) in (27) eingetragen worden sind.

Die eben behandelte Aufgabe ist ein spezieller Fall des folgenden allgemeinen Problems der Differentialrechnung: Es sind r simultane Gleichungen zwischen $n + r$ Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_r$ gegeben; dadurch sind im allgemeinen r von den Variablen, z. B. u_1, u_2, \dots, u_r , als Funktionen der n übrigen x_1, x_2, \dots, x_n , die voneinander unabhängig sind, be-

stimmt; es sollen die Differentialquotienten der u_1, u_2, \dots, u_r nach den einzelnen Variablen ermittelt werden.

Die Lösung besteht darin, daß man sämtliche Gleichungen in bezug auf die betreffende Variable, z. B. x_1 , differenziert, die linke Seite — die rechte wird als konstant vorausgesetzt — als zusammengesetzte Funktion behandelnd; dadurch entstehen r Gleichungen, welche in bezug auf $\frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \frac{\partial u_2}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_r}{\partial x_1}$ linear sind und eine Bestimmung dieser Größen nur dann zulassen, wenn die Determinante r -ten Grades aus deren Koeffizienten nicht Null ist.

Es bedarf kaum der Bemerkung, daß im allgemeinen die Auswahl der r unter den $n + r$ Variablen, die man als Funktionen der n anderen auffassen will, freigestellt ist; erst nach erfolgter Wahl hat die Aufgabe einen bestimmten Sinn.

63. Beispiele. 1) Durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 &= 4a^2 \\ x^2 + y^2 - 2ax &= 0\end{aligned}$$

sind y und z als stetige Funktionen von x in dem Intervalle $(0, 2a)$ bestimmt. Durch ein- und zweimalige Differentiation erhält man die Gleichungen:

$$\begin{aligned}x + y \frac{dy}{dx} + z \frac{dz}{dx} &= 0 \\ x - a + y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} + z \frac{d^2z}{dx^2} &= 0 \\ 1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} &= 0\end{aligned}$$

und durch Auflösung derselben:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{a-x}{y}, & \frac{dz}{dx} &= -\frac{a}{z} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{a^2}{y^3}, & \frac{d^2z}{dx^2} &= -\frac{a^3}{z^3}.\end{aligned}$$

2) Die Gleichungen

$$\begin{aligned}x + y + z + u &= a \\ x^2 + y^2 + z^2 + u^2 &= b^2 \\ x^3 + y^3 + z^3 + u^3 &= c^3\end{aligned}$$

bestimmen x, y, z als Funktionen von u in dem Intervalle $(-b, +b)$. Zur Bestimmung der ersten Differentialquotienten ergeben sich die Gleichungen:

$$\frac{dx}{du} + \frac{dy}{du} + \frac{dz}{du} + 1 = 0$$

$$x \frac{dx}{du} + y \frac{dy}{du} + z \frac{dz}{du} + u = 0$$

$$x^2 \frac{dx}{du} + y^2 \frac{dy}{du} + z^2 \frac{dz}{du} + u^2 = 0;$$

die Determinante der Koeffizienten ist

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(z-y)$$

und verschwindet nur dann, wenn sich unter den drei Werten x, y, z gleiche befinden; die Determinanten, welche die Zähler der Unbekannten bilden, sind der Reihe nach

$$\begin{aligned} &-(z-y)(u-y)(u-z), \quad (u-z)(x-z)(x-u), \\ &-(x-u)(y-u)(y-x); \end{aligned}$$

daraus folgt:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{du} &= -\frac{(u-y)(u-z)}{(x-y)(x-z)}, & \frac{dy}{du} &= -\frac{(u-z)(u-x)}{(y-z)(y-x)}, \\ \frac{dz}{du} &= -\frac{(u-x)(u-y)}{(z-x)(z-y)}. \end{aligned}$$

§ 4. Transformation der Variablen.

64. Simultane Transformation zweier voneinander abhängigen Variablen. Nachdem in 43 der einfachste Fall der Transformation behandelt worden ist, sind wir jetzt in der Lage, auch die übrigen Fälle zu erledigen. Wir beginnen mit dem folgenden Problem:

Zwischen den beiden Variablen x, y besteht ein funktionaler Zusammenhang, in welchem x als unabhängige Variable angesehen wird; an die Stelle von x, y werden zwei neue Variable u, v mittels der Transformationsgleichungen

$$(1) \quad \begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \end{cases}$$

eingeführt; es sind die ursprünglichen Differentialquotienten $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, ... durch die aus dem neuen Zusammenhange zwischen u und v hervorgehenden $\frac{dv}{du}$, $\frac{d^2v}{du^2}$, ... darzustellen.

Da in dem neuen Zusammenhange u als unabhängige Variable auftreten soll, so differenziere man die Gleichungen (1) in bezug auf u ; ein- und zweimalige Ausführung dieses Prozesses liefert:

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{dx}{du} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{dv}{du} \\ \frac{dy}{du} = \frac{\partial \psi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v} \frac{dv}{du} \\ \frac{d^2x}{du^2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v} \frac{dv}{du} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2} \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{d^2v}{du^2} \\ \frac{d^2y}{du^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v} \frac{dv}{du} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + \frac{\partial \psi}{\partial v} \frac{d^2v}{du^2}; \end{cases}$$

setzt man diese Ausdrücke in die Gleichungen 43, (6) oder die daraus resultierenden

$$(3) \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{du}}{\frac{dx}{du}} \\ \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dx}{du} \cdot \frac{d^2y}{du^2} - \frac{d^2x}{du^2} \cdot \frac{dy}{du}}{\left(\frac{dx}{du} \right)^3} \end{cases}$$

ein, so ist die gestellte Aufgabe gelöst.

Von den Transformationsgleichungen (1) wird vorausgesetzt, daß sie *umkehrbar eindeutig* sind; das bedeutet so viel, daß nicht allein φ , ψ eindeutige Funktionen der Argumente u , v , sondern daß auch u , v als eindeutige Funktionen von x , y bestimmt sind; wäre


$$(1^*) \quad \begin{cases} u = \varphi_1(x, y) \\ v = \psi_1(x, y) \end{cases}$$

diese Bestimmung, so heißt (1^{*}) die *inverse Transformation* zu (1).

Bei geometrischer Interpretation lassen die Gleichungen (1) und (1*) zwei wesentlich verschiedene Deutungen zu, welche kurz auseinandergesetzt werden sollen.

I. Sind x, y die Koordinaten eines Punktes M der Ebene in bezug auf ein bestimmtes, z. B. rechtwinkliges Koordinatensystem und u, v die Koordinaten *desselben* Punktes in bezug auf ein zweites System, so bestimmen die Gleichungen (1) und (1*) eine *Koordinatentransformation* und vermitteln insbesondere die Gleichungen (1) den Übergang vom ersten System zum zweiten, die (1*) den Übergang vom zweiten zum ersten. Geht durch den Punkt M eine Kurve, so bestimmt $\frac{dy}{dx}$ die Richtung der Tangente an dieselbe (22, (2)) und ist $\frac{dv}{du}$ für die *nämliche* Richtung bestimmend, jedesmal in einer dem Koordinatensystem entsprechenden Weise.

Einen der wichtigsten Fälle dieser Art bildet die Transformation rechtwinkliger Koordinaten in Polarkoordinaten, wobei der Ursprung und die positive Abszissenachse des ersten Systems als Pol, beziehungsweise Polarachse verwendet werden (Fig. 16). Dann ist $v = r$ der *Radiusvektor* und $u = \varphi$ die *Anomalie* des Punktes M ; die Gleichungen (1) lauten:



$$(4) \quad \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

und jene (1*)

$$(4^*) \quad \begin{cases} r = |\sqrt{x^2 + y^2}| \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \end{cases}$$

wobei die Eindeutigkeit der letzten Gleichung dadurch herbeigeführt wird, daß man festsetzt, φ sei jener Bogen aus dem Intervall $(0, 2\pi)$, dessen Sinus das Vorzeichen von y , dessen Kosinus das Vorzeichen von x hat. An die Stelle der Gleichungen (2) treten die folgenden:

$$(5) \quad \begin{cases} \frac{dx}{d\varphi} = -r \sin \varphi + \frac{dr}{d\varphi} \cos \varphi \\ \frac{dy}{d\varphi} = r \cos \varphi + \frac{dr}{d\varphi} \sin \varphi \\ \frac{d^2x}{d\varphi^2} = -r \cos \varphi - 2 \frac{dr}{d\varphi} \sin \varphi + \frac{d^2r}{d\varphi^2} \cos \varphi \\ \frac{d^2y}{d\varphi^2} = -r \sin \varphi + 2 \frac{dr}{d\varphi} \cos \varphi + \frac{d^2r}{d\varphi^2} \sin \varphi. \end{cases}$$

Es drücken sich dann beispielsweise $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ in den neuen Koordinaten, wenn man von den Abkürzungen $\frac{dr}{d\varphi} = r'$, $\frac{d^2r}{d\varphi^2} = r''$ Gebrauch macht, wie folgt aus:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{r \cos \varphi + r' \sin \varphi}{-r \sin \varphi + r' \cos \varphi} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{(-r \sin \varphi + r' \cos \varphi)^3}. \end{aligned}$$

II. Bedeuten wieder x, y die Koordinaten eines Punktes M der Ebene in bezug auf ein (rechtwinkliges) Koordinatensystem, $u = x_1, v = y_1$ die Koordinaten eines anderen Punktes M_1 derselben Ebene in bezug auf dasselbe Koordinatensystem, so vermitteln die Gleichungen (1*) oder

$$(6) \quad \begin{cases} x_1 = \varphi_1(x, y) \\ y_1 = \psi_1(x, y) \end{cases}$$

den Übergang von M zu M_1 , die inversen Gleichungen (1) oder

$$(6^*) \quad \begin{cases} x = \varphi(x_1, y_1) \\ y = \psi(x_1, y_1) \end{cases}$$

den Übergang von M_1 zu M , und beide bestimmen eine *Transformation der Ebene in sich*. Die Ebene erscheint nun als Trägerin zweier Punktsysteme S und S_1 , die Gleichungen (6) ordnen jedem Punkte aus S einen und nur einen Punkt aus S_1 , umgekehrt die Gleichungen (6*) jedem Punkte aus S_1 einen und nur einen Punkt aus S zu; aus diesem Grunde wird die Transformation auch eine *ein-eindeutige Punkttransformation* genannt. Weil wir von den Funktionen $\varphi_1, \psi_1; \varphi, \psi$ voraussetzen, daß sie stetig sind und bestimmte Differentialquotienten besitzen, so werden hinreichend kleinen Änderungen von x, y

beliebig kleine Änderungen von x_1, y_1 und umgekehrt entsprechen; infolgedessen wird bei stetiger Bewegung des Punktes M im allgemeinen auch der transformierte Punkt M_1 eine stetige Bewegung ausführen; daher nennt man die Transformation eine *kontinuierliche*. Geht durch den Punkt M eine Kurve, so bestimmt $\frac{dy}{dx}$ die Richtung ihrer Tangente daselbst, $\frac{dy_1}{dx_1}$ hingegen die Richtung der Tangente an die *transformierte Kurve* im Punkte M_1 .

Unter den ein-eindeutigen Punkttransformationen spielt die *projektive Transformation* eine besonders wichtige Rolle; sie ist durch die Gleichungen

$$(7) \quad \begin{cases} x_1 = \frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2} \\ y_1 = \frac{a_3 x + b_3 y + c_3}{a_2 x + b_2 y + c_2} \end{cases}$$

bestimmt, in welchen alle a, b, c gegebene Konstanten bedeuten. Allen (reellen) Wertverbindungen dieser Konstanten, deren Zahl durch Abkürzung mit einer, z. B. c_2 , auf 8 reduziert werden kann, entspricht die Gesamtheit aller projektiven Transformationen der Ebene.

Bezeichnet man die Transformation (7), durch die der Punkt x/y in den Punkt x_1/y_1 übergeführt wird, mit T , und läßt man auf sie eine zweite projektive Transformation T' folgen, so entsteht aus x_1/y_1 der neue Punkt

$$(7') \quad \begin{aligned} x_1' &= \frac{a_1' x_1 + b_1' y_1 + c_1'}{a_2' x_1 + b_2' y_1 + c_2'} \\ y_1' &= \frac{a_3' x_1 + b_3' y_1 + c_3'}{a_2' x_1 + b_2' y_1 + c_2'}; \end{aligned}$$

ersetzt man hierin x_1, y_1 durch ihre Werte aus (7) und vereinfacht die Ausdrücke, so entstehen Gleichungen von derselben Form wie (7):

$$\begin{aligned} x_1' &= \frac{\alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1}{\alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2} \\ y_1' &= \frac{\alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3}{\alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2} \end{aligned}$$

d. h. die Aufeinanderfolge von zwei projektiven Transformationen ist durch *eine* projektive Transformation ersetzbar. Man sagt von Transformationen, die ein solches Verhalten zeigen,

daß die Sukzession zweier durch eine Transformation aus derselben Gesamtheit ersetzt werden kann, sie bilden eine *Transformationsgruppe* oder *Gruppe* schlechtweg. Hiernach bilden also die projektiven Transformationen eine kontinuierliche Gruppe.

Zu den projektiven Transformationen gehören auch die *Bewegungen der Ebene in sich*; an diesen ist der Gruppencharakter am leichtesten erkennbar; in der Tat, hat man ein ebenes System S durch die Bewegung B in die Lage S_1 und aus dieser durch eine zweite Bewegung B' in die Lage S_1' gebracht, so gibt es immer auch eine Bewegung, durch die S unmittelbar in die Lage S_1' versetzt werden kann.

Um die *inverse* Transformation zu (7) zu erhalten, bezeichne man den gemeinsamen Nenner von x_1 und y_1 mit N und bilde aus (7) die Gleichungen

$$a_1 x + b_1 y + c_1 = N x_1$$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 = N y_1$$

$$a_3 x + b_3 y + c_3 = N;$$

werden in der Determinante

$$R = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

die den Elementen a_1, b_1, \dots adjungierten Unterdeterminanten mit α_1, β_1, \dots bezeichnet und multipliziert man die obigen drei Gleichungen der Reihe nach mit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ und addiert sie, so folgt wegen $a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 = R$, $b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + b_3 \alpha_3 = 0$, $c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + c_3 \alpha_3 = 0$:

$$R x = N(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1 + \alpha_3);$$

ebenso erhält man nach Multiplikation mit $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ und Addition:

$$R y = N(\beta_1 x_1 + \beta_2 y_1 + \beta_3)$$

und nach Multiplikation mit $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ und darauffolgender Addition:

$$R = N(\gamma_1 x_1 + \gamma_2 y_1 + \gamma_3);$$

ist nun $R \neq 0$ — und nur dann lassen die Gleichungen (7) Auflösung nach x, y zu und bestimmen eine eigentliche *Trans-*

formation der Ebene in sich —, so ergibt paarweise Division der letzten drei Gleichungen:

$$(7^*) \quad \begin{cases} x = \frac{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1 + \alpha_3}{\gamma_1 x_1 + \gamma_2 y_1 + \gamma_3} \\ y = \frac{\beta_1 x_1 + \beta_2 y_1 + \beta_3}{\gamma_1 x_1 + \gamma_2 y_1 + \gamma_3}, \end{cases}$$

woraus hervorgeht, daß die inverse Transformation auch der Gruppe der projektiven Transformationen angehört. In ihrer Aufeinanderfolge heben sich die Transformationen (7) und (7*) auf und sind äquivalent der *identischen Transformation*, welche die Ebene in Ruhe läßt.

Eines der wesentlichen Merkmale der projektiven Transformation liegt darin, daß sie jede Gerade der Ebene wieder in eine Gerade transformiert. Denn beschreibt der Punkt M die Gerade

$$Ax + By + C = 0,$$

so beschreibt der transformierte Punkt M_1 das Gebilde

$$A \frac{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 y_1 + \alpha_3}{\gamma_1 x_1 + \gamma_2 y_1 + \gamma_3} + B \frac{\beta_1 x_1 + \beta_2 y_1 + \beta_3}{\gamma_1 x_1 + \gamma_2 y_1 + \gamma_3} + C = 0,$$

d. i.

$$(A\alpha_1 + B\beta_1 + C\gamma_1)x_1 + (A\alpha_2 + B\beta_2 + C\gamma_2)y_1 + (A\alpha_3 + B\beta_3 + C\gamma_3) = 0,$$

also wieder eine Gerade.

Man erkennt ebenso leicht: Beschreibt der Punkt M einen Kegelschnitt, so beschreibt der zugeordnete Punkt M_1 wieder einen Kegelschnitt. Allgemein: Beschreibt M eine algebraische Kurve n -ter Ordnung, so beschreibt auch M_1 eine solche.

An die Stelle der Gleichungen (2) treten nun:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dx} &= \frac{(a_2 x + b_2 y + c_2) \left(a_1 + b_1 \frac{dy}{dx} \right) - (a_1 x + b_1 y + c_1) \left(a_2 + b_2 \frac{dy}{dx} \right)}{(a_2 x + b_2 y + c_2)^2} \\ &= \frac{-\gamma_2 y + \beta_2 + (\gamma_2 x - \alpha_2) \frac{dy}{dx}}{(a_2 x + b_2 y + c_2)^2}, \\ \frac{dy_1}{dx} &= \frac{(a_2 x + b_2 y + c_2) \left(a_2 + b_2 \frac{dy}{dx} \right) - (a_2 x + b_2 y + c_2) \left(a_2 + b_2 \frac{dy}{dx} \right)}{(a_2 x + b_2 y + c_2)^2} \\ &= \frac{\gamma_1 y - \beta_1 - (\gamma_1 x - \alpha_1) \frac{dy}{dx}}{(a_2 x + b_2 y + c_2)^2}, \end{aligned}$$

so daß

$$(8) \quad \frac{dy_1}{dx_1} = \frac{\gamma_1 y - \beta_1 - (\gamma_1 x - \alpha_1) \frac{dy}{dx}}{-\gamma_1 y + \beta_1 + (\gamma_1 x - \alpha_1) \frac{dy}{dx}};$$

dadurch ist die *Richtung* bestimmt, in welche die durch $\frac{dy}{dx}$ charakterisierte Richtung aus dem Punkte M im Wege der Transformation (7) übergeführt wird.

Eine Unterart der projektiven Transformation ist die *lineare Transformation*, bei der $a_3 = b_3 = 0$, $c_3 = 1$; sie ist also durch die Gleichungen

$$(9) \quad \begin{cases} x_1 = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ y_1 = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases}$$

bestimmt und nur dann eine eigentliche Transformation, wenn

$$\gamma = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0;$$

setzt man ferner

$$\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \alpha, \quad \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} = \beta,$$

so lautet die inverse Transformation:

$$(9^*) \quad \begin{cases} x = \frac{b_2 x_1 - b_1 y_1 + \alpha}{\gamma} \\ y = \frac{-a_2 x_1 + a_1 y_1 + \beta}{\gamma} \end{cases}$$

Die durch sie herbeigeführte Richtungstransformation ist durch die Gleichung

$$(10) \quad \frac{dy_1}{dx_1} = \frac{a_2 + b_2 \frac{dy}{dx}}{a_1 + b_1 \frac{dy}{dx}}$$

bestimmt. Da der rechtseitige Ausdruck x, y nicht enthält, so wird *jede* Richtung, deren Koeffizient $\frac{dy}{dx}$ ist, in eine Richtung vom Koeffizienten $\frac{dy_1}{dx_1}$ transformiert, mit andern Worten: *die lineare Transformation führt parallele Gerade wieder in parallele Gerade über.*

Unterarten der linearen Transformation sind beispielsweise die Translation $x_1 = x + c_1$, $y_1 = y + c_2$, die zur Gruppe der

Bewegungen gehört, und die perspektive Transformation, auch Ähnlichkeitstransformation, $x_1 = ax$, $y_1 = ay$, deren Zentrum der Ursprung ist.

65. Beispiele. 1) Der Ausdruck

$$\varrho = \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

für rechtwinklige Koordinaten x, y ist in Polarkoordinaten r, φ zu transformieren.

Mit Hilfe der am Schlusse von 64, I gefundenen Darstellung von $\frac{dy}{dx}$ und $\frac{d^2y}{dx^2}$ in Polarkoordinaten erhält man nach einfacher Rechnung

$$\varrho = \frac{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}{r^3 + 2r'r'' - rr'''}.$$

2) Für die projektive Punkttransformation

$$x_1 = \frac{c}{y}, \quad y_1 = \frac{ax}{y}$$

(dieselbe geht aus der allgemeinen (7) hervor, wenn $a_1 = b_1 = b_2 = c_2 = a_3 = c_3 = 0$, $c_1 = c$, $a_2 = a$, $b_3 = 1$ ist) die *Richtungstransformation* zu bestimmen.

Die nicht verschwindende Determinante

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & c \\ a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

gibt zur ersten und zweiten Zeile die Unterdeterminanten

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 0, & \beta_1 &= 0, & \gamma_1 &= a; \\ \alpha_2 &= c, & \beta_2 &= 0, & \gamma_2 &= 0; \end{aligned}$$

daher ist nach (8)

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{ay - ax \frac{dy}{dx}}{-c \frac{dy}{dx}};$$

d. h. geht durch den Punkt $M(x/y)$ eine Kurve, deren Tangente den Richtungskoeffizienten $\frac{dy}{dx}$ hat, so hat die Tangente

der transformierten Kurve im homologen Punkte M_1 den Richtungskoeffizienten $\frac{dy_1}{dx_1}$.

So wird beispielsweise der *Kreis*

$$x^2 + y^2 - 2ry = 0$$

durch die vorliegende projektive Transformation in

$$\frac{c^2 y_1^2}{a^2 x_1^2} + \frac{c^2}{x_1^2} - 2r \frac{c}{x_1} = 0,$$

also in die *Parabel*

$$cy_1^2 - 2a^2 r x_1 + a^2 c = 0$$

transformiert; im Punkte $x = 0$, $y = 2r$ des Kreises hat die Tangente den Richtungskoeffizienten $\frac{dy}{dx} = 0$, in dem homologen Punkte $x_1 = \frac{c}{2r}$, $y_1 = 0$ hat die Parabeltangente den Richtungskoeffizienten $\frac{dy_1}{dx_1} = \infty$.

66. Transformation der Variablen in Funktionen von mehr als einer Veränderlichen. Der einfachste Fall ist der folgende: *In einem funktionalen Zusammenhange zwischen drei Variablen x, y, z werden x, y als die unabhängigen Veränderlichen aufgefaßt; an ihre Stelle sollen zwei neue unabhängige Variable treten, welche mit ihnen in einem gegebenen Zusammenhange stehen.*

Wie das analoge Problem 43 tritt auch dieses in zwei verschiedenen Formen auf, je nachdem z eine beliebige unbestimmt gelassene oder eine *gegebene* Funktion von x, y ist. Hier wie dort sind die in beiden Fällen in Kraft tretenden Formeln im Wesen die gleichen.

I. Es sei z eine beliebige Funktion der unabhängigen Variablen x, y , an deren Stelle die neuen Variablen u, v mittels der Transformationsgleichungen

$$(11) \quad \begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \end{cases}$$

eingeführt werden sollen; irgend ein Ausdruck oder eine Relation zwischen x, y, z , $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, ... ist in den u, v, z , $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$, ... darzustellen.

Indem man s als zusammengesetzte Funktion von u, v auffaßt, erhält man, von den Abkürzungen:

$$\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} = f_u, \quad \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = f_v,$$

$$\frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial u^2} = f_{uu}, \quad \frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial v^2} = f_{vv}, \quad \frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial u \partial v} = f_{uv}$$

Gebrauch machend, zunächst die beiden Gleichungen (59, (11), (12))

$$(12) \quad \begin{cases} \frac{\partial s}{\partial u} = \varphi_u \frac{\partial s}{\partial x} + \psi_u \frac{\partial s}{\partial y} \\ \frac{\partial s}{\partial v} = \varphi_v \frac{\partial s}{\partial x} + \psi_v \frac{\partial s}{\partial y} \end{cases}$$

und aus diesen ergibt sich bei allen Wertverbindungen u, v , für welche die Determinante

$$\begin{vmatrix} \varphi_u & \psi_u \\ \varphi_v & \psi_v \end{vmatrix}$$

von Null verschieden ist, für $\frac{\partial s}{\partial x}, \frac{\partial s}{\partial y}$ die Bestimmung:

$$(13) \quad 1: \frac{\partial s}{\partial x} : \frac{\partial s}{\partial y} = \begin{vmatrix} \varphi_u & \psi_u \\ \varphi_v & \psi_v \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} \frac{\partial s}{\partial u} & \psi_u \\ \frac{\partial s}{\partial v} & \psi_v \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} \varphi_u & \frac{\partial s}{\partial u} \\ \varphi_v & \frac{\partial s}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Sind auch die zweiten Differentialquotienten $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 s}{\partial y^2}$ in der betreffenden Rechnung, so differentiire man die Gleichung (12) nochmals, und man erhält (59, (15) bis (17)):

$$(14) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial u^2} = \varphi_{uu} \frac{\partial s}{\partial x} + \psi_{uu} \frac{\partial s}{\partial y} + \varphi_u \left(\varphi_u \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \psi_u \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} \right) \\ \quad + \psi_u \left(\varphi_u \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} + \psi_u \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \right) \\ \frac{\partial^2 s}{\partial v^2} = \varphi_{vv} \frac{\partial s}{\partial x} + \psi_{vv} \frac{\partial s}{\partial y} + \varphi_v \left(\varphi_v \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \psi_v \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} \right) \\ \quad + \psi_v \left(\varphi_v \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} + \psi_v \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \right) \\ \frac{\partial^2 s}{\partial u \partial v} = \varphi_{uv} \frac{\partial s}{\partial x} + \psi_{uv} \frac{\partial s}{\partial y} + \varphi_u \left(\varphi_v \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \psi_v \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} \right) \\ \quad + \psi_u \left(\varphi_v \frac{\partial^2 s}{\partial x \partial y} + \psi_v \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \right) \end{cases}$$

— dabei ist von einer Reduktion der Gleichungen abgesehen worden; nach Einsetzung der Werte für $\frac{\partial s}{\partial x}, \frac{\partial s}{\partial y}$ aus (13) können

hieraus $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ bestimmt werden für alle Wertverbindungen u, v , für welche

$$\begin{vmatrix} \varphi_u & \psi_u \\ \varphi_v & \psi_v \end{vmatrix} \neq 0;$$

denn die Determinante der Koeffizienten von $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ in (14), d. i.

$$\begin{vmatrix} \varphi_u^2 & 2\varphi_u\psi_u & \psi_u^2 \\ \varphi_v^2 & 2\varphi_v\psi_v & \psi_v^2 \\ \varphi_u\varphi_v & \varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u & \psi_u\psi_v \end{vmatrix}$$

stellt sich als negative dritte Potenz der obigen Determinante zweiten Grades dar*) und ist daher zugleich mit dieser verschieden von Null.

II. Ist z eine *gegebene* Funktion von x, y : $z = f(x, y)$, so lautet die Aufgabe dahin, die Differentialquotienten $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dots$ oder einen aus x, y, z und diesen Differentialquotienten gebildeten Ausdruck in den neuen Variablen u, v darzustellen.

Führt man die Substitution (11) in der gegebenen Funktion aus, so ergibt sich

$$(15) \quad z = f[\varphi(u, v), \psi(u, v)] = \chi(u, v)$$

ebenfalls als bekannte Funktion von u, v und es lassen sich somit die Differentialquotienten

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \chi_u, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \chi_v, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = \chi_{uu}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = \chi_{vv}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \chi_{uv}$$

bestimmen; setzt man ihre Werte in (12) und (14) ein, so sind diese Gleichungen geeignet, $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ als Funktionen von u, v zu bestimmen.

*) Man löse, um dies einzusehen, die Determinante dritten Grades in die Summe

$$\begin{vmatrix} \varphi_u^2 & \varphi_u\psi_u & \psi_u^2 \\ \varphi_v^2 & \varphi_v\psi_v & \psi_v^2 \\ \varphi_u\varphi_v & \varphi_u\psi_v & \psi_u\psi_v \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \varphi_u^2 & \varphi_u\psi_u & \psi_u^2 \\ \varphi_v^2 & \varphi_v\psi_v & \psi_v^2 \\ \varphi_u\varphi_v & \varphi_v\psi_u & \psi_u\psi_v \end{vmatrix}$$

auf und entwickle beide Bestandteile nach der ersten oder der dritten Kolonne.

Die Föhrung der Rechnung im Falle von mehr als zwei unabhängigen Variablen und ihre Ausdehnung auf höhere Differentialquotienten bedarf keiner weiteren Erklärung.

67. Beispiele. 1) Für eine beliebige Funktion z von x, y ist der Ausdruck

$$R = 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2$$

der Transformation

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

zu unterwerfen (64, I).

Die Gleichungen (12) lauten im vorliegenden Falle:

$$\frac{\partial z}{\partial \varphi} = -r \sin \varphi \frac{\partial z}{\partial x} + r \cos \varphi \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \cos \varphi \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \varphi \frac{\partial z}{\partial y};$$

quadriert man sie, nachdem man die erste durch r dividiert hat, und bildet hierauf ihre Summe, so ergibt sich:

$$\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2;$$

mithin ist

$$R = 1 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2.$$

2) Es sei V eine beliebige Funktion der unabhängigen Variablen x, y, z ; man soll die mit Hilfe derselben gebildeten Ausdrücke:

$$\Delta V = \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)^2,$$

$$\Delta^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

einer homogenen linearen Transformation (64, II)

$$(16) \quad \begin{cases} x = a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 z_1 \\ y = a_2 x_1 + b_2 y_1 + c_2 z_1 \\ z = a_3 x_1 + b_3 y_1 + c_3 z_1 \end{cases}$$

unterwerfen von solcher Art, daß durch sie $x^2 + y^2 + z^2$ übergeführt wird in $x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$.

Eine lineare Transformation von dieser Beschaffenheit wird, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Variablen, eine *orthogonale Transformation* genannt. Sie bedeutet bei zwei und

drei Variablen den Übergang von einem rechtwinkligen Koordinatensystem zu einem andern ebensolchen bei Festhalten des Ursprungs; wird auch dieser geändert, so tritt in den Gleichungen rechts noch eine additive (beliebige) Konstante hinzu.

Um zunächst die *Eigenschaften der Koeffizienten* einer solchen Transformation zu ermitteln, bilde man die Quadratsumme der Transformationsgleichungen:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 = & \\ (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)x_1^2 + (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)y_1^2 + (c_1^2 + c_2^2 + c_3^2)z_1^2 & \\ + 2(b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)y_1z_1 + 2(c_1a_1 + c_2a_2 + c_3a_3)z_1x_1 & \\ + 2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)x_1y_1; & \end{aligned}$$

ersetzt man die linke Seite, entsprechend der Definition, durch $x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$, so führt die Vergleichung beider Seiten zu folgenden für die orthogonale Transformation charakteristischen Beziehungen*):

$$(17) \quad \begin{cases} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1 \\ b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 = 1 \\ c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1 \\ b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3 = 0 \\ c_1a_1 + c_2a_2 + c_3a_3 = 0 \\ a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0. \end{cases}$$

Multipliziert man ferner (16) der Reihe nach mit a_1, a_2, a_3 ; dann mit b_1, b_2, b_3 , endlich mit c_1, c_2, c_3 und bildet jedesmal die Summe mit Rücksicht auf (17), so ergibt sich die inverse Transformation

$$(16^*) \quad \begin{cases} x_1 = a_1x + a_2y + a_3z \\ y_1 = b_1x + b_2y + b_3z \\ z_1 = c_1x + c_2y + c_3z \end{cases}$$

*) Mit Hilfe dieser Relationen ist leicht nachzuweisen, daß das Quadrat der Determinante (des „Moduls“) der Transformation:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

gleich der Einheit, die Determinante selbst also $+1$ oder -1 und daher von Null verschieden ist.

und zu den Relationen (17) treten somit noch die folgenden:

$$(17^*) \quad \begin{cases} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = 1 \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 = 1 \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 = 1 \\ a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3 = 0 \\ a_3 a_1 + b_3 b_1 + c_3 c_1 = 0 \\ a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0. \end{cases}$$

Die Ausführung der Gleichungen (12) gibt nun:

$$(18) \quad \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x_1} = a_1 \frac{\partial V}{\partial x} + a_2 \frac{\partial V}{\partial y} + a_3 \frac{\partial V}{\partial z} \\ \frac{\partial V}{\partial y_1} = b_1 \frac{\partial V}{\partial x} + b_2 \frac{\partial V}{\partial y} + b_3 \frac{\partial V}{\partial z} \\ \frac{\partial V}{\partial z_1} = c_1 \frac{\partial V}{\partial x} + c_2 \frac{\partial V}{\partial y} + c_3 \frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

und die sinngemäße Ausführung von (14):

$$(19) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial x_1^2} = a_1^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + a_2^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + a_3^2 \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} + 2 a_2 a_3 \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial z} \\ \quad + 2 a_3 a_1 \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial x} + 2 a_1 a_2 \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial y_1^2} = b_1^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + b_2^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + b_3^2 \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} + 2 b_2 b_3 \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial z} \\ \quad + 2 b_3 b_1 \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial x} + 2 b_1 b_2 \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial z_1^2} = c_1^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + c_2^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + c_3^2 \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} + 2 c_2 c_3 \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial z} \\ \quad + 2 c_3 c_1 \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial x} + 2 c_1 c_2 \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y}. \end{cases}$$

Bildet man die Quadratsumme der Gleichungen (18), dann die einfache Summe der Gleichungen (19), beides mit Rücksicht auf (17*), so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial V}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial y_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial z_1} \right)^2 &= \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial z} \right)^2, \\ \frac{\partial^2 V}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z_1^2} &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}; \end{aligned}$$

d. h. die beiden Ausdrücke ΔV , $\Delta^2 V$ erleiden bei einer orthogonalen Transformation der Variablen x, y, z keine Änderung.

Man nennt Ausdrücke, die, aus den Ableitungen einer Funktion f (von zwei, drei Variablen) gebildet, die Eigenschaft

besitzen, einer orthogonalen Transformation gegenüber invariant zu bleiben, *Differentialinvarianten* oder *Differentialparameter* der betreffenden Funktion. Insbesondere bezeichnet man die vorhin aus V gebildeten Ausdrücke ΔV , $\Delta^2 V$ als deren Differentialparameter erster, beziehungsweise zweiter Ordnung. Die große Bedeutung solcher Ausdrücke für Geometrie, Physik, Mechanik u. a. besteht darin, daß sie notwendig Größen darstellen, die von der Wahl des (rechtwinkligen) Koordinatensystems unabhängig sind, also selbständig existieren.

3) Durch die Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

ist z als zweideutige Funktion der beiden Variablen x , y definiert auf dem Gebiete

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \leq 0,$$

d. h. im Innern und auf dem Umfange einer Ellipse mit den Halbachsen a , b . Es sind die Differentialquotienten $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ mittels der Transformation

$$x = a \sin u \cos v$$

$$y = b \sin u \sin v$$

in den Variablen u , v darzustellen.

Mit Hilfe dieser Substitution ergibt sich

$$z = \pm c \cos u$$

und die Gleichungen (12) gestalten sich wie folgt:

$$\mp c \sin u = a \cos u \cos v \frac{\partial z}{\partial x} + b \cos u \sin v \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$0 = -a \sin u \sin v \frac{\partial z}{\partial x} + b \sin u \cos v \frac{\partial z}{\partial y};$$

ihre Auflösung liefert:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \mp \frac{c \sin u \cos v}{a \cos u}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \mp \frac{c \sin u \sin v}{b \cos u};$$

die gleichgestellten Vorzeichen beziehen sich aufeinander.

4) Zu zeigen, daß die Transformation $x = u + v$, $y = uv$ zu den Gleichungen führt:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{u \frac{\partial z}{\partial u} - v \frac{\partial z}{\partial v}}{u - v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial z}{\partial u}}{u - v}.$$

5) Zu zeigen, daß infolge der Transformation

$$x = \xi + \eta \cos \omega$$

$$y = \eta \sin \omega$$

(Übergang von rechtwinkligen Koordinaten x, y zu schiefwinkligen ξ, η bei derselben Abszissenachse, demselben Ursprung und dem Koordinatenwinkel ω) die folgenden Relationen stattfinden:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{\sin^2 \omega} \left\{ \frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} \cos \omega + \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} \right\},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = \frac{1}{\sin^2 \omega} \left\{ \frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} \right)^2 \right\}.$$

68. Simultane Transformation dreier voneinander abhängigen Variablen. Zwischen den drei Variablen x, y, z bestehe ein funktionaler Zusammenhang, in welchem x, y als unabhängige Veränderliche gelten; an Stelle von x, y, z sollen neue Variable u, v, w mittels der Transformationsgleichungen

$$(20) \quad \begin{cases} x = \varphi(u, v, w) \\ y = \psi(u, v, w) \\ z = \chi(u, v, w) \end{cases}$$

eingeführt werden. Es sind die Differentialquotienten $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dots$ durch die aus dem neuen Zusammenhange hervorgehenden $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial^2 w}{\partial u^2}, \dots$ darzustellen.

Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Gleichungen 66, (12), (14) heranzuziehen, deren erste Gruppe wir zu diesem Zwecke in der Form schreiben

$$(21) \quad \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}; \end{cases}$$

nun sind, da w als Funktion von u, v aufgefaßt wird, vermöge (20) x, y, z zusammengesetzte Funktionen von u, v ; infolgedessen hat man mit Benutzung der in 66 eingeführten Bezeichnung:

$$(22) \quad \begin{cases} \frac{\partial x}{\partial u} = \varphi_u + \varphi_w \frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u} = \psi_u + \psi_w \frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} = \chi_u + \chi_w \frac{\partial w}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} = \varphi_v + \varphi_w \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v} = \psi_v + \psi_w \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} = \chi_v + \chi_w \frac{\partial w}{\partial v}; \end{cases}$$

nach Eintragung dieser Werte in (21) sind diese Gleichungen zur Lösung der gestellten Aufgabe geeignet, soweit sie die ersten Differentialquotienten von z betrifft.

Die erste der Gleichungen (14) lautet in anderer Schreibweise:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = & \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + \frac{\partial x}{\partial u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \\ & + \frac{\partial y}{\partial u} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial u} \right); \end{aligned}$$

darin sind $\frac{\partial x}{\partial u}$ und $\frac{\partial y}{\partial u}$ durch die Werte aus (22) und $\frac{\partial^2 x}{\partial u^2}$, $\frac{\partial^2 y}{\partial u^2}$ durch die folgenden zu ersetzen, die aus (22) sich ergeben:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 x}{\partial u^2} = & \varphi_{uu} + 2\varphi_{uw} \frac{\partial w}{\partial u} + \varphi_{ww} \left(\frac{\partial w}{\partial u} \right)^2 + \varphi_w \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} \\ \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} = & \psi_{uu} + 2\psi_{uw} \frac{\partial w}{\partial u} + \psi_{ww} \left(\frac{\partial w}{\partial u} \right)^2 + \psi_w \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} = & \chi_{uu} + 2\chi_{uw} \frac{\partial w}{\partial u} + \chi_{ww} \left(\frac{\partial w}{\partial u} \right)^2 + \chi_w \frac{\partial^2 w}{\partial u^2}; \end{aligned}$$

in ähnlicher Weise sind die beiden noch übrigen Gleichungen der Gruppe (14) zu behandeln, wodurch sich wieder Gleichungen ergeben, welche im Verein mit (21) die gestellte Aufgabe auch in bezug auf die zweiten Differentialquotienten lösen.

Bei geometrischer Interpretation dieses Problems sind wieder zwei Auffassungen zu unterscheiden, welche den in 64 unter I, II erörterten entsprechen.

I. Bedeuten x, y, z die Koordinaten eines Punktes M im Raume in bezug auf ein Koordinatensystem und u, v, w die Koordinaten *desselben* Punktes in bezug auf ein anderes Koordinatensystem, so spricht man von einer räumlichen *Koordinatentransformation*.

Eine der wichtigsten unter diesen bildet der Übergang von rechtwinkligen Koordinaten zu räumlichen Polarkoordinaten. Dann ist $w = r$ der Radiusvektor, $u = \varphi$ der Neigungswinkel der Ebene MOZ gegen die zx -Ebene und $v = \theta$ der Winkel ZOM (Fig. 17) und die Transformationsgleichungen lauten:

$$(23) \quad \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta; \end{cases}$$




Fig. 17.

die inverse Transformation ist durch

$$(23^*) \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \varphi = \arctg \frac{y}{x} \\ \theta = \arccos \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$

bestimmt, wobei die Eindeutigkeit der zweiten Gleichung dadurch herbeigeführt wird, daß man festsetzt, φ sei derjenige Bogen aus dem Intervalle $(0, 2\pi)$, dessen Sinus das Vorzeichen von y und dessen Kosinus das Vorzeichen von x hat.

In diesem Falle lauten die Gleichungen (21), nachdem bereits jene (22) berücksichtigt worden sind, wie folgt:

$$\begin{aligned} 0 = & \left(-r \sin \theta \sin \varphi + \frac{\partial r}{\partial \varphi} \sin \theta \cos \varphi \right) \frac{\partial z}{\partial x} \\ & + \left(r \sin \theta \cos \varphi + \frac{\partial r}{\partial \varphi} \sin \theta \sin \varphi \right) \frac{\partial z}{\partial y} \\ - r \sin \theta + \frac{\partial r}{\partial \theta} \cos \theta = & \left(r \cos \theta \cos \varphi + \frac{\partial r}{\partial \theta} \sin \theta \cos \varphi \right) \frac{\partial z}{\partial x} \\ & + \left(r \cos \theta \sin \varphi + \frac{\partial r}{\partial \theta} \sin \theta \sin \varphi \right) \frac{\partial z}{\partial y} \end{aligned}$$

und daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} = & \frac{r^2 \sin \theta \cos \varphi + r \frac{\partial r}{\partial \varphi} \sin \theta \sin \varphi - r \frac{\partial r}{\partial \theta} \cos \theta \cos \varphi - \frac{\partial r}{\partial \varphi} \frac{\partial r}{\partial \theta} \cos \theta \sin \varphi}{r^2 \cos \theta + r \frac{\partial r}{\partial \theta} \sin \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = & \frac{r^2 \sin \theta \sin \varphi - r \frac{\partial r}{\partial \varphi} \sin \theta \cos \varphi - r \frac{\partial r}{\partial \theta} \cos \theta \sin \varphi + \frac{\partial r}{\partial \varphi} \frac{\partial r}{\partial \theta} \cos \theta \cos \varphi}{r^2 \cos \theta + r \frac{\partial r}{\partial \theta} \sin \theta} \end{aligned}$$

Auf die zweiten Ableitungen soll nicht weiter eingegangen werden.

II. Läßt man wieder x, y, z die Koordinaten eines Punktes M im Raume in bezug auf ein (rechtwinkliges) Koordinatensystem, $u = x_1, v = y_1, w = z_1$ aber die Koordinaten eines anderen Punktes M_1 in bezug auf dasselbe Koordinatensystem vorstellen, so bestimmen die Gleichungen (20) und ihre inversen, d. i.

$$(24) \quad \begin{cases} x_1 = \varphi_1(x, y, z) \\ y_1 = \psi_1(x, y, z) \\ z_1 = \chi_1(x, y, z) \end{cases}$$

und

$$(24^*) \quad \begin{cases} x = \varphi(x_1, y_1, z_1) \\ y = \psi(x_1, y_1, z_1) \\ z = \chi(x_1, y_1, z_1) \end{cases}$$

eine *Transformation des Raumes in sich*; insbesondere vermitteln die Gleichungen (24) den Übergang von dem Systeme S , welchem der Punkt M angehört, zu dem Systeme S_1 , in welchem M_1 liegt; die Gleichungen (24*) den umgekehrten Prozeß. Sind φ, ψ, χ stetige Funktionen mit bestimmten Differentialquotienten und ebenso φ, ψ, χ , so ist die Transformation eine kontinuierliche.

Zu den wichtigsten ein-eindeutigen Punkttransformationen des Raumes gehört die *projektive*, deren allgemeinste Gleichungen lauten:

$$(25) \quad \begin{cases} x_1 = \frac{a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1}{a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4} \\ y_1 = \frac{a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2}{a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4} \\ z_1 = \frac{a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3}{a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4} \end{cases}$$

Mit dem Hinweise auf die Ausführungen in 64, II sei nur bemerkt, daß der Gesamtheit der projektiven Raumtransformationen Gruppencharakter zukommt, daß durch eine solche Transformation jede Ebene wieder in eine Ebene und jede Fläche zweiter Ordnung in eine Fläche zweiter Ordnung verwandelt wird.

Vierter Abschnitt.

Reihen.

§ 1. Reihen mit konstanten Gliedern.

69. Begriff der Konvergenz und Divergenz. Eine unbegrenzt fortsetzbare Folge reeller Zahlen sei gegeben:

$$(1) \quad a_0, a_1, a_2, \dots;$$

aus ihr läßt sich eine zweite, unbegrenzt fortsetzbare Zahlenfolge

$$(2) \quad s_0, s_1, s_2, \dots$$

bilden, indem man die ersten $1, 2, 3, \dots, n+1, \dots$ Zahlen der Folge (1) durch Addition verbindet, so daß

$$(3) \quad \begin{cases} s_0 = a_0 \\ s_1 = a_0 + a_1 \\ s_2 = a_0 + a_1 + a_2 \\ \dots \\ s_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n. \end{cases}$$

Wenn nun die Zahlen der Folge (2) sich einer bestimmten, endlichen Grenze s nähern, wenn also

$$(4^*) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s,$$

so nennt man die aus den Zahlen der Folge (1) gebildete *unendliche Reihe*

$$(5) \quad a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_0^{\infty} a_n$$

konvergent und s ihren *Grenzwert* (auch ihre *Summe*; vgl. hierzu

*) Es ist kaum nötig zu bemerken, daß bei diesem Grenzübergange n die Reihe der positiven ganzen oder der natürlichen Zahlen zu durchlaufen hat.

75). Die Zahlen der Folge (2), welche endliche Summen von Gliedern der Reihe (5) darstellen, bezeichnet man als *Partialsummen* dieser Reihe.

Zeigen die Partialsummen ein anderes Verhalten, als es hier beschrieben worden, so wird die unendliche Reihe *divergent* genannt. Welche Erscheinungen eine divergente Reihe aufweisen kann, werden die nachfolgenden Betrachtungen so gleich lehren.

Der direkte, allerdings nur selten gangbare Weg zur Untersuchung einer Reihe auf ihre *Konvergenz* oder *Divergenz* besteht in der Bildung der allgemeinen Partialsumme s_n und ihrer Prüfung für ein unbegrenzt wachsendes n . Zwei Beispiele werden dieses Verfahren erläutern und zugleich die verschiedenen Formen der Divergenz kennen lehren.

1) Es sei x eine reelle Zahl und $a_v = x^v$; die hieraus entspringende Reihe

$$(6) \quad \sum_0^{\infty} a_v = 1 + x + x^2 + \dots$$

ist die unendliche *geometrische Progression*; ihre allgemeine Partialsumme

$$s_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

zeigt nun folgendes Verhalten: α) Für $|x| < 1$ konvergiert x^{n+1} mit beständig wachsendem n gegen Null, s_n gegen $\frac{1}{1-x}$, die Reihe (6) ist konvergent und hat den Grenzwert

$$s = \frac{1}{1-x}.$$

β) Für $x > 1$ wächst x^{n+1} und auch s_n über jeden positiven Betrag hinaus, der Grenzwert von s_n ist $+\infty$ und die Reihe (6) divergent. γ) Ist $x < -1$, so wächst x^{n+1} und damit auch s_n dem Betrage nach über jede positive Zahl hinaus, wechselt aber beständig sein Vorzeichen, da der Exponent abwechselnd gerade, ungerade ist; die Reihe (6) ist divergent und man sagt, sie *schwänke zwischen $-\infty$ und $+\infty$* . δ) Für $x = 1$ verliert der Ausdruck für s_n seine Bestimmtheit; indessen läßt die Reihe selbst, welche nun lautet: $1 + 1 + 1 + \dots$, ihre Divergenz unmittelbar erkennen, und zwar ist ihr Grenz-

wert $+\infty$. ε) Ähnlich muß für $x = -1$ auf die Reihe selbst, d. i. $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ gegriffen werden, deren Partialsummen die Zahlenfolge $1, 0, 1, 0, \dots$ bilden; die Reihe (6) ist divergent und man sagt, sie *schwänke zwischen 0 und 1*.

Wie dieses Beispiel zeigt, tritt die Divergenz entweder dadurch zutage, daß die Partialsummen schließlich mit Beibehaltung eines bestimmten Vorzeichens dem Betrage nach größer werden und bleiben als jede positive Zahl — der Grenzwert der Reihe ist $+\infty$ oder $-\infty$ — oder daß sie bei numerischem Wachsen beständig ihr Vorzeichen wechseln — der Grenzwert ist unbestimmt unendlich — oder daß sie zwischen zwei endlichen Zahlen schwanken — der Grenzwert ist unbestimmt.

2) Aus der unbegrenzt fortsetzbaren Folge reeller Zahlen

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$$

bilde man die neue Folge

$$a_0 = \alpha_0 - \alpha_1, \quad a_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \quad a_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \dots;$$

dann gehört zu der unendlichen Reihe

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

die allgemeine Partialsumme

$$s_n = (\alpha_0 - \alpha_1) + (\alpha_1 - \alpha_2) + \dots + (\alpha_n - \alpha_{n+1}) = \alpha_0 - \alpha_{n+1};$$

die Reihe ist demnach konvergent, wenn α_{n+1} mit wachsendem n gegen eine bestimmte Grenze konvergiert; ist α diese Grenze, so hat die Reihe den Grenzwert $s = \alpha_0 - \alpha$. In jedem anderen Falle ist sie divergent.

Ist beispielsweise

$$\alpha_p = \frac{1}{(p + p - 1)(p + p) \dots (p + q + p - 1)},$$

also

$$\begin{aligned} a_p = \alpha_p - \alpha_{p+1} &= \frac{1}{(p + p) \dots (p + q + p - 1)} \left(\frac{1}{p + p - 1} - \frac{1}{p + q + p} \right) \\ &= \frac{q + 1}{(p + p - 1)(p + p) \dots (p + q + p)}, \end{aligned}$$

so ist $\lim_{p \rightarrow +\infty} \alpha_p = 0$, die Reihe $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$ also konvergent und $s = \alpha_0 = \frac{1}{(p - 1)p \dots (p + q - 1)}$ ihr Grenzwert, so daß

$$\begin{aligned} \sum_0^{\infty} \frac{q+1}{(p+v-1)(p+v)\cdots(p+q+v)} &= \\ \frac{q+1}{(p-1)p\cdots(p+q)} + \frac{q+1}{p(p+1)\cdots(p+q+1)} + \cdots \\ &= \frac{1}{(p-1)p\cdots(p+q-1)}; \end{aligned}$$

ist also insbesondere $p=2$, $q=0$, so folgt

$$\sum_0^{\infty} \frac{1}{(v+1)(v+2)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots = 1,$$

und für $p=2$, $q=1$ ergibt sich

$$\sum_0^{\infty} \frac{2}{(v+1)(v+2)(v+3)} = \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{2}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots = \frac{1}{2}.$$

70. Allgemeine Konvergenzbedingung. Aus dem Begriffe des Grenzwertes (15) ergibt sich die notwendige Bedingung für die Konvergenz einer unendlichen Reihe. Soll nämlich die Reihe (5) konvergent sein und den Grenzwert s besitzen, so muß der Unterschied zwischen s und den aufeinanderfolgenden Partialsummen schließlich dem Betrage nach kleiner werden und *bleiben* als eine beliebig klein festgesetzte positive Zahl ε ; mit anderen Worten, es muß sich zu dem gegebenen ε eine natürliche Zahl m derart bestimmen lassen, daß

$$|s_n - s| < \varepsilon$$

für alle $n \geq m$. Infolgedessen wird es auch zu $\frac{\varepsilon}{2}$ eine natürliche Zahl m' geben derart, daß sowohl

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2}$$

wie auch

$$|s_{n+p} - s| < \frac{\varepsilon}{2},$$

wenn nur $n \geq m'$, welche der Zahlen 1, 2, 3, ... auch p sein möge; aus diesen beiden Beziehungen folgt die weitere

$$(7) \quad |s_{n+p} - s_n| < \varepsilon,$$

oder, da $s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$, $s_{n+p} = a_0 + a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}$,

$$(7^*) \quad |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

Soll eine Reihe konvergent sein, so muß sich ein Glied bestimmen lassen, von welchem ab jede beliebig umfangreiche Gliedergruppe eine dem Betrage nach beliebig kleine Summe gibt.

Diese Bedingung ist zur Konvergenz auch hinreichend; denn ist sie für $n = m'$ erfüllt, so kann der absolute Betrag keiner Partialsumme $s_n (n > m')$ größer sein als $|s_{m'}| + \varepsilon$: die absoluten Beträge aller dieser Partialsummen sind also zwischen die Grenzen $|s_{m'}|$ und $|s_{m'}| + \varepsilon$ eingeschlossen, die sich durch Wahl des ε beliebig eng ziehen lassen.

Aus der für eine konvergente Reihe charakteristischen Eigenschaft lassen sich wichtige Folgerungen ziehen.

1) Für $p = 1$ lautet (7*)

$$(8) \quad |a_{n+1}| < \varepsilon,$$

dies aber ist gleichbedeutend mit dem Ansätze $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Soll also eine Reihe konvergent sein, so muß ihr allgemeines Glied a_n mit beständig wachsendem n der Null als Grenze sich nähern oder unendlich klein werden. Diese Bedingung ist notwendig, aber nicht hinreichend, wie man anfänglich, ja bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, geglaubt hat, weil es auch divergente Reihen gibt, welche sie erfüllen, wie alsbald gezeigt werden wird.

Man kann diesen Ergebnissen eine kurze Fassung geben in dem Falle, wo die Glieder der Reihe *rationale* Zahlen sind, nämlich: Die Glieder einer unendlichen Reihe müssen, soll sie konvergent sein, eine Elementarreihe und ihre Partialsummen eine *Fundamentalreihe* bilden; die durch diese Fundamentalreihe definierte Zahl ist der Grenzwert der unendlichen Reihe (4).

2) Zerlegt man die unendliche Reihe $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$ in die *endliche* Summe

$$s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

und in die unendliche Reihe

$$(9) \quad a_{n+1} + a_{n+2} + \dots,$$

so ist diese mit der ursprünglichen zugleich konvergent; denn ihre aufeinanderfolgenden Partialsummen s'_1, s'_2, \dots unterscheiden

sich von den Partialsummen s_{n+1}, s_{n+2}, \dots der ursprünglichen Reihe um den festen Betrag s_n , indem

$$s_{n+1} = s_n + s'_1, \quad s_{n+2} = s_n + s'_2, \dots;$$

nähern sich daher die Zahlen s_0, s_1, s_2, \dots einer Grenze s , so nähern sich die Zahlen s'_1, s'_2, s'_3, \dots der Grenze $s - s_n$. zufolge des Satzes (7*) ist der absolute Betrag des Grenzwertes r_n von (9) kleiner als ε , sobald $n \geq m'$. Man nennt r_n den Rest der bei dem $n+1$ ten Gliede a_n abgebrochenen Reihe (5). Es läßt sich also, wenn die Reihe konvergent ist, zu einem beliebig klein festgesetzten ε eine natürliche Zahl m' derart bestimmen, daß

$$|r_n| < \varepsilon,$$

wenn $n \geq m'$ ist. Dadurch, daß man statt des Grenzwertes s die Partialsumme $s_{m'}$ oder eine höhere nimmt, wird ein Fehler begangen, dessen Betrag kleiner als ε ist.

Auf dieser Eigenschaft beruht die Anwendung der konvergenten Reihen in der Analysis zur Darstellung von Zahlen; ferner ist es vermöge derselben bei der Untersuchung einer Reihe auf Konvergenz gestattet, beliebig viele Anfangsglieder außer acht zu lassen, was mitunter vorteilhaft sein kann.

3) Besteht die Reihe $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$ aus lauter positiven Gliedern und ist sie konvergent, so ist auch jede Reihe, welche aus ihr durch Unterdrückung einer endlichen oder unendlichen Anzahl*) von Gliedern oder durch beliebige Zeichenänderung an den Gliedern entsteht, konvergent. Denn die Relation (7*), wenn sie für die ursprüngliche Reihe bestanden hat, kann durch einen solchen Vorgang nicht aufgehoben werden, sie besteht vielmehr im allgemeinen für die abgeänderte Reihe nur noch in verstärktem Maße.

71. Allgemeine Sätze über Reihen. Aus dem Begriffe der Konvergenz und Divergenz lassen sich die folgenden Sätze erweisen:

- 1) Ist die Reihe $\sum_0^{\infty} a_n$ konvergent und s ihr Grenzwert,

*) Z. B. durch Weglassung aller Glieder mit geradem oder mit ungeradem Zeiger o. dgl.

so ist auch die mit Hilfe eines bestimmten von Null verschiedenen k gebildeten Reihe $\sum_0^{\infty} k a_n$, konvergent und ks ihr Grenzwert.

Ist nämlich s_n die Partialsumme aus den $n + 1$ Anfangsgliedern der ersten Reihe, so ist ks_n die entsprechende Partialsumme der zweiten, und konvergiert s_n für $\lim n = +\infty$ gegen s , so konvergiert ks_n gleichzeitig gegen ks .

War dagegen die erste Reihe divergent, so ist es die zweite auch.

Mit Hilfe dieses Satzes ergibt sich beispielsweise aus der letzten Gleichung in 69, daß

$$\sum_0^{\infty} \frac{1}{(v+1)(v+2)(v+3)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots = \frac{1}{4}.$$

2) Sind die Reihen $\sum_0^{\infty} a_n$, und $\sum_0^{\infty} b_n$, konvergent und s, t ihre Grenzwerte, so sind auch die Reihen

$$\sum_0^{\infty} (a_n + b_n), \quad \sum_0^{\infty} (a_n - b_n)$$

konvergent und $s + t, s - t$ beziehungsweise ihre Grenzwerte.

Bezeichnet man nämlich die Partialsummen aus den $n + 1$ ersten Gliedern der vier Reihen folgeweise mit $s_n, t_n, \sigma_n, \tau_n$, so ist

$$\sigma_n = s_n + t_n, \quad \tau_n = s_n - t_n$$

und daraus ergibt sich, wenn man den Grenzübergang $\lim n = +\infty$ ausführt, die Richtigkeit der obigen Behauptungen.

Ist nur eine der beiden ersten Reihen divergent, so gilt das Nämliche für die beiden letzten Reihen.

Der Satz läßt sich auf eine beliebige, aber beschränkte Anzahl von Reihen ausdehnen.

72. Reihen mit positiven Gliedern. Wir wenden uns nun der speziellen Betrachtung von unendlichen Reihen mit durchwegs positiven Gliedern zu, einestheils, weil diese Reihen ausgezeichnete Eigenschaften besitzen, andernteils, weil die Be-

trachtung der anderen Reihen auf sie zurückleitet. Zunächst sollen Sätze allgemeiner Natur vorgeführt werden.

1) *Eine Reihe mit durchwegs positiven Gliedern ist entweder konvergent, oder divergent mit dem Grenzwert $+\infty$.*

Denn die Partialsummen s_0, s_1, s_2, \dots einer solchen Reihe bilden eine steigende Folge von Zahlen, bei welcher nur zweierlei eintreten kann: entweder bleiben alle Glieder unter einer festen positiven Zahl und nähern sich dann notwendig mit beständig wachsendem Zeiger einer bestimmten Grenze, welche jener Zahl höchstens gleichkommt — die Reihe ist dann konvergent; oder sie werden schließlich größer als jede beliebige positive Zahl — die Reihe hat dann den Grenzwert $+\infty$.

Hieraus folgt, daß die Konvergenz einer Reihe mit positiven Gliedern erwiesen ist, sobald es gelingt zu zeigen, daß s_n für jedes n unter einer Zahl A verbleibt; unter dieser Zahl bleibt dann auch die Summe beliebig vieler aus der Reihe herausgegriffener Glieder.

2) *Ist eine Reihe mit durchwegs positiven Gliedern konvergent, so bleibt sie es auch, wenn man die Glieder anders anordnet, und behält dabei denselben Grenzwert.*

Würde sich die Änderung der Anordnung bloß auf einen endlichen Abschnitt der Reihe beziehen, so genügte zum Beweise des Satzes der Hinweis darauf, daß die über den Abschnitt hinausgehenden Partialsummen durch die Umordnung nicht berührt werden. Die Umordnung soll sich aber auf die Reihe in ihrem ganzen Verlaufe erstrecken, d. h. ist

$$(10) \quad a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

die ursprüngliche und

$$(11) \quad a_{\alpha_0} + a_{\alpha_1} + a_{\alpha_2} + \dots$$

die transformierte Reihe, so soll zwischen den Zeigern ν und α , eine ein-eindeutige Beziehung solcher Art bestehen, daß mit ν zugleich auch α , über jeden Betrag wächst; dann enthält die Reihe (11) alle Glieder von (10) und nur diese.

Bezeichnet s den Grenzwert von (10), so ist jede Partialsumme von (11) kleiner als s , weil sie aus Gliedern von (10) besteht; demnach ist (11) tatsächlich konvergent.

Es seien ferner

$$s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$$

$$\sigma_\nu = a_{\alpha_0} + a_{\alpha_1} + \cdots + a_{\alpha_\nu}$$

zwei Partialsummen von (10) und (11) von solcher Art, daß in σ_ν die Glieder von s_n vorkommen; die darüber hinausgehenden Glieder von σ_ν stammen daher aus dem zu s_n gehörigen Reste r_n , demzufolge ist

$$\sigma_\nu - s_n < r_n;$$

mit wachsendem n nimmt auch ν beständig zu und sinkt r_n unter jeden noch so klein festgesetzten Betrag ε hinab; folglich ist

$$\lim \sigma_\nu = \lim s_n = s.$$

Daß eine divergente Reihe aus positiven Gliedern divergent bleibt, wenn man ihre Glieder anders anordnet, folgt daraus, daß

$$\sigma_\nu > s_n,$$

und daß s_n mit wachsendem n größer wird als jede beliebige positive Zahl.

3) Wenn man in einer konvergenten Reihe aus positiven Gliedern die Glieder gruppenweise zusammenfaßt und aus den Summen dieser Gruppen eine neue Reihe bildet, so ist diese ebenfalls konvergent und hat denselben Grenzwert wie die ursprüngliche.

Denn die Partialsummen der neuen Reihe kommen unter den Partialsummen der ursprünglichen Reihe vor und nähern sich daher der nämlichen Grenze wie diese. Diese Schlußweise zeigt übrigens, daß der Satz für jede konvergente Reihe gilt.

Daß aus einer divergenten Reihe mit positiven Gliedern durch den beschriebenen Vorgang wieder eine divergente Reihe entsteht, erkennt man auf die nämliche Art.

Umgekehrt bleibt eine konvergente Reihe aus positiven Gliedern auch dann konvergent, wenn man einzelne oder alle Glieder in Summen positiver Zahlen auflöst.

Die Eigenschaften 2) und 3) begründen eine vollständige Analogie zwischen unendlichen Reihen mit positiven Gliedern einerseits und endlichen Summen andererseits; sowie der Wert der letzteren unabhängig ist von der Anordnung und gruppen-

weisen Zusammenfassung der Summanden, ist dort der Grenzwert unabhängig von der Anordnung und gruppenweise Zusammenfassung der Glieder; aus diesem Grunde bezeichnet man hier den Grenzwert auch als *Summe der unendlichen Reihe*.

73. Konvergenzkriterien der Reihen mit positiven Gliedern. Zur Entscheidung der Frage, ob eine vorgelegte Reihe aus positiven Gliedern — selbstverständlich eine solche, deren allgemeines Glied a_n mit wachsendem n der Grenze Null sich nähert — konvergent oder divergent sei, gibt es ein für alle Fälle anwendbares Verfahren nicht. Die Hilfsmittel, deren man sich dabei bedient, stützen sich zumeist auf die Vergleichung mit einer Reihe von bereits bekanntem Verhalten, und als solche dient insbesondere die unendliche geometrische Reihe. Einige der hierher gehörigen Sätze sind nachstehend entwickelt.

1) Ist die Reihe $\sum_0^{\infty} a_n$ aus positiven Gliedern konvergent, s ihre Summe, und die Reihe $\sum_0^{\infty} b_n$, ebenfalls aus positiven Gliedern, so beschaffen, daß wenigstens von einem Werte $n+1$ des Zeigers angefangen beständig $b_n < a_n$ ist, so ist auch $\sum_0^{\infty} b_n$ konvergent.*)

Denn die Partialsummen der Reihe

$$b_{n+1} + b_{n+2} + b_{n+3} + \dots$$

sind dann kleiner als die gleichstelligen Partialsummen der Reihe

$$a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots,$$

diese aber wieder sämtlich kleiner als $s - s_n$; infolgedessen ist

*) Man nennt eine Reihe mit positiven Gliedern, deren Glieder wenigstens von einer Stelle angefangen größer sind als die gleichstelligen Glieder einer anderen ebenso gearteten Reihe, eine *Majorante* dieser letzteren. Mit diesem Terminus kann man den obigen Satz so aussprechen, daß eine Reihe mit positiven Gliedern als konvergent erwiesen ist, sobald sich zu ihr eine konvergente Majorante angeben läßt. Übrigens kann der Begriff der Majorante auch dann noch aufrecht bleiben, wenn teilweise Gleichheit der Glieder stattfindet.

die erstangeschriebene Reihe konvergent (72, 1)), ihre Summe kleiner als $s - s_n$, daher auch $\sum_0^{\infty} b_v$ konvergent und ihre Summe kleiner als $\sum_0^n b_v + s - s_n$.

Daraus ergibt sich als Folgerung: Ist $\sum_0^{\infty} a_v$ divergent und von einem Werte $n + 1$ des Zeigers angefangen beständig $b_v > a_v$, so ist auch die Reihe $\sum_0^{\infty} b_v$ divergent. Denn wäre $\sum_0^{\infty} b_v$ konvergent, so müßte es nach dem obigen Satze auch $\sum_0^{\infty} a_v$ sein, gegen die Voraussetzung.

Von dem vorstehenden Satze kann Gebrauch gemacht werden bei Beurteilung der Reihe

$$(12) \quad \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots,$$

welche unter dem Namen der *harmonischen Reihe* als Vergleichsreihe häufige Anwendung findet. Faßt man die Glieder gruppenweise wie folgt zusammen (72, 3):

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right) + \cdots,$$

so sind die Glieder dieser neuen Reihe vom dritten angefangen größer als die gleichgestellten Glieder der Reihe

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{4}{8} + \frac{8}{16} + \cdots$$

oder

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots,$$

welche divergent ist; folglich ist auch die Reihe (12) divergent.

Auf diesem Wege läßt sich ferner die Konvergenz der Reihen

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

$$\frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots$$

erschließen; denn vom ersten, bzw. den zwei ersten Gliedern abgesehen sind

$$\frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \dots$$

$$\frac{1}{3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} + \frac{1}{5 \cdot 4 \cdot 3} + \dots$$

Majoranten dieser Reihen und als konvergent erkannt (69, 2); 71, 1)).

2) Wenn in der Reihe $\sum_0^{\infty} a_v$ aus positiven Gliedern der Quotient $\frac{a_{v+1}}{a_v}$ von einem Zeiger n an kleiner bleibt als ein echter Bruch, so ist die Reihe konvergent; bleibt dagegen von $v = n$ an gefangen $\frac{a_{v+1}}{a_v} \geq 1$, so ist die Reihe divergent.

Denn ist $k < 1$ und

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < k$$

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} < k$$

$$\dots$$

$$\frac{a_{n+p}}{a_{n+p-1}} < k,$$

so ergibt sich durch Multiplikation

$$a_{n+p} < a_n k^p;$$

von dem Werte $n + 1$ des Zeigers angefangen sind also die Glieder der vorgelegten Reihe kleiner als die korrespondierenden Glieder einer geometrischen Reihe mit echtgebrochenem Quotienten, die konvergent ist (69, 1)); nach dem vorangehen-

den Satze ist es also auch die Reihe $\sum_0^{\infty} a_v$.

Aus der vorigen Ungleichheit folgt, daß

$$r_n < a_n k (1 + k + k^2 + \dots) = \frac{a_n k}{1 - k},$$

daß also der Rest der Reihe, wenn man sie bei dem Gliede a_n abbricht, kleiner ist als $\frac{a_n k}{1 - k}$.

Der Beweis des zweiten Teiles ist einfach zu führen; aus den Relationen:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1, \quad \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \geq 1, \quad \frac{a_{n+3}}{a_{n+2}} \geq 1, \dots$$

schließt man auf

$$a_n \geq a_{n+1} \geq a_{n+2} \geq a_{n+3} \geq \dots,$$

folglich nehmen die Glieder von a_n an nicht mehr ab und kann daher $\lim a_n$ für $n = +\infty$ nicht Null sein (70, 1).

Es mag bemerkt werden, daß die Beziehung $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ für $n \geq n$ zur Konvergenz nicht ausreicht, wie das Beispiel der harmonischen Reihe erweist, wo $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1}$ tatsächlich beständig < 1 ist, während die Reihe doch divergiert; es läßt sich eben keine unter 1 liegende Zahl angeben, unter der *alle* $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ gelegen sind.

Aus dem obigen Satze fließt der nachstehende als Folgerung: Ist $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$, so ist $\sum a_n$ konvergent, wenn $\lambda < 1$, und divergent, wenn $\lambda > 1$; im Falle, daß $\lambda = 1$, kann keine Entscheidung getroffen werden.

Denn ist $\lambda < 1$ und schaltet man zwischen λ und 1 den echten Bruch k ein, so läßt sich notwendig ein Wert n des Zeigers bestimmen, von welchem an fortan $\frac{a_{n+1}}{a_n} < k$. Und ist $\lambda > 1$, so muß notwendig ein n sich angeben lassen derart, daß $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ ist für $n \geq n$.

Das vorstehende Kriterium, von Cauchy, dem Begründer der allgemeinen Reihentheorie, stammend, kommt bei Beurteilung von Reihen am häufigsten zur Anwendung.

In der Reihe

$$1 + \frac{a}{1} + \frac{a^2}{1 \cdot 2} + \frac{a^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots,$$

wo $a > 0$, ist

$$a_n = \frac{a^n}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n}, \quad a_{n+1} = \frac{a^{n+1}}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n+1)}, \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{n+1}$$

daher $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, wie groß auch die Zahl a sein mag; die angeschriebene Reihe ist also immer konvergent, auch wenn a negativ ist (70, 3)).

Dagegen ist in der Reihe

$$\frac{a}{1} + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3} + \dots,$$

wo wieder $a > 0$, wenn man die Bezeichnung der Glieder mit a_1 beginnt,

$$a_n = \frac{a^n}{n}, \quad a_{n+1} = \frac{a^{n+1}}{n+1}, \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} a$$

und $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$; diese Reihe ist somit konvergent, wenn a ein positiver echter Bruch ist; sie ist es aber auch, wenn a ein negativer echter Bruch ist (70, 3)). Für $a = 1$, wo das Kriterium unwirksam wird, ist die Reihe als divergent bereits bekannt.

Bezüglich der Reihe

$$\frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots \quad (p > 0),$$

von der die Fälle $p = 2, 3$ bereits erledigt sind (73, 1)), trifft das Kriterium keine Entscheidung; denn beginnt man mit a_1 , so ist

$$a_n = \frac{1}{n^p}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^p}, \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p$$

und somit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.

3) Ist in einer Reihe $\sum_{v=0}^{\infty} a_v$ mit positiven Gliedern $\lim_{v \rightarrow +\infty} v a_v$ nicht Null, wird also a_v im Vergleiche zu $\frac{1}{v}$ bei beständig wachsendem v unendlich klein von der ersten oder einer niedrigeren Ordnung, so ist die Reihe divergent.*)

*) Im Gegensatze zu dem vorigen operiert dieses Kriterium und das folgende nur mit einem Gliede; man unterscheidet hiernach Konvergenzkriterien erster und zweiter Art, je nachdem a_n oder $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ in Betracht gezogen wird.

Welches auch der genannte Grenzwert ist, immer läßt sich eine positive unter ihm liegende Zahl α angeben derart, daß von einem Werte n des Zeigers angefangen das Produkt νa_n größer bleibt als α , so daß

$$\begin{aligned} na_n &> \alpha \\ (n+1)a_{n+1} &> \alpha, \\ &\dots \end{aligned}$$

woraus

$$a_n + a_{n+1} + \dots > \alpha \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots \right);$$

der Rest r_n der vorgelegten Reihe ist also größer als der mit α multiplizierte Rest der harmonischen Reihe, die als divergent erkannt worden ist; folglich ist auch Σa_n divergent.

Daraus ergibt sich beispielsweise die Divergenz der Reihe

$$\sum_0^{\infty} \frac{a}{a\nu + b}$$

weil $\frac{a}{a\nu + b}$ in bezug auf $\frac{1}{\nu}$ unendlich klein wird von der ersten Ordnung; ebenso folgt daraus die Divergenz der Reihe

$$\sum_0^{\infty} \frac{1}{\nu^p}$$

für $p < 1$, weil dann $\frac{1}{\nu^p}$ in bezug auf $\frac{1}{\nu}$ unendlich klein von niederer als der ersten Ordnung ist; hiernach ist z. B. die Reihe

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots,$$

darin sämtliche Wurzeln mit demselben Zeichen genommen, divergent.

4) Wenn in einer Reihe $\sum_0^{\infty} a_n$ aus positiven Gliedern $\lim_{\nu=\infty} \nu^{1+p} a_n$ bei $p > 0$ nicht unendlich ist, wenn also a_n in bezug auf $\frac{1}{\nu}$ bei beständig wachsendem ν unendlich klein von höherer als der ersten Ordnung wird, so ist die Reihe konvergent.

Welches auch der genannte Grenzwert ist, so läßt sich zu einer über ihm liegenden Zahl β ein Zeigerwert n bestimmen,

von welchem angefangen das Produkt $v^{1+p}a_n$ beständig kleiner bleibt als β , so daß

$$\begin{aligned} n^{1+p}a_n &< \beta \\ (n+1)^{1+p}a_{n+1} &< \beta \\ &\dots \end{aligned}$$

woraus

$$(13) \quad \begin{cases} a_n < \frac{\beta}{n^{1+p}} \\ a_{n+1} < \frac{\beta}{(n+1)^{1+p}} \\ \dots \end{cases}$$

Die mit Ausschluß von $x=0$ durchwegs stetige Funktion $f(x) = -\frac{1}{px^p}$ besitzt an jeder Stelle einen Differentialquotienten $f'(x) = \frac{1}{x^{1+p}}$, infolgedessen kann auf sie der Mittelwertsatz (38, 2) angewendet werden und gibt:

$$\frac{1}{px^p} - \frac{1}{p(x+h)^p} = \frac{h}{(x+\theta h)^{1+p}}; \quad (0 < \theta < 1);$$

setzt man hierin $x=n$, $h=1$ und beachtet, daß die rechte Seite für $\theta=1$ ihren kleinsten Wert erreicht, so folgt

$$\frac{1}{(n+1)^{1+p}} < \frac{1}{pn^p} - \frac{1}{p(n+1)^p}$$

und nach Multiplikation mit β unter Rücksichtnahme auf (13):

$$\begin{aligned} a_{n+1} &< \beta \left(\frac{1}{pn^p} - \frac{1}{p(n+1)^p} \right) \\ a_{n+2} &< \beta \left(\frac{1}{p(n+1)^p} - \frac{1}{p(n+2)^p} \right) \\ a_{n+3} &< \beta \left(\frac{1}{p(n+2)^p} - \frac{1}{p(n+3)^p} \right) \\ &\dots \end{aligned}$$

Bildet man die Summe dieser Ungleichheiten, so entsteht rechts, vom Faktor β abgesehen, eine Reihe von dem Baue der Reihe in 69, 2); dieselbe ist konvergent, weil

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{p(n+r)^p} = 0,$$

und ihr Grenzwert ist $\frac{1}{pn^p}$; mithin ist

$$r_n < \frac{\beta}{pn^p}$$

und $\sum_0^{\infty} a_r = \sum_0^n a_r + r_n < \sum_0^n a_r + \frac{\beta}{p n^p}$, womit die Reihe als konvergent erwiesen ist (72, 1).

Diesem Satze zufolge ist jede Reihe von der Form:

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{r^r} = \frac{1}{1^r} + \frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r} + \dots,$$

(mit Beziehung auf den Spezialfall $r=1$ auch *hyperharmonische Reihe* genannt), konvergent, wenn $r > 1$; Beispiele solcher Art sind

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

$$\frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1^3}} + \frac{1}{\sqrt{2^3}} + \frac{1}{\sqrt{3^3}} + \dots$$

5) Die beiden Reihen $\sum_1^{\infty} a_r$ und $\sum_0^{\infty} 2^{\mu} a_{2^{\mu}}$ sind unter der Voraussetzung, daß die durchwegs positiven a_r beständig abnehmen, gleichzeitig konvergent oder divergent.

Denn aus $a_1 > a_2 > a_3 > \dots$ folgt einerseits

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 \\ 2a_2 &> a_2 + a_3 \\ 4a_4 &> a_4 + a_5 + a_6 + a_7 \\ &\dots \dots \dots \\ 2^m a_{2^m} &> a_{2^m} + a_{2^m+1} + \dots + a_{2^{m+1}-1} \end{aligned}$$

und daraus durch Summierung:

$$(\alpha) \quad \sum_0^m 2^{\mu} a_{2^{\mu}} > \sum_1^{2^{m+1}-1} a_r;$$

andererseits

$$\begin{aligned} a_1 &< 2a_1 \\ 2a_2 &= 2a_2 \\ 4a_4 &< 2(a_3 + a_4) \\ &\dots \dots \dots \\ 2^m a_{2^m} &< 2(a_{2^{m-1}+1} + a_{2^{m-1}+2} + \dots + a_{2^m}) \end{aligned}$$

und daraus durch Summierung:

$$(\beta) \quad \sum_0^m 2^\mu a_{2^\mu} < 2 \sum_1^{2^m} a_\nu.$$

Zu beiden Seiten der Relationen (α) und (β) stehen nun Partialsummen der zu vergleichenden Reihen.

Ist die erste Reihe konvergent, so ist es wegen (β) auch die zweite; und ist die erste divergent, so ist es wegen (α) auch die zweite.

Ist die zweite Reihe konvergent, so ist es wegen (α) auch die erste; und ist die zweite divergent, so ist es wegen (β) auch die erste.

74. Reihen mit positiven und negativen Gliedern. Indem wir uns nun der Betrachtung solcher Reihen zuwenden, welche *positive und negative Glieder in unbegrenzter Anzahl* enthalten, knüpfen wir zunächst an die 70, 3) aufgestellte Folgerung an, daß eine konvergente Reihe aus durchwegs positiven Gliedern konvergent bleibt, wenn man die Vorzeichen der Glieder beliebig verändert. Daraus folgt durch Umkehrung die Tatsache, daß eine Reihe mit beliebig bezeichneten Gliedern sicher konvergent ist, wenn diese Eigenschaft der aus den Absolutwerten ihrer Glieder gebildeten Reihe zukommt. Von einer solchen Reihe sagt man, sie sei *absolut* (unbedingt) *konvergent*. Die wesentlichen Eigenschaften solcher Reihen drückt der folgende Satz aus:

Der Grenzwert einer absolut konvergenten Reihe aus positiven und negativen Gliedern in unbeschränkter Anzahl ist gleich der Summe der Reihe, die aus den positiven Gliedern gebildet wird, vermindert um die Summe der Reihe, welche aus den Absolutwerten der negativen Glieder sich zusammensetzt. Er ist unabhängig von der Anordnung der Glieder.

Sei

$$(14) \quad a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

die gegebene Reihe, s ihr Grenzwert, s_n ihre allgemeine Partialsumme; ferner

$$(15) \quad |a_0| + |a_1| + |a_2| + \dots$$

die als konvergent vorausgesetzte Reihe aus den absoluten

Werten der Glieder von (14), σ ihr Grenzwert, σ_n ihre allgemeine Partialsumme; ferner seien $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ die Indizes der positiven Glieder in der Ordnung, in welcher sie in (14) auftreten, und ebenso $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$ die Zeiger der negativen Glieder; dann sind die Reihen

$$(16) \quad a_{\alpha_0} + a_{\alpha_1} + a_{\alpha_2} + \dots$$

$$(17) \quad |a_{\beta_0}| + |a_{\beta_1}| + |a_{\beta_2}| + \dots$$

beide notwendig konvergent; denn jede geht aus der konvergenten Reihe (15) durch Unterdrückung eines Teiles der Glieder hervor (70, 3).

Die Partialsumme s_n von (14) umfasse positive Glieder bis zum Zeiger α_μ , negative Glieder bis zum Zeiger β_ν ; werden die bis zu diesen Gliedern reichenden Partialsummen von (16) und (17) mit t_{α_μ} , beziehungsweise u_{β_ν} bezeichnet, so ist

$$(18) \quad s_n = t_{\alpha_\mu} - u_{\beta_\nu};$$

wächst nun n unaufhörlich, so nehmen auch die Gliederzahlen der rechtsstehenden Partialsummen beständig zu und überschreiten nach und nach jede natürliche Zahl; demnach nähern sich t_{α_μ} , u_{β_ν} für $\lim n = \infty$ den Summen t , u der Reihen (16), (17), so daß

$$(19) \quad s = t - u.$$

Damit ist der erste Teil der Behauptung erwiesen. Der zweite Teil ergibt sich daraus, daß t , u ungeändert bleiben, wenn man die Glieder in (16) und (17) anders anordnet (72, 2); demzufolge hängt auch s nicht ab von der Anordnung der Glieder in der ursprünglichen Reihe (14).

Eine absolut konvergente Reihe weist also wie eine Reihe aus positiven Gliedern das Merkmal einer endlichen Summe auf, von der Anordnung der Glieder unabhängig zu sein; daher kann auch der Grenzwert einer solchen Reihe als *Summe* derselben bezeichnet werden.

75. Bedingt konvergente Reihen. Multiplikationstheorem. Eine Reihe aus positiven und negativen Gliedern kann aber auch konvergent sein, ohne daß es die Reihe aus

den absoluten Werten ihrer Glieder ist; man nennt die Reihe dann *relativ* (bedingt) *konvergent*. Sie erfüllt die Bedingung 70, (7) und insbesondere ist auch $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, die aus den Absolutwerten der Glieder gebildete Reihe dagegen hat den Grenzwert $+\infty$.

Während also eine absolut konvergente Reihe schon *vermöge der Größe ihrer Glieder* konvergiert, tritt dies bei einer bedingt konvergenten *erst durch den Wechsel des Vorzeichens* ein. Von den bedingt konvergenten Reihen gilt nun der folgende Satz:

Der Grenzwert einer bedingt konvergenten Reihe ist abhängig von der Anordnung der Glieder; man kann ihn durch entsprechende Reihung der Glieder jeder beliebigen Zahl A gleichmachen.

Es sei wieder (14) die gegebene Reihe, welche als konvergent vorausgesetzt wird, während die aus ihr abgeleitete (15) jetzt divergent ist. Infolgedessen müssen auch beide Reihen (16) und (17) divergent sein; denn wäre es nur eine von beiden, so würde sich aus der immer noch zu Recht bestehenden Beziehung (18) für $\lim n = +\infty$ entweder $s = +\infty$ oder $s = -\infty$ ergeben, je nachdem man (16) oder (17) divergent annähme; beides steht im Widerspruche mit der Voraussetzung.

Welches nun auch die Zahl A ist (die wir zunächst als positiv uns denken wollen), so läßt sich die Reihe (16) vermöge ihrer Divergenz vom Anfang aus in Gruppen G_0, G_1, G_2, \dots und die Reihe (17) in Gruppen G'_0, G'_1, G'_2, \dots *) zerlegen derart, daß

$$G_0 > A,$$

während sich die Ungleichheit umkehrte oder in eine Gleichung verwandelte, wenn man das letzte Glied der Gruppe G_0 ausließe; daß ferner

$$G_0 - G'_0 < A,$$

während sich die Ungleichheit bei Fortlassung des letzten

*) Die Buchstaben sollen zugleich die *Summen* der betreffenden Gruppen, die unter Umständen auch eingliedrig sein können, bezeichnen.

Gliedes der Gruppe G'_0 umkehrte oder in eine Gleichung verwandelte; daß weiters

$$G_0 - G'_0 + G_1 > A$$

und

$$G_0 - G'_0 + G_1 - G'_1 < A$$

mit derselben Zusatzbemerkung usw. In dieser Anordnung bilden also die Glieder der Reihe (14) eine neue Reihe

$$(20) \quad G_0 - G'_0 + G_1 - G'_1 + G_2 - G'_2 + \dots$$

von solcher Art, daß eine mit G_n schließende Partialsumme Σ_n größer ist als A , jedoch so, daß

$$\Sigma_n - A \leq a_\mu,$$

wenn a_μ das letzte Glied der Gruppe G_n , und daß eine bei $-G'_n$ schließende Partialsumme Σ'_n kleiner ist als A , jedoch so, daß

$$A - \Sigma'_n \leq |a_{\mu'}|, *)$$

wenn $|a_{\mu'}|$ das letzte Glied der Gruppe G'_n ist.

Da nun mit n zugleich sowohl μ wie auch μ' beständig und über jeden Betrag hinaus wächst und da $\lim a_\mu$ sowohl wie $\lim |a_{\mu'}|$ Null ist, so zeigen die beiden letzten Ungleichungen, daß die Unterschiede $\Sigma_n - A$, $A - \Sigma'_n$ mit beständig wachsendem n schließlich unter jeden positiven Betrag herabsinken, so daß

$$\lim \Sigma_n = \lim \Sigma'_n = A,$$

d. h. in der durch (20) gekennzeichneten Anordnung ihrer Glieder hat die Reihe (14) den beliebig festgesetzten Grenzwert A .

Wäre A negativ, so hätte man mit einer negativ genommenen Gruppe aus (17) zu beginnen und zwischen beiden Reihen abzuwechseln.

Da der Grenzwert einer bedingt konvergenten Reihe erst durch eine bestimmte Anordnung der Glieder gegeben ist, so fehlt einer solchen Reihe der Charakter einer endlichen Summe; es empfiehlt sich daher nicht, jenen Grenzwert als Summe der Reihe zu bezeichnen.

Aus dem Zusammenhalt der beiden Sätze dieses und des vorigen Artikels geht hervor, daß eine Reihe aus positiven

*) Das Gleichheitszeichen käme in Kraft, wenn einmal nach Weglassung des letzten Gliedes die Partialsumme dem A gerade gleich würde.

oder

$$a_{n+1}t_{n-1} + a_{n+2}t_{n-2} + \cdots + a_{2n}t_0 \\ + b_{n+1}s_{n-1} + b_{n+2}s_{n-2} + \cdots + b_{2n}s_0.$$

Mithin ist

$$|u_{2n} - s_n t_n| \leq |a_{n+1}| |t_{n-1}| + |a_{n+2}| |t_{n-2}| + \cdots + |a_{2n}| |t_0| \\ + |b_{n+1}| |s_{n-1}| + |b_{n+2}| |s_{n-2}| + \cdots + |b_{2n}| |s_0|;$$

weiter gilt für jedes $m \leq n-1$

$$|s_m| < |a_0| + |a_1| + \cdots + |a_{n-1}| \\ |t_m| < |b_0| + |b_1| + \cdots + |b_{n-1}|;$$

wobei das Ungleichheitszeichen nur im Falle $m = n-1$ in ein Gleichheitszeichen übergehen kann; daher ist in verstärktem Maße

$$|u_{2n} - s_n t_n| < (|b_0| + |b_1| + \cdots + |b_{n-1}|)(|a_{n+1}| + |a_{n+2}| + \cdots + |a_{2n}|) \\ + (|a_0| + |a_1| + \cdots + |a_{n-1}|)(|b_{n+1}| + |b_{n+2}| + \cdots + |b_{2n}|);$$

die ersten Faktoren der beiden rechtsstehenden Produkte kon-

vergieren wegen der vorausgesetzten Konvergenz von $\sum_0^\infty |a_n|$

und $\sum_0^\infty |b_n|$ mit wachsendem n gegen bestimmte endliche

Grenzen, die zweiten Faktoren sinken schließlich aus dem nämlichen Grunde unter jeden noch so kleinen positiven Betrag herab (70); daraus folgt, daß der ganze rechtsstehende Ausdruck mit wachsendem n schließlich kleiner wird als jede noch so kleine positive Zahl; deshalb ist

$$\lim |u_{2n} - s_n t_n| = 0,$$

also

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = st.$$

Damit ist aber die Konvergenz der Reihe $\sum_0^\infty c_n$ und st

als ihr Grenzwert erwiesen.

Daß die Konvergenz absolut ist, ist so zu erkennen. Multipliziert man $\sum |a_n|$ mit $\sum |b_n|$, so entsteht eine konvergente Reihe mit dem allgemeinen Gliede

$$z_n = |a_0| |b_n| + |a_1| |b_{n-1}| + |a_2| |b_{n-2}| + \cdots + |a_n| |b_0|;$$

nun ist $|c_n| \leq \gamma_n$, folglich $\Sigma \gamma_n$ eine konvergente Majorante von $\Sigma |c_n|$, in Folge dessen ist auch $\Sigma |c_n|$ konvergent, also Σc_n tatsächlich absolut konvergent.

Um ein Beispiel zu geben, betrachten wir die geometrische Reihe

$$1 + x + x^2 + \dots,$$

die nach den Ausführungen in 69, 1) absolut konvergent ist mit dem Grenzwert $\frac{1}{1-x}$, wenn $|x| < 1$; unter dieser Voraussetzung kann also das Quadrat der Reihe nach der vorstehenden Multiplikationsregel gebildet werden, gibt wieder eine absolut konvergente Reihe und $\frac{1}{(1-x)^2}$ ist ihr Grenzwert. Die früheren Gliederzeiger sind nun Exponenten; somit entsteht x^n auf so viele Arten, als sich n als Summe zweier Zahlen der Reihe 0, 1, 2, ... zusammensetzen läßt, also auf $n+1$ Arten; mithin ist

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$$

Durch Multiplikation dieser Reihe mit der vorigen erhält man eine absolut konvergente Reihe mit dem Grenzwert $\frac{1}{(1-x)^3}$; ihr Bildungsgesetz ergibt sich durch Zusammenfassung der Teilprodukte

$$\begin{array}{r} 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \\ x + 2x^2 + 3x^3 + \dots \\ x^2 + 2x^3 + \dots \\ x^3 + \dots \\ \dots \end{array}$$

folglich ist

$$\frac{1}{(1-x)^3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots$$

76. Alternierende Reihen. Unter den Reihen mit positiven und negativen Gliedern sind die *alternierenden Reihen*, bei welchen positive und negative Glieder miteinander abwechseln, besonders bemerkenswert. Für solche Reihen gibt es ein in vielen Fällen brauchbares Konvergenzmerkmal, das in dem folgenden Satze enthalten ist.

Wenn in einer alternierenden Reihe die absoluten Beträge der Glieder beständig abnehmen und schließlich gegen die Grenze Null konvergieren, so ist die Reihe konvergent.

Es sei $a_\nu > 0$ für jedes ν und

$$(22) \quad a_0 - a_1 + a_2 - \dots + (-1)^n a_n + \dots$$

die gegebene Reihe; ferner $a_0 > a_1 > a_2 > \dots$ und $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Aus der Darstellung

$$s_{2p-1} = (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_{2p-2} - a_{2p-1})$$

folgt, daß s_{2p-1} als Summe positiver Zahlen mit p wächst, daß also die Partialsummen

$$(23) \quad s_1, s_3, s_5, \dots$$

eine steigende Zahlenreihe bilden.

Aus den beiden Darstellungen

$$\begin{aligned} s_{2p} &= a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \dots - (a_{2p-1} - a_{2p}) \\ &= (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_{2p-2} - a_{2p-1}) + a_{2p} \end{aligned}$$

folgt, und zwar aus der ersten, daß s_{2p} mit p beständig abnimmt, aus der zweiten, daß es immer positiv ist, daß also die Partialsummen

$$(24) \quad s_0, s_2, s_4, \dots$$

sämtlich positiv sind und eine fallende Zahlenreihe bilden; diese muß daher notwendig einen Grenzwert besitzen, der s'' heißen möge.

Da aber

$$s_{2p} = s_{2p-1} + a_{2p},$$

so ist

$$s_{2p-1} = s_{2p} - a_{2p} < s_{2p} < s_0 = a_0,$$

es bleiben also die Zahlen der steigenden Zahlenfolge (23) unter einer festen Zahl, somit besitzt auch sie einen Grenzwert, er heiße s' .

Weil jedoch

$$s_{2p} - s_{2p-1} = a_{2p},$$

so ist für $\lim p = \infty$

$$\lim (s_{2p} - s_{2p-1}) = \lim a_{2p} = 0,$$

also $s'' = s'$, d. h. die beiden Zahlenfolgen (23) und (24) konvergieren gegen denselben Grenzwert s , die erste wachsend, die zweite abnehmend, so daß bei jedem p

$$s_{2p-1} < s < s_{2p}.$$

Aus $r_n = (-1)^{n+1} \{a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - \dots\}$ folgt, daß $|r_n| < |a_{n+1}|$ und daß r_n das Vorzeichen von a_{n+1} hat. Bricht man also bei einem Gliede ab, so hat der zugehörige Rest das Vorzeichen des nächsten Gliedes und ist numerisch kleiner als dieses.

77. Beispiele. 1) Die Bedingungen des obigen Satzes erfüllt die Reihe

$$(25) \quad \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots,$$

sie ist daher konvergent, jedoch nicht absolut konvergent, weil die aus den absoluten Werten der Glieder gebildete Reihe, die harmonische, divergent ist (73, 1)). Bei *dieser* Anordnung der Glieder hat die Reihe einen Grenzwert, welcher liegt zwischen 1 und $\frac{1}{2}$, ebenso zwischen $\frac{1}{2}$ und $\frac{5}{6}$, zwischen $\frac{5}{6}$ und $\frac{7}{12}$ usw., Grenzen, welche immer näher zusammenrücken.

Bei *anderer* Anordnung der Glieder, z. B. bei der Anordnung

$$(26) \quad \frac{1}{1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots,$$

bleibt sie zwar konvergent, hat aber einen anderen Grenzwert, wie man sogleich erkennt, wenn man die positiven Gliederpaare zusammenzieht (72, 3)); ihr Grenzwert liegt dann zwischen $\frac{4}{3}$ und $\frac{5}{6}$, also über $\frac{5}{6}$, während er bei der früheren unter $\frac{5}{6}$ war. Man kann übrigens die Beziehung der beiden Grenzwerte genau feststellen; bezeichnet man den von (25) mit s , so ist (72, 3))

$$s = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8}\right) + \dots,$$

ferner auch (71, 1))

$$\frac{s}{2} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + \dots;$$

addiert man beide Gleichungen, so ergibt sich (71, 2):

$$\frac{3}{2}s = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4}\right) + \dots$$

und rechts steht nun die Reihe (26) bei erlaubter Zusammenfassung der Glieder in Gruppen; heißt also s' ihr Grenzwert, so ist $s' = \frac{3}{2}s$. Durch das Vorseilen der positiven Glieder hat sich also der Grenzwert um die Hälfte vergrößert.

2) Die Reihe

$$(27) \quad \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots$$

erfüllt die Bedingungen der Konvergenz für jedes $p > 0$; absolut konvergent ist sie aber nur, wenn $p > 1$, dagegen nur bedingt konvergent, wenn $p \leq 1$ (73, 3), 4). Wir behalten den Fall $p < 1$ im Auge und ordnen die Glieder wie folgt um:

$$(28) \quad \frac{1}{1^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{7^p} - \frac{1}{4^p} + \dots$$

In der Reihe (27) ist die Partialsumme der $2n$ ersten Glieder

$$s_{2n} = \sum_{\nu=0}^{n-1} \frac{1}{(2\nu+1)^p} - \sum_{\nu=1}^n \frac{1}{(2\nu)^p},$$

in der Reihe (28) die Partialsumme aus den $3n$ ersten Gliedern

$$s'_{3n} = \sum_{\nu=0}^{2n-1} \frac{1}{(2\nu+1)^p} - \sum_{\nu=1}^n \frac{1}{(2\nu)^p},$$

infolgedessen

$$s'_{3n} - s_{2n} = \sum_{\nu=n}^{3n-1} \frac{1}{(2\nu+1)^p} = \frac{1}{(2n+1)^p} + \frac{1}{(2n+3)^p} + \dots + \frac{1}{(4n-1)^p};$$

ersetzt man in der rechtsstehenden Summe sämtliche Glieder, „an der Zahl, durch $\frac{1}{(4n)^p}$, so wird sie verkleinert, daher ist

$$s'_{3n} - s_{2n} > \frac{n}{(4n)^p} = \frac{n^{1-p}}{4^p}.$$

Mit beständig wachsendem n wird die rechte Seite wegen $1-p > 0$ schließlich größer als jeder positive Betrag, s_{2n} konvergiert gegen den Grenzwert von (27), mithin ist

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s'_{3n} = +\infty$$

und gleiches gilt für s'_{3n+1} und s'_{3n+2} , weil $s'_{3n} < s'_{3n+1} < s'_{3n+2}$. Die Reihe (27) hat also durch die Umstellung (28) ihre Konvergenz verloren und den Grenzwert $+\infty$ erlangt. Man überzeugt sich durch ganz analoge Schlüsse, daß sie bei der Anordnung

$$-\frac{1}{2^p} - \frac{1}{4^p} + \frac{1}{1^p} - \frac{1}{6^p} - \frac{1}{8^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

den Grenzwert $-\infty$ hat.

78. Unendliche Produkte. Die Untersuchung *unendlicher Produkte* führt auf die Betrachtung unendlicher Reihen zurück.

Ist

$$(29) \quad a_0, a_1, a_2, \dots$$

eine unbegrenzt fortsetzbare Folge reeller Zahlen, deren keine Null ist, und bildet man aus ihr die neue Folge

$$(30) \quad p_0, p_1, p_2, \dots,$$

indem man

$$p_0 = a_0, \quad p_1 = a_0 a_1, \quad p_2 = a_0 a_1 a_2, \dots$$

nimmt, so ist auch kein Glied dieser neuen Folge gleich Null; man sagt dann, das *unendliche Produkt*

$$(31) \quad a_0 a_1 a_2 \dots = \prod_0^{\infty} a_n$$

sei *konvergent*, wenn p_n mit beständig wachsendem n einer bestimmten von Null verschiedenen Grenze sich nähert; diese Grenze

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = p$$

nennt man den *Grenzwert des unendlichen Produktes*. In jedem anderen Falle heißt das Produkt (31) *divergent**). Die Produkte (30) von $[1], 2, 3, \dots$ Faktoren belegt man mit dem Namen *Partialprodukte*.

Da das Vorzeichen des Produktes aus der (endlich vorausgesetzten) Anzahl der negativen Faktoren im voraus bestimmt werden kann, so darf man sich bloß mit dem absoluten Werte des Produktes befassen und daher alle Faktoren (29) als positiv voraussetzen. Dann folgt aus

$$lp_n = la_0 + la_1 + \dots + la_n$$

sofort, daß die hinreichende und notwendige Bedingung zur Konvergenz des Produktes (31) in der Konvergenz der Reihe

$$la_0 + la_1 + la_2 + \dots$$

gelegen ist; denn ist diese Reihe konvergent und s ihr Grenz-

*) Man zählt Produkte mit dem Grenzwert Null zu den divergenten, weil ihnen die singuläre Eigenschaft zukommt, den Wert Null zu haben, ohne daß einer der Faktoren Null ist.

wert, so ist es auch das Produkt und e' sein Grenzwert; ist die Reihe divergent, so ist es auch das Produkt.

Zur Konvergenz der letztangeschriebenen Reihe ist es aber notwendig, daß $\lim_{n \rightarrow +\infty} l a_n = 0$ sei; zur Konvergenz des Produktes (31) ist es also *notwendig*, daß $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$ sei.

Aus diesem Grunde werden die Faktoren des Produktes in der Form

$$a_n = 1 + \alpha_n$$

dargestellt, und es ist dann

$$(32) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$$

eine zur Konvergenz notwendige Bedingung. Im übrigen können die Zahlen α_n , entweder durchwegs positiv, oder durchwegs negativ oder teils positiv, teils negativ (beides in einer unbeschränkten Anzahl von malen), die Faktoren des Produktes also sämtlich unechte, sämtlich echte oder teilweise unechte, teilweise echte Brüche sein. In dem Falle, wo die α_n , durchgehends oder zum Teil negativ sind, darf man annehmen, daß sie dem Betrage nach unter der Einheit liegen. Denn vermöge (32) muß dies, wenn es nicht schon vom Anfang an der Fall ist, von einem Werte $n + 1$ des Zeigers angefangen notwendig anhalten; dann denke man sich die Faktoren a_0, a_1, \dots, a_n abgeschieden und erstrecke die Untersuchung

blos auf das unendliche Produkt $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$; ist dieses konvergent

und p sein Grenzwert, so ist es auch das ursprüngliche mit dem Grenzwerte $p_n p$; ist es divergent, so gilt dies auch von

$$\prod_0^{\infty} a_n.$$

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz eines unendlichen Produktes $\prod_0^{\infty} (1 + \alpha_n)$ läßt sich da-

hin aussprechen, daß p_n sich der Null nicht beliebig nähern dürfe und daß zu einem beliebig klein festgesetzten η sich n derart bestimmen lasse, daß

$$|p_{n+r} - p_n| < \eta$$

sei für jedes r ; mit Rücksicht auf die über p_n gemachte Voraussetzung kann man dafür auch schreiben:

$$\left| \frac{p_{n+r}}{p_n} - 1 \right| < \frac{\eta}{p_n}$$

und die Bedingung nun dahin formulieren, es müsse sich zu beliebig klein festgesetztem ε ein n derart bestimmen lassen, daß für jedes r

$$(33) \quad \left| \prod_{n+1}^{n+r} (1 + \alpha_n) - 1 \right| < \varepsilon$$

sei. $\prod_{n+1}^{n+r} (1 + \alpha_n)$ heiße das zu p_n gehörige *Restprodukt*.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wenden wir uns dazu, die folgenden Sätze über unendliche Produkte nachzuweisen.

1) Ist $\alpha_n > 0$ für alle Zeigerwerte, so ist das Produkt

$\prod_0^{\infty} (1 + \alpha_n)$ konvergent, wenn die Reihe $\sum_0^{\infty} \alpha_n$ konvergiert, und divergent mit dem Grenzwerte $+\infty$, wenn die Reihe divergent ist.

Das Restprodukt in seiner Entwicklung

$$\begin{aligned} \prod_{n+1}^{n+r} (1 + \alpha_n) &= (1 + \alpha_{n+1})(1 + \alpha_{n+2}) \cdots (1 + \alpha_{n+r}) \\ &= 1 + \alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \cdots + \alpha_{n+r} + S, \end{aligned}$$

worin S die Summe der durchwegs positiven Produkte der α zu zweien, dreien, ... bedeutet, läßt unmittelbar erkennen, daß

$$(34) \quad \prod_{n+1}^{n+r} (1 + \alpha_n) - 1 = \alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \cdots + \alpha_{n+r} + S$$

für den Fall der Divergenz von $\sum_0^{\infty} \alpha_n$ über jede Grenze wächst,

die Bedingung der Konvergenz von $\prod_0^{\infty} (1 + \alpha_n)$ also nicht erfüllt ist. Da p_n in dem vorliegenden Falle mit n beständig wächst, so ist $\lim p_n = +\infty$.

Im Falle der Konvergenz von $\sum_0^\infty \alpha_r$ kann n so gewählt werden, daß bei jedem r

$$\alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \alpha_{n+r} < q < 1$$

sei; löst man S in die Summen $\Sigma_2, \Sigma_3, \dots, \Sigma_r$ der Produkte von je 2, 3, \dots r Faktoren auf und beachtet, daß

$$\Sigma_2 < (\alpha_{n+1} + \dots + \alpha_{n+r})^2 < q^2$$

$$\Sigma_3 < (\alpha_{n+1} + \dots + \alpha_{n+r})^3 < q^3$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\Sigma_r < (\alpha_{n+1} + \dots + \alpha_{n+r})^r < q^r$$

ist, so folgt, daß

$$\prod_{n+1}^{n+r} (1 + \alpha_r) + 1 < q + q^2 + \dots + q^r = q \frac{1 - q^r}{1 - q} < \frac{q}{1 - q};$$

wählt man q derart, daß $\frac{q}{1 - q} < \varepsilon$ wird, wozu nur $q < \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}$ genommen zu werden braucht, so ist die Bedingung (33) der Konvergenz erfüllt.

Aus

$$l \prod_0^\infty (1 + \alpha_r) = \sum_0^\infty l(1 + \alpha_r)$$

schließt man, weil die Reihe rechter Hand aus lauter positiven Gliedern besteht und der Grenzwert einer solchen von der Anordnung der Glieder unabhängig ist (72, 2)), daß der Grenzwert eines konvergenten Produktes von der hier betrachteten Art auch unabhängig ist von der Anordnung der Faktoren.

2) Ist $\alpha_r > 0$ für alle Werte des Zeigers, so ist das Produkt $\prod_0^\infty (1 - \alpha_r)$ konvergent, wenn die Reihe $\sum_0^\infty \alpha_r$ konvergent ist, und divergent mit dem Grenzwerte Null, wenn die Reihe divergent ist.

Da $1 - \alpha_r = \frac{1 - \alpha_r^2}{1 + \alpha_r} < \frac{1}{1 + \alpha_r}$ ist, so folgert man, daß

$$\prod_0^n (1 - \alpha_r) < \frac{1}{\prod_0^n (1 + \alpha_r)}.$$

Ist nun $\sum_0^\infty \alpha_r$ divergent, so ist nach dem vorigen Satze

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_0^n (1 + \alpha_r) = \infty, \text{ daher}$$

$$\prod_0^\infty (1 - \alpha_r) = 0.$$

Aus der jetzt geltenden Entwicklung des Restproduktes:

$$\prod_{n+1}^{n+r} (1 - \alpha_r) = 1 - (\alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \cdots + \alpha_{n+r}) + \Sigma_2 - \Sigma_3 + \cdots + (-1)^r \Sigma_r,$$

ergibt sich, wenn $\sum_0^\infty \alpha_r$ konvergiert, mit den vorhin benutzten Bezeichnungen: -

$$1 - \prod_{n+1}^{n+r} (1 - \alpha_r) < (\alpha_{n+1} + \cdots + \alpha_{n+r}) + \Sigma_2 + \Sigma_3 + \cdots + \Sigma_r < \frac{q}{1-q},$$

und wenn q so gewählt wird wie unter 1), so wird

$$1 - \prod_{n+1}^{n+r} (1 - \alpha_r) < \varepsilon,$$

womit die Konvergenzbedingung (33) erfüllt ist.

Die Unabhängigkeit des $\prod_0^\infty (1 - \alpha_r)$ von der Anordnung der Faktoren ergibt sich durch einen ähnlichen Schluß wie vorhin.

3) Sind die α_r verschieden bezeichnet und positive wie negative in unbegrenzter Anzahl vorhanden, so ist das Produkt

$\prod_0^\infty (1 + \alpha_r)$ konvergent und seinem Grenzwerte nach unabhängig

von der Reihenfolge der Faktoren, wenn die Reihe $\sum_0^\infty \alpha_r$ absolut

konvergent ist, d. h. wenn $\sum_0^\infty |\alpha_r|$ konvergiert.

Das Partialprodukt p_n von $\prod_0^\infty (1 + \alpha_n)$ enthalte n' Faktoren mit positiven α_n , — ihr Produkt heie Π_n' , — und n'' Faktoren mit negativen α_n , — ihr Produkt heie Π_n'' ; dann ist $n' + n'' = n$ und

$$p_n = \Pi_n' \Pi_n'';$$

mit n wachsen zugleich n' , n'' ber jede natrliche Zahl hinaus.

Ist nun, wie vorausgesetzt wurde, $\sum_0^\infty \alpha_n$ absolut konvergent, so konvergiert (74) die Reihe aus den positiven α_n , und mit ihr dem Falle 1) zufolge auch das Produkt Π_n' nach einem von der Ordnung der Faktoren unabhngigen Grenzwerte Π' ; es konvergiert aber auch die Reihe aus den negativen α_n , und mit ihr dem Falle 2) zufolge das Produkt Π_n'' nach einem von der Ordnung der Faktoren unabhngigen Grenzwerte Π'' . Demzufolge hat auch das Produkt $\prod_0^\infty (1 + \alpha_n)$ bei jeder Anordnung seiner Faktoren einen und denselben Grenzwert

$$p = \Pi' \Pi''.$$

Den absolut konvergenten Produkten stehen bedingt konvergente gegenber; es sind dies solche, deren zugehrige aus positiven und negativen Gliedern in unbegrenzter Anzahl zusammengesetzte Reihe $\sum_0^\infty \alpha_n$ bedingt konvergent ist (74). Hier kann nur von einem Grenzwerte *bei bestimmter Anordnung der Faktoren* die Rede sein; doch soll hierauf nicht weiter eingegangen werden.

79. Beispiele. 1) Das Produkt

$$(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^4)(1 + x^8) \dots$$

ist nur dann konvergent, wenn es die Reihe $x + x^2 + x^4 + x^8 + \dots$ ist, d. h. fr $x^2 < 1^*$). Dies zeigt auch das Partialprodukt

$$\begin{aligned} p_n &= (1 + x)(1 + x^2) \dots (1 + x^{2^n}) \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2^{n+1}-1} = \frac{1 - x^{2^{n+1}}}{1 - x} \end{aligned}$$

*) Diese Bedingung ist notwendig, damit die Glieder schlielich gegen Null konvergieren. Sie ist aber auch hinreichend, weil dann $x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$ eine konvergente Majorante ist.

an; denn für $\lim n = +\infty$ konvergiert dasselbe nur dann gegen eine bestimmte Grenze, wenn $|x| < 1$, und zwar gegen die Grenze

$$p = \frac{1}{1-x}.$$

2) Die Produkte

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{k}{1}\right) \left(1 + \frac{k}{2}\right) \left(1 + \frac{k}{3}\right) \cdots \\ & \left(1 - \frac{k}{1}\right) \left(1 - \frac{k}{2}\right) \left(1 - \frac{k}{3}\right) \cdots \end{aligned} \quad (k > 0)$$

sind divergent — wegen der Divergenz der Reihe $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdots$, — und zwar divergiert das erste gegen $+\infty$, das zweite gegen Null.

3) Das Produkt

$$\left(1 + \frac{k}{1}\right) \left(1 - \frac{k}{2}\right) \left(1 + \frac{k}{3}\right) \left(1 - \frac{k}{4}\right) \cdots$$

ist konvergent; es hat bei dieser Anordnung der Faktoren einen bestimmten Grenzwert, einen anderen aber, wenn man die Reihenfolge der Faktoren abändert.

4) Das Produkt

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots,$$

auf die normale Form gebracht, lautet:

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdots;$$

und nun erkennt man seine Konvergenz, weil die Reihe

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \cdots$$

konvergent ist (76); aber auch hier ist die Konvergenz eine bedingte, weil die Reihe $\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \cdots$ oder $\frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{2}{5} + \cdots$ divergent ist*).

*) Da $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \cdots$ divergent ist (78, 1) und 71, 1), so ist es auch

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots$$

(78, 1)), umsomehr also

$$\frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{2}{5} + \cdots$$

5) Um das Produkt

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{a+1}{b+1} \cdot \frac{a+2}{b+2} \cdots,$$

in welchem a, b positive Zahlen bedeuten, zu beurteilen, bringe man es auf die Form

$$\left(1 + \frac{a-b}{b}\right) \left(1 + \frac{a-b}{b+1}\right) \left(1 + \frac{a-b}{b+2}\right) \cdots;$$

nun erkennt man sogleich seine Divergenz aus der Divergenz der Reihe

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{b+2} + \cdots$$

(73, 3)); und zwar ist der Grenzwert des Produktes $+\infty$ für $a > b$ und 0 für $a < b$.

80. Reihen mit komplexen Gliedern. Die Untersuchung *unendlicher Reihen mit komplexen Gliedern* führt auf Reihen mit reellen Gliedern zurück. Man definiert eine Reihe

$$(35) \quad a_0 + a_1 + a_2 + \cdots,$$

deren Glieder komplexe Zahlen sind, als konvergent, wenn es eine komplexe Zahl s gibt derart, daß die Partialsumme s_n aus den ersten $n+1$ Gliedern von (35) sich ihr bei unbegrenzt wachsendem n als Grenze nähert, so daß $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s$; die Zahl

s bezeichnet man als Grenzwert der Reihe (35). Es läßt sich nun der folgende Satz erweisen:

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz der Reihe $\sum_0^\infty a_i$ besteht in der Konvergenz der Reihe aus den reellen Bestandteilen und der Reihe der Koeffizienten von i in den aufeinanderfolgenden Gliedern a_0, a_1, a_2, \dots

Ist nämlich $a_i = \alpha_i + \beta_i i$, $s = \sigma + \tau i$, sind ferner σ_n, τ_n die Partialsummen aus den $n+1$ ersten Gliedern der reellen Reihen

$$(36) \quad \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots,$$

$$(36^*) \quad \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \cdots,$$

so ist

$$s_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = \sigma_n + \tau_n i;$$

soll nun s der Grenzwert von s_n für $\lim n = +\infty$ sein, so

muß sich zu einem positiven beliebig kleinen ε eine natürliche Zahl m derart bestimmen lassen, daß

$$(37) \quad |s_n - s| = |(\sigma_n - \sigma) + (\tau_n - \tau)i| < \varepsilon$$

ist für jedes $n \geq m$, wobei der absolute Wert einer komplexen Größe im Sinne von 6, d. i. als *Modul* derselben zu verstehen ist; denn eine veränderliche komplexe Zahl kann nicht anders der Grenze Null sich nähern, als daß dies der reelle Teil und der Koeffizient der imaginären Einheit, jeder für sich, tut; dann aber nähert sich auch der Modul der Grenze Null, da er die positive Quadratwurzel aus der Quadratsumme der beiden genannten Zahlen ist. Statt also zu verlangen, die komplexe Zahl $s_n - s$ selbst konvergiere gegen die Grenze Null, kann man diese Forderung in bezug auf ihren absoluten Wert oder Modul stellen; dies ist aber der wesentliche Inhalt der Relation (37).

Da nun

$$|(\sigma_n - \sigma) + (\tau_n - \tau)i| = \sqrt{(\sigma_n - \sigma)^2 + (\tau_n - \tau)^2}$$

und

$$\begin{aligned} |\sigma_n - \sigma| &\leq \sqrt{(\sigma_n - \sigma)^2 + (\tau_n - \tau)^2} \\ |\tau_n - \tau| &\leq \sqrt{(\sigma_n - \sigma)^2 + (\tau_n - \tau)^2} \end{aligned}$$

so finden mit (37) gleichzeitig die Beziehungen

$$(38) \quad |\sigma_n - \sigma| < \varepsilon, \quad |\tau_n - \tau| < \varepsilon$$

statt für jedes $n \geq m$; hiermit aber ist gesagt, daß die Reihen (36) und (36*) konvergent sind und die Grenzwerte σ , bzw. τ besitzen (70).

Es reichen aber auch umgekehrt die Beziehungen (38) zur Konvergenz von (35) hin; denn aus ihnen folgt:

$$|\sqrt{(\sigma_n - \sigma)^2 + (\tau_n - \tau)^2}| < \varepsilon \sqrt{2},$$

d. i.

$$|(\sigma_n - \sigma) + (\tau_n - \tau)i| = |s_n - s| < \varepsilon \sqrt{2}$$

für jedes $n \geq m$.

Aus der für eine konvergente Reihe hiermit gewonnenen Beziehung

$$\sum_0^{\infty} a_v = \sum_0^{\infty} \alpha_v + i \sum_0^{\infty} \beta_v$$

folgt unmittelbar, daß die linksstehende Reihe nur dann einen

von der Anordnung ihrer Glieder unabhängigen Grenzwert besitzt, wenn die Reihen

$$\sum_0^{\infty} \alpha_v, \quad \sum_0^{\infty} \beta_v$$

absolut konvergieren, d. h. wenn auch die Reihen

$$\sum_0^{\infty} |\alpha_v|, \quad \sum_0^{\infty} |\beta_v|$$

konvergent sind. Wenn aber dies stattfindet, so konvergiert (71, 2) auch die Reihe

$$\sum_0^{\infty} (|\alpha_v| + |\beta_v|),$$

und weil

$$|\alpha_v| = \sqrt{\alpha_v^2 + \beta_v^2} \leq |\alpha_v| + |\beta_v|,$$

so konvergiert (73, 1) auch die Reihe aus den absoluten Werten oder *Moduln* der einzelnen Glieder von $\sum_0^{\infty} \alpha_v$, d. i. die Reihe

$$\sum_0^{\infty} |\alpha_v|.$$

Da man, von dieser letzten Annahme ausgehend, auf Grund der Ungleichungen

$$\begin{aligned} |\alpha_v| &\leq \sqrt{\alpha_v^2 + \beta_v^2} = |\alpha_v| + |\beta_v| \\ |\beta_v| &\leq \sqrt{\alpha_v^2 + \beta_v^2} = |\alpha_v| + |\beta_v| \end{aligned}$$

wieder zur Konvergenz der Reihen $\sum_0^{\infty} |\alpha_v|$ und $\sum_0^{\infty} |\beta_v|$ geführt wird, so gilt der Satz:

Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die Reihe $\sum_0^{\infty} \alpha_v$ bei jeder Anordnung ihrer Glieder konvergiere und einen von der Anordnung unabhängigen Grenzwert besitze, besteht in der Konvergenz der Reihe $\sum_0^{\infty} |\alpha_v|$ aus den absoluten Werten oder Moduln der Glieder, oder, wie man dies ausdrückt, in der absoluten Konvergenz der Reihe.

Im Wesen kommt also, wie dies schon eingangs angedeutet worden, die Untersuchung von Reihen mit komplexen Gliedern auf die Untersuchung einer oder zweier Reihen mit reellen Gliedern zurück.

§ 2. Reihen mit variablen Gliedern.

81. Gleichmäßige Konvergenz einer Reihe mit variablen Gliedern. Die bisher betrachteten unendlichen Rechenprozesse mit *konstanten* Elementen (Gliedern, Faktoren) definieren, sofern sie konvergent sind, einzelne Zahlen, rationale oder *irrationale*; insbesondere in dem letzteren Falle stellen sie eine bedeutsame Fortbildung der *Arithmetik* dar, insofern sie gestatten, Rechnungsergebnisse, die nur durch einen unendlichen Algorithmus darstellbar sind, mit jeder erwünschten Genauigkeit durch rationale Zahlen zu ersetzen, in welcher Form allein solche Ergebnisse praktische Verwendung finden können.

Mit dem Übergang zu solchen Rechenprozessen, deren Elemente von einer *Variablen* abhängen, tritt eine wesentliche Änderung der Auffassung ein. Eine unendliche Reihe, deren Glieder eine Variable x enthalten, stellt eine Mannigfaltigkeit von so vielen Reihen der bisher behandelten Art dar, als dem x Werte erteilt werden können, und so weit diese Reihen konvergent sind, führen sie auf eine Mannigfaltigkeit von Zahlen, die jenen Werten von x zugeordnet sind; wie um eine Fortbildung der *Arithmetik* vorhin, handelt es sich jetzt um eine Fortbildung der *Funktionentheorie* über jenes Gebiet hinaus, das durch eine endliche Anzahl arithmetischer Prozesse mit der Variablen beherrscht wird, also in das Gebiet der *transzendenten* Funktionen.

Für einen Bereich der stetigen Variablen x sei eine unbegrenzt fortsetzbare Folge von eindeutigen reellen Funktionen

$$(1) \quad u_0 = f_0(x), \quad u_1 = f_1(x), \quad u_2 = f_2(x), \dots$$

definiert; die aus diesen Funktionen gebildete unendliche Reihe

$$(2) \quad u_0 + u_1 + u_2 + \dots$$

sei nicht bloß für einen einzelnen Wert von x , sondern für alle Werte eines Kontinuums (α, β) , das jenem Bereiche an-

gehört, konvergent; dann konstituieren die zu diesen Werten des x gehörigen Grenzwerte der Reihe (2) eine Funktion von x , von der man sagt, sie sei durch die unendliche Reihe (2) definiert. Bezeichnet man diese Funktion mit $f(x)$, so gilt für alle Werte x aus dem Intervall (α, β) der Ansatz:

$$(3) \quad f(x) = \sum_0^{\infty} u_n = \sum_0^{\infty} f_n(x).$$

Hiermit ist dem Begriffe nach folgendes ausgesagt: Ist x ein Wert aus (α, β) , so läßt sich zu einem beliebig klein festgesetzten positiven ε eine natürliche Zahl m bestimmen derart, daß

$$(4) \quad |u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots u_{n+p}| < \varepsilon$$

für alle $n \geq m$ und jeden Wert von p aus der natürlichen Zahlenreihe, daß also auch insbesondere der zu der Partialsumme

$$(5) \quad s_n(x) = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

gehörige Rest

$$(6) \quad r_n(x) = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$$

für $n \geq m$ seinem Betrage nach kleiner ist als ε . Die Partialsumme $s_n(x)$ stellt dann für den betrachteten Wert x die Funktion $f(x)$ mit einem Fehler dar, dessen absoluter Wert unter ε liegt. Man kann den Inhalt der Gleichung (3) auch in der Form

$$(7) \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n(x)$$

darstellen; gleichzeitig findet die Beziehung

$$(8) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n(x) = 0$$

statt.

Die natürliche Zahl m , welche zu einem gegebenen x gehört derart, daß

$$|r_n(x)| < \varepsilon$$

für jedes $n \geq m$, wird — das liegt in der Natur der Sache — für verschiedene Werte von x auch verschiedene Werte aufweisen; das heißt mit anderen Worten so viel, daß man, um einen festgesetzten Grad der Annäherung an den Grenzwert $f(x)$ zu erreichen, in der Folge der Partialsummen bei verschiedenen Werten von x verschieden weit vorschreiten muß.

Gibt es aber unter den m , welche zu verschiedenen Werten des x aus dem Intervalle (α, β) gehören, ein größtes, M , so wird dieses für alle Werte von x die Bedingung erfüllen, daß

$$|r_n(x)| < \varepsilon$$

für jedes $n \geq M$. In diesem Falle bezeichnet man die unendliche Reihe (2) als *gleichmäßig konvergent* in dem Intervalle (α, β) .

Wenn dagegen kein größtes m bezeichnet werden kann, wenn also zu einer beliebig großen natürlichen Zahl x ein x aus (α, β) angegeben werden kann, für welches das zur Relation $|r_n(x)| < \varepsilon$ gehörige m größer ist als x , dann heißt die Reihe in dem Intervalle (α, β) *ungleichmäßig konvergent*.

Hiernach hat man folgende Definition: *Die Reihe (2) heißt in dem Intervalle (α, β) gleichmäßig konvergent, wenn zu einem beliebig kleinen positiven ε eine natürliche Zahl m sich so bestimmen läßt, daß für jeden Wert von x aus dem genannten Intervalle*

$$|r_n(x)| < \varepsilon,$$

sobald $n \geq m$ ist.

Die Reihe (2) kann für einen Wert x aus (α, β) entweder absolut oder bedingt konvergent sein; ersteres findet statt, wenn alle ihre Glieder gleich bezeichnet sind, oder, falls sie ungleich bezeichnet sind, wenn auch

$$|u_0| + |u_1| + |u_2| + \dots$$

konvergent ist; nur in diesem Falle hat $f(x)$ die Eigenschaften einer Summe von (2). Bei bedingter Konvergenz ist der Wert von $f(x)$ mit der Anordnung der Glieder untrennbar verbunden.

Ist die Reihe (2) für jeden Wert von x aus (α, β) absolut konvergent, so nennt man sie *absolut konvergent in dem Intervalle (α, β)* .

Was die *Stetigkeit* des Grenzwertes $f(x)$ in dem Intervalle (α, β) anlangt, so möge vorerst nur folgendes bemerkt werden. Nach einer am Schlusse von 18 gemachten Bemerkung ist eine endliche Summe von stetigen Funktionen selbst wieder eine stetige Funktion. Wie die Beispiele der nächsten Nummer zeigen werden, gilt dies für den Grenzwert einer unendlichen Reihe aus stetigen Funktionen nicht immer; zugleich

wird die Wahrnehmung gemacht werden, daß das Unstetigwerden des Grenzwertes und ungleichmäßige Konvergenz der Reihe nebeneinander hergehende Erscheinungen sind.

82. Beispiele. 1) Die Reihe

$$\frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2x}{2^2} + \frac{\sin 3x}{3^2} + \dots$$

ist für alle Werte von x absolut und gleichmäßig konvergent. Denn es ist die Reihe

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

konvergent (73, 1)), infolgedessen auch die Reihe

$$\left| \frac{\sin x}{1^2} \right| + \left| \frac{\sin 2x}{2^2} \right| + \left| \frac{\sin 3x}{3^2} \right| + \dots,$$

weil ihre Glieder im allgemeinen kleiner, in keinem Falle größer sind als die korrespondierenden Glieder der vorangehenden (73, 1)). Dadurch ist die absolute Konvergenz erwiesen.

Aus der Konvergenz der Vergleichsreihe folgt, daß sich eine natürliche Zahl m bestimmen läßt derart, daß

$$\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \frac{1}{(n+3)^2} + \dots < \varepsilon$$

für jedes $n \geq m$; da nun für jedes x

$$\left| \frac{\sin(n+1)x}{(n+1)^2} + \frac{\sin(n+2)x}{(n+2)^2} + \dots \right| < \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots,$$

so ist auch für jedes x

$$\left| \frac{\sin(n+1)x}{(n+1)^2} + \frac{\sin(n+2)x}{(n+2)^2} + \dots \right| < \varepsilon,$$

sobald $n \geq m$; damit ist die gleichmäßige Konvergenz dargetan.

2) Aus den Funktionen

$$v_0 = 1, \quad v_1 = x, \quad v_2 = x^2, \dots$$

bilde man nach Vorschrift von 69, 2) die Reihe:

$$(v_0 - v_1) + (v_1 - v_2) + (v_2 - v_3) + \dots,$$

d. i.

$$(1 - x) + (1 - x)x + (1 - x)x^2 + \dots,$$

welche nach den dortigen Ausführungen konvergent ist, wenn

$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ eine bestimmte Zahl v entspricht, und zwar ist dann $v_0 - v$ ihr Grenzwert. Nun aber hat $v_n = x^n$ nur dann einen bestimmten Grenzwert, wenn $|x| < 1$ oder wenn $x = 1$, und

zwar ist im ersten Falle dieser Grenzwert $v = 0$, im zweiten Falle $v = 1$; sonach hat die vorliegende Reihe für alle Werte x aus dem Intervalle $(-1, +1)$, mit Ausschluß der unteren Grenze -1 , einen bestimmten Grenzwert, nämlich für alle Werte *zwischen* -1 und $+1$ den Grenzwert 1 , für $x = +1$ selbst den Grenzwert 0 ; die Reihe definiert also eine im allgemeinen stetige (weil konstante) Funktion, welche jedoch an der Stelle $x = +1$ unstetig wird.

Um die Art der Konvergenz näher zu prüfen, bilden wir den Rest

$$r_n(x) = (v_{n+1} - v_{n+2}) + (v_{n+2} - v_{n+3}) + \dots;$$

dieser hat für $|x| < 1$ den Grenzwert $v_{n+1} = x^{n+1}$, so daß

$$r_n(x) = x^{n+1};$$

verlangt man nun zu einem gegebenen $1 > \varepsilon > 0$ die zugehörige Zahl m , so ist die Relation

$$|x^{n+1}| < \varepsilon$$

nach n zu lösen und dies gibt, wenn man beachtet, daß im natürlichen Logarithmensystem (wie in jedem System, dessen Basis größer ist als 1) zu dem kleineren von zwei echten Brüchen der dem Betrage nach größere Logarithmus gehört,

$$n > \left| \frac{\log \varepsilon}{\log |x|} \right| - 1,$$

so daß m die nächste über dem Wert der rechten Seite liegende ganze Zahl ist.

Indem sich nun $|x|$ der Grenze 1 nähert, wächst die Zahl m über jeden Betrag hinaus; in der Nähe der Stellen -1 und $+1$ hört die Reihe auf gleichmäßig konvergent zu sein, sie ist es aber in jedem Intervalle, dessen Grenzen dem absoluten Werte nach kleiner sind als 1 .

3) Aus der unbegrenzten Folge von Funktionen

$$v_0 = \frac{1}{1}, \quad v_1 = \frac{1}{x+1}, \quad v_2 = \frac{1}{2x+1}, \dots$$

entsteht nach der in 2) befolgten Vorschrift die Reihe

$$\frac{x}{1(x+1)} + \frac{x}{(x+1)(2x+1)} + \frac{x}{(2x+1)(3x+1)} + \dots;$$

für $x > 0$ sind alle v endlich und stetig, ebenso alle Glieder der Reihe, und weil unter dieser Voraussetzung

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{nx + 1} = 0$$

ist, so hat die Reihe den von x unabhängigen Grenzwert $v_0 = 1$. Für $x = 0$ ist $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$, der Grenzwert der Reihe also 0. Die Reihe definiert demnach in dem Intervalle $(0, +\infty)$ eine im allgemeinen stetige (weil konstante) Funktion, die jedoch an der Stelle $x = 0$ unstetig wird*).

Um die Art der Konvergenz kennen zu lernen, bilde man den Rest

$$r_n(x) = (v_{n+1} - v_{n+2}) + (v_{n+2} - v_{n+3}) + \dots,$$

dieser hat für $x > 0$ den Grenzwert $v_{n+1} = \frac{1}{(n+1)x + 1}$; aus der Relation

$$\frac{1}{(n+1)x + 1} < \varepsilon$$

folgt $n > \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon x} - 1$. Die zu ε gehörige Zahl n wächst also, indem x sich der Grenze 0 nähert, über jeden Betrag hinaus; in der Nähe dieser Stelle hört die Reihe auf gleichmäßig zu konvergieren, ist es aber in jedem Intervalle $(\theta, +\infty)$, dessen untere Grenze $\theta > 0$ ist.

83. Stetigkeit des Grenzwertes einer gleichmäßig konvergenten Reihe. Aus der Stetigkeit der Glieder einer konvergenten Reihe von Funktionen der Variablen x kann also auf die Stetigkeit der durch die Reihe definierten Funktion im allgemeinen nicht geschlossen werden; wenn jedoch die Konvergenz als eine gleichmäßige erwiesen ist, dann tritt der folgende Satz in Kraft:

Wenn eine unendliche Reihe, deren Glieder stetige Funktionen von x sind, in dem Intervalle (α, β) gleichmäßig konver-

*) In dem Intervalle $(-\infty, 0)$ müßten die Werte

$$x = -\frac{1}{1}, \quad -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{4}, \dots$$

die gegen Null hin immer dichter zusammenrücken, ausgeschlossen werden, weil für jeden solchen Wert eine der Funktionen v und daher zwei Glieder der Reihe nicht definiert sind.

gent ist, so ist ihr Grenzwert eine in diesem Intervalle stetige Funktion von x .

Zwischen dem Grenzwerte $f(x)$, der Partialsumme $s_n(x)$ und dem zugeordneten Reste $r_n(x)$ besteht die Beziehung:

$$f(x) = s_n(x) + r_n(x);$$

der Behauptung des Satzes zufolge muß sich zu einem beliebig festgesetzten positiven ε ein positives δ so bestimmen lassen, daß (17, 2)

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

für jedes Wertepaar x, x' aus (α, β) , für welches $|x - x'| < \delta$.

In der Tat, vermöge der gleichmäßigen Konvergenz kann n so groß gewählt werden, daß für jedes x aus (α, β)

$$|r_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

also auch

$$|r_n(x')| < \frac{\varepsilon}{3};$$

da ferner $s_n(x)$ als endliche Summe stetiger Funktionen selbst stetig ist, so läßt sich ein positives δ so festsetzen, daß

$$|s_n(x) - s_n(x')| < \frac{\varepsilon}{3},$$

wenn nur $|x - x'| < \delta$. Hieraus folgt, was zu beweisen war, nämlich:

$$\begin{aligned} & |f(x) - f(x')| \\ = & |s_n(x) - s_n(x') + r_n(x) - r_n(x')| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

84. Potenzreihen. Unter den Reihen mit variablen Gliedern sind am wichtigsten die *Potenzreihen*. Man versteht unter einer Potenzreihe eine Reihe, deren jedes Glied das Produkt aus einer Konstanten — dem Koeffizienten — und aus einer ganzen positiven Potenz der Variablen x ist; ihre allgemeine Form lautet demnach:

$$(9) \quad \mathfrak{P}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots;$$

unter a_0, a_1, a_2, \dots sollen, wenn nichts anderes bemerkt wird, reelle Zahlen verstanden werden.

Aus den allgemeinen Sätzen über die Konvergenz unendlicher Reihen kann zunächst der folgende Satz abgeleitet werden.

Konvergiert der Quotient $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ mit beständig wachsendem n gegen eine bestimmte Grenze λ (welche auch 0 oder $+\infty$ sein kann), so ist die Reihe (9) absolut konvergent für alle Werte von x , für welche $|x| < \lambda$; über ihr Verhalten bei $x = -\lambda$ und $x = \lambda$ selbst läßt sich zunächst keine bestimmte Aussage machen.

Man nennt $(-\lambda, \lambda)$ das *Konvergenzintervall*, λ wohl auch den *Konvergenzradius**).

Bezeichnet man nämlich die aus den absoluten Werten der Glieder von (9) gebildete Reihe

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_2 x^2| + \dots$$

allgemein mit $u_0 + u_1 + u_2 + \dots$, so ist

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x|.$$

Hat nun $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ für $\lim n = +\infty$ den Grenzwert λ , so besitzt $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ den Grenzwert $\frac{1}{\lambda}$ und es ist

$$\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|x|}{\lambda};$$

somit ist die Reihe (9) absolut konvergent, wenn $|x| < \lambda$ (73, 2); 74); für $|x| = \lambda$ ist aber kein allgemeines Urteil möglich, weil dann $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ ist.

*) Diese Bezeichnung weist auf eine allgemeinere Auffassung der Potenzreihen hin, bei der x nicht wie hier als reelle, sondern als *komplexe Variable*, $x = \xi + i\eta$ (worin ξ, η reelle Variable bedeuten) und die Koeffizienten auch als komplexe Zahlen vorausgesetzt werden. Bei geometrischer Darstellung von x in der Zahlenebene (6) ist dann der Bereich derjenigen Werte von x , für welche $\Re(x)$ konvergiert, durch einen Kreis vom Radius λ , beschrieben um den Ursprung $\xi = 0, \eta = 0$, begrenzt, den man den *Konvergenzkreis* von $\Re(x)$ nennt. Bezüglich der Theorie der Potenzreihen in dieser umfassenderen Auffassung ist zu verweisen auf den Artikel „Algebraische Analysis“ von A. Pringsheim-G. Faber in Bd. II 3 der Enzykl. der mathem. Wissensch., Leipzig 1909, p. 1—46, woselbst auch ausführliche Literaturangaben.

Hat $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ den Grenzwert $+\infty$, so besitzt $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ den Grenzwert 0, und welches auch der Wert von $|x|$ sein mag, es ist immer $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$, die Reihe (9) daher absolut konvergent für jeden endlichen Wert von x ; man nennt sie dann *beständig konvergent*.

Konvergiert $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ gegen die Grenze Null, so hat $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ den Grenzwert $+\infty$ und denselben Grenzwert besitzt $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ für jedes $|x| > 0$; die Reihe ist für keinen Wert von x konvergent außer für $x = 0$ (im uneigentlichen Sinne), weil sie sich dann auf ihr Anfangsglied a_0 reduziert; man nennt sie in diesem Falle *beständig divergent*.

Man hat daher niemals konvergente, beständig konvergente und in einem endlichen Intervalle konvergente Potenzreihen zu unterscheiden. Ein Beispiel der ersten Art bietet die Reihe

$$1 + 1 \cdot x + 1 \cdot 2x^2 + 1 \cdot 2 \cdot 3x^3 + \dots,$$

weil $\lim \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim \frac{1}{n+1} = 0$; ein Beispiel der zweiten Art die Reihe

$$1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots,$$

weil $\lim \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim (n+1) = +\infty$; ein Beispiel der dritten Art die Reihe

$$\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots,$$

weil $\lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{n+1}{n} = 1$, so daß $(-1, +1)$ das Konvergenzintervall ist; an den Grenzen dieses Intervalls zeigt die Reihe ein verschiedenes Verhalten: sie ist für $x = +1$ bedingt konvergent (77, 1), für $x = -1$ divergent (73, 1).

85. Erster Abelscher Satz über Potenzreihen. In die Natur der Konvergenz der Potenzreihen führen die von Abel hierüber angestellten Untersuchungen ein, deren Ergebnis in zwei Sätzen zusammengefaßt werden kann. Der erste dieser Sätze lautet:

Wenn die absoluten Werte der Glieder einer Potenzreihe (9) für einen Wert $x = X$ der Variablen insgesamt unter einer Grenze κ bleiben, so ist die Reihe absolut konvergent für jeden Wert von x , für welchen $|x| < |X|$.

Nach Voraussetzung ist für jede natürliche Zahl n

$$|a_n X^n| < \kappa,$$

folglich

$$|a_n x^n| = |a_n X^n| \left(\frac{x}{X}\right)^n < \kappa \left|\frac{x}{X}\right|^n,$$

d. h. die Glieder der Reihe

$$(10) \quad |a_0| + |a_1 x| + |a_2 x^2| + \dots;$$

sind kleiner als die korrespondierenden Glieder der geometrischen Reihe

$$\kappa + \kappa \left|\frac{x}{X}\right| + \kappa \left|\frac{x}{X}\right|^2 + \dots;$$

diese ist konvergent, wenn $\left|\frac{x}{X}\right| < 1$, also wenn $|x| < |X|$; dann ist auch die Reihe (10) konvergent (73, 1)) und somit die Reihe (9) absolut konvergent (75).

Aus dieser Vergleichung kann überdies bei bekanntem κ eine obere Grenze für den Fehler abgeleitet werden, welcher begangen wird, wenn man sich bei der Reihe (9) auf die Summe der ersten $n+1$ Glieder beschränkt; es ist nämlich

$$\begin{aligned} r_n(x) &= |a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \dots| < |a_{n+1}x^{n+1}| + |a_{n+2}x^{n+2}| + \dots \\ &< \kappa \left|\frac{x}{X}\right|^{n+1} + \kappa \left|\frac{x}{X}\right|^{n+2} + \dots = \frac{\kappa \left|\frac{x}{X}\right|^{n+1}}{1 - \left|\frac{x}{X}\right|}, \end{aligned}$$

der absolute Betrag dieses Fehlers also kleiner als die zuletzt angeschriebene Größe.

Aus diesem Satze können die nachstehenden Folgerungen gezogen werden.

1) Ist die Reihe (9) für $x = X$ konvergent, so ist sie auch für jeden Wert von x , dessen absoluter Betrag kleiner ist als $|X|$, konvergent.

Denn da sie für $x = X$ konvergiert, so sind für diesen Wert alle ihre Glieder endlich, liegen also insgesamt unter einer Grenze κ .

2) Ist die Reihe (9) für $x = X$ divergent, so ist sie es auch für jeden Wert von x , der dem Betrage nach größer ist als $|X|$.

Wäre sie nämlich für einen solchen Wert — gegen die Behauptung — konvergent, so müßte sie für den Wert X zufolge 1) auch konvergent sein — gegen die Voraussetzung.

3) Gilt bezüglich X die in dem obigen Satze getroffene Voraussetzung, so ist die Reihe (9) in jedem Intervall (α, β) , dessen Grenzen dem Betrage nach kleiner sind als $|X|$, *gleichmäßig konvergent* und definiert daher in einem solchen Intervalle eine *stetige Funktion* $f(x)^*)$ von x (83).

Man kann nämlich einen Wert x' annehmen, dessen Betrag $|x'|$ größer ist als $|\alpha|$ und $|\beta|$ (also auch größer als die Beträge aller Werte aus (α, β)) und doch kleiner ist als $|X|$; dem Satze zufolge ist die Reihe für diesen Wert absolut konvergent, daher kann die natürliche Zahl m so bestimmt werden, daß

$$|a_{n+1}x'^{n+1}| + |a_{n+2}x'^{n+2}| + \dots < \varepsilon$$

für jedes $n \geq m$, wobei ε eine beliebig klein festgesetzte positive Zahl bedeutet. Ist nun x ein Wert aus dem Intervall (α, β) [mit Einschluß der Grenzen], so ist wegen $|x| < |x'|$ um so mehr

$$|a_{n+1}x^{n+1}| + |a_{n+2}x^{n+2}| + \dots < \varepsilon;$$

und da endlich

$$r_n(x) = |a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \dots| \leq |a_{n+1}x^{n+1}| + |a_{n+2}x^{n+2}| + \dots$$

so ist auch, und zwar für jeden Wert aus (α, β) [mit Einschluß der Grenzen]

$$|r_n(x)| < \varepsilon;$$

dadurch ist aber die gleichmäßige Konvergenz erwiesen (81).

Aus der Stetigkeit der durch die Reihe definierten Funktion ergibt sich der folgende Schluß: Ist x_0 ein Wert von x , dessen Betrag kleiner ist als $|X|$, und konvergiert x gegen

*) Zum Unterschiede von dem rein formalen Zeichen $\mathfrak{P}(x)$ für die Potenzreihe ohne Rücksicht auf deren Konvergenz oder Divergenz. Man kann aber auch übereinkommen, unter $\mathfrak{P}(x)$ die durch die Reihe, soweit sie konvergent ist, definierte Funktion zu verstehen.

die Grenze x_0 , so konvergiert $f(x)$ gegen die Grenze $f(x_0)$, d. h. es ist

$$f(x_0) = \lim_{x=x_0} f(x) = a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots$$

Insbesondere folgt daraus

$$f(0) = a_0,$$

so daß eine durch eine Potenzreihe definierte Funktion für $x = 0$ nur dann verschwindet, wenn die Reihe kein von x freies Glied enthält. Wenn allgemein

$$f(x) = a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \dots$$

und wenn die Reihe konvergiert für alle Werte von x , die absolut genommen kleiner sind als $|X|$, so konvergiert für dieselben Werte auch die Reihe

$$a_n + a_{n+1} x + a_{n+2} x^2 + \dots = \varphi(x)$$

und es ist

$$f(x) = x^n \varphi(x),$$

und da $\varphi(x)$ für $x = 0$ nicht verschwindet, so hat die Gleichung

$$f(x) = 0$$

$x = 0$ zur n -fachen Wurzel.

86. Zweiter Abelscher Satz über Potenzreihen
Durch die letzte Folgerung ist die gleichmäßige Konvergenz einer Potenzreihe und die Stetigkeit der durch sie definierten Funktion für jedes Intervall erwiesen, das *innerhalb* des Konvergenzintervalls liegt. An den Grenzen dieses Intervalls selbst kann die Reihe verschiedenes Verhalten zeigen; sie kann unbedingt oder bedingt konvergent, sie kann aber auch divergent sein (s. letztes Beispiel in 84). Für die Einbeziehung der Grenzen des Konvergenzintervalles ist nun der folgende Abelsche Satz von Wichtigkeit:

Ist die Potenzreihe (9) für $x = \beta$ konvergent, so ist sie in jedem Intervalle (α, β) , dessen untere Grenze dem absoluten Werte nach kleiner ist als $|\beta|$, mit Einschluß der Grenzen gleichmäßig konvergent und stellt somit eine in dem Intervall (α, β) stetige Funktion von x dar.

Es genügt, den Beweis bloß für das Intervall $(0, \beta)$ bzw. $(\beta, 0)$ zu führen, je nachdem $\beta > 0$ oder $\beta < 0$; denn für

$(\alpha, 0)$, bzw. $(0, \alpha)$, wo $|\alpha| < |\beta|$, besteht die gleichmäßige Konvergenz schon auf Grund von 85, 3), 1).

Setzt man

$$(11) \quad r_n(\beta) = a_{n+1}\beta^{n+1} + a_{n+2}\beta^{n+2} + \dots,$$

so läßt sich der Voraussetzung und dem Begriff der Konvergenz gemäß (70) zu einem beliebig klein festgesetzten positiven ε eine natürliche Zahl m so feststellen, daß alle Partialsummen von (11), — sie mögen mit

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots$$

bezeichnet werden —, dem Betrage nach kleiner sind als ε , sobald nur $n \geq m$. Nun ist

$$\begin{aligned} & a_{n+1}\beta^{n+1} + a_{n+2}\beta^{n+2} + \dots + a_{n+p}\beta^{n+p} \\ &= \sigma_1 + (\sigma_2 - \sigma_1) + \dots + (\sigma_p - \sigma_{p-1}); \end{aligned}$$

multipliziert man die aufeinanderfolgenden Glieder dieser p Glieder umfassenden Summe mit den positiven, dem Betrage nach abnehmenden Zahlen

$$(12) \quad \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p,$$

so entsteht die Gleichung:

$$\begin{aligned} & a_{n+1}\beta^{n+1}\theta_1 + a_{n+2}\beta^{n+2}\theta_2 + \dots + a_{n+p}\beta^{n+p}\theta_p \\ &= \sigma_1\theta_1 + (\sigma_2 - \sigma_1)\theta_2 + \dots + [\sigma_p - \sigma_{p-1}]\theta_p \\ &= \sigma_1(\theta_1 - \theta_2) + \sigma_2(\theta_2 - \theta_3) + \dots + \sigma_{p-1}(\theta_{p-1} - \theta_p) + \sigma_p\theta_p; \end{aligned}$$

aus der zweiten Form der rechten Seite, in welcher der Voraussetzung gemäß $\theta_1 - \theta_2, \theta_2 - \theta_3, \dots, \theta_{p-1} - \theta_p, \theta_p$ positive Zahlen sind, geht folgendes hervor. Da alle $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_p$ dem absoluten Betrage nach kleiner sind als ε , so wird diese rechte Seite dem Betrage nach vergrößert, wenn man statt der $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_p$ durchwegs ε setzt; daher ist

$$|a_{n+1}\beta^{n+1}\theta_1 + a_{n+2}\beta^{n+2}\theta_2 + \dots + a_{n+p}\beta^{n+p}\theta_p| < \varepsilon\theta_1;$$

sind nun überdies die Beträge der Zahlen θ unter der Einheit gelegen, so daß auch das größte $\theta_1 < 1$, so gilt umsomehr

$$(13) \quad |a_{n+1}\beta^{n+1}\theta_1 + a_{n+2}\beta^{n+2}\theta_2 + \dots + a_{n+p}\beta^{n+p}\theta_p| < \varepsilon.$$

Eine Zahlenreihe von den Eigenschaften der Reihe (12) ist

$$\left(\frac{x}{\beta}\right)^{n+1}, \quad \left(\frac{x}{\beta}\right)^{n+2}, \dots, \left(\frac{x}{\beta}\right)^{n+p},$$

wenn nur $|x| < |\beta|$ und x, β gleich bezeichnet sind; führt man sie in (13) ein, so entsteht

$$|a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \dots + a_{n+p}x^{n+p}| < \varepsilon.$$

Diese Relation, gültig für jedes p aus der Reihe 1, 2, 3 ... und für jedes x , das mit β gleichbezeichnet dem absoluten Betrage nach kleiner ist als $|\beta|$, nach der Voraussetzung aber auch gültig für $x = \beta$ selbst, beweist in der Tat die gleichmäßige Konvergenz der Reihe (9) in dem Intervall $(0, \beta)$ bzw. $(\beta, 0)$ mit Einschluß der Grenzen, und mit Berücksichtigung der an die Spitze des Beweises gestellten Bemerkung findet nun die gleichmäßige Konvergenz in dem ganzen Intervall (α, β) statt, wenn nur $|\alpha| < |\beta|$.

Aus diesem Satze ergibt sich folgende wichtige Folgerung: Ist $f(x)$ der Grenzwert der Reihe (9) auf ihrem Konvergenzgebiete (α, β) mit Einschluß der Grenzen, und nähert sich x der Grenze β durch Werte, welche dem absoluten Betrage nach kleiner sind als β , so nähert sich $f(x)$ vermöge seiner Stetigkeit der Grenze $f(\beta)$, so daß

$$f(\beta) = a_0 + a_1\beta + a_2\beta^2 + \dots$$

Dieser Schluß dürfte nicht gemacht werden, wenn die Reihe (9) für $x = \beta$ nicht konvergent wäre, selbst wenn $f(x)$ an der Stelle $x = \beta$ stetig wäre.

Zwei Beispiele mögen dies erläutern. Die Reihe

$$\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

ist konvergent in dem Intervalle $(-1, +1)$ und auch an der oberen Grenze desselben (84); daher ist, wenn $f(x)$ den Grenzwert dieser Reihe bezeichnet, soweit sie konvergiert, auch

$$f(1) = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

Die Reihe

$$1 + x + x^2 + \dots$$

hat, solange sie konvergiert, d. i. für $|x| < 1$, den Grenzwert $f(x) = \frac{1}{1-x}$; derselbe ist auch für $x = -1$ stetig und doch darf nicht

$$\frac{1}{2} = 1 - 1 + 1 - \dots$$

gesetzt werden, weil die definierende Reihe an der Grenze $x = -1$ nicht mehr konvergiert.

Die Reihe des ersten Beispiels ist zugleich ein Beleg dafür, daß man bei einer Potenzreihe, welche gerade und ungerade Potenzen von x enthält, aus der Konvergenz für $x = \beta$ nicht auch auf die Konvergenz für $x = -\beta$ schließen darf; bei einer Reihe, welche nur gerade oder nur ungerade Potenzen enthält, ist dieser Schluß immer zutreffend.

87. Abgeleitete Reihen. Für jeden Wert von x , für welchen die Potenzreihe (9):

$$\mathfrak{P}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

konvergent ist, ist auch die aus den Differentialquotienten der einzelnen Glieder gebildete Reihe

$$(14) \quad \mathfrak{P}'(x) = 1 a_1 + 2 a_2 x + 3 a_3 x^2 + \dots$$

konvergent.

Existiert nämlich für die Reihe (9) der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ und heißt er λ , so ist diese Reihe konvergent für alle Werte innerhalb des Intervalles $(-\lambda, +\lambda)$ (84). Bezeichnet man aber die Koeffizienten der Reihe (14) mit A_1, A_2, A_3, \dots , so ist $\left| \frac{A_n}{A_{n+1}} \right| = \frac{n}{n+1} \cdot \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, es hat demnach $\left| \frac{A_n}{A_{n+1}} \right|$ denselben Grenzwert wie $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ und die Reihe (14) ist demselben Satze zufolge absolut konvergent für die nämlichen Werte von x wie (9)

Hiernach ist also beispielsweise mit der Reihe

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

gleichzeitig die Reihe

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

absolut konvergent, solange $|x| < 1$.

Unabhängig von der Existenz des Grenzwertes für $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ kann die obige Behauptung auch so erwiesen werden. Angenommen, für den Wert $x = X$ seien die Glieder von (9) dem absoluten Betrage nach unter der positiven Zahl k gelegen, also

$$|a_n X^n| < k$$

für jedes n ; dann ist dem ersten Abelschen Satze gemäß (9) absolut konvergent für jedes x , wofür $|x| < X$. Nun aber gilt bezüglich des allgemeinen Gliedes von (14) der Ansatz:

$$\begin{aligned} |na_n x^{n-1}| &= \frac{n}{X} a_n X^n \left(\frac{x}{X}\right)^{n-1} \\ &= \frac{n}{X} \left|\frac{x}{X}\right|^{n-1} |a_n X^n| < \frac{k}{X} n \left|\frac{x}{X}\right|^{n-1}, \end{aligned}$$

infolgedessen, wenn man

$$\left|\frac{x}{X}\right| = q$$

setzt,

$$|1a_1| + |2a_2 x| + |3a_3 x^2| + \dots < \frac{k}{X} (1 + 2q + 3q^2 + \dots);$$

macht man von der vorhin gemachten Feststellung Gebrauch, wonach die rechts stehende Reihe konvergent ist bei $q < 1$, so folgt daraus, daß auch die Reihe

$$|1a_1| + |2a_2 x| + |3a_3 x^2| + \dots$$

konvergent und infolgedessen die Reihe (14) absolut konvergent ist für alle x , welche dem absoluten Betrage nach kleiner sind als $|X|$.

Auf Grund von 85, 3) ist die Konvergenz von (14) in jedem Intervalle, dessen Grenzen dem Betrage nach kleiner sind als $|X|$, eine gleichmäßige und ist der Grenzwert von (14) ebenso wie der von (9) eine stetige Funktion von x .

An den Grenzen des Konvergenzintervalls darf, selbst wenn für diese die Reihe (9) konvergent ist, auf die Konvergenz der Reihe (14) nicht geschlossen werden. So ist die Reihe

$$\frac{x}{1^2} + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^2} + \dots$$

auch an den Grenzen $-1, +1$ ihres Konvergenzintervalls und zwar absolut konvergent, die aus ihr nach Vorschrift von (14) gebildete Reihe

$$\frac{1}{1} + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots$$

ist an der unteren Grenze bedingt konvergent, an der oberen aber divergent.

Durch wiederholte Anwendung des an die Spitze dieses Artikels gestellten Satzes ergibt sich die folgende Tatsache:

Die aus einer Potenzreihe

$$(9) \quad \mathfrak{P}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

durch wiederholte gliedweise Differentiation abgeleiteten Potenzreihen:

$$(15) \quad \left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{P}'(x) = 1 a_1 + 2 a_2 x + 3 a_3 x^2 + \dots \\ \mathfrak{P}''(x) = 2 \cdot 1 a_2 + 3 \cdot 2 a_3 x + 4 \cdot 3 a_4 x^2 + \dots \\ \mathfrak{P}^{(n)}(x) = n(n-1) \dots 1 a_n + (n+1)n \dots 2 a_{n+1} x \\ \quad \quad \quad + (n+2)(n+1) \dots 3 a_{n+2} x^2 + \dots \\ \dots \end{array} \right.$$

sind innerhalb desselben Intervalls konvergent, innerhalb dessen die ursprüngliche Reihe konvergiert, und definieren eine unbegrenzte Folge in diesem Intervalle stetiger Funktionen.*)

88. Differentialquotienten einer konvergenten Potenzreihe. Taylorsche Reihe. Die Bedeutung der vorstehenden Funktionen wird sich auf Grund des folgenden, für die Analysis wichtigen Satzes ergeben:

Ist $f(x)$ eine durch eine konvergente Potenzreihe definierte Funktion, so läßt sich $f(x+h)$, sofern auch $x+h$ dem Konvergenzintervall angehört, durch eine nach h fortschreitende Potenzreihe darstellen.

Es sei also

$$(16) \quad f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

und die Reihe konvergiere für alle Werte von x , welche dem Betrage nach kleiner sind als $|X|$; sei x ein solcher Wert und h so bestimmt, daß

$$(17) \quad |h| < |X| - |x|,$$

so daß also $|x| + |h|$ und somit auch $|x+h|$ dem Konvergenzintervall angehört; dann gilt auch

$$(18) \quad f(x+h) = a_0 + a_1(x+h) + a_2(x+h)^2 + \dots + a_n(x+h)^n + \dots$$

In dieser Gleichung werde x als ein fester Wert und h als Variable angesehen; dann ist die absolute Konvergenz der Reihe (18) für alle Werte von h , welche der Bedingung (17)

*) Die Zeichen $\mathfrak{P}'(x)$, $\mathfrak{P}''(x)$, ... sind nur Symbole für die durch gliedweise Differentiation von $\mathfrak{P}(x)$ entstandenen Potenzreihen.

genügen, feststehend; man darf daher die einzelnen Glieder durch die Gliedergruppen, welche sich nach Ausführung der Potenzen von $x+h$ ergeben, ersetzen und die Glieder beliebig umstellen und zusammenfassen, insbesondere diejenigen mit gleichen Potenzen von h vereinigen: denn alle diese Operationen sind vermöge 72, 3) und 2) an der aus (18) abgeleiteten Reihe

$$a_0 + |a_1|(|x| + |h|) + |a_2|(|x| + |h|)^2 + \dots$$

gestattet, folglich auch an (18) selbst. Nach ihrer Ausführung ist

$$(18^*) \quad f(x+h) = u_0 + u_1 h + u_2 h^2 + \dots + u_n h^n + \dots$$

und zwar ist

$$u_0 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

$$u_1 = \binom{1}{1} a_1 + \binom{2}{1} a_2 x + \binom{3}{1} a_3 x^2 + \dots$$

$$= \frac{1}{1} [1 a_1 + 2 a_2 x + 3 a_3 x^2 + \dots]$$

$$u_2 = \binom{2}{2} a_2 + \binom{3}{2} a_3 x + \binom{4}{2} a_4 x^2 + \dots$$

$$= \frac{1}{1 \cdot 2} [2 \cdot 1 a_2 + 3 \cdot 2 a_3 x + 4 \cdot 3 a_4 x^2 + \dots]$$

$$\dots \dots \dots$$

$$u_n = \binom{n}{n} a_n + \binom{n+1}{n} a_{n+1} x + \binom{n+2}{n} a_{n+2} x^2 + \dots$$

$$= \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} [n(n-1) \dots 1 a_n + (n+1)n \dots 2 a_{n+1} x + (n+2)(n+1) \dots 3 a_{n+2} x^2 + \dots].$$

Es ist also $u_0 = f(x)$ und $u_1, u_2, \dots u_n, \dots$ sind die durch die Faktoriellen von 1, 2, $\dots n, \dots$ bzw. dividierten Grenzwerte der Reihen (15), welche als gleichzeitig konvergierend mit der Reihe (9) erwiesen worden sind.

Aus (18*) folgt hiernach zunächst:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = u_1 + u_2 h + \dots + u_n h^{n-1} + \dots,$$

wobei die Reihe rechts für dieselben Werte von h absolut und gleichmäßig konvergent ist wie (18), d. i. für Werte, welche der Bedingung (17) genügen. Läßt man nun h gegen die Grenze Null konvergieren, so konvergiert die rechte Seite

gegen den Wert u_1 (85, 3)), die linke aber hat zum Grenzwert den Differentialquotienten der Funktion $f(x)$; mithin ist

$$f'(x) = u_1 = 1a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots$$

Dadurch ist aber auch die Bedeutung aller übrigen Reihen in (15) gegeben, da jede folgende aus der vorangehenden ebenso abgeleitet ist, wie die erste aus der Reihe (9); es ist also:

$$f''(x) = 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + \dots$$

$$f^{(n)}(x) = n(n-1) \dots 1a_n + (n+1)n \dots 2a_{n+1}x + (n+2)(n+1) \dots 3a_{n+2}x^2 + \dots$$

Dieses Ergebnis fassen wir in dem Satze zusammen: *Die durch n -malige gliedweise Differentiation einer konvergenten Potenzreihe entstandene Potenzreihe hat für alle Werte von x innerhalb des gemeinsamen Konvergenzintervalls beider Reihen zum Grenzwerte den n -ten Differentialquotienten des Grenzwertes der ursprünglichen Reihe.* Man spricht es kurz dahin aus, eine konvergente Potenzreihe werde differentiiert, indem man sie gliedweise differentiiert, also wie eine endliche Summe von Funktionen behandelt.

Hiernach ist nun

$$u_0 = f(x), \quad u_1 = \frac{f'(x)}{1}, \quad u_2 = \frac{f''(x)}{1 \cdot 2}, \quad \dots \quad u_n = \frac{f^{(n)}(x)}{1 \cdot 2 \dots n}$$

und die endgültige Form von (18*) lautet:

$$(19) \quad f(x+h) = f(x) + \frac{f'(x)}{1}h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x)}{1 \cdot 2 \dots n}h^n + \dots,$$

gültig, solange

$$|x| < |X|, \quad |h| < |X| - |x|.$$

Die Entwicklung (19) führt den Namen der *Taylor'schen Reihe* für die Funktion $f(x+h)$; ihre Ableitung erfolgte unter der Voraussetzung, daß $f(x)$ der Grenzwert einer konvergenten Potenzreihe sei.

Als konvergente Potenzreihe kann auch jede rationale ganze Funktion von x angesehen werden; ihr Konvergenzintervall erstreckt sich über das ganze Gebiet der reellen Zahlen; ist

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

so ist

$$f^{(n)}(x) = n(n-1) \dots 1 \cdot a_n$$

und jeder höhere Differentialquotient gleich Null; für eine solche Funktion bricht also die Taylorsche Reihe ebenfalls mit dem $(n + 1)$ -ten Gliede ab und lautet:

$$(20) \quad f(x + h) = f(x) + \frac{f'(x)}{1} h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2} h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x)}{1 \cdot 2 \cdots n} h^n,$$

sie ist hier gültig für jeden endlichen Wert von x und von h .

89. Identische Gleichheit zweier Potenzreihen. Um die Bedingungen festzustellen, unter welchen *zwei Potenzreihen eine und dieselbe Funktion darstellen*, weisen wir zunächst den folgenden Satz nach:

Wenn die durch die konvergente Potenzreihe

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$$

definierte Funktion $f(x)$ für alle Werte von x aus einem beliebig engen Intervall $(-\delta, +\delta)$ Null ist, so ist sie für alle Werte von x gleich Null, weil dann die Koeffizienten der Potenzreihe sämtlich verschwinden müssen.

Weil der Wert $x = 0$ dem Intervall angehört, so ist

$$f(0) = a_0 = 0;$$

daher ist

$$f(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = x(a_1 + a_2 x + \cdots),$$

und soll dies letzte Produkt an jeder Stelle von $(-\delta, +\delta)$ gleich Null sein, so muß

$$a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + \cdots$$

für alle diese Werte von x verschwinden, wofür wieder

$$a_1 = 0$$

notwendige Bedingung ist; dann aber ist

$$f(x) = a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots = x^2(a_2 + a_3 x + \cdots),$$

und damit das Produkt rechter Hand an allen Stellen des Intervalls $(-\delta, +\delta)$ verschwinde, muß dies seitens des Faktors

$$a_2 + a_3 x + a_4 x^2 + \cdots$$

geschehen, und dafür besteht die notwendige Bedingung

$$a_2 = 0$$

usw. Es muß also tatsächlich $a_n = 0$ sein für jedes n aus der Reihe $0, 1, 2, \dots$; dann aber ist für jeden Wert von x

$$f(x) = 0.$$

Der Satz gilt auch für eine rationale ganze Funktion, weil eine solche als besonderer Fall einer konvergenten Potenzreihe zu gelten hat.

Die Beweisführung hat hier an den Umstand angeknüpft, daß dem Intervall $(-\delta, +\delta)$ auch die Stelle Null angehört. Man kann aber ganz allgemein beweisen:

Wenn die Funktion $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ für alle Werte von x aus einem beliebigen die Null nicht enthaltenden Intervalle (α, β) ihres Konvergenzgebietes Null ist, so ist sie identisch Null.

Wählt man nämlich innerhalb (α, β) einen Wert x , so lassen sich für h Grenzen $(-\varepsilon, +\varepsilon)$ feststellen derart*), daß auch $x + h$ innerhalb (α, β) verbleibt; dann ist nach Voraussetzung

$$f(x + h) = u_0 + u_1h + u_2h^2 + \dots$$

für alle Werte von h aus $(-\varepsilon, +\varepsilon)$ gleich Null, daher notwendig

$$(21) \quad u_0 = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 0, \dots$$

für alle Werte von x innerhalb (α, β) . Von dem der Null näherliegenden Werte $x = \alpha$ ausgehend kann man nun ein Intervall konstruieren, das bis an die ihm näherliegende Grenze des Konvergenzgebietes reicht, dessen Mitte α ist und in welchem vermöge (21) und (18) $f(x)$ beständig Null ist. Von dem der Null zunächstliegenden Punkte dieses Intervalls ausgehend konstruiere man ebenso ein erweitertes Intervall, in welchem wieder $f(x)$ beständig gleich Null ist. Auf diese Weise fortfahrend muß man notwendig zu einem Intervall kommen, das die Null einschließt; dann aber befindet man sich im Falle des vorigen Satzes und schließt, daß

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = 0, \dots$$

Auf Grund dieser beiden Sätze kann nun die Richtigkeit der folgenden Behauptung erwiesen werden:

Besitzen zwei konvergente Potenzreihen

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \\ b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots \end{aligned}$$

*) Man braucht nur ε kleiner zu nehmen als den kleineren von den beiden Abschnitten, in welche (α, β) durch das gewählte x zerfällt.

für jedes x aus einem beliebigen Intervall (α, β) übereinstimmende Grenzwerte $f(x)$, $g(x)$, so sind die Koeffizienten gleichhoher Potenzen von x einander gleich und die Grenzwerte im ganzen Konvergenzintervall übereinstimmend.

Da nämlich

$$f(x) - g(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + \dots$$

Null ist für alle x aus (α, β) , so ist

$$a_0 - b_0 = 0, \quad a_1 - b_1 = 0, \quad a_2 - b_2 = 0, \dots,$$

also

$$a_0 = b_0, \quad a_1 = b_1, \quad a_2 = b_2, \dots$$

und die Gleichung $f(x) - g(x) = 0$ oder $f(x) = g(x)$ besteht für alle Werte von x , für welche die Reihen konvergieren.

Daraus ergibt sich die Tatsache, daß eine Funktion, wenn sie als Grenzwert einer Potenzreihe darstellbar ist, es nur auf eine einzige Art sein kann.

Auf dem eben erwiesenen Satze von der Eindeutigkeit der Potenzreihendarstellung, der übrigens wie für Potenzreihen auch für ganze Funktionen gilt, beruht die *Methode der unbestimmten Koeffizienten*, von der in der Analysis vielfacher Gebrauch gemacht wird*).

90. Rechnen mit Potenzreihen. Die Anwendung der Regeln in 71, 2) und 75 für konvergente Reihen überhaupt auf Potenzreihen führt dazu, daß die Summe und Differenz, das Produkt und unter gewissen Voraussetzungen auch der Quotient zweier Potenzreihen $\mathfrak{P}_1(x)$, $\mathfrak{P}_2(x)$ wieder in der Gestalt einer Potenzreihe $\mathfrak{P}(x)$ dargestellt werden können. Über das Konvergenzintervall dieser letzteren mögen die folgenden Bemerkungen genügen.**)

Haben $\mathfrak{P}_1(x)$, $\mathfrak{P}_2(x)$ verschiedene Konvergenzradien λ_1 , λ_2 , so ist der kleinere von beiden der Konvergenzradius von

$$\mathfrak{P}(x) = \mathfrak{P}_1(x) \pm \mathfrak{P}_2(x);$$

*) Ihr Grundgedanke ist zuerst von *R. Descartes* in dem 1637 anonym erschienenen Werke ausgesprochen worden, von dem der Ursprung der analytischen Geometrie gewöhnlich datiert wird.

**) *A. Pringsheim-G. Faber* l. c.

ist aber $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, so kann der Konvergenzradius von $\mathfrak{P}(x)$ beliebig größer sein als λ . So ist z. B. bei

$$\mathfrak{P}_1(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad \lambda_1 = 1,$$

bei

$$\mathfrak{P}_2(x) = 1 + \left(\frac{x}{2}\right) + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^3 + \dots \quad \lambda_2 = 2$$

und die Reihen

$$\mathfrak{P}_1(x) \pm \mathfrak{P}_2(x) = \sum_0^{\infty} \left(1 \pm \left(\frac{1}{2}\right)^v\right) x^v$$

haben den Konvergenzradius 1; hingegen haben die Reihen

$$\mathfrak{P}_1(x) = \sum_0^{\infty} x^v, \quad \mathfrak{P}_2(x) = \sum_0^{\infty} \left(\frac{1}{v!} - 1\right) x^v$$

den gemeinsamen Konvergenzradius 1, während ihre Summe

$$\mathfrak{P}(x) = \sum_0^{\infty} \frac{x^v}{v!}$$

den Konvergenzradius ∞ besitzt (84).

Über den Konvergenzradius der Produktreihe

$$\mathfrak{P}(x) = \mathfrak{P}_1(x) \mathfrak{P}_2(x)$$

läßt sich nur aussagen, daß er mindestens dem kleineren von den Radien λ_1, λ_2 der Faktoren gleichkommt; er kann aber auch dem größeren gleich oder beliebig größer sein. Es geben beispielsweise

$$\mathfrak{P}_1(x) = \sum_0^{\infty} x^v, \quad \mathfrak{P}_2(x) = \sum_0^{\infty} (-x)^v$$

mit dem gemeinsamen Konvergenzradius $\lambda = 1$ die Produktreihe

$$\mathfrak{P}(x) = \sum_0^{\infty} x^{2v}$$

mit demselben Radius; hingegen

$$\mathfrak{P}_1(x) = \sum_0^{\infty} x^v, \quad \mathfrak{P}_2(x) = \sum_0^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^v \quad \text{mit } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$$

die Produktreihe

$$\mathfrak{P}(x) = \sum_0^{\infty} \frac{2^{v+1} - 1}{2^v} x^v$$

mit dem Radius $\lambda = 2$.

Bezüglich der Darstellung des Quotienten $\frac{\mathfrak{P}_1(x)}{\mathfrak{P}_2(x)}$ durch eine Potenzreihe ist zu bemerken, daß eine solche nur dann möglich ist, wenn $\mathfrak{P}_2(0) \neq 0$, wenn also in $\mathfrak{P}_2(x)$ ein von x freies Glied vorkommt, und daß sodann das Konvergenzintervall abhängt von dem kleinsten $x \neq 0$, für welches $\mathfrak{P}_2(x) = 0$ wird. Ist

$$\mathfrak{P}_1(x) = \sum_0^{\infty} a_r x^r, \quad \mathfrak{P}_2(x) = \sum_0^{\infty} b_r x^r \quad (b_0 \neq 0)$$

und schreibt man den Quotienten in der Form

$$\mathfrak{P}(x) = \sum_0^{\infty} c_r x^r,$$

so ergeben sich zur Bestimmung der c , im Sinne von 75 die Gleichungen:

$$b_0 c_r + b_1 c_{r-1} + b_2 c_{r-2} + \cdots + b_r c_0 = a_r \quad (r = 0, 1, 2, \dots).$$

§ 3. Die Formeln und Reihen von Taylor und Maclaurin.

91. Die Taylorsche Formel. Es ist gezeigt worden (88), daß eine Funktion $f(x)$, welche als Grenzwert einer konvergenten Potenzreihe definiert ist, für das Argument $x + h$, sofern x sowohl als $x + h$ dem Konvergenzintervalle angehören, in eine nach positiven ganzen Potenzen von h fortschreitende Reihe entwickelt werden kann; die bezügliche Entwicklung erhielt dort den Namen *Taylorsche Reihe*.

Nun sei $f(x)$ eine beliebige Funktion von x , von der wir voraussetzen, daß sie in einem Intervalle (α, β) eindeutig und stetig sei und Differentialquotienten bis zur $(n-1)$ -ten Ordnung einschließlich zulasse; übrigens hat die Existenz eines bestimmten vollständigen Differentialquotienten $n-1$ -ter Ordnung die Stetigkeit aller vorausgehenden und auch der Funktion selbst zur Folge. Wir stellen uns die Aufgabe, den Fehler zu bestimmen, welcher begangen wird, wenn man für $f(x+h)$ die auf die ersten n Glieder erstreckte Partialsumme der Taylorschen Reihe (88, (19)), d. i.

$$f(x) + \frac{f'(x)}{1} h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2} h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} h^{n-1}$$

nimmt; dieser Fehler werde mit R_n bezeichnet.

Behufs Erledigung dieser Frage führen wir zunächst eine neue Bezeichnung ein, indem wir

$$x = a, \quad x + h = b$$

setzen, woraus

$$h = b - a$$

folgt; das Intervall (a, b) muß eingeschlossen sein von jenem (α, β) . Es ist dann

$$(1) \quad \begin{cases} R_n = f(b) - f(a) - \frac{f'(a)}{1} (b-a) - \frac{f''(a)}{1 \cdot 2} (b-a)^2 - \dots \\ \quad - \frac{f^{(n-1)}(a)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} (b-a)^{n-1}; \end{cases}$$

dies aber läßt sich als Differenz zweier besonderen Werte der folgenden Funktion darstellen:

$$(2) \quad \begin{cases} \varphi(z) = f(z) + \frac{f'(z)}{1} (b-z) + \frac{f''(z)}{1 \cdot 2} (b-z)^2 + \dots \\ \quad + \frac{f^{(n-1)}(z)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} (b-z)^{n-1}, \end{cases}$$

indem nämlich

$$\varphi(a) = f(a) + \frac{f'(a)}{1} (b-a) + \frac{f''(a)}{1 \cdot 2} (b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} (b-a)^{n-1}$$

$$\varphi(b) = f(b);$$

mithin ist tatsächlich

$$(3) \quad R_n = \varphi(b) - \varphi(a).$$

Auf Grund dieser Bemerkung ist eine Schätzung von R_n durchführbar, in allgemeinsten Form mit Hilfe des verallgemeinerten Mittelwertsatzes (39). Hat nämlich die Funktion $\varphi(z)$ an jeder Stelle zwischen a und b einen vollständigen Differentialquotienten — ihre Stetigkeit in dem Intervalle (a, b) ist durch die Voraussetzungen gewährleistet, wenn man sie für $f^{(n-1)}(z)$ annimmt — und gilt dasselbe von der beliebigen Funktion $\psi(z)$ mit der weiteren Maßgabe, daß $\psi'(z)$ an keiner Stelle zwischen a und b Null ist, so gilt der Ansatz:

$$(4) \quad \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} = \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)}$$

mindestens für einen Wert ξ zwischen a und b . Nun folgt aus (2):

$$\begin{aligned} \varphi'(z) = f'(z) + \frac{f''(z)}{1} (b-z) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(z)}{1 \cdot 2 \cdots (n-2)} (b-z)^{n-2} \\ + \frac{f^{(n)}(z)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} (b-z)^{n-1} \\ - f'(z) - \frac{f''(z)}{1} (b-z) - \cdots - \frac{f^{(n-1)}(z)}{1 \cdot 2 \cdots (n-2)} (b-z)^{n-2}, \end{aligned}$$

also ist

$$\varphi'(z) = \frac{f^{(n)}(z)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} (b-z)^{n-1}$$

und die Existenz dieses Differentialquotienten innerhalb (a, b) hängt von der Existenz auch des n -ten Differentialquotienten von $f(x)$ in dem genannten Intervalle ab, was wir den bisher gemachten Voraussetzungen als neue hinzufügen. Damit ist aber zufolge (4) und (3)

$$R_n = \frac{\psi(b) - \psi(a)}{\psi'(\xi)} \frac{f^{(n)}(\xi)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} (b-\xi)^{n-1}.$$

Das Willkürliche in dieser Formel kann durch bestimmte Wahl von $\psi(x)$ beseitigt werden; setzt man

$$\psi(x) = (b-x)^p,$$

worin p eine positive ganze Zahl bedeutet, so ist den Bedingungen entsprochen und

$$\psi'(x) = -p(b-x)^{p-1}.$$

Bei dieser Wahl ist also

$$R_n = \frac{f^{(n)}(\xi)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)p} (b-a)^p (b-\xi)^{n-p};$$

kehrt man zu der ursprünglichen Bezeichnung zurück, so kann ξ als ein zwischen x und $x+h$ liegender Wert in der Form

$$\xi = x + \theta h \quad (0 < \theta < 1)$$

dargestellt werden; weiter ist $b-\xi = x+h-x-\theta h = h(1-\theta)$; mithin

$$(5) \quad R_n = \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)p} (1-\theta)^{n-p} h^n.$$

Dadurch erscheint die Aufgabe in dem Sinne gelöst, daß sich für R_n ein Spielraum bestimmen läßt: R_n liegt nämlich notwendig zwischen dem kleinsten und dem größten der Werte, welche die rechte Seite von (5) annimmt, indem θ das vorgeschriebene Intervall $(0, 1)$ durchläuft.

Vermöge der Bedeutung, welche dem R_n zukommt, ist also

$$(6) \quad \begin{cases} f(x+h) = f(x) + \frac{f'(x)}{1} h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2} h^2 + \dots \\ \quad + \frac{f^{(n-1)}(x)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} h^{n-1} + R_n. \end{cases}$$

Diese Gleichung in Verbindung mit (5) gibt die *Taylorsche Formel* in derjenigen Gestalt, welche ihr in Ansehung des *Restgliedes* R_n Schlömilch und Roche*) erteilt haben. Die älteren Formen des Restgliedes nach Lagrange und Cauchy erhält man aus (5) durch Spezialisierung von p , erstere für $p = n$:

$$(7) \quad R_n = \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{1 \cdot 2 \dots n} h^n,$$

letztere für $p = 1$:

$$(8) \quad R_n = \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} (1-\theta)^{n-1} h^n;$$

die Form (7) ist dadurch bemerkenswert, daß sie sich bis auf das Argument bei $f^{(n)}$ dem Bau der übrigen Glieder von (6) völlig anschließt.

Für die späteren, überaus zahlreichen Anwendungen der Taylorschen Formel sind die folgenden Bemerkungen im Auge zu behalten.

1) Die Formel darf für alle Werte von x und h angesetzt werden, welche so beschaffen sind, daß x sowohl als $x+h$ in dem Intervall (α, β) liegen, in welchem $f(x)$ endlich ist und vollständige Differentialquotienten bis zur n -ten Ordnung einschließlich besitzt. Betrachtet man x als fest, so sagt man, die Formel gelte für die Stelle x ; h darf dann innerhalb gewisser Grenzen variabel sein.

2) Die Formel darf für jedes n angesetzt werden, wenn nur die eben ausgesprochenen Bedingungen bis zu diesem Ordnungsexponenten erfüllt sind. Für $n = 1$ reduziert sich die Taylorsche Formel auf

$$f(x+h) = f(x) + \frac{f'(x+\theta h)}{1} h,$$

woraus

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x+\theta h),$$

und dies ist der Ausdruck für den Mittelwertsatz (38, (2)).

*) Liouville, Journ. de Mathém., Série II, t. III.

3) Bei den meisten Anwendungen ist h eine Größe von sehr kleinem Betrage, ein nahe an Null liegender echter Bruch, dessen steigende Potenzen rasch abnehmend der Null sich nähern; zur näherungsweisen Berechnung von $f(x+h)$ aus $f(x)$ und den Differentialquotienten genügen dann wenige Glieder von (6). Insbesondere läßt sich erweisen, daß h dem Betrage nach derart eingeschränkt werden kann, daß das Verhältnis des Gliedes, bei welchem die Formel abbricht, zu dem darauffolgenden Restgliede dem absoluten Betrage nach eine beliebig große vorgeschriebene positive Zahl K überschreitet. In der Tat, soll

$$\left| \frac{f^{(n-1)}(x)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} h^{n-1} \right| > K \left| \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{1 \cdot 2 \cdots n} h^n \right|$$

sein, so braucht h nur so gewählt zu werden, daß

$$|h| < \frac{n}{K} \left| \frac{f^{(n-1)}(x)}{f^{(n)}(x+\theta h)} \right|$$

und dies ist sicher erreicht, wenn man

$$|h| < \frac{n}{GK} |f^{(n-1)}(x)|$$

nimmt, wobei G den größten Wert bezeichnet, welchen $|f^{(n)}(x+\theta h)|$ in dem Intervalle (α, β) erlangt.

92. Die Taylorsche Reihe. Die Funktion $f(x)$ sei nun solcher Art, daß sie in dem Intervalle (α, β) endlich bleibend vollständige Differentialquotienten *aller* Ordnungen besitzt. Die unendliche Reihe

$$f(x) + \frac{f'(x)}{1} h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2} h^2 + \cdots$$

hat dann vermöge der Gleichung (6) den Grenzwert

$$f(x+h) - \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n,$$

d. h. sie hat nur dann einen bestimmten Grenzwert und ist somit konvergent, wenn $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n$ eine bestimmte Größe A bedeutet, und zwar ist ihr Grenzwert dann $f(x+h) - A$; er ist insbesondere $f(x+h)$ selbst, wenn $A = 0$, d. h. wenn

$$(9) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0.$$

Dann also ist

$$(10) \quad f(x+h) = f(x) + \frac{f'(x)}{1} h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2} h^2 + \dots,$$

die Funktion $f(x)$ also ebenso wie der Grenzwert einer nach x fortschreitenden Potenzreihe in die *Taylor'sche Reihe* entwickelbar.

Die eindeutige Funktion $f(x+h)$ ist durch die Taylor'sche Reihe

$$f(x+h) = \sum_0^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{1 \cdot 2 \dots n} h^n$$

darstellbar, wenn die Funktion $f(x)$ in dem Intervall $(x, x+h)$ endlich bleibt, vollständige bestimmte Differentialquotienten jeder beliebigen Ordnung daselbst besitzt und wenn das Restglied R_n in einer der unter (5), (7), (8) angegebenen Formen geschrieben, für $\lim n = \infty$ gegen die Grenze Null konvergiert.)*

Die Untersuchung des Restgliedes gestaltet sich am einfachsten bei Funktionen, für welche $f^{(n)}(x)$ bei jedem n eine endliche Größe, wenigstens in dem Intervalle $(x, x+h)$, bedeutet; denn alsdann hängt es laut (7) nur von dem Ausdruck

$$\frac{h^n}{1 \cdot 2 \dots n}$$

ab, ob R_n für $\lim n = +\infty$ den Grenzwert Null hat; dieser Ausdruck konvergiert aber für jedes *endliche* h gegen die Grenze Null, somit auch R_n . Schreibt man nämlich das unendliche Produkt, in welches der Ausdruck bei dem Grenzübergange sich verwandelt, in der Form $(1-\alpha_1)(1-\alpha_2)(1-\alpha_3)\dots$, d. i.

$$\left(1 - \frac{1-h}{1}\right) \left(1 - \frac{2-h}{2}\right) \left(1 - \frac{3-h}{3}\right) \dots$$

so ist $\alpha_n > 0$, sobald $n > h$, und die Reihe

$$\frac{n-h}{n} + \frac{n+1-h}{n+1} + \frac{n+2-h}{n+2} + \dots$$

divergiert, weil

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots$$

*) Die angeführten Bedingungen reichen zur Gültigkeit des Ansatzes hin. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, die also den ganzen Umfang der Funktionen kennzeichnen, welche eine solche Entwicklung gestatten, hat A. Pringsheim festgestellt. Vgl. *Mathem. Annalen*, Bd. 44 (1894).

divergent ist (73, 1)) und die Zähler überdies beständig wachsen; infolgedessen divergiert auch das unendliche Produkt gegen die Grenze Null (78, 2)).

Die Gleichung (10) gestattet, die Änderung $f(x+h) - f(x) = \Delta f(x)$, welche die Funktion bei dem Übergange von der Stelle x zu der Stelle $x+h$ erfährt, in Form einer konvergenten Potenzreihe nach h auszudrücken:

$$\Delta f(x) = f'(x)h + \frac{f''(x)}{1 \cdot 2} h^2 + \frac{f'''(x)}{1 \cdot 2 \cdot 3} h^3 + \dots$$

und daher mit jedem gewünschten Grade der Annäherung zu berechnen; dieses Ziel wird um so rascher erreicht, je kleiner der Betrag von h ist. Unter der Voraussetzung eines sehr kleinen h sind die Produkte

$$f'(x)h, \quad f''(x)h^2, \quad f'''(x)h^3, \dots$$

unter dem Namen des ersten, zweiten, dritten, ... Differentials eingeführt und mit

$$df(x), \quad d^2f(x), \quad d^3f(x), \dots$$

bezeichnet worden (42); für $\Delta f(x)$ ergibt sich dann die Darstellung:

$$(11) \quad \Delta f(x) = df(x) + \frac{d^2f(x)}{1 \cdot 2} + \frac{d^3f(x)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots,$$

welche den Zusammenhang zwischen der wirklichen Änderung der Funktion und ihren mit h gebildeten Differentialen der verschiedenen Ordnungen nachweist; sie gibt auch den analytischen Ausdruck für den Fehler, der begangen wird, wenn man $\Delta f(x)$ durch $df(x)$ ersetzt.

Wenn $f(a+h)$ die Taylorsche Entwicklung zuläßt, so vertritt das Restglied

$$R_n = \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a + \theta h)$$

die Reihe

$$\frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \frac{h^{n+2}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(a) + \dots;$$

entwickelt man $f^{(n)}(a + \theta h)$ wieder in die Taylorsche Reihe, wofür die hinreichenden Bedingungen vorhanden sind, und

setzt beide Entwicklungen einander gleich, so entsteht die Gleichung:

$$\begin{aligned} & \theta f^{(n+1)}(a) + \frac{\theta^2}{2!} f^{(n+2)}(a) h + \frac{\theta^3}{3!} f^{(n+3)}(a) h^2 + \dots \\ &= \frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1} + \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+1)(n+2)} h + \frac{f^{(n+3)}(a)}{(n+1)(n+2)(n+3)} h^2 + \dots \end{aligned}$$

welche zur Bestimmung von θ zu dienen hätte. Nimmt man θ , das von h (und a) abhängt, in der Form

$$\theta = \alpha + \beta h + \gamma h^2 + \dots$$

an, so gibt die Vergleichung der Koeffizienten gleicher Potenzen von h zu beiden Seiten der Gleichung:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{n+1}; \\ \beta f^{(n+1)}(a) + \frac{\alpha^2}{2} f^{(n+2)}(a) &= \frac{f^{(n+2)}(a)}{(n+1)(n+2)}, \end{aligned}$$

woraus

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{n}{2(n+1)^2(n+2)} \frac{f^{(n+2)}(a)}{f^{(n+1)}(a)}; \\ \gamma f^{(n+1)}(a) + \alpha \beta f^{(n+2)}(a) + \frac{\alpha^3}{6} f^{(n+3)}(a) &= \frac{f^{(n+3)}(a)}{(n+1)(n+2)(n+3)}, \end{aligned}$$

woraus

$$\gamma = \frac{n(5n+7) f^{(n+1)}(a) f^{(n+3)}(a) - 3n(n+3) \{f^{(n+2)}(a)\}^2}{6(n+1)^3(n+2)(n+3) \{f^{(n+1)}(a)\}^3}.$$

Hiernach ergibt sich für das θ des Mittelwertsatzes 38, d. i.

$$f(a+h) = f(a) + f'(a + \theta h) h,$$

da hier $n = 1$ ist, der Näherungswert

$$\theta = \frac{1}{2} + \frac{f'''(a) h}{f''(a) 24} + \frac{f''(a) f^{IV}(a) - \{f'''(a)\}^2}{\{f''(a)\}^3} \frac{h^2}{48}$$

also beispielweise für $f(x) = \sin x$, $a = \frac{\pi}{3}$:

$$\theta = \frac{1}{2} + \frac{h}{24\sqrt{3}} - \frac{h^2}{36}.$$

93. Die Maclaurinsche Formel. Wenn das Intervall (α, β) , in welchem die Funktion $f(x)$ die für die Taylorsche Formel (6) zureichenden Bedingungen erfüllt, auch den Wert $x = 0$ einschließt, so kann auch dieser zum Ausgangspunkte der Entwicklung gemacht werden; h als Variable betrachtet

ist dann durch das Intervall (α, β) beschränkt und soll mit x bezeichnet werden. Mit diesen Veränderungen [$x = 0$ gesetzt und x für h geschrieben] nimmt die Formel (6) die Gestalt an:

$$(12) \quad f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1} x + \frac{f''(0)}{1 \cdot 2} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} x^{n-1} + R_n,$$

während gleichzeitig aus (7) und (8)

$$(13) \quad R_n = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{1 \cdot 2 \cdots n} x^n$$

$$(14) \quad R_n = \frac{f^{(n)}(\theta x)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} (1 - \theta)^{n-1} x^n$$

folgt. Die Gleichung (12) in Verbindung mit einer oder der andern der beiden letzten Gleichungen bezeichnet man als *Maclaurinsche Formel*. Ihr analytischer Inhalt fällt im Wesen mit jenem der Taylorschen überein.

Die Bedingungen des Ansatzes (12) fließen unmittelbar aus 91, 1) und lauten dahin, daß 0 und x in jenem Intervall (α, β) gelegen sein müssen, in welchem $f(x)$ endlich bleibt und vollständige bestimmte Differentialquotienten bis zur n -ten Ordnung einschließlich besitzt.

94. Die Maclaurinsche Reihe. Wenn die Funktion $f(x)$ in dem Intervall $(0, x)$ endlich ist und daselbst vollständige bestimmte Differentialquotienten aller Ordnungen besitzt, und wenn überdies das Restglied R_n mit wachsendem n der Grenze Null sich nähert, so gilt der Ansatz:

$$(15) \quad f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1} x + \frac{f''(0)}{1 \cdot 2} x^2 + \cdots,$$

welchen man als *Maclaurinsche Reihe* bezeichnet.

Im Hinblick auf die 89 festgestellte Tatsache kann der Satz ausgesprochen werden: *Wenn eine Funktion $f(x)$ in eine nach x fortschreitende Potenzreihe entwickelbar ist, so ist sie es nur auf eine Art und diese Entwicklung ist die Maclaurinsche.*

Dem Wesen nach lösen die Taylorsche und die Maclaurinsche Reihe die nämliche Aufgabe*): die Entwicklung

*) Die nachmals zu einem Fundamentalsatz der Differentialrechnung gewordene Taylorsche Reihe findet sich zum erstenmal in Brook Taylor's *Methodus incrementorum directa et inversa*, London 1715. Der Fall $x = 0$ ist zuerst von Colin Maclaurin in dem Werke *Treatise of fluxions*, Edinburgh 1742 benutzt und später nach ihm benannt worden.

einer Funktion in eine Potenzreihe; die erstere leistet dies an einer beliebigen Stelle des Intervalls (α, β) , die letztere nimmt die Null zum Ausgangspunkte.

In den folgenden Artikeln werden wir uns mit der Entwicklung einiger elementaren Funktionen in Potenzreihen nach der Variablen x befassen und in diesen Reihen zunächst ein Hilfsmittel erhalten, die Werte dieser Funktionen für jeden zulässigen Wert der Variablen mit jedem gewünschten Grade der Genauigkeit zu berechnen. In diesen Reihenentwicklungen ist eine bedeutsame Erweiterung der Funktionslehre zu erblicken, indem sie gestatten, auch die Berechnung der transzendenten Funktionen, die bisher nur formal definiert worden waren, auf die arithmetischen Operationen zurückzuführen.

95. Exponentialreihen. Die natürliche Potenz e^x ist eine Funktion, deren n -ter Differentialquotient für jedes $n = 1, 2, \dots$ ihr selbst gleichkommt (41, 3), mit ihr zugleich stetig bleibt für jeden endlichen Wert von x , und für $x = 0$ den Wert 1 annimmt. Da ferner das Restglied

$$(16) \quad R_n = \frac{e^{\theta x}}{1 \cdot 2 \cdots n} x^n$$

bei jedem endlichen Werte von x mit wachsendem n gegen Null konvergiert (92), so gilt für jedes x der Ansatz:

$$(17) \quad e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \cdots$$

Aus der in 30 begründeten Darstellung der Zahl e durch einen Grenzwert, nämlich:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} (1 + \epsilon)^{\frac{1}{\epsilon}} = e,$$

ergibt sich auch eine Darstellung von e^x als Grenzwert. Erhebt man nämlich zur Potenz x und führt links die Potenzierung unter dem Limeszeichen aus, was wegen der Stetigkeit der Potenz statthaft ist, so entsteht zunächst

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} (1 + \epsilon)^{\frac{x}{\epsilon}} = e^x$$

und setzt man $\frac{x}{\epsilon} = \omega$, so wird $\lim \omega = \infty$, daher

$$(17^*) \quad \lim_{\omega = \infty} \left(1 + \frac{x}{\omega}\right)^{\omega} = e^x.$$

Setzt man in (17) $x = 1$, so ergibt sich eine unendliche Reihe zur Berechnung der Zahl e selbst (30), nämlich

$$e = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots$$

Aus dieser Darstellung von e läßt sich die Stellung dieser Zahl im Bereiche der reellen Zahlen näher kennzeichnen. Zunächst ist e keine rationale Zahl; bricht man nämlich bei dem $(n+1)$ -ten Glied ab, so ist der Rest

$$\begin{aligned} r_n &= \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (n+1)} + \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (n+2)} + \dots \\ &= \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \right) \\ &< \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots \right) = \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n \cdot n}, \end{aligned}$$

also jedenfalls

$$r_n = \frac{\theta}{1 \cdot 2 \dots n \cdot n}; \quad (0 < \theta < 1)$$

wäre nun $e = \frac{p}{q}$ ein irreduzibler rationaler Bruch, so folgte aus

$$\frac{p}{q} = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \dots q} + \frac{\theta}{1 \cdot 2 \dots q \cdot q}$$

die weitere Gleichung

$$\frac{p}{q} - 1 - \frac{1}{1} - \frac{1}{1 \cdot 2} - \dots - \frac{1}{1 \cdot 2 \dots q} = \frac{\theta}{1 \cdot 2 \dots q \cdot q},$$

deren linke Seite sich nach Multiplikation mit $1 \cdot 2 \dots q$ in eine ganze Zahl verwandelt, während die in gleicher Weise abgeänderte rechte Seite $\frac{\theta}{q}$ weder Null, noch eine ganze Zahl sein kann. Dieser Widerspruch bezeugt die Unzulässigkeit der Annahme $e = \frac{p}{q}$. Es gehört also e zu den *irrationalen* Zahlen, nimmt aber auch unter diesen eine besondere Stellung ein. Ch. Hermite hat nämlich den Nachweis geführt, daß es keine algebraische Gleichung irgend welchen Grades mit rationalen (also, wie man immer annehmen kann, ganzen) Koeffizienten gibt, welche durch die Zahl e befriedigt wird*); man nennt

*) Früher schon hatte Liouville den Beweis hierfür in bezug auf eine quadratische Gleichung geführt wie folgt: gäbe es ganze Zahlen α, β, γ , für die

$$\alpha e^2 + \beta e + \gamma = 0,$$

also auch

$$\alpha e + \gamma e^{-1} + \beta = 0$$

Zahlen dieser Eigenschaft *transzendente Zahlen*, zum Unterschiede von den *algebraischen Zahlen*, denen die eben der Zahl e abgesprochene Eigenschaft zukommt.

Bringt man in der Gleichung (17) xla an die Stelle von x , unter a eine positive Zahl verstanden, so ergibt sich wegen $e^{xla} = a^x$ die Entwicklung für die allgemeine Exponentialfunktion:

$$(19) \quad a^x = 1 + \frac{xla}{1} + \frac{(xla)^2}{1 \cdot 2} + \dots,$$

welche ebenfalls für jeden Wert von x Geltung hat. Aus diesem Ansatz folgt

$$\frac{a^x - 1}{x} = la + \frac{x(la)^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^2(la)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots;$$

vermöge der Stetigkeit konvergiert die rechtsstehende Potenzreihe bei $\lim x = 0$ gegen den Grenzwert la , somit ist

$$(20) \quad \lim_{x=0} \frac{a^x - 1}{x} = la;$$

aus dieser Formel folgt mit der Substitution $x = \frac{1}{z}$:

$$(21) \quad \lim_{z=\infty} z(\sqrt[z]{a} - 1) = la.$$

96. Trigonometrische Reihen. Die Funktionen $\sin x$ und $\cos x$ sind ebenso wie ihre n -ten Differentialquotienten $\sin\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$ (41, (7), (8)) auf dem ganzen Ge-

ist, so hätte man nach Einsetzung der für e und e^{-1} aus (17) und (16) gebildeten Werte:

$$\alpha \left(1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} - \dots + \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} + \frac{e^\theta}{1 \cdot 2 \dots n} \right) + \gamma \left(1 - \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} + \frac{(-1)^n e^{-\theta'}}{1 \cdot 2 \dots n} \right) + \beta = 0;$$

θ, θ' bedeuten positive echte Brüche. Multipliziert man diese Gleichung mit $1 \cdot 2 \dots (n-1)$, so nimmt sie im wesentlichen die Gestalt

$$\alpha e^\theta + \frac{(-1)^n \gamma e^{-\theta'}}{n} = \mu$$

an, wobei μ eine ganze Zahl darstellt; α kann immer als positiv vorausgesetzt und n so gewählt werden, daß auch $(-1)^n \gamma$ positiv und die linke Seite ein beliebig kleiner positiver echter Bruch ist. Hierin liegt ein Widerspruch, der seinen Grund in der Annahme hat, es könnte $\alpha e^\theta + \beta e + \gamma = 0$ sein.

biete der reellen Zahlen stetige Funktionen, deren Werte in dem Intervalle $(-1, +1)$ liegen; infolgedessen lassen sie sich (92) in beständig konvergente Potenzreihen entwickeln.

$\sin\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$ geht für $x = 0$ in $\sin n \frac{\pi}{2}$ über, und dies ist nur dreier verschiedenen Werte fähig, nämlich:

$$\text{für } n = 2p \quad \text{ist } \sin n \frac{\pi}{2} = 0$$

$$,, \quad n = 4q + 1 \quad ,, \quad \sin n \frac{\pi}{2} = +1$$

$$,, \quad n = 4q + 3 \quad ,, \quad \sin n \frac{\pi}{2} = -1;$$

infolgedessen ist

$$(22) \quad \sin x = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots$$

Die Reihe ist für positive wie für negative Werte von x alternierend, daher (76)

$$|\sin x| < |x|, \quad |\sin x| > \left|x - \frac{x^3}{6}\right|, \quad |\sin x| < \left|x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right|, \dots$$

Bricht man sie bei dem Gliede

$$(-1)^{p-1} \frac{x^{2p-1}}{1 \cdot 2 \dots (2p-1)}$$

ab, so kann dem Restgliede die Form

$$R_{2p+1} = \frac{\sin\left[\theta x + (2p+1) \frac{\pi}{2}\right]}{1 \cdot 2 \dots (2p+1)} x^{2p+1} = (-1)^p \frac{\cos \theta x}{1 \cdot 2 \dots (2p+1)} x^{2p+1}$$

gegeben werden, weil $\sin\left(\alpha + 2p+1 \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^p \cos \alpha$.

$\cos\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$ geht für $x = 0$ in $\cos n \frac{\pi}{2}$ über und dies ist wieder dreier verschiedenen Werte fähig, indem

$$\text{für } n = 2p + 1 \quad \cos n \frac{\pi}{2} = 0$$

$$,, \quad n = 4q \quad \cos n \frac{\pi}{2} = +1$$

$$,, \quad n = 4q + 2 \quad \cos n \frac{\pi}{2} = -1$$

ist; demnach gilt für jedes x der Ansatz:

$$(23) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \dots$$

Diese stets alternierende Reihe zeigt, daß

$$|\cos x| < 1, |\cos x| > \left|1 - \frac{x^2}{2}\right|, |\cos x| < \left|1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right|, \dots;$$

bleibt man bei dem Gliede

$$(-1)^p \frac{x^{2p}}{1 \cdot 2 \dots (2p)}$$

stehen, so kann das Restglied in der Form

$$R_{2p+2} = \frac{\cos[\theta x + (p+1)\pi]}{1 \cdot 2 \dots (2p+2)} x^{2p+2} = (-1)^{p+1} \frac{\cos \theta x}{1 \cdot 2 \dots (2p+2)} x^{2p+2}$$

geschrieben werden, weil $\cos(\alpha + \pi) = (-1) \cos \alpha$.

97. Logarithmische Reihen. Die Funktion $\ln x$ selbst ist in eine nach x fortschreitende Potenzreihe nicht entwickelbar, weil sie für $x=0$ unstetig wird. Wir legen uns daher die Funktion $f(x) = \ln(1+x)$ vor, welche für alle -1 überschreitenden Werte von x stetig bleibt wie auch ihr n -ter Differentialquotient, der sich aus 41, (4) ergibt:

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 2 \dots (n-1)}{(1+x)^n}.$$

Da $f(0) = 0$ und $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} 1 \cdot 2 \dots (n-1)$, so hat man

$$(24) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

für alle Werte von x , für welche das Restglied der bei $(-1)^{n-2} \frac{x^{n-1}}{n-1}$ abgebrochenen Reihe, d. i.

$$R_n = \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n(1+\theta x)^n} \quad \text{oder} \quad = \frac{(-1)^{n-1} (1-\theta)^{n-1} x^n}{(1+\theta x)^n},$$

je nachdem man sich an die Form (13) oder (14) in 93 hält, mit wachsendem n gegen Null konvergiert.

Das Konvergenzintervall der Reihe (24) ist aus 84 bekannt; es ist durch -1 und $+1$ begrenzt und an seiner oberen Grenze findet noch bedingte Konvergenz statt; nur auf dieses Intervall braucht also die Untersuchung des Restgliedes erstreckt zu werden. Für $0 < x \leq 1$ zeigt die erste Form

$$(-1)^{n-1} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{1+\theta x} \right)^n,$$

in welcher $\frac{x}{1+\theta x}$ sicher ein echter Bruch ist*), daß

*) Denn θ kann weder 0 noch 1 sein.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$. Bei negativem x , sobald dessen absoluter Wert $\frac{1}{1+\theta}$ überschreitet, versagt die Formel. Schreibt man dann die zweite Formel, $-|x|$ für x setzend, in der Gestalt

$$-\frac{1}{1-\theta} \left(\frac{|x| - \theta|x|}{1-\theta|x|} \right)^n,$$

so zeigt sich, daß für $|x| < 1$ der eingeklammerte Bruch wieder echt ist, daß auch jetzt $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$.

Die Gleichung (24) besteht also zurecht, solange

$$-1 < x \leq +1$$

und gibt auch an der oberen Grenze den entsprechenden Wert der Funktion (86), nämlich

$$l2 = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

Für positive x ist die Reihe in (24) alternierend und hat für negative Werte durchwegs negative Glieder; vermöge ihres Geltungsbereiches läßt sie nur die Berechnung der natürlichen Logarithmen aller Zahlen aus dem Intervall $(0, 2)$ zu. Aus diesem Grunde und wegen ihrer schwachen Konvergenz ist sie zur Berechnung der Logarithmen nicht unmittelbar geeignet.

Um zu einer Reihe zu gelangen, welche die Berechnung der Logarithmen aller Zahlen gestattet, verbinde man die beiden Gleichungen

$$l(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$l(1-x) = -\frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

durch Subtraktion; dadurch entsteht (71, 2):

$$l \frac{1+x}{1-x} = 2 \left[\frac{x}{1} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right],$$

und hier kann $\frac{1+x}{1-x}$ bei $0 < x < 1$ jede noch so große die Einheit übertreffende Zahl, bei $-1 < x < 0$ jeden positiven echten Bruch vorstellen. Setzt man

$$\frac{1+x}{1-x} = \frac{a+x}{a} \quad (a > 0),$$

so wird

$$x = \frac{2x}{2a+x}$$

und die letzte Gleichung gibt

$$(25) \quad l(a+z) = la + 2 \left[\frac{z}{2a+z} + \frac{1}{3} \left(\frac{z}{2a+z} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{z}{2a+z} \right)^5 + \dots \right],$$

insbesondere für $z = 1$

$$(26) \quad l(a+1) = la + 2 \left[\frac{1}{2a+1} + \frac{1}{3(2a+1)^3} + \frac{1}{5(2a+1)^5} + \dots \right].$$

Formel (25) gestattet, mit Hilfe von la den Logarithmus jeder anderen Zahl zu berechnen; (26) ist geeignet, die natürlichen Logarithmen der aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen zu bestimmen; insbesondere gibt sie für $a = 1$

$$l2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} + \dots \right),$$

eine Reihe, die viel rascher konvergiert als die oben für $l2$ angegebene alternierende Reihe. Bei wirklicher Ausrechnung einer Logarithmentafel würde man selbstverständlich nur die Logarithmen der Primzahlen direkt bestimmen und aus ihnen durch Addition die Logarithmen der zusammengesetzten Zahlen ableiten.

Um aus den natürlichen Logarithmen die gemeinen zu gewinnen, bedarf es der Multiplikation der ersteren mit dem Modul $M = \frac{1}{l10}$ (30). Für $l10$ ergibt sich auf folgende Weise eine Bestimmung durch unendliche Reihen. Setzt man in (25)

$$a = 2^{10} = 1024, \quad z = -24,$$

so ergibt sich mit Rücksicht auf die für $l2$ soeben gefundene Reihe die Gleichung

$$l10 = \left. \begin{aligned} & \frac{20}{3} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} + \dots \right) \\ & - \frac{2}{3} \left(\frac{3}{253} + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{253} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{3}{253} \right)^5 + \dots \right) \end{aligned} \right\} = \frac{20}{3} A - \frac{2}{3} B,$$

in welcher die zweite Reihe so rasch konvergiert, daß verhältnismäßig nur sehr wenige Glieder zur Erzielung einer vorgegebenen Annäherung erforderlich sind. Bei einer auf 6 Dezimalen angelegten Rechnung hat man:

$$\frac{1}{3} = 0,33333333$$

$$\frac{1}{3 \cdot 3^2} = 0,012345679$$

$$\frac{1}{5 \cdot 3^2} = 0,000823045$$

$$\frac{1}{7 \cdot 3^2} = 0,000065321$$

$$\frac{3}{253} = 0,011857707$$

$$\frac{1}{9 \cdot 3^2} = 0,000005645$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{3}{253} \right)^3 = 0,000000555$$

$$\frac{1}{11 \cdot 3^{11}} = 0,000000513$$

$$B = 0,011858\bar{2}62$$

$$\frac{1}{13 \cdot 3^{13}} = 0,000000048$$

$$\frac{2}{3} B = 0,007905508$$

$$\frac{1}{15 \cdot 3^{15}} = 0,000000004$$

$$A = 0,346573588$$

$$\frac{20}{3} A = 2,310490586$$

Da A um weniger als 8 Einheiten der neunten Stelle zu klein*), so ist $\frac{20}{3} A$ um weniger als 54 Einheiten der neunten Stelle zu klein; B ist um weniger als 2 Einheiten der neunten Stelle zu klein, daher auch $\frac{2}{3} B$; folglich ist

$$\frac{20}{3} A - \frac{2}{3} B = 2,302585078$$

dem strengen Betrage gegenüber um weniger als 52 Einheiten der niedrigsten Stelle zu klein, der strenge Wert kann also nicht größer sein als

$$2,302585130,$$

aber auch nicht kleiner als die erstgefundene Zahl, so daß mit Sicherheit

$$l_{10} = 2,302585 \dots$$

und

$$M = 0,434294 \dots$$

(vgl. 30).

98. Die Binomialreihe. Schließt man in der Funktion

$$F(x) = (a + x)^m$$

*) Als Summe von 8 bei der neunten Stelle *abgebrochenen* Dezimalbrüchen.

den Fall, daß m eine *positive ganze Zahl* sei, aus und setzt a sowohl als $a + z$ positiv voraus, so hat $F'(z)$ bei jedem m auch einen positiven reellen Wert und dieser läßt sich als Produkt der reellen Faktoren

$$a^m \cdot \left(1 + \frac{z}{a}\right)^m$$

darstellen, wovon nur der zweite veränderlich ist. Wird $\frac{z}{a} = x$ gesetzt, so handelt es sich also um die Entwicklung von

$$f(x) = (1 + x)^m.$$

Laut 41, (2) ist

$$f^{(n)}(x) = m(m-1) \dots (m-n+1)(1+x)^{m-n},$$

daher

$$f(0) = 1, \quad f^{(n)}(0) = m(m-1) \dots (m-n+1);$$

hiermit liefert die Maclaurinsche Reihe die Entwicklung:

$$(27) \quad (1+x)^m = 1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^3 + \dots,$$

welche man als *Binomialreihe* oder binomische Reihe bezeichnet. Für ihre Koeffizienten, die Binomialkoeffizienten, sind verschiedene Abkürzungen im Gebrauch, so m_1, m_2, m_3, \dots oder $\binom{m}{1}, \binom{m}{2}, \binom{m}{3}, \dots$ u. a. Es erübrigt noch, den Geltungsbereich dieses Ansatzes festzustellen.

Zunächst ist das Konvergenzintervall der Reihe zu bestimmen; schreibt man sie in der allgemeinen Form $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$, so ist

$$a_n = m_n = \frac{m(m-1) \dots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \dots n}, \quad a_{n+1} = m_{n+1} = \frac{m(m-1) \dots (m-n)}{1 \cdot 2 \dots (n+1)},$$

infolgedessen

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{m-n} = 1,$$

daher $(-1, +1)$ das Konvergenzintervall (84). Nur auf dieses braucht die Untersuchung des Restgliedes beschränkt zu werden, das sich in den Formen:

$$R_n = \frac{m(m-1) \dots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \dots n} (1 + \theta x)^{m-n} x^n$$

$$R_n = \frac{m(m-1) \dots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} (1 - \theta)^{n-1} (1 + \theta x)^{m-n} x^n$$

darstellen läßt.

I. Ist $|x| < 1$, so zerlege man das Restglied in seiner zweiten Form in die Faktoren

$$(1 + \theta x)^{m-1}, \quad \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^{n-1}, \quad p_n = \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} x^n;$$

der erste hängt von n nicht ab und hat einen endlichen Wert; der zweite konvergiert gegen die Grenze Null, weil, gleichgültig, ob x positiv oder negativ, $\frac{1-\theta}{1+\theta x}$ ein echter Bruch ist; es bleibt also noch zu untersuchen, wie sich der Faktor p_n bei beständig wachsendem n verhält. Erhöht man in diesem Faktor n um eine Einheit, so wird

$$p_{n+1} = \frac{m-n}{n} x p_n,$$

also ist

$$\frac{p_{n+1}}{p_n} = \frac{m-n}{n} x;$$

mit wachsendem n nähert sich die rechte Seite der Grenze $-x$; folglich muß sich zu einer positiven Zahl q , welche der Bedingung $|x| < q < 1$ genügt, ein Zeigerwert ν bestimmen lassen derart, daß $\left|\frac{p_{n+1}}{p_n}\right| < q$, solange $n \geq \nu$; infolgedessen ist also

$$\begin{aligned} |p_{\nu+1}| &< |p_\nu| q \\ |p_{\nu+2}| &< |p_{\nu+1}| q < |p_\nu| q^2 \\ |p_{\nu+3}| &< |p_{\nu+2}| q < |p_\nu| q^3, \\ &\dots \end{aligned}$$

die Reihe

$$|p_{\nu+1}| + |p_{\nu+2}| + |p_{\nu+3}| + \dots$$

daher konvergent, weil eine fallende geometrische Reihe als ihre Majorante nachgewiesen ist; daraus folgt

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0.$$

Daher ist auch $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$ und der Ansatz (27) bei jedem m gültig, solange $|x| < 1$.

II. Für $x = +1$ zerlege man das Restglied in seiner ersten Form in die Faktoren

$$(1 + \theta)^m, \quad \frac{1}{(1 + \theta)^n}, \quad R_n = (-1)^n \cdot \frac{m}{1} \cdot \frac{m+1}{2} \cdots \frac{m+n-1}{n};$$

der erste hängt von n nicht ab und hat einen endlichen Wert; der zweite konvergiert mit wachsendem n gegen die Grenze Null; der dritte verwandelt sich, von dem das Vorzeichen bestimmenden Faktor $(-1)^n$ abgesehen, für $\lim n = +\infty$ in das unendliche Produkt

$$\left(1 - \frac{m+1}{1}\right) \left(1 - \frac{m+1}{2}\right) \left(1 - \frac{m+1}{3}\right) \dots,$$

das (79, 2)) gegen die Grenze Null divergiert, wenn

$$(28) \quad m+1 > 0, \text{ also } m > -1$$

ist, während es gegen die Grenze $+\infty$ divergieren würde, sobald $m+1$ negativ wäre; *nur in dem ersten Falle* ist

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$$

und die Reihe

$$(29) \quad 1 + \frac{m}{1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

nicht allein als konvergent, sondern auch 2^m als ihr Grenzwert erwiesen.

III. Für $x = -1$ zerfällt das Restglied in seiner zweiten Form in die Faktoren

$$m(1-\theta)^{m-1}, \quad II'_{n-1} = (-1)^{n-1} \frac{m+1}{1} \cdot \frac{m+2}{2} \dots \frac{m+n-1}{n-1};$$

der erste hat einen endlichen Wert, der zweite geht, vom Vorzeichen abgesehen, für $\lim n = +\infty$ in das unendliche Produkt

$$\left(1 - \frac{m}{1}\right) \left(1 - \frac{m}{2}\right) \left(1 - \frac{m}{3}\right) \dots$$

über, das gegen die Grenze Null divergiert, wenn

$$(30) \quad m > 0,$$

hingegen $+\infty$ wird, wenn m negativ ist; *nur in dem ersten Falle* ist

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$$

und die Reihe

$$(31) \quad 1 - \frac{m}{1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} - \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots$$

nicht allein als konvergent, sondern auch 0 als ihr Grenzwert erwiesen.

Das Gesamtergebnis der Untersuchung läßt sich in folgendem zusammenfassen: *Die Binomialreihe*

$$1 + \frac{m}{1} x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} x^2 + \dots$$

ist für $|x| < 1$ bei jedem m konvergent und $(1+x)^m$ ihr Grenzwert; für $x=1$ konvergiert sie nur, wenn m dem Intervall $(-1, +\infty)$ angehört, und 2^m ist dann ihr Grenzwert; für $x=-1$ konvergiert sie nur, wenn m dem Intervall $(0, +\infty)$ entnommen ist und hat den Grenzwert 0.

Von der Binomialreihe wird im praktischen Rechnen bei der Ausziehung von Wurzeln Gebrauch gemacht. Um $\sqrt[p]{A}$ zu berechnen, bestimme man die der Zahl A zunächstliegende p -te Potenz a^p , so daß $A = a^p \pm \alpha$ und $\alpha < a^p$; dann ist

$$\begin{aligned} \sqrt[p]{A} &= a \sqrt[p]{1 \pm \frac{\alpha}{a^p}} \\ &= a \left[1 \pm \frac{1}{p} \frac{\alpha}{a^p} - \frac{p-1}{1 \cdot 2 p^2} \left(\frac{\alpha}{a^p} \right)^2 \pm \frac{(p-1)(2p-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 p^3} \left(\frac{\alpha}{a^p} \right)^3 - \dots \right]; \end{aligned}$$

je kleiner $\frac{\alpha}{a^p}$, um so rascher konvergiert die Reihe. Um die Konvergenz zu verstärken, kann man $\sqrt[p]{A}$ in $\frac{1}{k} \sqrt[p]{k^p A}$ umgestalten und dann die Entwicklung für $\sqrt[p]{k^p A}$ vornehmen.

Für $\sqrt{2}$ ergibt sich aus (29), wenn man $m = \frac{1}{2}$ setzt, unmittelbar die Reihe

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} - \dots,$$

welche jedoch wegen ihrer langsamen Konvergenz zur wirklichen Ausrechnung nicht gut geeignet ist; dagegen ist

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= \frac{1}{5} \sqrt{50} = \frac{1}{5} \sqrt{7^2 + 1} \\ &= \frac{7}{5} \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{49} - \frac{1}{2 \cdot 4} \frac{1}{49^2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{49^3} - \dots \right); \end{aligned}$$

die Ausführung gestaltet sich so:

$$\begin{array}{rcl} 1 & = & 1,000000000 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{49} & = & 0,010204080 \\ \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{49^3} & = & 0,000000531 \\ \hline & & 1,010204611 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} \frac{1}{2 \cdot 4} \frac{1}{49^2} & = & 0,000052061 \\ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \frac{1}{49^4} & = & 0,000000006 \\ \hline & & 0,000052067 \end{array}$$

Die Differenz der beiden Summen mit $\frac{7}{5}$ multipliziert gibt die Zahl 1,414213556, deren letzte Stelle um weniger als zwei Einheiten zu klein ist, so daß $\sqrt{2}$ notwendig zwischen 1,414213556 und 1,414213558 liegt; auf acht Stellen abgekürzt ist also

$$\sqrt{2} = 1,41421356.$$

99. Zyklometrische Reihen. 1) Die Funktion

$$f(x) = \arctan x$$

und ihr n -ter Differentialquotient (41, (10))

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 2 \dots (n-1)}{2i} \left(\frac{1}{(x-i)^n} - \frac{1}{(x+i)^n} \right)$$

sind auf dem ganzen Gebiete der reellen Zahlen stetig und insbesondere ist (33, 3))

$$f(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1} 1 \cdot 2 \dots (n-1)}{2i} \left(\frac{1}{(-i)^n} - \frac{1}{i^n} \right),$$

daher

$$f^{(2p)}(0) = 0,$$

$$f^{(4q+1)}(0) = \frac{1 \cdot 2 \dots (4q)}{2i} \cdot \frac{-2}{i} = 1 \cdot 2 \dots (4q)$$

$$f^{(4q+3)}(0) = \frac{1 \cdot 2 \dots (4q+2)}{2i} \cdot \frac{2}{i} = -1 \cdot 2 \dots (4q+2).$$

Setzt man die aus diesen allgemeinen Formeln für $f'(0)$, $f'''(0)$, ... sich ergebenden Werte in die Maclaurinsche Reihe ein, so ergibt sich:

$$(32) \quad \arctan x = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots,$$

vorbehaltlich der erst zu erweisenden Konvergenz des Restgliedes gegen die Grenze Null. Dieses Restglied hat zufolge 93, (13) den allgemeinen Ausdruck:

$$R_n = \frac{(-1)^{n-1} x^n}{2ni} \left(\frac{1}{(\theta x - i)^n} - \frac{1}{(\theta x + i)^n} \right);$$

trennt man in $\frac{1}{(\theta x - i)^n}$ das Reelle von dem Imaginären, so sei

$$\frac{1}{(\theta x - i)^n} = u + vi,$$

dann ist notwendig

$$(\theta x + i)^n = u - v i$$

und hiermit

$$R_n = \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} v;$$

der gemeinsame absolute Wert von $\theta x - i$ und $\theta x + i$ ist $|\sqrt{\theta^2 x^2 + 1}|$, daher der gemeinsame absolute Wert von $u + v i$ und $u - v i$ einerseits gleich $\frac{1}{(|\sqrt{\theta^2 x^2 + 1}|)^n}$, andererseits gleich $\sqrt{u^2 + v^2}$, woraus folgt, daß

$$|v| \leq \frac{1}{(|\sqrt{\theta^2 x^2 + 1}|)^n}$$

und

$$|R_n| \leq \frac{1}{n} \left(|\sqrt{\frac{x^2}{\theta^2 x^2 + 1}}| \right)^n.$$

Ist nun $x^2 \leq 1$, so ist der Bruch $\frac{x^2}{\theta^2 x^2 + 1}$ echt und es konvergiert die rechtsstehende Größe mit beständig wachsendem n gegen den Grenzwert Null; daher ist auch

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0.$$

Für $x^2 > 1$ ist die Untersuchung überflüssig, weil dann die Reihe in (32) aufhört konvergent zu sein.

Der Bereich, auf welchem der Ansatz (32) Geltung hat, ist also durch

$$(33) \quad -1 \leq x \leq +1$$

gekennzeichnet.

Für $x = 1$ ergibt sich die Leibniz zugeschriebene Reihe*)

$$(34) \quad \frac{\pi}{4} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots,$$

welche jedoch zur wirklichen Berechnung eines genaueren Näherungswertes von π wegen ihrer außerordentlich langsamen Konvergenz nicht geeignet ist. Für diesen Zweck empfiehlt

*) 1673 gefunden und in den *Acta eruditorum* für 1682 veröffentlicht. Vor ihm schon (1671) hatte sie wie auch die Reihe (32) J. Gregory aufgestellt.

sich das folgende von John Machin angegebene Verfahren.*)
Es sei α ein Bogen, dessen Tangens ein kleiner rationaler
echter Bruch a ist; dann ergeben sich für

$$\operatorname{tg} 2\alpha, \operatorname{tg} 3\alpha, \dots \operatorname{tg} n\alpha$$

nach bekannten trigonometrischen Formeln ebenfalls rationale
Brüche; man schreite in der Bildung derselben so weit vor,
bis man der Einheit von der einen oder anderen Seite mög-
lichst nahe kommt; sei beispielsweise

$$\operatorname{tg} n\alpha = b > 1,$$

dann ist $n\alpha > \frac{\pi}{4}$,

$$\operatorname{tg}\left(n\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\operatorname{tg} n\alpha - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}}{1 + \operatorname{tg} n\alpha \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}} = \frac{b - 1}{1 + b} = c$$

ebenfalls eine rationale Zahl und

$$\frac{\pi}{4} = n\alpha - \arctan c = n \arctan a - \arctan c,$$

d. h. auf Grund von (32)

$$\frac{\pi}{4} = n \left(\frac{a}{1} - \frac{a^3}{3} + \frac{a^5}{5} - \dots \right) - \left(\frac{c}{1} - \frac{c^3}{3} + \frac{c^5}{5} - \dots \right).$$

Mit $a = \frac{1}{5}$ erhält man

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\frac{2}{5}}{1 - \frac{1}{5^2}} = \frac{5}{12}, \quad \operatorname{tg} 4\alpha = \frac{\frac{5}{6}}{1 - \left(\frac{5}{12}\right)^2} = \frac{120}{119} = b > 1,$$

$$\operatorname{tg}\left(4\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\frac{120}{119} - 1}{1 + \frac{120}{119}} = \frac{1}{239},$$

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= 4 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3 \cdot 5^3} + \frac{1}{5 \cdot 5^5} - \dots \right) \\ &\quad - \left(\frac{1}{239} - \frac{1}{3 \cdot 239^3} + \frac{1}{5 \cdot 239^5} - \dots \right); \end{aligned}$$

*) 1706 in Jone's *Synopsis palmariorum matheseos* mit einem auf
100 Dezimalen berechneten Näherungswert von π mitgeteilt; der Buch-
stabe π findet hier zum erstenmal Anwendung in diesem Sinne; all-
gemeinen Eingang verschaffte ihm erst Euler. Die Berechnung von π
ist später bis zu 707 Dezimalen geführt worden.

die erste Reihe kann mittels folgender Bemerkung durch rascher konvergierende Reihen ersetzt werden; aus

$$\operatorname{tg} \alpha' = \frac{1}{10}$$

folgt

$$\operatorname{tg} 2\alpha' = \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{10^2}} = \frac{20}{99} > a,$$

daher ist

$$\operatorname{tg} (2\alpha' - \alpha) = \frac{\frac{20}{99} - \frac{1}{5}}{1 + \frac{20}{99} \cdot \frac{1}{5}} = \frac{1}{515}$$

$$\alpha = 2\alpha' - \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{515} = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{10} - \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{515},$$

so daß also

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= 8 \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{3 \cdot 10^3} + \frac{1}{5 \cdot 10^5} - \dots \right) \\ &\quad - 4 \left(\frac{1}{515} - \frac{1}{3 \cdot 515^3} + \frac{1}{5 \cdot 515^5} - \dots \right) \\ &\quad - \left(\frac{1}{239} - \frac{1}{3 \cdot 239^3} + \frac{1}{5 \cdot 239^5} - \dots \right) \\ &= 8A - 4B - C. \end{aligned}$$

Diese Formel gibt schon bei geringer Rechnung eine zureichende Bestimmung für π , wie die folgende Zusammenstellung zeigt:

$\frac{1}{10} =$	0,100000000	$\frac{1}{515} =$	0,001941747
$\frac{1}{5 \cdot 10^3} =$	0,000002000	$-\frac{1}{3 \cdot 515^3} =$	- 0,000000002
$-\frac{1}{3 \cdot 10^5} =$	- 0,000333333	$B =$	0,001941745
$-\frac{1}{7 \cdot 10^7} =$	- 0,000000014	$\frac{1}{239} =$	0,004184100
$A =$	0,099668653	$-\frac{1}{3 \cdot 239^3} =$	- 0,000000024
		$C =$	0,004184076

$$8A - 4B - C = 0,785398168.$$

A ist um weniger als 2 Einheiten der niedrigsten Stelle zu groß, B und ebenso C um weniger als eine Einheit zu groß oder zu klein; daher $8A - 4B - C$ um weniger als 21 Einheiten und das 4fache davon um weniger als 84 Einheiten zu

groß, so daß π zwischen 3,141592672 und ... 588 liegt; auf 6 Stellen abgekürzt ist daher

$$\pi = 3,141592.$$

Der Beweis, daß die Zahl π ebenso wie die Zahl e eine transzendente Zahl ist (95), gelang erst in jüngster Zeit (Lindemann).*) Damit war auch dargetan, daß die Aufgabe der Verwandlung eines Kreises in ein gleich großes Quadrat, die *Quadratur des Zirkels*, mit Lineal und Zirkel nicht gelöst werden kann.

2) Zur Entwicklung der Funktion

$$f(x) = \arcsin x$$

bedienen wir uns eines Verfahrens, von dem in früherer Zeit bei der Potenzreihenentwicklung vorgelegter Funktionen hauptsächlich Gebrauch gemacht wurde, ehe noch die Methode der unbestimmten Koeffizienten, auf der es beruht, streng begründet war.

Wenn eine Entwicklung existiert, so hat sie die Form:

$$\arcsin x = a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots,$$

weil $\arcsin 0 = 0$ ist (33, 1)), und weiter gilt (88):

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 a_1 + 2 a_2 x + 3 a_3 x^2 + \dots;$$

beide Reihen haben denselben Konvergenzbereich; andererseits ist auf Grund von 98 für $x^2 < 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^6 + \dots;$$

die beiden letzten Gleichungen haben zur notwendigen Folge (89):

$$a_{2n} = 0, \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$1 a_1 = 1, \quad 3 a_3 = \frac{1 \cdot 3}{2}, \quad 5 a_5 = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}, \dots (2n+1) a_{2n+1} = \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots (2n)},$$

woraus

$$a_1 = \frac{1}{1}, \quad a_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}, \quad a_5 = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{5}, \dots a_{2n+1} = \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1}.$$

*) Mathematische Annalen, 20. Bd. (1882).

Durch Einsetzung dieser Werte in die supponierte Reihe ergibt sich die verlangte Entwicklung:


$$(35) \quad \arcsin x = \frac{x}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \dots,$$

welche gleichfalls Geltung hat, solange $-1 < x < +1$; sie gilt auch noch für $x = -1$ und $x = +1$, weil sie auch für diese Werte konvergiert. Auch sie kann zur Berechnung von x verwendet werden (mit $x = \frac{1}{2}$ z. B. gibt sie für $\frac{\pi}{6}$, mit $x = 1$ für $\frac{\pi}{2}$ eine konvergente Reihe), ist aber hierzu weniger geeignet als (32).

100. Die Formeln von Taylor und Maclaurin für Funktionen mehrerer Variablen. Zum Schlusse dieses Paragraphen möge die Aufgabe, welche die Taylorsche Formel für Funktionen einer Variablen löst, für Funktionen mehrerer Variablen gestellt und gelöst werden: Ist nämlich $f(x, y, \dots)$ eine Funktion mehrerer unabhängigen Variablen, so soll $f(x+h, y+k, \dots)$ in eine nach positiven Potenzen und Produkten solcher Potenzen von h, k, \dots fortschreitende Reihe entwickelt werden, sofern eine solche Entwicklung überhaupt möglich ist.

Es genügt, die Untersuchung für eine Funktion zweier Variablen, $f(x, y)$, zu führen, weil die Ausdehnung auf mehr als zwei Variable aus dem Gange derselben unmittelbar sich ergibt.

Der Wertverbindung x/y , von welcher ausgegangen wird und die dem Gebiete P angehören muß, auf welchem die Funktion gegeben ist, entspreche der Punkt M (Fig. 18), der Wertverbindung $x+h/y+k$ der Punkt M_1 ; verfolgt man die Funktion längs der Geraden, welche M und M_1 verbindet, so verhält sie sich wie eine Funktion einer Variablen. Sind nämlich φ, ψ die Richtungswinkel von $M(S)$ (47); s der von einem festen Punkte M_0 mit den Koordinaten x_0/y_0 gemessene Abstand M_0M , welcher positiv oder negativ gezählt wird, je



nachdem M_0M die Richtung $M_0(S)$ oder die entgegengesetzte Richtung hat; $\Delta s = MM_1$; so ist

$$(36) \quad \begin{cases} x = x_0 + s \cos \varphi & h = \Delta s \cos \varphi \\ y = y_0 + s \cos \psi & k = \Delta s \cos \psi \end{cases}$$

und

$$(37) \quad \begin{cases} f(x, y) = f(x_0 + s \cos \varphi, y_0 + s \cos \psi) = F(s) \\ f(x+h, y+k) = f(x_0 + (s + \Delta s) \cos \varphi, y_0 + (s + \Delta s) \cos \psi) \\ \quad = F(s + \Delta s). \end{cases}$$

Ist nun $F(s)$ in einem Intervalle, das die Werte s und $s + \Delta s$ einschließt, eindeutig und endlich, und besitzt es daselbst vollständige bestimmte Differentialquotienten bis zur n -ten Ordnung einschließlich, so gilt nach 91, (6) und (7), der Ansatz:

$$(38) \quad \begin{cases} F(s + \Delta s) = F(s) + \frac{F'(s)}{1} \Delta s + \frac{F''(s)}{1 \cdot 2} \Delta s^2 + \dots \\ \quad + \frac{F^{(n-1)}(s)}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} \Delta s^{n-1} + \frac{F^{(n)}(s + \theta \Delta s)}{1 \cdot 2 \dots n} \Delta s^n \\ \quad 0 < \theta < 1. \end{cases}$$

$F'(s), F''(s), \dots$ sind aber die aufeinanderfolgenden totalen Differentialquotienten der Funktion $f(x, y)$ in der Richtung (S): für sie wurden in 47, 54 in einer dort erklärten symbolischen Schreibweise die Ausdrücke gefunden:

$$\begin{aligned} F'(s) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial}{\partial y} \cos \psi \right) f(x, y) \\ F''(s) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial}{\partial y} \cos \psi \right)^2 f(x, y) \\ &\dots \dots \dots \\ F^{(n-1)}(s) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial}{\partial y} \cos \psi \right)^{n-1} f(x, y); \end{aligned}$$

daraus folgt nach Multiplikation mit $\Delta s, \Delta s^2, \dots \Delta s^{n-1}$ unter Rücksichtnahme auf (36):

$$(39) \quad \begin{cases} F'(s) \Delta s = \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right) f(x, y) \\ F''(s) \Delta s^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right)^2 f(x, y) \\ \dots \dots \dots \\ F^{(n-1)}(s) \Delta s^{n-1} = \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right)^{n-1} f(x, y); \end{cases}$$

da schließlich vermöge (37) und (36)

$$\begin{aligned} F(s + \theta \Delta s) &= f[x_0 + (s + \theta \Delta s) \cos \varphi, y_0 + (s + \theta \Delta s) \cos \psi] \\ &= f(x + \theta h, y + \theta k), \end{aligned}$$

so ist

$$(40) \quad F^{(n)}(s + \theta \Delta s) \Delta s^n = \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right)^n f(x + \theta h, y + \theta k).$$

Trägt man die Werte aus (37), (39) und (40) in (38) ein, so ergibt sich:

$$(41) \quad \left\{ \begin{aligned} f(x + h, y + k) &= f(x, y) + \frac{1}{1} \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right) f(x, y) \\ &+ \frac{1}{1 \cdot 2} \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right)^2 f(x, y) + \dots \\ &+ \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right)^{n-1} f(x, y) \\ &+ \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} \left(\frac{\partial}{\partial x} h + \frac{\partial}{\partial y} k \right)^n f(x + \theta h, y + \theta k). \end{aligned} \right.$$

Dies ist die *Taylor'sche Formel* für die Funktion $f(x, y)$. Zureichende Bedingungen für ihre Gültigkeit bestehen darin, daß die Funktion $f(x, y)$ in einem Intervalle auf $M_0(S)$, das die Wertverbindungen x/y und $x + h/y + k$ einschließt, eindeutig und endlich ist, und daß alle partiellen Differentialquotienten bis zur n -ten Ordnung einschließlich in dem genannten Intervall vorhanden, die der letztgenannten Ordnung auch stetig sind.

Gehört die Stelle $x = 0/y = 0$ dem Gebiete P an, auf welchem die Funktion $f(x, y)$ gegeben ist, so kann sie zum Ausgangspunkte der Entwicklung genommen werden; ersetzt man dann h, k , um sie als variable Größen zu kennzeichnen, durch x, y , so geht die Formel (41) über in:

$$(42) \quad \left\{ \begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + \frac{1}{1} \left(\frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y \right) f(0, 0) \\ &+ \frac{1}{1 \cdot 2} \left(\frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y \right)^2 f(0, 0) + \dots \\ &+ \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} \left(\frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y \right)^{n-1} f(0, 0) \\ &+ \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} \left(\frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y \right)^n f(\theta x, \theta y), \end{aligned} \right.$$

die *Maclaurinsche Formel* für $f(x, y)$.

Um keinen Zweifel über die Bedeutung der Glieder in (41) und (42) zu lassen, sei bemerkt, daß beispielsweise

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}h + \frac{\partial}{\partial y}k\right)^2 f(x, y)$$

den Ausdruck

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} h k + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} k^2$$

vorstellt, die Differentialquotienten sämtlich an der Stelle x/y genommen,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}x + \frac{\partial}{\partial y}y\right)^2 f(0, 0)$$

den Ausdruck

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} x^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} xy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} y^2,$$

die Differentialquotienten sämtlich an der Stelle $0/0$ genommen, usw.

Die Bedingungen für die Ausdehnung der Formeln (41) und (42) zu unendlichen Reihen brauchen nach den Ausführungen in 92 und 94 nicht besonders angeführt zu werden.

Hiermit erfährt der Begriff der Potenzreihe eine Erweiterung von einer auf zwei und mehrere Variablen. Die Maclaurinsche Reihe gibt die Vorschrift an, nach der eine vorgelegte Funktion $f(x, y)$, sofern sie dazu fähig ist, in eine nach x und y fortschreitende Potenzreihe $\mathfrak{P}(x, y)$ zu entwickeln ist; andererseits treten zu den elementaren (in endlicher Form darstellbaren) Funktionen zweier Variablen solche hinzu, die durch die Grenzwerte konvergenter Potenzreihen $\mathfrak{P}(x, y)$ in deren Konvergenzgebiet definiert sind. So auch für mehr als zwei Variable.

§ 4. Die elementaren Funktionen einer komplexen Variablen.

101. Begriff der Funktion einer komplexen Variablen. Unter der komplexen Variablen z versteht man das Aggregat $x + yi$, worin x und y reelle stetige Variablen bedeuten. Da beide als voneinander unabhängig aufgefaßt werden, so ist die Menge der Werte von z durch ∞^2 zu bezeichnen. Zum Nullwerden von z ist $x = 0$, $y = 0$ erforderlich; dagegen wird z unendlich, auch wenn nur eine der Variablen x, y unendlich wird.

Stellt man die Wertverbindung x/y durch einen Punkt im rechtwinkligen Koordinatensystem $O(XY)$ dar, so kann dieser auch als Darstellung der komplexen Variablen z angesehen werden; in diesem Sinne soll die Ebene $O(XY)$ als z -Ebene bezeichnet werden. Der Bereich P , welcher der Verbindung x/y zugewiesen wird, ist zugleich der Bereich von z .

Führt man mit z und etwaigen, reellen oder komplexen, Konstanten einen bestimmten (algebraischen) Rechnungsprozeß aus, so ist das Resultat w desselben, eine Funktion von z , darstellbar in der Form einer komplexen Größe $u + vi$, worin u, v *reelle* Funktionen von x, y bedeuten; wir schreiben dies in der Form an:

$$w = f(z) = u + vi.$$

Aber nicht jeder aus zwei Funktionen u, v von x, y gebildete Ausdruck $u + vi$ soll als Funktion von $x + yi$ gelten; vielmehr soll dies nur unter einer sogleich zu entwickelnden Bedingung stattfinden. Vorher sei noch bemerkt, daß die Stetigkeit von $f(z)$ in derselben Weise erklärt wird wie bei einer Funktion einer reellen Variablen, wobei man den absoluten Wert einer komplexen Zahl in dem in 6 angegebenen Sinne zu verstehen hat. Insbesondere ist leicht zu zeigen, daß $f(z)$ stetig ist, sobald es u und v sind, was wir denn auch für den ganzen Bereich P voraussetzen wollen. Überdies nehmen wir an, daß u, v daselbst auch stetige partielle Differentialquotienten nach x und y besitzen.

Als Funktion von x, y aufgefaßt, hat $f(z) = u + vi$ unter den gemachten Voraussetzungen in der durch die Winkel φ, ψ gekennzeichneten Richtung den totalen Differentialquotienten (46):

$$\frac{dw}{ds} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cos \varphi + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cos \psi;$$

in bezug auf z also, weil $dz = ds (\cos \varphi + i \cos \psi)$, den Differentialquotienten:

$$\frac{dw}{dz} = \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \cos \varphi + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \cos \psi}{\cos \varphi + i \cos \psi};$$

soll dieser *unabhängig* sein von der Richtung, nach welcher man sich in der z -Ebene von dem Punkte x/y aus bewegt, mit

andern Worten: soll $f(z)$ als Funktion von z an der betrachteten Stelle geradeso wie eine Funktion einer reellen Variablen nur *einen* bestimmten Differentialquotienten haben, so muß:

$$\frac{\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}}{1} = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y}}{i}$$

sein; denn alsdann ist

$$(1) \quad \frac{dw}{dz} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \text{ oder } -\frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

frei von φ, ψ ; die obige Bedingung führt aber zu den Gleichungen:

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{aligned}$$

Eine stetige Funktion $w = u + vi$, in welcher u, v den Bedingungen (2) entsprechen, heißt eine *analytische Funktion*, und nur eine solche wird als eine *Funktion der komplexen Variablen* $x + yi$ betrachtet. Die Gleichungen (2) heißen die *Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen*.

Besitzen die Funktionen u, v auch stetige Differentialquotienten zweiter Ordnung*), so folgt aus (2):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \end{aligned}$$

und hieraus nach 52

$$(3) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

und eine analoge Gleichung ergibt sich für v . Diese Gleichung, die *Laplacesche Differentialgleichung* genannt, ist grundlegend für die Theorie der analytischen Funktionen. Man nennt Funktionen, die ihr genügen, *harmonische Funktionen*, und ein Funktionenpaar, das den Gleichungen (2) genügt, bezeichnet man als ein Paar *konjugierter Funktionen*; ein solches ist also zur Bildung einer analytischen Funktion geeignet.

*) Eine weitere Ausführung dieser Theorie zeigt, daß dies eine notwendige Folge der Existenz und Stetigkeit der ersten Differentialquotienten ist.

Wie aus (1) zu ersehen, ist der absolute Wert von $\frac{dw}{dz}$ durch die positive Wurzel aus $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2$ oder aus $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2$ ausdrückbar, daher ist

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2,$$

eine Beziehung, die auch unmittelbar aus (2) zu erschließen ist.

102. Konforme Abbildung. Faßt man auch u/v als rechtwinklige Koordinaten eines Punktes in einer zweiten Ebene, der „ w -Ebene“ auf, so ist durch

$$w = f(x + yi) = u + vi$$

eine Zuordnung der Punkte der beiden Ebenen, der z -Ebene und der w -Ebene, vermittelt oder eine *Abbildung* der z -Ebene auf die w -Ebene bestimmt. Beschreibt der Punkt x/y im Gebiete P eine Linie, so beschreibt infolge der Stetigkeit von f auch der Punkt u/v eine Linie in seiner Ebene. Es soll nun untersucht werden, von welcher Art diese Abbildung bei einer analytischen Funktion ist.

Zu diesem Zwecke gehen wir von dem Differential der Funktion $f(z)$ aus, das den Ausdruck hat:

$$dw = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}\right) (dx + i dy).$$

Bewegt man den Punkt $M(x/y)$ bei festbleibendem y um die sehr kleine Strecke dx parallel der x -Achse nach $M_1(x + dx/y)$, so ist $dy = 0$ und die zugehörige Bewegung des Bildes also durch

$$d_x w = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}\right) dx$$

bestimmt; daraus liest man den Richtungskoeffizienten dieser Bewegung ab:

$$(4) \quad \frac{\partial v}{\partial x} : \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Bewegt man $M(x/y)$ sodann bei festbleibendem x nach $M_2(x/y + dy)$, so ist $dx = 0$ und die zugehörige Bewegung des Bildes ist durch

$$d_y w = \left(-\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial x}\right) dy$$

bestimmt, woraus man ihren Richtungskoeffizienten

$$(5) \quad -\frac{\partial u}{\partial x} : \frac{\partial v}{\partial x}$$

abliest.

Aus (4) und (5) erkennt man, daß die Bilder von MM_1 und MM_2 ebenso aufeinander senkrecht sind wie MM_1 und MM_2 selbst; und da das Längenverhältnis dieser Bilder:

$$(6) \quad |d_x w| : |d_y w| \\ = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2} dx : \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2} dy = |dx| : |dy|,$$

gleich dem Längenverhältnis der Originale ist, so bildet sich das infinitesimale rechtwinklige Dreieck MM_1M_2 der s -Ebene in ein *ähnliches* infinitesimales Dreieck der w -Ebene ab. Es ist leicht zu erkennen, wie sich dieser Sachverhalt auf beliebige infinitesimale Dreiecke und infinitesimale Figuren überhaupt überträgt, und da in ähnlichen Dreiecken einander entsprechende Winkel gleich sind, so kann man sagen:

Die durch eine analytische Funktion vermittelte Abbildung der s -Ebene auf die w -Ebene ist in den kleinsten Teilen ähnlich, oder winkeltreu, oder, nach einer von Gauß eingeführten Benennung, konform.

Das Größenverhältnis der kleinsten Figuren in Bild und Original ist nicht in allen Teilen dasselbe; aus (6) ergibt sich das Längenverhältnis sehr kleiner Strecken; das lineare *Verzerrungsverhältnis* aber, das bestimmt ist durch den Quotienten $\frac{|d_x w|}{|dx|}$ gleich $\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2}$, ist gleich dem absoluten Wert des Differentialquotienten $\frac{dw}{dz}$ an der betreffenden Stelle und somit veränderlich von einer zur andern.

Die konforme Abbildung hat für die Kartographie große Bedeutung.

Zur Illustration der vorgeführten Begriffe diene die Funktion

$$w = f(z) = (x^2 - y^2) + 2xyi;$$

daß sie analytisch ist, folgt daraus, daß $x^2 - y^2 = u$, $2xy = v$ konjugierte Funktionen sind, weil

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y}$$

und

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Ihr Differentialquotient ist


$$\frac{dw}{dz} = 2x + 2yi,$$

sein absoluter Wert $2\sqrt{x^2 + y^2}$.

Eliminiert man y zwischen den Gleichungen $x^2 - y^2 = u$, $2xy = v$, so ergibt sich

$$u = x^2 - \frac{v^2}{4x^2}$$

als Gleichung jener Kurven in der w -Ebene, in welche sich



das System der Parallelen zur y -Achse abbildet; es sind Parabeln. Durch Elimination von x entsteht

$$u = \frac{v^2}{4y^2} - y^2$$

als Gleichung jener Kurven der w -Ebene, in welche sich die Parallelen zur x -Achse abbilden; auch sie sind Parabeln. Beide Arten von Parabeln, durch entgegengesetzte Lage voneinander unterschieden, haben den Ursprung der w -Ebene zum gemeinsamen Brennpunkt (Fig. 19). Sie zerlegen diese Ebene in rechtwinklig krummlinige Vierecke, speziell in infinitesimale Quadrate, wenn die z -Ebene in infinitesimale Quadrate zerlegt worden war.

Da u , v und somit auch w sich nicht ändern, wenn man bei x und y zugleich das Zeichen wechselt, so bilden sich je zwei in bezug auf 0 symmetrische Quadrate der z -Ebene in ein Viereck der w -Ebene ab.

Man erörtere jene Zerlegung der z -Ebene, die einer Zerlegung der w -Ebene in Quadrate durch Parallele zu den Achsen entspricht.

Im folgenden werden die *elementaren* Funktionen einer komplexen Variablen einer kurzen Erörterung unterzogen.

103. Die Potenz. Moivres Binomialformel für ganze Exponenten. Es gelte als Grundsatz, daß die *Potenz* einer komplexen Zahl begrifflich ebenso aufzufassen sei wie die Potenz einer reellen Zahl; wenn also n eine natürliche Zahl bedeutet, so sei auch bei komplexem z

$$z^n = z \cdot z \dots (n\text{-mal}), \quad z^{-n} = \frac{1}{z^n}, \quad z^0 = 1.$$

Es sei nun

$$(1) \quad z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi);$$

dann ist

$$z^2 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$= r^2 [\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \sin \varphi \cos \varphi]$$

$$= r^2 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi),$$

$$z^3 = r^3 (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$= r^3 [\cos 2\varphi \cos \varphi - \sin 2\varphi \sin \varphi + i(\sin 2\varphi \cos \varphi + \cos 2\varphi \sin \varphi)]$$

$$= r^3 (\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi);$$

die Allgemeingültigkeit von

$$(2) \quad z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

ergibt sich daraus, daß die Hinzufügung eines weiteren Faktors $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ für z^{n+1} dasselbe Bildungsgesetz liefert.

Aus der Beziehung

$$r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \frac{1}{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \frac{1}{r} (\cos \varphi - i \sin \varphi) = \frac{1}{r} [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)]$$

ergibt sich

$$(3) \quad \begin{cases} z^{-n} = r^{-n} (\cos(-n\varphi) + i \sin(-n\varphi)) \\ \quad = r^{-n} (\cos n\varphi - i \sin n\varphi). \end{cases}$$

Da r^{-n} , $\cos n\varphi$, $\sin n\varphi$ einwertige Größen darstellen, so sind die *positive und die negative ganze Potenz einer komplexen Variablen einwertige Funktionen derselben*.

Vergleicht man die Formeln (2), (3) mit den aus (1) unmittelbar hervorgehenden

$$z^n = r^n (\cos \varphi + i \sin \varphi)^n, \quad z^{-n} = r^{-n} (\cos \varphi + i \sin \varphi)^{-n},$$

so ergibt sich

$$(1) \quad (\cos \varphi + i \sin \varphi)^{\pm n} = \cos(\pm n\varphi) + i \sin(\pm n\varphi),$$

die Moivresche *Binomialformel**, zunächst gültig für jedes ganze n .

104. Die Wurzel. Moivresche Binomialformel für rationale Exponenten. Die n -te Wurzel aus einer komplexen Zahl werde begrifflich ebenso aufgefaßt wie die Wurzel aus einer reellen Zahl; es sei also auch bei komplexem z und ganzem positiven n

$$\sqrt[n]{z} = w$$

nur dann, wenn

$$w^n = z.$$

Setzt man $w = u + iv = R(\cos \Phi + i \sin \Phi)$, so führt dies vermöge des vorigen Artikels zu der Beziehung:

$$R^n (\cos n\Phi + i \sin n\Phi) = r (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

welcher nur auf die eine Weise genügt werden kann, daß

$$R^n = r,$$

$$n\Phi = \varphi + 2x\pi$$

gesetzt wird, wobei x jede positive wie negative ganze Zahl einschließlich der Null bedeuten darf. Hieraus ergibt sich

$$R = |\sqrt[n]{r}|, \quad \Phi = \frac{\varphi + 2x\pi}{n};$$

daher ist

$$(5) \quad \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} (\cos \varphi + i \sin \varphi) = |\sqrt[n]{r}| \left(\cos \frac{\varphi + 2x\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2x\pi}{n} \right).$$

Der anscheinend unendlich vieldeutige Ausdruck auf der rechten Seite nimmt in Wirklichkeit nur n verschiedene Werte an, die man erhält, wenn man der Reihe nach

$$(6) \quad x = 0, 1, 2, \dots (n-1)$$

setzt. Die Verschiedenheit der aus diesen Substitutionen hervorgehenden Werte folgt daraus, daß die zugehörigen Werte von $\frac{\varphi + 2x\pi}{n}$ sämtlich in dem Intervalle $(0, 2\pi)$ liegen und

*) Abraham de Moivre, *Miscellanea analytica*, London 1730.

voneinander verschieden sind. Bezeichnet man ferner irgend eine Zahl der Reihe (6) mit α , so kann jede ganze Zahl außerhalb dieser Reihe durch

$$pn + \alpha$$

ausgedrückt werden, wobei p eine positive oder negative ganze Zahl bedeutet; setzt man nun $z = pn + \alpha$, so wird

$$\frac{\varphi + 2\pi}{n} = \frac{\varphi + 2(pn + \alpha)\pi}{n} = \frac{\varphi + 2\alpha\pi}{n} + 2p\pi,$$

und da $2p\pi$ auf den Wert der trigonometrischen Funktionen in (5) keinen Einfluß hat, so liefert die Substitution $z = pn + \alpha$ dasselbe wie die Substitution $z = \alpha$.

Hieraus folgt, daß die n -te Wurzel aus einer komplexen Variablen eine n -wertige Funktion dieser Variablen ist; doch haben die n Werte denselben absoluten Betrag und unterscheiden sich nur in der Amplitude, so daß ihre Bilder auf einem Kreise um den Ursprung liegen und seinen Umfang in n gleiche Teile teilen. Da übrigens die komplexe Variable auch die reelle und die rein imaginäre Variable in sich begreift, so gilt das Gesagte auch für die n -te Wurzel aus einer reellen Zahl.

Setzt man in der Formel (5) $r = 1$ und läßt auch für ein komplexes z den Ansatz

$$\sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}}$$

zurecht bestehen, so ergibt sich

$$(7) \quad (\cos \varphi + i \sin \varphi)^{\frac{1}{n}} = \cos \frac{\varphi + 2\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi}{n}.$$

Gilt ferner auch für komplexe z

$$\sqrt[p]{z^q} = z^{\frac{q}{p}} = (z^{\frac{1}{p}})^q,$$

wo unter $\frac{q}{p}$ ein irreduzibler Bruch verstanden werden soll, so ergibt sich durch Verbindung von (4) und (5):

$$(8) \quad \left\{ \begin{aligned} \sqrt[p]{z^q} &= \sqrt[p]{[r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^q} \\ &= \sqrt[p]{r^q (\cos q\varphi + i \sin q\varphi)} \\ &= r^{\frac{q}{p}} \left(\cos \frac{q\varphi + 2\pi}{p} + i \sin \frac{q\varphi + 2\pi}{p} \right); \end{aligned} \right.$$

und hieraus für $r = 1$

$$(9) \quad (\cos \varphi + i \sin \varphi)^p = \cos \frac{p\varphi + 2\pi x}{p} + i \sin \frac{p\varphi + 2\pi x}{p};$$

in beiden Formeln ist nach und nach

$$x = 0, 1, \dots (p-1)$$

zu setzen, um alle Werte zu erhalten, deren die rechte Seite fähig ist.

Hiernach gilt für jedes rationale (positive wie negative) n die Formel:

$$(10) \quad (\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n(\varphi + 2\pi x) + i \sin n(\varphi + 2\pi x).$$

Man kann also, alle Fälle umfassend, für die Potenz mit komplexer Basis die Formel aufschreiben:

$$z^n = |r^n| \{ \cos n(\varphi + 2\pi x) + i \sin n(\varphi + 2\pi x) \},$$

und läßt man sie auch für ein *irrationales* n gelten, so erweist sich z^n für ein solches n als eine unendlich vielwertige Funktion.

105. Die natürliche Potenz. Als analytische Definition der natürlichen Potenz werde die auch für einen komplexen Exponenten beständig und absolut konvergente Potenzreihe angenommen, welche in 95, (17) unter Voraussetzung eines reellen Exponenten gefunden worden ist; es sei also

$$(11) \quad e^z = 1 + \frac{z}{1} + \frac{z^2}{1 \cdot 2} + \dots$$

Für einen andern Wert z' der Variablen ist

$$e^{z'} = 1 + \frac{z'}{1} + \frac{z'^2}{1 \cdot 2} + \dots$$

Wendet man auf diese zwei Reihen das in 75 entwickelte Multiplikationstheorem absolut konvergenter Reihen an, so ergibt sich für das allgemeine Glied c_n der Produktreihe der Ausdruck:

$$\begin{aligned} c_n &= 1 \cdot \frac{z'^n}{1 \cdot 2 \dots n} + \frac{z}{1} \cdot \frac{z'^{n-1}}{1 \cdot 2 \dots (n-1)} \\ &\quad + \frac{z^2}{1 \cdot 2} \cdot \frac{z'^{n-2}}{1 \cdot 2 \dots (n-2)} + \dots + \frac{z^n}{1 \cdot 2 \dots n} \cdot 1 \\ &= \frac{1}{1 \cdot 2 \dots n} \left\{ z'^n + \frac{n}{1} z'^{n-1} z + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} z'^{n-2} z^2 + \dots + z^n \right\} \\ &= \frac{(z + z')^n}{1 \cdot 2 \dots n}; \end{aligned}$$

hiernach ist

$$e^z \cdot e^{z'} = 1 + \frac{z+z'}{1} + \frac{(z+z')^2}{1 \cdot 2} + \dots,$$

d. h.

$$e^z \cdot e^{z'} = e^{z+z'}.$$

Die natürliche Potenz erfüllt also, wenn man ihr die Definition (11) zugrunde legt, das Gesetz, welches die Arithmetik für Potenzen gleicher Basis und mit reellem Exponenten nachweist, auch für komplexe Exponenten, sie erfüllt es also ganz allgemein.

Daraus folgt

$$e^z = z + iy = e^z e^{iy};$$

vermöge der Definition (11) ist aber

$$e^{iy} = 1 + \frac{iy}{1} - \frac{y^2}{1 \cdot 2} - \frac{iy^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{y^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{iy^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots;$$

wegen der beständigen absoluten Konvergenz dieser Reihe sind notwendig auch die Reihen

$$1 - \frac{y^2}{1 \cdot 2} + \frac{y^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \dots$$

$$\frac{y}{1} - \frac{y^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{y^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots$$

beständig und absolut konvergent; als solche sind sie bereits in 96, (22) und (23), erkannt und $\cos y$, respektive $\sin y$ als ihre Grenzwerte erwiesen worden; mithin ist

$$(12) \quad e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

und

$$(13) \quad e^{z+iy} = e^z (\cos y + i \sin y).$$

Die erste dieser beiden Formeln ist von Euler*) nach ihrer hohen Bedeutung für die Analysis gewürdigt worden. Formal gestattet sie, das Moivresche Binom $\cos \varphi + i \sin \varphi$ in Form einer natürlichen Potenz mit imaginärem Exponenten, $e^{i\varphi}$, darzustellen.

Ändert man in (12) y um 2π , unter π eine positive oder negative ganze Zahl verstanden, so ändert sich die rechte Seite

*) *Introductio in Analysin infinitorum*, 1748; deutsch von F. Maser, Berlin 1885.

wegen der Periodizität der trigonometrischen Funktionen mit der Periode 2π nicht; folglich ist


$$e^{i(y+2\pi)} = e^{iy}$$

und

$$(14) \quad e^{i+2\pi i} = e^i.$$

Die natürliche Potenz e^z ist demnach eine eindeutige periodische Funktion von z und $2\pi i$ der Modul der Periode (32). Ist z rein imaginär $= iy$, so ist vermöge (12) der Modul von e^{iy} bei jedem Werte von y die Einheit; ist z komplex $= x + iy$, so ist der Modul von e^z auf Grund von (13) e^x .

Wegen der Periodizität von e^z genügt es, um alle Werte der Funktion, deren sie fähig ist, zu erhalten, z ein Gebiet zuzuordnen, das dem x das Intervall $(-\infty, +\infty)$, dem y das Intervall $(0, 2\pi)$ zuweist, also einen Streifen der Ebene, welcher von der x -Achse und einer zu ihr parallelen Geraden im Abstände 2π begrenzt wird (Fig. 20). Zerlegt man die ganze Ebene in Streifen dieser Breite, so wiederholen sich die Werte von e^z , welche aus dem erstgenannten Streifen entspringen, in jedem anderen derart, daß $e^z = e^{z'}$, wenn $zs' \parallel YY'$, $zs' = 2\pi$ oder ein positives oder negatives Vielfaches hiervon ist. Die Ebene XOY ist daher unendlich vielfach auf die Ebene UOV abgebildet (102).



Verbindet man die Gleichung (12) oder

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

mit der aus ihr durch Zeichenänderung des x hervorgehenden

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

durch Addition und Subtraktion, so ergeben sich die ebenfalls von Euler aufgestellten Formeln:

$$\begin{cases} \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \end{cases}$$

106. Der natürliche Logarithmus. Unter dem natürlichen Logarithmus der komplexen Variablen $z = x + iy$

soll jede komplexe Variable $w = u + iv$ verstanden werden, die für alle Werte von x, y die Beziehung

$$e^w = z$$

erfüllt; mit andern Worten, wie bei reellen Variablen soll der natürliche Logarithmus die Umkehrung der natürlichen Potenz sein. Zu seiner Bezeichnung diene dasselbe Symbol lz wie bei reellen Variablen.

Aus

$$e^w = e^{u+iv} = e^u(\cos v + i \sin v) = x + iy$$

folgt aber nach dem Grundsatz, daß zwei komplexe Größen nur dann gleich sind, wenn die reellen Bestandteile und die Koeffizienten von i beiderseits übereinstimmen, daß

$$e^u \cos v = x$$

$$e^u \sin v = y;$$

daraus ergibt sich für den Modul von e^w , d. i. für e^u , der Wert

$$e^u = |\sqrt{x^2 + y^2}|, \quad \text{woraus } u = l |\sqrt{x^2 + y^2}|;$$

ferner

$$\cos v = \frac{x}{e^u}, \quad \sin v = \frac{y}{e^u}, \quad \operatorname{tg} v = \frac{y}{x};$$

bezeichnet also $\operatorname{Arc} \operatorname{tg} \frac{y}{x}$ jenen einzigen Bogen aus dem Intervalle $(0, 2\pi)$, dessen Tangens den Wert $\frac{y}{x}$ hat und dessen Kosinus, Sinus beziehungsweise mit x, y dem Zeichen nach übereinstimmen, so ist

$$v = \operatorname{Arc} \operatorname{tg} \frac{y}{x} + 2\pi\kappa,$$

wobei κ jede positive und negative ganze Zahl mit Einschluß der Null bedeuten kann.

Nachdem so die Elemente von w durch jene von z dargestellt sind, hat man:

$$(16) \quad l(x + iy) = l |\sqrt{x^2 + y^2}| + i \operatorname{Arc} \operatorname{tg} \frac{y}{x} + 2\pi\kappa i.$$

Der natürliche Logarithmus einer komplexen Variablen ist demnach eine unendlich vielwertige Funktion, und aus einem seiner Werte ergibt sich jeder andere durch additive Hinzufügung eines entsprechenden Vielfachen von $2\pi i$.

Den zu $\kappa = 0$ gehörigen Wert bezeichnet man als *Hauptwert* mit dem Symbol $\bar{l}z$, so daß $lz = \bar{l}z + 2\pi\kappa$.

Dieses Verhalten ist die notwendige Folge der Periodizität der natürlichen Potenz, aus welcher der natürliche Logarithmus durch Umkehrung hervorgeht (33).

Weil die komplexe Variable auch die reelle und die rein imaginäre umfaßt, so gilt der eben ausgesprochene Satz auch für diese.

Ist $y = 0$, so ist $\text{Arc tg } \frac{y}{x}$ entweder $= 0$ oder $= \pi$, je nachdem $x > 0$ oder $x < 0$; man hat also für den allgemeinen Logarithmus einer reellen Zahl x die Ansätze:

$$\text{für } x > 0 \quad lx = \bar{l}x + 2\pi i$$

$$\text{für } x < 0 \quad lx = \bar{l}|x| + (2\pi + 1)\pi i,$$

wobei $\bar{l}x$, bzw. $\bar{l}|x|$ den Logarithmus im gewöhnlichen arithmetrischen Sinne bedeutet.

Die erste dieser Formeln zeigt, daß sich unter den unendlich vielen Werten des natürlichen Logarithmus einer positiven reellen Zahl ein einziger reeller Wert befindet, eben der Hauptwert; dieser ist es, den man gewöhnlich mit lx bezeichnet. Aus der zweiten Formel geht hervor, daß die Werte des Logarithmus einer negativen reellen Zahl wie die einer komplexen Zahl sämtlich imaginär sind.

Es mag noch die einfache Gestalt der Formel (16) angeführt werden, welche sich bei trigonometrischer Darstellung von z ergibt. Ist $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, so hat man:

$$lz = \bar{l}r + i\varphi + 2\pi i.$$

Bei der Abbildung von $w = lz$ entsprechen jedem Punkte der z -Ebene unendlich viele (äquidistante) Punkte der w -Ebene.

107. Trigonometrische Funktionen. Zur Definition der trigonometrischen Funktionen Sinus und Kosinus sollen bei komplexem Argument dieselben beständig und absolut konvergenten Potenzreihen genommen werden, welche sich in 96, (22) und (23), bei reellem Argument für diese Funktionen ergeben haben. Bezüglich der anderen Funktionen sollen die nämlichen Beziehungen gelten, wie bei reellem Argument, also $\text{tg } z = \frac{\sin z}{\cos z}$ usw. Wir wollen zeigen, daß dies auf das nämliche hinauskommt, wie wenn man die Formeln 105, (15) als allgemein geltende Definitionen festgelegt hätte.

In der Tat folgt aus (11):

$$e^z = 1 + \frac{iz}{1} - \frac{z^2}{1 \cdot 2} - \frac{iz^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{z^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{iz^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots,$$

$$e^{-iz} = 1 - \frac{iz}{1} - \frac{z^2}{1 \cdot 2} + \frac{iz^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{z^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{iz^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots$$

und hieraus durch Addition und Subtraktion:

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 1 - \frac{z^2}{1 \cdot 2} + \frac{z^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \dots$$

$$\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{z}{1} - \frac{z^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{z^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots;$$

nimmt man also die rechtsstehenden Reihen, die mit jenen 96, (23), (22) übereinstimmen, als Definitionen für $\cos z$ und $\sin z$, so ist auch

$$(17) \quad \begin{cases} \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{cases}$$

Da die natürliche Potenz periodisch ist mit dem Modul $2\pi i$, so daß $e^{iz+2\pi n i} = e^{i(z+2\pi n)} = e^{iz}$, so sind die Funktionen $\cos z$, $\sin z$ ebenso wie die gleichnamigen Funktionen der reellen Variablen periodisch mit dem Modul 2π .

Ist z rein imaginär, $z = ix$, so geben die Formeln (17)

$$(18) \quad \begin{cases} \cos ix = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \\ \sin ix = i \frac{e^x - e^{-x}}{2} = i \sinh x, \end{cases}$$

so daß der Kosinus einer rein imaginären Variablen reell, der Sinus rein imaginär ist. Durch diese Formeln ist zugleich der Zusammenhang zwischen den Kreis- und den Hyperbelfunktionen (34) hergestellt.

Ist z komplex $= x + iy$, so hat man nach (17):

$$\begin{aligned} & \cos(x + iy) \\ &= \frac{e^{ix} \cdot e^{-y} + e^{-ix} \cdot e^y}{2} = \frac{(e^{ix} + e^{-ix})(e^y + e^{-y}) - (e^{ix} - e^{-ix})(e^y - e^{-y})}{4} \\ & \sin(x + iy) \\ &= \frac{e^{ix} \cdot e^{-y} - e^{-ix} \cdot e^y}{2i} = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})(e^y + e^{-y}) - (e^{ix} + e^{-ix})(e^y - e^{-y})}{4i}; \end{aligned}$$

mit Beachtung der Formeln (15) und (18) gibt dies:

$$\cos(x + iy) = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy$$

$$\sin(x + iy) = \sin x \cos iy + \cos x \sin iy,$$

Formeln, welche völlig dem für reelle Bögen geltenden Additionstheorem entsprechen; in der Form geschrieben:


$$\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

$$\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

lassen sie die linksstehenden Funktionen unmittelbar als komplexe Größen erscheinen.

Der Kosinus und der Sinus einer komplexen Variablen sind demnach eindeutige periodische Funktionen mit dem Modul 2π .

Wegen der Periodizität genügt es, um den ganzen Verlauf dieser Funktionen kennen zu lernen, dem z als Gebiet einen Streifen der Ebene zuzuweisen, welcher von der y -Achse und einer zu ihr parallelen Geraden im Abstände 2π begrenzt ist (Fig. 21). Teilt man die ganze Ebene in derlei Streifen, so wiederholen sich in jedem derselben die Werte aus dem erstgedachten Streifen derart, daß $\cos z' = \cos z$, $\sin z' = \sin z$, wenn $zz' \parallel XX'$ und $zz' = 2\pi$ oder einem Vielfachen davon.



108. Zyklometrische Funktionen. Als *Arcustangens* einer komplexen Variablen $z = x + iy$ werde jede komplexe Zahl $w = u + iv$ bezeichnet, die der Bedingung:

$$\operatorname{tg} w = z$$

genügt. Mit Benutzung der Gleichungen (17) führt dies zu der Gleichung

$$\frac{1}{i} \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{e^{iw} + e^{-iw}} = z,$$

aus welcher zunächst

$$\frac{e^{2iw} - 1}{e^{2iw} + 1} = iz$$

und weiter

$$e^{2iw} = \frac{1 + iz}{1 - iz}$$

folgt, so daß sich für w die Bestimmung:

$$w = \frac{1}{2i} l \frac{1+i}{1-i} = \text{Arc tg } z$$

ergibt; dadurch ist die Lösung der Aufgabe auf die Bestimmung des natürlichen Logarithmus einer komplexen Variablen zurückgeführt, die in 106 erledigt worden ist. Es ist

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{1-y+ix}{1+y-ix} = \frac{1-x^2-y^2}{x^2+(1+y)^2} + \frac{2x}{x^2+(1+y)^2} i,$$

der Modul hiervon die positive Quadratwurzel aus

$$\frac{(1-x^2-y^2)^2+4x^2}{\{x^2+(1+y)^2\}^2} = \frac{(1+x^2+y^2)^2-4y^2}{\{x^2+(1+y)^2\}^2} = \frac{x^2+(1-y)^2}{x^2+(1+y)^2},$$

daraus ergibt sich auf Grund von 106, (16):

$$l \frac{1+i}{1-i} = \frac{1}{2} l \frac{x^2+(1-y)^2}{x^2+(1+y)^2} + i \text{Arc tg } \frac{2x}{1-x^2-y^2} + 2\pi i$$

und hiermit

$$(19) \quad \begin{cases} \text{Arc tg } (x+iy) \\ = \frac{i}{4} l \frac{x^2+(1+y)^2}{x^2+(1-y)^2} + \frac{1}{2} \text{Arc tg } \frac{2x}{1-x^2-y^2} + \pi; \end{cases}$$

dabei ist unter $\text{Arc tg } \frac{2x}{1-x^2-y^2}$ jener Bogen aus dem Intervalle $(0, 2\pi)$ zu verstehen, dessen Tangens $\frac{2x}{1-x^2-y^2}$ ist und dessen Sinus, Kosinus im Vorzeichen mit $2x$, $1-x^2-y^2$ respektive übereinstimmen.

Der Arcustangens einer komplexen Variablen ist demnach eine unendlich vieldeutige Funktion; aus einem seiner Werte ergibt sich jeder andere durch additive Hinzufügung eines entsprechenden Vielfachen von π .

Als bevorzugter Wert soll jener gelten, der $x=0$ entspricht, und als *Hauptwert* mit $\arctg z$ bezeichnet werden; es ist dann $\text{Arctg } z = \arctg z + \pi$.

Die andern zyklometrischen Funktionen führen ebenfalls auf den natürlichen Logarithmus zurück. Auch wenn w eine komplexe Zahl ist, gilt nämlich vermöge (17) die Gleichung:

$$e^{iw} = \cos w + i \sin w,$$

woraus

$$w = \frac{1}{i} l (\cos w + i \sin w);$$

setzt man nun einmal $\sin w = s$, ein zweitesmal $\cos w = s$, so ergibt sich im ersten Falle

$$\operatorname{Arc} \sin s = \frac{1}{i} l(\sqrt{1-s^2} + is);$$

im zweiten Falle

$$\operatorname{Arc} \cos s = \frac{1}{i} l(s + i\sqrt{1-s^2}),$$

die Wurzel beidemale als zweideutige Größe aufgefaßt. Die Ausführung dieser Formeln in den Variablen x, y soll unterbleiben. Nur einige Bemerkungen mögen noch angefügt werden. Ist s reell und dem Betrage nach kleiner als 1, so ist auch $\sqrt{1-s^2}$ reell und der Modul von $\sqrt{1-s^2} + is$, ebenso wie der von $s + i\sqrt{1-s^2}$ gleich 1; infolgedessen entfällt vermöge 106, (16) der logarithmische Teil und es bleibt ein reeller Bogen bestehen. Wenn hingegen s reell und dem Betrage nach größer als 1 ist, dann ist $\sqrt{1-s^2}$ imaginär und der Modul von $\sqrt{1-s^2} + is$ gleich $|s + \sqrt{s^2-1}|$, jener von $s + i\sqrt{1-s^2} = s - \sqrt{s^2-1}$ gleich $|s - \sqrt{s^2-1}|$; man hat also auf Grund von 106, (16):

$$\operatorname{Arc} \sin s = \frac{1}{i} l|s + \sqrt{s^2-1}| + \frac{\pi}{2} + 2\pi\kappa$$

$$\operatorname{Arc} \cos s = \frac{1}{i} l|s - \sqrt{s^2-1}| + 2\pi\kappa.$$

Aus diesen Darlegungen ergibt sich die für reelle s , welche absolut genommen kleiner sind als 1, aus den Elementen schon bekannte Formel:

$$\operatorname{Arc} \sin s + \operatorname{Arc} \cos s = \frac{\pi}{2} + 2\pi\kappa.$$

Hervorgehoben seien zum Schluß die nahen Beziehungen, die sich durch Heranziehung der komplexen Variablen zwischen den trigonometrischen Funktionen und der Exponentialfunktion einerseits, den zyklometrischen Funktionen und dem Logarithmus andererseits aufgetan haben und die sich durch die ganze Analysis hindurch verfolgen lassen.

§ 5. Die unbestimmten Formen.

109. Die Form $\frac{0}{0}$. Wenn eine Funktion $f(x)$ der stetigen Variablen x für ein Intervall (α, β) eindeutig definiert und in diesem Intervall stetig ist, mit Ausnahme einer einzigen Stelle

$x = a$, welche innerhalb (α, β) liegt oder mit einer der Grenzen zusammenfällt und an welcher die Definition ihre Geltung verliert, so stellt sich die Aufgabe ein, das Verhalten der Funktion in der Umgebung dieser kritischen Stelle zu untersuchen. Diese Aufgabe erhält einen bestimmten Ausdruck in der Forderung: den Grenzwert von $f(x)$ zu suchen für einen näher bezeichneten, aber stetigen Grenzübergang $\lim x = a$ (18).

Die Funktion $f(x)$ erscheint an einer solchen Stelle $x = a$ in einer sogenannten *unbestimmten* Form und nach dieser Form richtet sich das einzuschlagende Verfahren. Welches diese Form aber auch sei, so bezeichnet man den Grenzwert $\lim_{x=a} f(x)$, wenn ein solcher existiert, als einen *uneigentlichen Funktionswert*, wohl auch nicht gerade zutreffend als den wahren Wert der unbestimmten Form, und ergänzt die an der Stelle $x = a$ unterbrochene Definition der Funktion dadurch, daß man diesen Grenzwert als ihren Wert an dieser Stelle festsetzt, also

$$(1) \quad f(a) = \lim_{x=a} f(x)$$

annimmt; dies geschieht auch dann, wenn der gedachte Grenzwert $+\infty$ oder $-\infty$ ist. Die Ergänzung erfolgt also, sofern der Grenzwert ein endlicher ist, nach dem Grundsatz, daß die im Intervalle (α, β) mit Ausschluß von a herrschende Stetigkeit auch für $x = a$ fortbestehen bleibe.

Unter den unbestimmten Formen ist es eine, auf welche man die übrigen zurückzuführen sucht; sie hat folgende Entstehung.

Es sei $f(x) = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ eine gebrochene Funktion, deren Zähler und Nenner in dem Intervalle (α, β) stetig sind und an der Stelle $x = a$ zugleich verschwinden; dann nimmt der Ausdruck der Funktion die Form $\frac{0}{0}$ an.

Da $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ für $\lim x = a$ unendlich klein werden, so hängt der Grenzwert ihres Quotienten von der Ordnung des Unendlichkleinwerdens jeder einzelnen ab (16).

Hierüber gibt mitunter schon eine einfache algebraische Umformung Auskunft; sind z. B. m, n natürliche Zahlen, so ist

$$f(x) = \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{(x-a)(x^{m-1} + ax^{m-2} + \dots + a^{m-1})}{(x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1})};$$

Zähler und Nenner werden also für $\lim x = a$ von derselben Ordnung unendlich klein wie $x - a$, daher ist

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \left(\frac{x^{m-1} + ax^{m-2} + \dots + a^{m-1}}{x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1}} \right)_{x=a} = \frac{m}{n} a^{m-n}.$$

Ist $x = 0$ die kritische Stelle und sind $\varphi(x)$, $\psi(x)$ in Potenzreihen entwickelbar, so können diese Reihen ein von x freies Glied nicht enthalten (85, Schluß); es sei daher:

$$\varphi(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m+1} + a_2 x^{m+2} + \dots = x^m (a_0 + a_1 x + \dots),$$

$$\psi(x) = b_0 x^n + b_1 x^{n+1} + b_2 x^{n+2} + \dots = x^n (b_0 + b_1 x + \dots);$$

für $\lim x = 0$ werden jetzt $\varphi(x)$, $\psi(x)$ in bezug auf x selbst unendlich klein von der m -ten, bzw. von der n -ten Ordnung und man hat nun drei Fälle zu unterscheiden:

a) für $m > n$ ist $\lim_{x=0} \frac{x^m}{x^n} = 0$, daher

$$f(0) = \lim_{x=0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = 0;$$

b) für $m < n$ ist $\lim_{x=0} \frac{x^m}{x^n} = \infty$ ($+\infty$ bei geradem $n - m$, bei ungeradem $n - m$ links $-\infty$, rechts $+\infty$), also

$$f(0) = \lim_{x=0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \infty;$$

c) für $m = n$ endlich erhält man

$$f(0) = \lim_{x=0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{a_0}{b_0}.$$

Zur Erläuterung dieses Verfahrens mögen folgende Beispiele dienen:

1) Für $x = 0$ nimmt

$$f(x) = \frac{x - \sin x}{x^6}$$

die Form $\frac{0}{0}$ an; es ist aber

$$\begin{aligned} x - \sin x &= x - \left(x - \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \dots \right) \\ &= \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{x^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots; \end{aligned}$$

daher

$$f(0) = \lim_{x=0} f(x) = \frac{1}{6}.$$

2) Dieselbe Erscheinung tritt bei

$$f(x) = \frac{x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x}{1 - \cos x}$$

ein; die Entwicklungen von Zähler und Nenner geben

$$x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x = x - \left(\frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \right) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \dots$$

$$1 - \cos x = 1 - \left(1 - \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \dots \right) = \frac{x^2}{1 \cdot 2} - \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots$$

folglich ist

$$f(0) = \lim_{x=0} f(x) = 0.$$

3) Das gleiche Verhalten zeigt

$$f(x) = \frac{l(1+x+x^2) + l(1-x+x^2)}{e^x + e^{-x} - 2 \cos x}$$

für $x = 0$; nun ist, sobald x genügend klein geworden,

$$\begin{aligned} & l(1+x+x^2) + l(1-x+x^2) \\ &= \frac{x+x^2}{1} - \frac{(x+x^2)^2}{2} + \frac{(x+x^2)^3}{3} - \dots - \left(\frac{x-x^2}{1} + \frac{(x-x^2)^2}{2} + \frac{(x-x^2)^3}{3} + \dots \right) \\ &= x^3 + \frac{x^4}{2} + \dots, \\ & e^x + e^{-x} - 2 \cos x \\ &= 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \dots + 1 - \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} - \dots - 2 \left(1 - \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \dots \right) \\ &= 2x^3 + \frac{x^6}{180} - \dots, \end{aligned}$$

daher

$$f(0) = \lim_{x=0} f(x) = \frac{1}{2}.$$

Die Entwicklung gibt zugleich ein bequemes Mittel, die betreffende Funktion für der Null naheliegende Werte von x näherungsweise zu berechnen; so kann die Funktion des 1. Beispiels für sehr kleine Werte von x durch $\frac{1}{6} - \frac{x^2}{120}$, jene des

2. Beispiels durch $\frac{\frac{x}{3} - \frac{x^3}{5}}{\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}}$ und dies wieder durch $\frac{2x}{3} - \frac{31x^3}{90}$,

die des 3. Beispiels durch $\frac{1 + \frac{x^2}{2}}{2 + \frac{x^4}{180}}$ und dies wieder durch

$\frac{1}{2} + \frac{x^2}{4}$ näherungsweise ersetzt werden.

Zu einem allgemeinen Verfahren der Grenzwertbestimmung von Quotienten, deren Zähler und Nenner für $x = a$ gleichzeitig Null werden, führt die Differentialrechnung. Angenommen, die Funktionen $\varphi(x)$, $\psi(x)$ besitzen in einem beliebig engen, a und $a + h$ enthaltenden Intervalle stetige Differentialquotienten m -ter, bzw. n -ter Ordnung, so können $\varphi(a + h)$ und $\psi(a + h)$ nach der Taylorschen Formel (91) wegen $\varphi(a) = 0$, $\psi(a) = 0$ wie folgt entwickelt werden:

$$\varphi(a + h) = \varphi'(a)h + \frac{\varphi''(a)}{1 \cdot 2} h^2 + \dots + \frac{\varphi^{(m)}(a + \theta' h)}{1 \cdot 2 \dots m} h^m \quad (0 < \theta' < 1)$$

$$\psi(a + h) = \psi'(a)h + \frac{\psi''(a)}{1 \cdot 2} h^2 + \dots + \frac{\psi^{(n)}(a + \theta'' h)}{1 \cdot 2 \dots n} h^n \quad (0 < \theta'' < 1).$$

Wenn nun $\varphi'(a) \neq 0$ und $\psi'(a) \neq 0$, so werden $\varphi(a + h)$, $\psi(a + h)$ mit h zugleich unendlich klein von erster Ordnung, und man hat

$$(2) \quad f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(a + h)}{\psi(a + h)} = \frac{\varphi'(a)}{\psi'(a)} \cdot *$$

Ist hingegen

$\varphi'(a) = 0$ und auch weiter noch $\varphi''(a) = 0, \dots \varphi^{(m-1)}(a) = 0$,
aber $\varphi^{(m)}(a) \neq 0$,

$\psi'(a) = 0$ und auch weiter noch $\psi''(a) = 0, \dots \psi^{(n-1)}(a) = 0$,
aber $\psi^{(n)}(a) \neq 0$,

und bleiben die letzten Beziehungen auch in dem Intervalle $(a, a + h)$ bestehen, so wird

$$\frac{\varphi(a + h)}{\psi(a + h)} = \frac{1 \cdot 2 \dots n h^m \varphi^{(m)}(a + \theta' h)}{1 \cdot 2 \dots m h^n \psi^{(n)}(a + \theta'' h)};$$

unter diesen Voraussetzungen wird also $\varphi(a + h)$ für $\lim h = 0$ in bezug auf h unendlich klein von der m -ten, $\psi(a + h)$ von der n -ten Ordnung; danach ist

*) Die in diesem Ansätze enthaltene Regel hat Johann Bernoulli zuerst gefunden. Acta erudit. 1704. Die Aufgabe, den Grenzwert eines Bruches zu bestimmen, der die Form $\frac{0}{0}$ oder die im nächsten Artikel besprochene $\frac{\infty}{\infty}$ annimmt, hat zum erstenmale (in geometrischer Einkleidung) G. F. de l'Hospital, Analyse des infiniment petits, Paris 1696, in Angriff genommen.

$$f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(a+h)}{\psi(a+h)} = 0, \quad \text{wenn } m > n,$$

$$f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(a+h)}{\psi(a+h)} = \infty, \quad \text{wenn } m < n,$$

$$(3) \quad f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(a+h)}{\psi(a+h)} = \frac{\varphi^{(m)}(a)}{\psi^{(n)}(a)}, \quad \text{wenn } m = n.$$

Das Verfahren, zu welchem diese Betrachtung führt, läßt sich folgendermaßen charakterisieren: *Man differenziere Zähler und Nenner des Bruches $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ je für sich und wiederhole dies so oft, bis man im Zähler oder im Nenner zu einem Differentialquotienten kommt, der für $x = a$ nicht Null ist; je nachdem dies im Nenner zuerst oder im Zähler zuerst oder nach m Wiederholungen in beiden gleichzeitig eintritt, ist $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ für $\lim x = a$ gleich Null, oder $= \infty$ oder $= \frac{\varphi^{(m)}(a)}{\psi^{(m)}(a)}$.*

In dem letztgedachten Falle nimmt nicht allein $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$, sondern nehmen auch $\frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}, \frac{\varphi''(x)}{\psi''(x)}, \dots, \frac{\varphi^{(m-1)}(x)}{\psi^{(m-1)}(x)}$ für $x = a$ die unbestimmte Form $\frac{0}{0}$ an und alle diese Quotienten haben denselben Grenzwert $\frac{\varphi^{(m)}(a)}{\psi^{(m)}(a)}$; denn wendet man die Taylorsche Formel auf $\varphi^{(r)}(a+h)$ und $\psi^{(r)}(a+h)$, wo $r < m$, an, so wird wegen $\varphi^{(r)}(a) = 0, \varphi^{(r+1)}(a) = 0, \dots, \varphi^{(m-1)}(a) = 0$ und $\psi^{(r)}(a) = 0, \psi^{(r+1)}(a) = 0, \dots, \psi^{(m-1)}(a) = 0$:

$$\varphi^{(r)}(a+h) = \frac{\varphi^{(m)}(a+\theta'h)}{1 \cdot 2 \dots (m-r)} h^{m-r}$$

$$\psi^{(r)}(a+h) = \frac{\psi^{(m)}(a+\theta''h)}{1 \cdot 2 \dots (m-r)} h^{m-r}$$

und

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi^{(r)}(a+h)}{\psi^{(r)}(a+h)} = \frac{\varphi^{(m)}(a)}{\psi^{(m)}(a)},$$

so daß man schreiben kann:

$$(4) \quad f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi''(x)}{\psi''(x)} = \dots$$

Bisher wurde die kritische Stelle als im Endlichen liegend vorausgesetzt. Wenn aber $\varphi(x), \psi(x)$ mit beständig wachsen-

dem x , z. B. bei $\lim x = +\infty$, gegen Null konvergieren, so nimmt $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ für $\lim x = +\infty$ die Form $\frac{0}{0}$ an, das durch (4) charakterisierte Verfahren der Grenzwertbestimmung bleibt aber

bestehen. Setzt man nämlich $x = \frac{1}{z}$, so nimmt $\frac{\varphi(\frac{1}{z})}{\psi(\frac{1}{z})}$ die unbestimmte Form für $\lim z = +0$ an und hierfür gilt der Vorgang der sukzessiven Differentiation; nun ist aber

$$D_z \varphi\left(\frac{1}{z}\right) = -\frac{1}{z^2} \cdot \varphi'\left(\frac{1}{z}\right)$$

$$D_z \psi\left(\frac{1}{z}\right) = -\frac{1}{z^2} \cdot \psi'\left(\frac{1}{z}\right),$$

wobei $\varphi'\left(\frac{1}{z}\right)$ den Wert von $\varphi'(x)$ für $x = \frac{1}{z}$, $\psi'\left(\frac{1}{z}\right)$ den Wert von $\psi'(x)$ für $x = \frac{1}{z}$ bedeutet; daher ist

$$\frac{D_z \varphi\left(\frac{1}{z}\right)}{D_z \psi\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{\varphi'\left(\frac{1}{z}\right)}{\psi'\left(\frac{1}{z}\right)} \quad \text{und} \quad \lim_{z \rightarrow +0} \frac{D_z \varphi\left(\frac{1}{z}\right)}{D_z \psi\left(\frac{1}{z}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}.$$

Das an erster Stelle unter Voraussetzung ganzzahliger positiver m, n behandelte Beispiel

$$f(x) = \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}$$

erledigt sich mit Hilfe der Differentialrechnung für beliebige rationale m, n ($a > 0$); es ist vermöge (2)

$$f(a) = \left(\frac{m x^{m-1}}{n x^{n-1}} \right)_{x=a} = \frac{m}{n} a^{m-n}.$$

Die drei späteren Beispiele führen auf diesem Wege zu folgender Rechnung:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{\frac{x^2}{\sin x}} = \left(\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right)_{x=0} = 0; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{l(1+x+x^2) + l(1-x+x^2)}{e^x + e^{-x} - 2 \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x+4x^3}{1+x^2+x^4}}{\frac{2+10x^2-2x^4-4x^6}{e^x + e^{-x} + 2 \cos x}} = \left(\frac{2+10x^2-2x^4-4x^6}{e^x + e^{-x} + 2 \cos x} \right)_{x=0} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Als weitere *Beispiele* mögen dienen:

$$f(x) = \frac{x^3 - 19x + 30}{x^3 - 2x^2 - 9x + 18} \text{ bei } x = 2 \text{ und } x = 3, \left\{ \frac{7}{5}, \frac{4}{3} \right\}.$$

$$f(x) = \frac{\operatorname{tg} ax - ax}{\operatorname{tg} bx - bx} \text{ bei } x = 0, \left\{ \frac{a^3}{b^3} \right\}.$$

$$f(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\sin 2x - \cos 2x - 1} \text{ bei } x = \frac{\pi}{4}, \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$$

$$f(x) = \frac{x - \sin x}{\operatorname{tg} x - x} \text{ bei } x = 0, \left\{ \frac{1}{2} \right\}.$$

110. Die Form $\frac{\infty}{\infty}$. Es habe die Funktion wieder die Form eines Bruches $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$; bei der stetigen Annäherung von x an die Grenze a mögen jedoch Zähler wie Nenner, jeder mit einem bestimmten Vorzeichen, ins Unendliche wachsen. Dann nimmt $f(x)$, wie man dies kurz ausdrückt, an der Stelle $x = a$ die unbestimmte Form $\frac{\infty}{\infty}$ an; der Grenzwert dagegen, welchem sich dabei $f(x)$ im gegebenen Falle nähert, hängt wieder von der Ordnung des Unendlichwerdens von Zähler und Nenner ab.

Einen wichtigen Fall, in welchem die Frage leicht erledigt werden kann, bildet die Funktion

$$f(x) = \frac{e^x}{x^n},$$

wo $n > 0$ vorausgesetzt wird; für $\lim x = +\infty$ wachsen Zähler und Nenner, positiv bleibend, ins Unendliche; wie groß aber auch x und m ist, es gilt

$$e^x > 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{x^m}{1 \cdot 2 \cdots m},$$

daher auch

$$\frac{e^x}{x^n} > \frac{1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{x^m}{1 \cdot 2 \cdots m}}{x^n},$$

wo immer $m > n$ vorausgesetzt werden kann, so daß der rechtsseitige Bruch mit x über jeden positiven Betrag wächst; daher ist

$$\lim_{x=+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty. \quad (n > 0).$$

Es wird also die natürliche Potenz e^x (und jede Exponentialgröße a^x , deren $a > 1$) für $\lim x = +\infty$ unendlich groß von

höherer Ordnung als jede noch so hohe algebraische Potenz x^n mit positivem Exponenten. Daraus schließt man umgekehrt, daß

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0. \quad (n > 0).$$

Von dieser Funktion läßt sich leicht schließen auf

$$f(x) = \frac{lx}{x^n}$$

für $n > 0$ und $\lim x = +\infty$; denn setzt man $lx = z$, so wird $x = e^z$ und mit $\lim x = +\infty$ zugleich $\lim z = +\infty$; die Funktion aber geht über in

$$\frac{z}{e^{nz}} = \frac{nz}{n \cdot e^{nz}},$$

infolgedessen ist

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{lx}{x^n} = \frac{1}{n} \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{nz}{e^{nz}} = 0. \quad (n > 0).$$

Hiernach wird der natürliche und jeder Logarithmus, dessen Basis größer als 1 ist, für $\lim x = +\infty$ unendlich groß von niedrigerer Ordnung als jede positive Potenz.

Mit Hilfe der Differentialrechnung wird die Grenzwertbestimmung im vorliegenden Falle ebenso erledigt, wie bei der Form $\frac{0}{0}$. Zuerst soll dies unter der Voraussetzung gezeigt werden, daß $\lim x = +\infty$ (oder $-\infty$), und daß von einer Stelle X angefangen $\psi'(x)$ nicht mehr Null wird, $\psi(x)$ also monoton verläuft. Dann gilt der Satz, daß, sofern $\frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$ einen Grenzwert A besitzt, $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ gegen denselben Grenzwert konvergiert.

Sind nämlich x_0, x ($x_0 < x$) zwei Werte der Variablen, welche dem Intervalle $(X, +\infty)$ angehören, so ist nach dem verallgemeinerten Mittelwertsatze (39):

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(x_1)}{\psi'(x_1)}; \quad x_0 < x_1 < x;$$

daraus schließt man weiter:

$$\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \cdot \frac{1 - \frac{\varphi(x_0)}{\varphi(x)}}{1 - \frac{\psi(x_0)}{\psi(x)}} = \frac{\varphi'(x_1)}{\psi'(x_1)}$$

und

$$(5) \quad \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \frac{1 - \frac{\psi(x_0)}{\psi(x)}}{1 - \frac{\varphi(x_0)}{\varphi(x)}} \cdot \frac{\varphi'(x_1)}{\psi'(x_1)}.$$

Da nun $\frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$ für $\lim x = +\infty$ den Grenzwert A hat, so kann man x_0 so groß festsetzen, daß $\frac{\varphi'(x_1)}{\psi'(x_1)}$ von A um einen beliebig kleinen Betrag ε verschieden, also gleich $A \pm \varepsilon$ ist; nach Festsetzung von x_0 kann man ferner x so groß annehmen, daß der Bruch

$$\frac{1 - \frac{\psi(x_0)}{\psi(x)}}{1 - \frac{\varphi(x_0)}{\varphi(x)}}$$

von der Einheit um einen beliebig kleinen Betrag sich unterscheidet, also gleich $1 \pm \eta$ sei; dann aber hat man

$$\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = (1 \pm \eta)(A \pm \varepsilon),$$

und weil ε, η dadurch, daß man x_0 und x groß genug wählt, der Null immer näher gebracht werden können, so ist tatsächlich

$$\lim_{x=+\infty} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = A = \lim_{x=+\infty} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}.$$

Der Satz gilt auch dann noch, wenn $\frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$ mit x ins Unendliche wachsen sollte; denn da der erste Faktor der rechten Seite in (5) gegen 1 konvergiert, so ist mit $\lim_{x=+\infty} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)} = \infty$ auch $\lim_{x=+\infty} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \infty$.

Der Fall, daß $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$ die unbestimmte Form $\frac{\infty}{\infty}$ für $\lim x = a$ annimmt, läßt sich auf den vorigen durch die Substitution

$$x = a + \frac{1}{z}$$

und darauffolgenden Grenzübergang $\lim z = +\infty$ (oder $-\infty$) zurückführen; da aber

$$D_z \varphi \left[a + \frac{1}{z} \right] = - \frac{1}{z^2} \cdot \varphi' \left(a + \frac{1}{z} \right),$$

$$D_z \psi \left(a + \frac{1}{z} \right) = - \frac{1}{z^2} \cdot \psi' \left(a + \frac{1}{z} \right),$$

wobei die Differentiation rechts sich auf das x vertretende Aggregat $a + \frac{1}{z}$ bezieht, so ist

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{D_z \varphi \left(a + \frac{1}{z} \right)}{D_z \psi \left(a + \frac{1}{z} \right)} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\varphi' \left(a + \frac{1}{z} \right)}{\psi' \left(a + \frac{1}{z} \right)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}.$$

Die über das Verhalten von $\psi'(x)$ gemachte Voraussetzung lautet jetzt dahin, daß sich eine Umgebung von a wie in (5) muß bezeichnen lassen, innerhalb welcher $\psi'(x)$ nicht Null wird.

Sollte $\frac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$ bei dem vorgeschriebenen Grenzübergange wieder die unbestimmte Form $\frac{\infty}{\infty}$ annehmen, so geht man zu dem Verhältnis der zweiten Differentialquotienten über, sofern auch $\psi''(x)$ die angeführten Bedingungen erfüllt, usw.

Mitunter bedarf es nur einer anderen Schreibung, um eine Funktion, die die Form $\frac{\infty}{\infty}$ annimmt, so darzustellen, daß sie die Form $\frac{0}{0}$ erlangt; dies findet beispielsweise bei $\frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} (2n+1)x}$ für $x = \frac{\pi}{2}$ statt, wenn man $\frac{\cotg (2n+1)x}{\cotg x}$ dafür schreibt; bei $\frac{\pi}{\cotg \frac{\pi x}{2}}$ für $x = 0$, wenn man es in $\pi \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{x}$ umsetzt.

Beispiele. 1) Die vorhin behandelten zwei Fälle erledigen sich nach dem gegenwärtigen Verfahren wie folgt: Sind $p, p+1$ zwei aufeinanderfolgende natürliche Zahlen und $p \leq n < p+1$, so hört die Unbestimmtheit von

$$\frac{e^x}{x^n}$$

nach p -maliger, bzw. nach $(p+1)$ -maliger Wiederholung des

Verfahrens (6) auf, je nachdem $p = n$ oder $p < n$ ist; im ersten Falle ist

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{p(p-1) \dots 1} = +\infty,$$

im zweiten Falle

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{n(n-1) \dots (n-p) x^{n-p-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{p+1-n} e^x}{n(n-1) \dots (n-p)} = +\infty. \end{aligned}$$

Was ferner

$$\frac{lx}{x^n} \quad (n > 0)$$

anlangt, so ist schon nach einmaligem Differenzieren

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{lx}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{nx^n} = 0.$$

2) Auf die Funktion

$$\frac{x + \cos x}{x - \sin x}$$

ist für $\lim x = +\infty$ (wie auch $-\infty$) das Verfahren nicht anwendbar, weil es keine Zahl X gibt, über welche hinaus der Differentialquotient des Nenners, d. i. $1 - \cos x$, nicht mehr Null wird; auch nähert sich der Quotient der Ableitungen, $\frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$, keiner bestimmten Grenze; indessen zeigt der bloße Anblick, daß

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \cos x}{x - \sin x} = 1.$$

3) Die Funktion

$$\frac{l \operatorname{tg} ax}{l \operatorname{tg} x}$$

nimmt für $a > 0$ bei dem Grenzübergange $\lim x = +0$ die Form $\frac{\infty}{\infty}$ an, und es ist

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{l \operatorname{tg} ax}{l \operatorname{tg} x} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{a \cdot \sec^2 ax}{\operatorname{tg} ax}}{\frac{\sec^2 x}{\operatorname{tg} x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{a \sin 2x}{\sin 2ax} = \left(\frac{2a \cos 2x}{2a \cos 2ax} \right)_{x=0} = 1, \end{aligned}$$

wobei bemerkt wird, daß der Quotient der ersten Differentialquotienten, nämlich $\frac{a \sin 2x}{\sin 2ax}$, bei $x = 0$ die Form $\frac{0}{0}$ erlangt.

111. Die Form $0 \cdot \infty$. Wenn $f(x) = \varphi(x) \psi(x)$ und wenn bei einem bestimmten Grenzübergange $\lim x = a$

$$\lim \varphi(x) = 0, \quad \lim \psi(x) = \infty$$

wird, so nimmt $f(x)$ die unbestimmte Form $0 \cdot \infty$ an, die sich auf eine der Formen $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ bringen läßt, z. B. dadurch, daß man $f(x)$ in der Gestalt

$$\frac{\varphi(x)}{1/\psi(x)}, \quad \text{beziehungsweise} \quad \frac{\psi(x)}{1/\varphi(x)}$$

schreibt. Es treten dann die früheren Methoden in Kraft.

Einen Fall dieser Art bietet die Funktion

$$f(x) = x^m (lx)^n \quad (m > 0, n > 0)$$

daß für $\lim x = +0$, wenn nur auch m, n solche Zahlen sind, daß $x^m, (lx)^n$ reelle Bedeutung haben. Schreibt man

$$f(x) = \frac{(lx)^n}{x^{-m}},$$

so kann das Verfahren von 110 angewandt werden, wonach

$$\lim_{x=+0} f(x) = \lim_{x=+0} \frac{n(lx)^{n-1} \frac{1}{x}}{-m x^{-m-1}} = -\frac{n}{m} \lim_{x=+0} x^m (lx)^{n-1};$$

ist n eine natürliche Zahl, so gibt die n -malige Wiederholung dieses Vorganges schließlich

$$\lim_{x=+0} f(x) = (-1)^n \frac{n(n-1) \cdots 1}{m^n} \lim_{x=+0} x^n = 0,$$

und liegt n zwischen den natürlichen Zahlen p und $p+1$, so ist nach $(p+1)$ -maliger Wiederholung

$$\lim_{x=+0} f(x) = (-1)^{p+1} \frac{n(n-1) \cdots (n-p)}{m^{p+1}} \lim_{x=+0} x^m (lx)^{n-p-1} = 0,$$

weil $x^m (lx)^{n-p-1} = \frac{x^m}{(lx)^{p+1-n}}$ nun ein Bruch ist, dessen Zähler

gegen Null abnimmt, während der Nenner über jeden Betrag wächst.

Man hätte mit Berufung auf ein früher erledigtes Beispiel auch so vorgehen können: Setzt man $x = e^{-z}$, woraus $lx = -z$, so verwandelt sich $f(x)$ in

$$(-1)^n \frac{z^n}{e^{mz}} = \frac{(-1)^n}{m^n} \frac{(mz)^n}{e^{mz}},$$

und da $\lim x = +0$ zur Folge hat $\lim mz = +\infty$, so ist zufolge des ersten Beispiels in 110

$$\lim_{x=+0} f(x) = \frac{(-1)^n}{m^n} \lim_{mz=+\infty} \frac{(mz)^n}{e^{mz}} = 0.$$

Die Form $\infty \cdot 0$ tritt bei der Funktion

$$f(x) = x \left(a^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \quad (a > 0)$$

für $\lim x = +\infty$ (wie $-\infty$) ein; schreibt man dafür

$$f(x) = \frac{a^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}}$$

und setzt $\frac{1}{x} = z$, so hat man es mit dem Quotienten

$$\frac{a^z - 1}{z}$$

für $\lim z = 0$ zu tun, der die Form $\frac{0}{0}$ annimmt; daher ist nach 109, (2):

$$\lim_{x=\infty} x \left(a^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = \lim_{z=0} \frac{a^z - 1}{z} = \left(\frac{a^z \ln a}{1} \right)_{z=0} = \ln a.$$

Es soll gezeigt werden, daß $2^x \sin \frac{a}{2^x}$ für $x = \infty$ den Grenzwert a und $(a-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2a}$ für $x=a$ den Grenzwert $\frac{2a}{\pi}$ hat.

112. Die Form $\infty - \infty$. Wenn $f(x) = \varphi(x) - \psi(x)$, und wenn bei einem bestimmten Grenzübergange $\lim x = a$ die beiden Teile $\varphi(x)$, $\psi(x)$ zugleich gegen die Grenze $+\infty$ oder gegen die Grenze $-\infty$ konvergieren, so erscheint $f(x)$ in der unbestimmten Form $\infty - \infty$.

Zur Ermittlung des Grenzwertes von $f(x)$ läßt sich auch hier mitunter von Reihenentwicklungen zweckmäßiger Gebrauch machen. Handelt es sich z. B. um

$$f(x) = \sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}$$

für $\lim x = \infty$ — die beiden Quadratwurzeln positiv gedacht —, so bilde man mit Benutzung der Binomialreihe (98):

$$\begin{aligned} \sqrt{(a+x)(b+x)} &= x \left(1 + \frac{a+b}{x} + \frac{ab}{x^2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= x \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{a+b}{x} + \frac{ab}{x^2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{a+b}{x} + \frac{ab}{x^2} \right)^2 + \dots \right\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(a-x)(b-x)} &= x \left(1 - \frac{a+b}{x} + \frac{ab}{x^2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= x \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{a+b}{x} - \frac{ab}{x^2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{a+b}{x} - \frac{ab}{x^2} \right)^2 - \dots \right\}; \end{aligned}$$

diese Entwicklungen sind zulässig, sobald nur x so groß geworden ist, daß $\frac{a+b}{x} + \frac{ab}{x^2}$ und $\frac{a+b}{x} - \frac{ab}{x^2}$ dem Betrage nach unter der Einheit liegen; es ist dann

$$f(x) = a + b - \frac{(a+b)ab}{2x^2} - \dots$$

und hieraus

$$f(\infty) = \lim_{x=\infty} f(x) = a + b.$$

Desgleichen kann bei

$$f(x) = x - x^2 l \left(1 + \frac{1}{x} \right),$$

das für $\lim x = \infty$ die Form $\infty - \infty$ annimmt*), von der Reihenentwicklung Gebrauch gemacht werden; denn sobald $x > 1$ geworden, ist

$$f(x) = x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \dots \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3x} + \dots$$

und

$$\lim_{x=\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$$

*) Die folgende Rechnung belehrt selbst darüber, daß der zweite Teil, der die Form $\infty \cdot 0$ annimmt, den Grenzwert ∞ hat.

Wo dieser Weg nicht eingeschlagen werden kann oder beschwerlich ist, da bringe man $f(x)$ in eine Gestalt, die für $\lim x = a$ die unbestimmte Form $\frac{0}{0}$ annimmt, indem man

$$\varphi(x) = \frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}, \quad \psi(x) = \frac{\psi_1(x)}{\psi_2(x)}$$

setzt derart, daß $\varphi_2(x)$, $\psi_2(x)$ für $\lim x = a$ gegen Null, $\varphi_1(x)$, $\psi_1(x)$ aber weder gegen Null noch gegen ∞ konvergieren. Dann erlangt

$$f(x) = \frac{\varphi_1(x)\psi_2(x) - \varphi_2(x)\psi_1(x)}{\varphi_2(x)\psi_2(x)}$$

die Form $\frac{0}{0}$, welche nach früher entwickelten Methoden zu behandeln ist. Auch eine der beiden Darstellungen:

$$f(x) = \varphi(x) - \psi(x) = l \frac{e^{-\psi(x)}}{e^{-\varphi(x)}} = l \frac{e^{\varphi(x)}}{e^{\psi(x)}}$$

kann zum Ziele führen.

Beispiele. 1) Es sei für

$$f(x) = 2x \operatorname{tg} x - \pi \sec x$$

der Grenzwert zu bestimmen bei $\lim x = \frac{\pi}{2}$. Man findet

$$\lim_{x=\frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x=\frac{\pi}{2}} \frac{2x \sin x - \pi}{\cos x} = \left(\frac{2 \sin x + 2x \cos x}{-\sin x} \right)_{x=\frac{\pi}{2}} = -2.$$

2) Die Funktion $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$ wird bei $\lim x = 0$ unbestimmt; es ist nun:

$$\begin{aligned} \lim_{x=0} f(x) &= \lim_{x=0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x=0} \frac{2x - \sin 2x}{2x \sin^2 x + x^2 \sin 2x} \\ &= \lim_{x=0} \frac{2 - 2 \cos 2x}{2 \sin^2 x + 4x \sin 2x + 2x^2 \cos 2x} \\ &= \lim_{x=0} \frac{4 \sin 2x}{6 \sin 2x + 12x \cos 2x - 4x^2 \sin 2x} \\ &= \left(\frac{8 \cos 2x}{24 \cos 2x - 32x \sin 2x - 8x^2 \cos 2x} \right)_{x=0} = \frac{1}{3}; \end{aligned}$$

dreimal wiederholt sich die Form $\frac{0}{0}$ und erst der Quotient aus den vierten Differentialquotienten führt zu dem Grenzwerte.

3) Man weise nach, daß $\frac{1}{x^2} - \cotg^2 x$ für $x = 0$ den Grenzwert $\frac{2}{3}$ besitzt.

113. Die Formen 0^0 , ∞^0 , 1^∞ . Eine Funktion von der Gestalt

$$f(x) = \varphi(x)^{\psi(x)} \quad (\varphi(x) > 0)$$

kann zu drei weiteren unbestimmten Formen Anlaß bieten; sie nimmt nämlich, wenn bei einem bestimmten Grenzübergange $\lim x = a$

$$\lim \varphi(x) = 0 \quad \lim \psi(x) = 0,$$

die Form 0^0 ; ferner wenn

$$\lim \varphi(x) = \infty \quad \lim \psi(x) = 0,$$

die Form ∞^0 ; endlich wenn

$$\lim \varphi(x) = 1 \quad \lim \psi(x) = \infty,$$

die Form 1^∞ an. Geht man aber von der Funktion selbst zu ihrem Logarithmus über:

$$\lg f(x) = \psi(x) \lg \varphi(x),$$

so kommt man zu einem Ausdrucke, der in allen drei Fällen die bereits erledigte unbestimmte Form $0 \cdot \infty$ annimmt; existiert für ihn ein Grenzwert und ist dieser A , so ist

$$\lim_{x=a} f(x) = e^A.$$

Beispiele. 1) Der Logarithmus von $f(x) = x^x$, d. i. $x \lg x$, hat für $\lim x = +0$ zufolge 111 den Grenzwert 0; mithin ist

$$\lim_{x=+0} x^x = 1.$$

2) Für $\lim x = \frac{\pi}{2} - 0$ tritt bei

$$f(x) = (\lg x)^{\cos x}$$

die Form ∞^0 ein; der Logarithmus hiervon, in der Gestalt

$$\frac{\lg \lg x}{\sec x}$$

geschrieben, nimmt die Form $\frac{\infty}{\infty}$ an; nach zweimaliger Differentiation von Zähler und Nenner findet man aber

$$\begin{aligned} \lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} \frac{\lg \lg x}{\sec x} &= \lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} \frac{\frac{\sec^2 x}{\lg x}}{\sec x \lg x} \\ &= \lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} \frac{\sec x}{\lg^2 x} = \lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} \frac{\sec x \lg x}{2 \lg x \sec^2 x} = \lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} \frac{1}{2 \sec x} = 0, \end{aligned}$$

daher ist

$$\lim_{x=\frac{\pi}{2}-0} (\operatorname{tg} x)^{\cos x} = e^0 = 1.$$

3) Für $\lim z = \infty$ und ein beliebiges aber bestimmtes x erlangt

$$f(x) = \left(1 + \frac{x}{z}\right)^z$$

die Form 1^∞ ; der Logarithmus davon kann, sobald nur z dem absoluten Werte nach größer ist als x , entwickelt werden wie folgt:

$$z \ln \left(1 + \frac{x}{z}\right) = z \left(\frac{x}{z} - \frac{x^2}{2z^2} + \dots\right) = x - \frac{x^2}{2z} + \dots$$

und hat demnach für $\lim z = \infty$ den Grenzwert x ; infolgedessen ist

$$\lim_{z=\infty} \left(1 + \frac{x}{z}\right)^z = e^x.$$

(Vgl. 30, (J), (K); 95.)

4) Dieselbe unbestimmte Form wie in 3) stellt sich bei

$$f(x) = (\cos ax)^{\frac{b}{x^2}}$$

für $\lim x = 0$ ein; der Logarithmus hat die Form $\frac{0}{0}$ und gibt nach zweimaliger Differentiation

$$\begin{aligned} & \lim_{x=0} \frac{b \ln \cos ax}{x^2} \\ &= \lim_{x=0} \frac{-ab \sin ax}{2x \cos ax} = \left(\frac{-a^2 b \cos ax}{2 \cos ax - 2ax \sin ax} \right)_{x=0} = -\frac{a^2 b}{2}; \end{aligned}$$

daher ist

$$\lim_{x=0} (\cos ax)^{\frac{b}{x^2}} = e^{-\frac{a^2 b}{2}}.$$

5) Zu zeigen, daß $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\operatorname{cosec}^r x}$ für $\lim x = +0$ entweder den Grenzwert 1 oder $e^{-\frac{1}{6}}$ oder 0 hat, je nachdem $r <, =$ oder > 2 ist. (Man bestimme nach einmaliger Differentiation den Grad des Zählers und Nenners.)

6) Nachzuweisen, daß $\lim_{x=\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ und

$$\lim_{x=\frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{e}$$

ist.

Fünfter Abschnitt.

Maxima und Minima der Funktionen.

§ 1. Maxima und Minima der Funktionen einer Variablen.

114. Begriff der extremen Werte einer Funktion.
In dem Verlaufe einer nicht einförmigen oder *nicht monotonen* stetigen Funktion (17) sind solche Werte der Variablen von besonderer Bedeutung, bei welchen der Übergang vom Wachsen ins Abnehmen oder das Umgekehrte stattfindet, mit anderen Worten, bei welchen die Trennung der Kontinua erfolgt, welche die Funktion in abwechselndem Sinne durchläuft. Die für solche Werte der Variablen geltenden Werte der Funktion sind es, welche in den Anwendungen der Analysis häufig vorzugsweise in Betracht kommen. Man bezeichnet sie als *extreme Werte* der Funktion oder als *Extreme* kurzweg; ihre genaue Kennzeichnung und Unterscheidung besteht in Folgendem.

Es sei $f(x)$ eine in dem Intervalle (α, β) definierte eindeutige und stetige Funktion der Variablen x . Dieselbe hat an einer *innerhalb* (α, β) gelegenen Stelle $x = a$ einen *größten Wert* oder ein *Maximum*, wenn sich eine Umgebung von a feststellen läßt derart, daß der an der Stelle a geltende Wert $f(a)$ der Funktion größer ist als jeder andere aus dieser Umgebung; die Funktion hat an der mehrerwähnten Stelle einen *kleinsten Wert* oder ein *Minimum*, wenn sich eine Umgebung von a angeben läßt derart, daß der Funktionswert $f(a)$ kleiner ist als jeder andere aus dieser Umgebung.

Es läßt sich also dieser Definition zufolge ein positiver Betrag η so bestimmen, daß im Falle eines *Maximums*

$$(1) \quad f(a + h) - f(a) < 0$$

und im Falle eines *Minimums*

$$(2) \quad f(a + h) - f(a) > 0$$

für alle Werte von h , welche der Bedingung

$$|h| < \eta$$

genügen, mit alleiniger Ausnahme von $h = 0$.*)

Die zulässige Größe der Umgebung, also der äußerste Wert von η , wird davon abhängen, wie häufig $f(x)$ in (α, β) zwischen Wachstum und Abnahme wechselt; es darf aber für den Zweck der Untersuchung η unter diesem äußersten Werte bleiben und beliebig klein angenommen werden.

Die Begriffe des Maximums und Minimums beziehen sich also nicht auf die Gesamtheit der Werte der Funktion, sondern immer nur auf die Werte einer beliebigen Umgebung. Eine Funktion kann in dem ihr zugewiesenen Intervalle mehrere oder selbst unbegrenzt viele Extreme erlangen und unter ihren verschiedenen Maximis kann es ein größtes, ebenso unter ihren Minimis ein kleinstes geben; erst die Vergleichung dieser mit den Werten $f(\alpha)$, $f(\beta)$, welche die Funktion an den Grenzen des Intervalls besitzt, kann die Frage nach dem größten und kleinsten Wert der Funktion im Intervall (α, β) zur Entscheidung bringen.**)

115. Notwendige Bedingung für ein Extrem bei stetigem Verlauf des ersten Differentialquotienten. Der Übergang vom Wachsen zum Abnehmen oder umgekehrt kann in verschiedener Weise vor sich gehen. Wir stellen den wichtigsten, die Regel bildenden Fall an die Spitze und setzen voraus, die Funktion $f(x)$ besitze an jeder Stelle innerhalb (α, β) einen Differentialquotienten im eigentlichen Sinne oder einen *vollständigen* Differentialquotienten (20). Unter dieser Voraussetzung läßt sich der Satz erweisen, daß an einer Stelle, an

*) Nach einer von O. Stolz (Grundzüge der Differential- und Integralrechnung, Leipzig 1893) getroffenen Unterscheidung bezeichnet man die so definierten Extremwerte als *eigentliches* Maximum und Minimum und spricht von einem *uneigentlichen* Extrem, wenn bei noch so kleinem η Stellen $a + h$ existieren, an denen $f(a + h) = f(a)$ ist. Hier soll von dieser ausnahmsweisen Erscheinung abgesehen werden.

**) Man bezeichnet wohl auch die in obigem Sinne definierten Extreme als *relative* Maxima und Minima zum Unterschiede von den *absoluten*, die sich auf das *ganze* Intervall (α, β) beziehen.

welcher die Funktion ein Extrem erreicht, ihr Differentialquotient verschwindet.

Im Falle eines Maximums ist nämlich vermöge der Relation (1)

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

für Werte von h aus dem Intervalle $(-\eta, 0)$ positiv, für Werte aus $(0, \eta)$ negativ, und der eine Grenzwert dieses Quotienten für $\lim h = \mp 0$ kann daher weder negativ noch positiv sein, es muß also

$$(3) \quad f'(a) = 0$$

sein. Im Falle eines Minimums ist derselbe Quotient vermöge (2) links von a negativ, rechts davon positiv, sein als existierend vorausgesetzter Grenzwert für $\lim h = \mp 0$ kann deshalb weder positiv noch negativ, muß also notwendig gleich Null sein.

Daraus aber ist der folgende Schluß zu ziehen: Wenn die Funktion $f(x)$ an jeder Stelle zwischen α und β einen eigentlichen Differentialquotienten besitzt, so sind die Werte von x , für welche sie ein Extrem erlangen kann, unter den Wurzeln der Gleichung $f'(x) = 0$ zu suchen.

Wäre $x = a$ eine dieser Wurzeln, so bestünde die unmittelbarste Entscheidung der Frage, ob hier ein Extrem und welches von beiden stattfindet, in der Untersuchung des Vorzeichens von $f'(a+h)$ für entsprechend kleine, entgegengesetzt bezeichnete Werte von h ; ist nämlich $f'(a+h)$ in einer entsprechend klein festgestellten Umgebung von a links von a positiv, rechts davon negativ, so ist $f(x)$ in dieser Umgebung links von a wachsend, rechts von a abnehmend und erlangt in a selbst ein Maximum, bei dem umgekehrten Verhalten ein Minimum.

Die Funktion $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + b$ beispielsweise besitzt für alle Werte von x einen eigentlichen Differentialquotienten:

$$f'(x) = 6x(x-1),$$

und die Gleichung $f'(x) = 0$ hat die beiden Wurzeln $x = 0$ und $x = 1$. Bedeutet δ eine positive Zahl < 1 , so ist

$$f'(-\delta) = 6\delta(1+\delta) > 0$$

$$f'(\delta) = -6\delta(1-\delta) < 0;$$

demnach hat die Funktion an der Stelle $x = 0$ ein Maximum, und dieses ist $f(0) = b$. Ferner ist unter der gleichen Voraussetzung über δ

$$f'(1 - \delta) = -6\delta(1 - \delta) < 0$$

$$f'(1 + \delta) = 6\delta(1 + \delta) > 0,$$

an der Stelle $x = 1$ tritt also ein Minimum ein, und dasselbe ist $f(1) = b - 1$.

116. Unterscheidung zwischen Maximum und Minimum. Die Entscheidung kann einfacher getroffen werden, wenn die Funktion $f(x)$ an jeder Stelle innerhalb (α, β) auch einen eigentlichen zweiten Differentialquotienten $f''(x)$ besitzt und wenn dieser an der Stelle $x = a$ nicht Null ist. Es gilt dann der Satz: *Wenn $f''(a) < 0$, so ist $f(a)$ ein Maximum, und wenn $f''(a) > 0$, so ist $f(a)$ ein Minimum.*

Ist nämlich $f''(a) < 0$, so muß es eine Umgebung von a geben, in welcher auch

$$\frac{f'(a+h) - f'(a)}{h},$$

wovon ja $f''(a)$ der Grenzwert für $\lim h = \mp 0$ ist, negativ ist; wegen $f'(a) = 0$ bleibt in dieser Umgebung auch

$$\frac{f'(a+h)}{h}$$

negativ; daher ist $f'(a+h)$ links von a positiv, rechts davon negativ, $f(a)$ also in der Tat ein Maximum.

Ist $f''(a) > 0$, so muß sich eine Umgebung von a begrenzen lassen, in welcher auch

$$\frac{f'(a+h) - f'(a)}{h},$$

oder das diesem gleichkommende

$$\frac{f'(a+h)}{h}$$

positiv bleibt; infolgedessen ist $f'(a+h)$ links von a negativ, rechts davon positiv, $f(a)$ also tatsächlich ein Minimum.

Wenn jedoch $f''(a) = 0$ ist, dann gilt zunächst der folgende Satz: *Ist $f''(a) = 0$ und $f'''(a) \neq 0$, so ist $f(a)$ kein Extrem; ist aber auch $f'''(a) = 0$, dagegen $f^{IV}(a) \neq 0$, so ist $f(a)$ ein Extrem und es entscheidet das Vorzeichen von $f^{IV}(a)$ über*

die Art des Extrems nach derselben Regel, wie vorhin $f''(a)$ entschieden hat.

Wenn nämlich $f''(a) = 0$ und $f'''(a) < 0$, so sind die Kriterien dafür vorhanden, daß $f'(a)$ ein Maximum ist; da aber $f'(a) = 0$ ist, so muß $f'(a + h)$ in gehöriger Nähe und zu beiden Seiten von a negativ sein; dann aber ist $f(a)$ kein Extrem.

In gleicher Weise schließt man aus $f''(a) = 0$ und $f'''(a) > 0$, daß $f'(a) = 0$ ein Minimum ist, daß also $f'(a + h)$ in gehöriger Nähe und beiderseits von a positiv sein müsse, woraus folgt, daß $f(a)$ kein Extrem ist.

Der zweite Teil der Behauptung erweist sich folgendermaßen als richtig.

Aus $f'''(a) = 0$ und $f^{IV}(a) < 0$ schließt man, daß $f''(a) = 0$ ein Maximum ist, daß also eine Umgebung von a existiert, in welcher $f''(a + h)$ negativ bleibt mit alleinigem Ausschluß von $h = 0$; in dieser selben Umgebung ist $f'(a + h)$ abnehmend, und da $f'(a) = 0$, so ist $f'(a + h)$ links von a positiv, rechts davon negativ, infolgedessen $f(a)$ ein Maximum.

In analoger Weise ergibt sich, daß für $f^{IV}(a) > 0$ $f(a)$ ein Minimum ist.

117. Allgemeines Kriterium. Unter gewissen Voraussetzungen, die aber bei den gewöhnlich auftretenden Funktionen fast ausnahmslos vorhanden sind, läßt sich die Frage nach den Extremen allgemein erledigen. Die Funktion $f(x)$ besitze im ganzen Bereiche, in welchem sie betrachtet wird (etwa mit Ausnahme der Grenzen), eigentliche Differentialquotienten und für einen Wert $x = a$, für den $f'(a) = 0$, sei auch

$$f''(a) = 0, \quad f'''(a) = 0, \quad \dots \quad f^{(n-1)}(a) = 0,$$

hingegen $f^{(n)}(a) \neq 0$; ferner sei $f^{(n)}(x)$ wenigstens in einer angebaren Umgebung von a stetig.

Unter diesen Voraussetzungen läßt die Funktion in der letztgedachten Umgebung die Anwendung der Taylorsche Formel zu, und diese (91, (6) und (7)) gibt:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{f^{(n)}(a + \theta h)}{1 \cdot 2 \dots n} h^n, \quad (0 < \theta < 1)$$

woraus

$$(4) \quad f(a + h) - f(a) = \frac{h^n}{1 \cdot 2 \dots n} f^{(n)}(a + \theta h).$$

Vermöge der Stetigkeit von $f^{(n)}(x)$ läßt sich eine hinreichend kleine Umgebung von a feststellen so, daß innerhalb derselben $f^{(n)}(x)$ von $f^{(n)}(a)$ um beliebig wenig sich unterscheidet, daß also $f^{(n)}(a + \theta h)$ dasselbe Vorzeichen hat wie $f^{(n)}(a)$.

Dann hat für ein *gerades* n die Differenz $f(a + h) - f(a)$ in dieser ganzen Umgebung, also zu beiden Seiten von a , dasselbe Vorzeichen wie $f^{(n)}(a)$; $f(a)$ ist sonach ein Extrem und zwar ein Maximum, wenn $f^{(n)}(a) < 0$, ein Minimum, wenn $f^{(n)}(a) > 0$.

Für ein *ungerades* n dagegen ändert die Differenz $f(a + h) - f(a)$ mit h zugleich ihr Vorzeichen, infolgedessen ist $f(a)$ kein Extrem.

Das Ergebnis dieser Betrachtung kann in dem Satze zusammengefaßt werden: *An einer Stelle $x = a$, welche der Gleichung $f'(x) = 0$ genügt, hat die Funktion $f(x)$ ein Extrem nur dann, wenn der nächste an dieser Stelle nicht verschwindende Differentialquotient von $f(x)$ von gerader Ordnung ist; ist er negativ, so ist $f(a)$ ein Maximum, ist er positiv, so ist $f(a)$ ein Minimum.*

Die beiden in 116 nachgewiesenen Sätze sind spezielle Fälle dieses allgemeinen Satzes.

Das gemeinsame Merkmal des Maximums und Minimums, das in der Gleichung

$$f'(a) = 0$$

sich ausspricht, hat im Zusammenhalte mit 22, 2) eine einfache Bedeutung in dem Falle, wo man die Werte von $f(x)$ durch die Ordinaten einer Kurve in einem rechtwinkligen Koordinatensystem darstellt; es sagt aus, daß in einem Punkte, der einem Extrem entspricht, die Tangente an jene Kurve parallel ist zur Abszissenachse. Man erkennt leicht, daß dies auch für schiefwinklige Koordinaten gilt.

118. Beispiele. 1) Die in 115 behandelte Funktion

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + b,$$

deren Differentialquotient für $x = 0$ und $x = 1$ Null wird, erledigt sich mit Hilfe des zweiten Differentialquotienten

$$f''(x) = 12x - 6,$$

indem $f''(0) = -6$ und $f''(1) = 6$ ist; daher ist $f(0) = b$ ein Maximum und $f(1) = b - 1$ ein Minimum.

2) Eine Funktion von der Form

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m+1} + a_2 x^{m+2} + \dots$$

— m eine natürliche Zahl ≥ 2 —, wo die rechte Seite ein Polynom oder eine konvergente Potenzreihe ist, besitzt an der Stelle $x=0$ ein Extrem, wenn m *gerad*, und zwar ein Maximum oder Minimum, je nachdem a_0 negativ oder positiv ist; das Extrem selbst ist $f(0) = 0$.

Denn es ist $f'(0) = 0$, und der erste für $x=0$ nicht verschwindende Differentialquotient ist

$$f^{(m)}(x) = 1 \cdot 2 \dots m a_0 + 2 \cdot 3 \dots (m+1) a_1 x + \dots,$$

daher $f^{(m)}(0) = 1 \cdot 2 \dots m a_0$.

Von diesem Satze kann häufig Gebrauch gemacht werden.

So folgt aus ihm beispielsweise, daß

$$y = \frac{x^2}{2p} + q$$

ein Maximum oder Minimum erreicht bei $x=0$, je nachdem $p < 0$ oder $p > 0$; denn nach obigem gilt dies für $y - q$, und zwar ist das Extrem dieser Differenz 0, daher jenes von y gleich q . Desgleichen kann über das Extrem von

$$y = \alpha x^3 + 2\beta x + \gamma$$

entschieden werden; bringt man nämlich diese Gleichung auf die Form

$$y - \gamma + \frac{\beta^2}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} (\alpha x + \beta)^2,$$

so ist unmittelbar zu erkennen, daß $y - \gamma + \frac{\beta^2}{\alpha}$ für $x = -\frac{\beta}{\alpha}$ den maximalen oder minimalen Wert 0 annimmt, je nachdem $\alpha < 0$ oder $\alpha > 0$; dieselbe Erscheinung tritt auch bei y selbst ein, und zwar ist dessen maximaler, bzw. minimaler Wert $\gamma - \frac{\beta^2}{\alpha}$. (Scheitel der Parabel.)

Auch bei der Funktion

$$f(x) = x^m (a - x)^n,$$

in welcher m, n natürliche Zahlen ≥ 2 und a eine positive Zahl bedeuten sollen, kann der Satz benutzt werden; faßt man

sie als nach x geordnetes Polynom auf, so ist $a^n x^n$ das niedrigste Glied, daher $f(0) = 0$ ein Minimum, wenn m gerad ist; man kann die Funktion aber auch in der Gestalt

$$(a - (a - x))^m (a - x)^n$$

schreiben und in ein nach $a - x$ geordnetes Polynom umformen, dessen niedrigstes Glied dann $a^n (a - x)^n$ ist; infolgedessen ist $f(a) = 0$ ein Minimum, wenn n gerad ist. Ein Extrem, und zwar ein Maximum, besitzt die Funktion unbedingt; denn

$$f'(x) = x^{m-1} (a - x)^{n-1} \{ m a - (m + n) x \}$$

verschwindet außer an den beiden erledigten Stellen $x = 0$ und $x = a$ auch an der Stelle

$$x = \frac{m a}{m + n},$$

und weil bei dem Durchgange durch dieselbe $f'(x)$ von positiven Werten zu negativen Werten übergeht, so ist

$$f\left(\frac{m a}{m + n}\right) = m^m n^n \left(\frac{a}{m + n}\right)^{m+n}$$

ein Maximum.

3) Die extremen Werte der Funktion

$$(\alpha) \quad y = \frac{a x^2 + 2 b x + c}{A x^2 + 2 B x + C}$$

können außer auf dem Wege der Differentialrechnung auch in der folgenden rein algebraischen Weise bestimmt werden. Ordnet man die Gleichung nach x und löst die so erhaltene quadratische Gleichung:

$$(A y - a) x^2 + 2(B y - b) x + C y - c = 0$$

nach x auf:

$$x = \frac{-(B y - b) \pm \sqrt{(B y - b)^2 - (A y - a)(C y - c)}}{A y - a},$$

so bestimmen die Grenzen für die Realität von x zugleich die extremen Werte von y ; man erhält sie aus der Gleichung

$$(B y - b)^2 - (A y - a)(C y - c) = 0,$$

die geordnet lautet:

$$(\beta) \quad (A C - B^2) y^2 - (A c + a C - 2 B b) y + a c - b^2 = 0;$$

sie hat aber zur Folge

$$(\gamma) \quad x = -\frac{By - b}{Ay - a}$$

und daraus ergibt sich weiter mit Berücksichtigung des ursprünglichen Ansatzes:

$$(\delta) \quad y = \frac{ax + b}{Ax + B} = \frac{bx + c}{Bx + C},$$

so daß man zur Bestimmung der Stellen, an welchen ein Wechsel von wachsenden zu abnehmenden y und umgekehrt stattfindet, die quadratische Gleichung hat:

$$(\varepsilon) \quad (Ab - aB)x^2 + (Ac - aC)x + Bc - bC = 0.$$

Entweder bestimmt man aus (β) die Werte von y und dazu mittels (γ) die zugehörigen Werte von x , oder aus (ε) die Werte von x und mittels (δ) die dazugehörigen Werte von y .

Beispielsweise ergibt sich für $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}$ die Lösung:

$$x_1 = 1, y_1 = 3 \text{ (Maximum); } x_2 = -1, y_2 = \frac{1}{3} \text{ (Minimum).}$$

4) Es sind die extremen Werte der Funktion

$$f(x) = a \cos x + b \sin x$$

festzustellen.

Besitzt eine periodische Funktion — und eine solche ist $f(x)$ — *einen* extremen Wert, so besitzt sie deren unendlich viele von gleicher Größe und zwar an Stellen, welche um je eine Periode voneinander abstehen; deshalb genügt es, die Untersuchung auf das Intervall einer Periode, hier also auf $(0, 2\pi)$, zu beschränken.

Es ist

$$f'(x) = -a \sin x + b \cos x$$

$$f''(x) = -a \cos x - b \sin x;$$

aus $f'(x) = 0$ ergibt sich

$$\sin x : \cos x = b : a,$$

woraus

$$\sin x = \frac{b}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos x = \frac{a}{\pm \sqrt{a^2 + b^2}};$$

für diese Werte von $\sin x$, $\cos x$ nimmt $f''(x)$ einen der Werte

$$\mp \sqrt{a^2 + b^2}$$

an; infolgedessen hat die Funktion an der durch

$$\sin x = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

bestimmten Stelle ein Maximum von der Größe $\sqrt{a^2 + b^2}$ und an der durch

$$\sin x = \frac{b}{-\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos x = \frac{a}{-\sqrt{a^2 + b^2}}$$

bestimmten Stelle ein Minimum von der Größe $-\sqrt{a^2 + b^2}$.

Man bemerke, daß sich die vorgelegte Funktion in die Gestalt

$$f(x) = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(x - \arctg \frac{b}{a} \right)$$

bringen läßt, an welcher die extremen Werte unmittelbar zu erkennen sind.

5) Die Zahl a ist in zwei Teile zu zerlegen derart, daß das Produkt dieser Teile den größtmöglichen Wert annehme.*)

Ist der eine Teil x , so ist $a - x$ der andere, und es handelt sich um das Maximum von

$$f(x) = x(a - x).$$

Aus $f'(x) = a - 2x = 0$ folgt $x = \frac{a}{2}$, und da $f''(x) = -2$ negativ ist, so ist tatsächlich

$$f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}$$

der größtmögliche Wert des Produktes.

Auf diesen einfachen Fall lassen sich mancherlei Probleme zurückführen; als Beleg dafür mögen die folgenden dienen.

a) Unter den Rechtecken von gegebenem Umfange $2a$ jenes von der größten Fläche zu bestimmen.

Heißt eine Seite des Rechtecks x , so ist $a - x$ die andere; es soll also $x(a - x)$ ein Maximum werden. Das verlangte Rechteck ist demnach das Quadrat.

*) In geometrischer Fassung zuerst von *P. Fermat* (1638) behandelt.

β) Unter den einem gegebenen Kreise vom Durchmesser a eingeschriebenen Rechtecken dasjenige von der größten Fläche aufzusuchen.

Ist x die eine Seite des Rechtecks, so ist das Quadrat der anderen $a^2 - x^2$, $x\sqrt{a^2 - x^2}$ die Fläche; ihr Quadrat $x^2(a^2 - x^2)$ wird ein Maximum für $x^2 = \frac{a^2}{2}$, die Fläche selbst ist dann ebenfalls ein Maximum $= \frac{a^3}{2}$ und der Gestalt nach ein Quadrat, weil $x = \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$.


γ) Den Elevationswinkel bei dem schiefen Wurf zu bestimmen, bei welchem sich die größte Wurfweite einstellt.

Heißt c die Wurfgeschwindigkeit, g die Beschleunigung der Schwerkraft und x der Elevationswinkel, so ist $\frac{2c^2 \sin x \cos x}{g}$ die Wurfweite; sie wird zu einem Maximum, wenn $\sin x \cos x$ oder $\sin^2 x \cos^2 x = \sin^2 x (1 - \sin^2 x)$ seinen größten Wert erlangt; dies aber geschieht für $\sin^2 x = \frac{1}{2}$, also für $x = \frac{\pi}{4}$, d. i. bei einem Winkel von 45° .

δ) Die Höhenlage der Öffnung in der vertikalen Seitenwand eines Gefäßes zu bestimmen, bei welcher die Ausflußweite am größten ist.

Bedeutet h die Tiefe der horizontalen Grundebene und x die Tiefe der Öffnung unter dem Flüssigkeitsspiegel, so ist die Ausflußweite $2\sqrt{x(h-x)}$; sie wird am größten, wenn $x(h-x)$ ein Maximum erreicht, und dieses tritt für $x = \frac{h}{2}$ ein.

6) Es sind zwei Punkte A, B und eine Gerade XX' gegeben (Fig. 22); man soll jene Punkte P in XX' bestimmen, für welche der Winkel APB — als relative Größe aufgefaßt — einen extremen Wert erlangt.



Bezeichnet O den Schnittpunkt der Geraden AB mit XX' , so ist

$$\theta = APB = XPB - XPA;$$

setzt man $OA = a$, $OB = b$, $OP = x$, $\angle XOA = \alpha$, fällt AA' und BB' senkrecht zu XX' , so findet sich:

$$XPA = \text{Arc tg } \frac{a \sin \alpha}{a \cos \alpha - x}$$

$$XPB = \text{Arc tg } \frac{b \sin \alpha}{b \cos \alpha - x}$$

und daraus

$$\begin{aligned} \theta &= \text{Arc tg } \frac{b \sin \alpha}{b \cos \alpha - x} - \text{Arc tg } \frac{a \sin \alpha}{a \cos \alpha - x} \\ &= \text{Arc tg } \frac{(a - b) \sin \alpha \cdot x}{ab - (a + b) \cos \alpha \cdot x + x^2}. \end{aligned}$$

Um die Rechnung zu vereinfachen, bezeichne man Zähler und Nenner des letzten Bruches mit u, v , so daß $\theta = \text{Arc tg } \frac{u}{v}$; dann ist

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{\frac{u'v - uv'}{v^2}}{1 + \frac{u^2}{v^2}} = \frac{u'v - uv'}{u^2 + v^2},$$

und es lautet somit die für einen extremen Wert notwendige Bedingung:

$$u'v - uv' = 0,$$

d. h.

$$\begin{aligned} &(a - b) \sin \alpha \{ ab - (a + b) \cos \alpha \cdot x + x^2 \} \\ &- (a - b) \sin \alpha \cdot x \{ -(a + b) \cos \alpha + 2x \} = 0, \end{aligned}$$

oder nach Ausführung der Rechnung

$$x^2 - ab = 0,$$


woraus

$$x = \pm \sqrt{ab}.$$

In analytischem Sinne entspricht die eine Lösung einem Maximum, die andere einem Minimum von θ ; um eine Unterscheidung treffen zu können, ist eine Festsetzung über θ notwendig: θ soll den *hohlen* Winkel bedeuten, durch welchen PA in PB übergeführt wird, und soll *negativ* oder *positiv* sein, je nachdem die Drehung im Sinne des Uhrzeigers oder in dem entgegengesetzten Sinne vor sich geht. Unter solchen Umständen ist θ positiv, wenn in Fig. 22 P rechts von O liegt, negativ, wenn P links von O liegt; es entspricht dann $x = +\sqrt{ab}$ ein Maximum, $x = -\sqrt{ab}$ ein Minimum.

Sind a, b entgegengesetzt bezeichnet, liegen also A, B zu entgegengesetzten Seiten von XX' (Fig. 23), so zeigt die Lösung an, daß es keinen größten oder kleinsten Wert von θ gibt. Versteht man unter θ den Winkel, durch welchen PA in PB übergeführt wird mittels einer Drehung gegen den Sinn des Uhrzeigers*), so durchläuft θ , während x das Intervall $(-\infty, +\infty)$ beschreibt, beständig abnehmend das Intervall $(2\pi, 0)$, es findet daher tatsächlich weder ein Maximum noch ein Minimum statt.


Fig. 23



Die Aufgabe kann durch geometrische Betrachtung wie folgt gelöst werden. Den Ort der Punkte P , für welche der Winkel APB (Fig. 22) konstant ist, bildet ein Kreisbogen über der Sehne AB ; die beiden Kreise des Kreisbüschels mit den Grundpunkten A, B , welche die Gerade XX' berühren, geben in den Berührungspunkten die Lösungen der Aufgabe. Denn, geht man von einem dieser Kreise über zu einem ein wenig größeren aus dem Büschel, der die Gerade XX' schneidet, so ruht in diesem, wie man sich durch eine einfache Betrachtung überzeugt, über der Sehne AB ein kleinerer Winkel als in dem berührenden Kreise.

Handelte es sich in Fig. 22 um jenen Punkt in XX' , aus welchem die Strecke AB unter dem größten Winkel erscheint, so entspräche dieser Frage der Punkt $x = +\sqrt{ab}$, rechts von O .

Fig. 24.



7) Es sind zwei Punkte A, B und eine sie nicht trennende Gerade XX' gegeben (Fig. 24). Man soll den kürzesten über einen Punkt von XX' führenden Weg von A nach B bestimmen.

Einem Grundsatz der Geometrie zufolge wird der Weg aus zwei geradlinigen Strecken sich zusammensetzen, so daß es darauf ankommt, den Punkt P in XX' so zu bestimmen, daß $s = AP + PB$ ein Minimum werde.

*) Die Festsetzung ist beidemal so getroffen, daß θ bei Überschreitung von $x = 0$ stetig bleibt.

Setzt man $AA' = a$, $BB' = b$, $A'B' = c$, $A'P = x$, so ist

$$s = \sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + (c-x)^2},$$

und die notwendige Bedingung für ein Extrem lautet:

$$(\alpha) \quad \frac{ds}{dx} = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{c-x}{\sqrt{b^2 + (c-x)^2}} = 0,$$

oder in den Linien der Figur ausgedrückt:

$$\frac{A'P}{AP} = \frac{PB'}{BP};$$

daraus schließt man auf die Ähnlichkeit der Dreiecke $AA'P$ und $BB'P$ und hieraus wieder auf die Gleichheit der Winkel $X'PA$ und XPB (Reflexionsgesetz). Die Konstruktion von P geschieht in der Weise, daß $B'B_1 = BB'$ gemacht und A mit B_1 verbunden wird.

Die direkte Verfolgung der Bedingungsgleichung (α) führt nach Beseitigung der Irrationalitäten und der Nenner zu der quadratischen Gleichung

$$(\beta) \quad (b^2 - a^2)x^2 + 2a^2cx - a^2c^2 = 0,$$

und diese gibt die beiden Wurzeln

$$x_1 = \frac{ac}{a+b}, \quad x_2 = \frac{ac}{a-b};$$

die erste leitet auf die gefundene Lösung hin; denn aus der hervorgehobenen Ähnlichkeit folgt

$$A'P : a = (c - A'P) : b,$$

woraus

$$A'P = \frac{ac}{a+b} = x_1.$$

Die zweite Lösung ist der gestellten Aufgabe fremd und rührt daher, daß die Gleichung (β) umfassender ist als (α) infolge der ausgeführten Quadrierung; die Gleichung (β) schließt auch die Bedingung für das Maximum von $AP - BP$ oder von

$$\sqrt{a^2 + x^2} - \sqrt{b^2 + (c-x)^2}$$

in sich und hierfür gilt x_2 , das den Schnittpunkt Q der Geraden AB mit XX' bestimmt; in der Tat ist

$$AP - PB \leq AB,$$

daher AB der Maximalwert der Differenz $AP - PB$, welcher sich dann einstellt, wenn P mit Q zusammenfällt.

Man hätte auch von der folgenden Betrachtung ausgehen können. Der Ort der Punkte P , für welche $AP + PB$ einen bestimmten konstanten Wert s hat, ist eine Ellipse mit den Brennpunkten AB und der großen Achse s (Fig. 24); die kleinste unter diesen (konfokalen) Ellipsen, welche mit der Geraden XX' reelle Punkte gemein hat, ist diejenige, welche sie berührt; der Berührungspunkt bestimmt die Lösung der Aufgabe und hat nach einer bekannten Eigenschaft der Ellipsentangente eine solche Lage, daß $\sphericalangle X'PA = \sphericalangle XPB$.

8) Es sind zwei Punkte A, B und eine sie trennende Gerade XX' gegeben (Fig. 25). Man soll denjenigen Punkt P in XX' bestimmen, für welchen die Differenz

$$d = AP - PB$$

ein Maximum wird.

Die analytische Behandlung der Aufgabe führt zu der nämlichen Gleichung (β) wie vorhin. Von den beiden Wurzeln entspricht nun

$$x_2 = \frac{ac}{a-b}$$

dem verlangten Maximum und liefert den Punkt P , zu dessen Konstruktion $B'B_1 = BB'$ zu machen und A mit B_1 zu verbinden ist; dieser Punkt ist also durch die Gleichheit der Winkel $X'PA$ und $X'PB$ charakterisiert. Die zweite Lösung

$$x_1 = \frac{ac}{a+b},$$


welche auf den Schnittpunkt Q der Geraden AB mit XX' hinleitet, ist der gestellten Aufgabe fremd und bestimmt das Minimum von $AP + PB$; denn tatsächlich ist

$$AP + PB \geq AB,$$

daher AB der kleinste Wert von $AP + PB$, welcher eintritt, wenn P mit Q zusammenfällt.


Geometrisch löst sich die gestellte Aufgabe durch folgende Betrachtung. Der Ort der Punkte P , für welche die Differenz

Fig. 25.



$AP - BP$ einen bestimmten konstanten Wert d hat, ist eine Hyperbel mit den Brennpunkten A, B und der reellen Achse d ; diejenige unter diesen konfokalen Hyperbeln, welche die Gerade XX' berührt, hat unter denen, die mit dieser Geraden reelle Punkte gemein haben, die größte reelle Achse; ihr Berührungspunkt bestimmt also die Lösung der Aufgabe und liegt nach einer bekannten Eigenschaft der Hyperbel so, daß $\sphericalangle X'PA = \sphericalangle X'PB$.

9) Es sind zwei Punkte A, B und eine sie trennende Ebene MM' gegeben (Fig. 26). Man soll den Weg von A nach B bestimmen, welchen ein Bewegliches in der kürzesten Zeit zurücklegt, wenn es sich von A bis zur Ebene mit der Geschwindigkeit u und von da ab bis B mit der Geschwindigkeit v bewegt.*)



Der Weg wird sich notwendig aus zwei geradlinigen Strecken zusammensetzen und bestimmt sein, sobald man den Punkt P

der Ebene kennt, über welchen er führt. Von diesem läßt sich ferner erweisen, daß er in die Verbindungslinie der orthogonalen Projektionen A', B' von A, B auf MM' fällt, daß der Weg selbst also in der durch A, B zu MN gelegten Normalebene verläuft. Denn zu einem Wege wie AQB , der über einen Punkt Q außer $A'B'$ führt, läßt sich immer ein Weg finden, der in kürzerer Zeit zurückgelegt wird als AQB ; man braucht nur QP senkrecht zu $A'B'$ zu ziehen, und erkennt sogleich, daß $AP < AQ$, $BP < BQ$, daß also auch APB in kürzerer Zeit zurückgelegt wird als AQB .

Ist $AA' = a$, $BB' = b$, $A'B' = c$, $A'P = x$, so ist die für den Weg APB erforderliche Zeit

$$t = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{u} + \frac{\sqrt{b^2 + (c-x)^2}}{v},$$

*) Mit dieser Aufgabe befaßte sich *P. Fermat* (1662), der ein Verfahren zur Bestimmung der Maxima und Minima gefunden hatte, das im Wesen auf die Annullierung des ersten Differentialquotienten hinauskommt. *Leibniz* nahm sie in die historisch denkwürdige Abhandlung auf, die in der zweiten Fußnote zu 22 zitiert ist und die sich neben dem Tangentenproblem auch mit den Extremwerten beschäftigt.

und ihr kleinster Wert ergibt sich, wenn P so gewählt wird, daß

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{u\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{c-x}{v\sqrt{b^2 + (c-x)^2}} = 0,$$

oder in den Linien der Figur ausgedrückt, daß

$$\frac{1}{u} \cdot \frac{A'P}{AP} = \frac{1}{v} \cdot \frac{PB'}{BP};$$

bezeichnet man also die Winkel APN und BPN' , welche die Wegteile mit dem Lote NN' zur Ebene einschließen, mit α , β , so ist der verlangte Weg durch die Beziehung

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{u}{v}$$

gekennzeichnet, wonach das Sinusverhältnis der genannten Winkel gleich sein muß dem analog gebildeten Verhältnis der Geschwindigkeiten (Refraktionsgesetz).

10) Man erledige die folgenden Fälle.

a) $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$

$\{x = 1, y = 2 \text{ (Max.)}; x = 2, y = 1 \text{ (Min.)}\}.$

b) $y = x - x^3$

$\left\{x = \frac{\sqrt{3}}{3}, y = \frac{2\sqrt{3}}{9} \text{ (Max.)}; x = -\frac{\sqrt{3}}{3}, y = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \text{ (Min.)}\right\}.$

c) $y = x^3 - 3x^2 + 6x$ { weder ein Max. noch ein Min. }.

d) $y = \frac{x^3 - x - 1}{x^2 + x + 1}$

$\{x = 0, y = -1 \text{ (Min.)}; x = -2, y = \frac{5}{3} \text{ (Max.)}\}.$

11) Ein einseitig offenes zylindrisches Hohlgefäß von gegebenem Fassungsraum ist so zu formen, daß es eine möglichst kleine Oberfläche habe (Basisradius = Höhe).

12) Ein beiderseits geschlossener Hohlzylinder von gegebenem Volumen ist so zu formen, daß er eine möglichst kleine Oberfläche besitze (Basisdurchmesser = Höhe).

13) Einer gegebenen Kugel ist ein Kegel von minimalem Volumen umzuschreiben (Höhe = doppeltem Kugeldurchmesser, Kegelvolumen = doppeltem Kugelvolumen).

14) Der Raum unter einem kegelförmigen Zeltdach ist gegeben; wie ist dasselbe zu gestalten, damit es eine möglichst

kleine Oberfläche (Mantelfläche) erhalte? (Höhe = Basisradius $\times \sqrt{2}$; Zentriwinkel des ausgebreiteten Mantels $207^{\circ}50'$).

119. Extreme Werte bei singulärem Verhalten des Differentialquotienten. Die bisher gepflogenen Untersuchungen über die Extreme einer stetigen Funktion $f(x)$ waren an die Voraussetzung geknüpft, daß die Funktion an jeder Stelle innerhalb des Intervalls (α, β) , für welches sie definiert ist, einen vollständigen Differentialquotienten besitzt. Aber auch bei anderem Verhalten der Funktion können sich extreme Werte einstellen.

1) Angenommen, an einer Stelle a zwischen α und β höre die Ableitung $f'(x)$ auf definiert zu sein; dagegen gebe es dort einen bestimmten linken und ebenso einen bestimmten rechten Differentialquotienten (20), und die beiden seien ungleich bezeichnet; dann ist $f(a)$ ein Maximum oder ein Minimum, je nachdem bei der angegebenen Ordnung der beiden Differentialquotienten ein Übergang vom positiven zum negativen oder das Umgekehrte stattfindet.

Denn im ersten Falle ist

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h},$$

das für $\lim h = -0$ gegen eine positive Grenze konvergiert, für negative h , deren Betrag über eine angebbare Grenze nicht hinausreicht, positiv, folglich für solche h

$$f(a+h) - f(a) < 0;$$

derselbe Quotient, da er für $\lim h = +0$ gegen eine negative Grenze konvergiert, bleibt für positive h unter einem angebbaren Betrage negativ, so daß für solche h

$$f(a+h) - f(a) < 0;$$

dadurch ist aber $f(a)$ als Maximum erwiesen (114, (1)).

Ähnlich gestaltet sich der Beweis im zweiten Falle.

Der Übergang vom Wachsen ins Abnehmen oder umgekehrt äußert sich, wenn man $f(x)$ durch die Ordinaten einer Kurve darstellt, im vorliegenden Falle in solcher Weise, daß die Kurve an der Übergangsstelle zwei verschiedene Tangenten aufweist (17, Fig. 4).


Als Beispiel diene die Funktion

$$f(x) = b + \sqrt[3]{(x-a)^2},$$

wo die Wurzel als *positiv* aufgefaßt wird; diese Funktion besitzt an jeder Stelle mit Ausnahme von $x = a$ einen bestimmten Differentialquotienten:

$$f'(x) = \frac{x-a}{\sqrt[3]{(x-a)^2}},$$

der negativ und $= -1$ ist im Intervalle $(-\infty, a)$, positiv und $= +1$ im Intervalle $(a, +\infty)$; an der Stelle a selbst ist der linke Differentialquotient -1 , der rechte $+1$, daher ist $f(a) = b$ ein Minimum. — Die Funktion $f(x)$ ist geometrisch durch die Ordinaten der Schenkel des rechten Winkels LMN (Fig. 27) dargestellt, dessen Scheitel die Koordinaten (a, b) hat und dessen Schenkel gegen die Achsen gleichgeneigt sind.




2) Angenommen ferner, die Ableitung $f'(x)$ von $f(x)$ sei an einer Stelle $x = a$ innerhalb (α, β) , an der die Funktion selbst einen bestimmten Wert $f(a)$ hat, nicht definiert und werde bei Annäherung an dieselbe unendlich groß in der Weise, daß $\lim_{x \rightarrow a-0} f'(x) = +\infty$ und $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) = -\infty$ oder umgekehrt;

dann ist $f(a)$ ein Extrem und zwar ein Maximum, wenn $f'(x)$ sich in der erstgedachten Weise verhält, ein Minimum, wenn es das umgekehrte Verhalten zeigt.

Die Begründung hierfür ist dieselbe wie vorhin.

Der Übergang vom Wachsen ins Abnehmen oder umgekehrt äußert sich bei geometrischer Darstellung jetzt so, daß die beiden bei $x = a$ zusammenstoßenden Teile der Kurve eine zur y -Achse parallele Tangente haben (Fig. 28).



Eine solche Erscheinung weist beispielsweise die durchaus stetige Funktion

$$f(x) = b + \sqrt[3]{(x-a)^2}$$

auf, indem ihr Differentialquotient

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-a}},$$

an der Stelle $x = a$ nicht existiert, links davon $-\infty$, rechts $+\infty$ wird bei unbegrenzter Annäherung des x an a ; daher ist $f(a) = b$ ein Minimum (Fig. 28).

120. Extreme Werte einer implizit gegebenen Funktion. Es bleibt noch zu zeigen, wie man *die extremen Werte einer implizit gegebenen Funktion* ermittelt.

Durch die Gleichung

$$(5) \quad F(x, y) = 0$$

sei y als stetige Funktion von x definiert. Ihr Differentialquotient $\frac{dy}{dx}$ ergibt sich aus der Gleichung

$$(6) \quad \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0;$$

er muß — von den in 119 behandelten Ausnahmefällen abgesehen, welche jedesmal eine besondere Untersuchung erfordern — für einen extremen Wert verschwinden, und dies hat zur Folge, daß auch

$$(7) \quad \frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

wird. Besitzen nun die Gleichungen (5) und (7) gemeinsame Lösungen, deren eine

$$x = a, \quad y = b$$

sein möge, so bezeichnet $x = a$ eine Stelle, an welcher y einen größten oder kleinsten Wert haben kann, und dieser extreme Wert selbst ist dann $y = b$. Darüber kann im Sinne von 116 in vielen Fällen schon durch den zweiten Differentialquotienten $\frac{d^2y}{dx^2}$ entschieden werden; dieser aber ergibt sich *allgemein* aus der Gleichung:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{d^2y}{dx^2} = 0,$$

die durch nochmalige Differentiation der Gleichung (6) entsteht (57); im vorliegenden Falle soll er jedoch an der Stelle $x = a$ untersucht werden, an welcher die Funktion y selbst den Wert b hat und wo $\frac{dy}{dx} = 0$ ist; für diese Stelle gilt also die einfache Beziehung

$$\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right)_{a,b} + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{a,b} \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)_a = 0$$

woraus

$$(8) \quad \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{x=a} = - \left(\frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}}{\frac{\partial F}{\partial y}} \right)_{a, b}.$$

Ist dieser Wert nicht Null, so zeigt sein Vorzeichen an, ob $y = b$ ein Maximum ist oder ein Minimum.

Die Resultate dieser Untersuchung werden hinfällig, wenn für $x = a$, $y = b$ der Differentialquotient $\frac{\partial F}{\partial y}$ verschwindet; denn dann ist die Gleichung (7) eine Folge von (6) auch dann, wenn $\frac{dy}{dx}$ nicht Null ist. Dieser Fall wird später in anderem Zusammenhange zur Erledigung kommen.

Beispiele. 1) Es sind die extremen Werte von y zu bestimmen, wenn

$$F(x, y) = x^3 y^3 + y - x = 0.$$

Verbindet man mit dieser Gleichung die weitere

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 y^3 - 1 = 0,$$

so führt die Auflösung beider zu dem Wertepaar

$$x = \sqrt[5]{\frac{9}{8}}, \quad y = \sqrt[5]{\frac{4}{27}};$$

für dieses erlangt

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 6xy^3 \quad \text{den Wert } 2\sqrt[5]{\frac{8}{9}},$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3x^3 y^2 + 1 \quad \text{den Wert } \frac{5}{2},$$

folglich ist an der errechneten Stelle

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{4}{5} \sqrt[5]{\frac{8}{9}}$$

negativ und aus diesem Grunde $y = \sqrt[5]{\frac{4}{27}}$ das Maximum von y .

2) Für die in 58, 2) bereits behandelte Funktion y , definiert durch die Gleichung

$$F(x, y) = x^3 - 3axy + y^3 = 0,$$

die extremen Werte zu bestimmen.

Aus der gegebenen und der aus ihr abgeleiteten Gleichung

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - 3ay = 0$$

ergeben sich durch Auflösung die Wertepaare:

$$x_1 = 0, y_1 = 0; \quad x_2 = a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{2}, y_2 = a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{4};$$

für das erste nimmt

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - 3ax$$

den Wert 0 an und es tritt der erwähnte Ausnahmefall ein; für das zweite hat dieser Differentialquotient den Wert $3a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{2}$, der zweite Differentialquotient

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = 6x$$

den Wert $6a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{2}$; mithin ist an dieser zweiten Stelle

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{2}{a},$$

infolgedessen $y_2 = a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{4}$ ein Maximum oder ein Minimum der Funktion y , je nachdem $a > 0$ oder $a < 0$ ist

3) Ist $xy(x-y) = 2a^3$, so ist für $x = -a$ $y = -2a$ ein Maximum oder ein Minimum, je nachdem $a > 0$ oder $a < 0$ ist.

4) Wenn $x^3 + y^3 - 4a^2xy = 0$ und $a > 0$ ist, so entspricht die Lösung: $x = a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{3}$, $y = a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{27}$ dem Maximum, die Lösung: $x = -a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{3}$, $y = -a^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{27}$ dem Minimum von y .

§ 2. Maxima und Minima der Funktionen mehrerer unabhängigen Variablen.

121. Kriterien für eine Funktion zweier Variablen.

Wir gehen von einer Funktion zweier Variablen $z = f(x, y)$ aus, welche auf dem Gebiete P eindeutig und stetig ist. Dieselbe hat an einer innerhalb P gelegenen Stelle $x = a$, $y = b$ ein Maximum, bzw. ein Minimum, wenn sich eine Umgebung von a/b feststellen läßt derart, daß der Funktionswert $f(a, b)$ größer, bzw. kleiner ist als jeder andere aus dieser Umgebung entnommene Wert der Funktion. Es muß sich also eine

Es sei nun a/b eine aus diesen Gleichungen hervorgegangene Lösung. Zur weiteren Entscheidung werde der zweite totale Differentialquotient (54, (4)):

$$(4) \quad \frac{d^2 f}{ds^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cos^2 \varphi + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cos \varphi \cos \psi + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \cos^2 \psi$$

für die Stelle a/b herangezogen; er muß, soll $f(a, b)$ ein Maximum sein, für alle Richtungen negativ, und soll $f(a, b)$ ein Minimum sein, für alle Richtungen positiv sein. Dazu ist vor allem erforderlich, daß weder $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ noch $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ verschwinde; denn wäre $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$, so würde $\frac{d^2 f}{ds^2} = 0$ für $\psi = \frac{\pi}{2}$, und wäre $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, so würde $\frac{d^2 f}{ds^2} = 0$ für $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Nun ist, wenn $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \neq 0$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{d^2 f}{ds^2} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)^2 \cos^2 \varphi + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cos \varphi \cos \psi + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \cos^2 \psi,$$

und nach Ergänzung der beiden ersten Teile der rechten Seite zu einem vollständigen Quadrat:

$$(5) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{d^2 f}{ds^2} \\ = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cos \varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cos \psi \right]^2 + \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] \cos^2 \psi; \end{array} \right.$$

jetzt läßt sich darüber entscheiden, unter welcher Voraussetzung die rechte Seite, also auch die linke Seite, also auch $\frac{d^2 f}{ds^2}$ in *allen* Richtungen ein und dasselbe Vorzeichen hat. Die hinreichende und notwendige Bedingung hierfür ist nämlich, daß an der Stelle a/b

$$(6) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 > 0$$

sei.

Daß diese Bedingung hinreichend ist, erkennt man so gleich; denn besteht sie, so ist der Ausdruck auf der rechten Seite von (5) für alle Richtungen positiv und es hat somit $\frac{d^2 f}{ds^2}$ beständig das nämliche Vorzeichen wie $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{a,b}$.

Daß die Bedingung auch notwendig ist, ergibt sich auf folgende Art. Wäre

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 < 0,$$

so ließen sich sowohl Gerade bezeichnen, für welche die rechte Seite von (5) positiv, als auch solche, für welche sie negativ ist; eine Gerade der ersten Art wäre diejenige, welche durch $\cos \psi = 0$ (wozu $\cos \varphi = \pm 1$ gehört) gekennzeichnet ist; und eine Gerade der anderen Art würde sich beispielsweise aus

$$(7) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cos \varphi + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cos \psi = 0$$

ergehen. Bestände endlich

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0,$$

so hätte allerdings die rechte Seite von (5) für alle Geraden das positive Zeichen, jedoch mit Ausnahme derjenigen, die sich aus (7) ergibt, weil für diese der ganze Ausdruck und somit $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ verschwände, so daß für diese Gerade eine Entscheidung nicht getroffen werden könnte.*)

Auf Grund dieser Erörterung ergibt sich also der folgende Satz: *An einer Stelle a/b , an welcher die beiden ersten Differentialquotienten $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ verschwinden, hat die Funktion $f(x, y)$ einen extremen Wert, wenn dort $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 > 0$ ist, und zwar*

*) Die vorstehende Untersuchung kann auch in die folgende allgemeinere Form gebracht werden, in der sie wiederholt auftritt: „Unter welchen Bedingungen besitzt die Funktion

$$F_2 = a_{11} \xi^2 + 2a_{12} \xi \eta + a_{22} \eta^2$$

mit den reellen Variablen ξ, η und den reellen Koeffizienten a_{11}, a_{12}, a_{22} die Eigenschaft, daß sie nur für die Wertverbindung $\xi = 0, \eta = 0$ Null wird, für jede andere entweder einen positiven oder für jede einen negativen Wert besitzt?“

Man braucht nur F_2 durch die positive Zahl $\xi^2 + \eta^2$ zu dividieren, wodurch an dem Vorzeichen nichts geändert wird, und $\frac{\xi}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}} = \cos \varphi$,

$\frac{\eta}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}} = \cos \psi$ zu setzen, um auf die Form (4) zurückzukommen, die wegen $\cos^2 \varphi + \cos^2 \psi = 1$ ein gleichzeitiges Nullwerden von $\cos \varphi, \cos \psi$ ausschließt.

Eine Funktion der hier betrachteten Art, mit zwei Variablen und homogen vom zweiten Grade, nennt man eine *binäre quadratische Form*

ist $f(a, b)$ ein Maximum, wenn $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ an der genannten Stelle negativ, ein Minimum, wenn $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ positiv ist. Ist hingegen an der Stelle a/b der Ausdruck $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 < 0$, so findet ein extremer Wert nicht statt, und ist er $= 0$, so läßt sich ohne weitergehende Untersuchung eine Entscheidung nicht treffen.

Im Falle eines Extrems kann übrigens die letzte Unterscheidung ebensowohl mit Hilfe von $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ wie mit $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ erfolgen, weil die Bedingung (6) nicht erfüllt sein kann, ohne daß $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ beide von Null verschieden und desselben Vorzeichens sind.

Die durchgeführte Betrachtung verliert ihre Grundlage, wenn $\frac{d^2 f}{ds^2}$ für jede Richtung verschwindet, und dies tritt vermöge (4) dann ein, wenn für $x = a$, $y = b$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

Es muß dann, soll $f(a, b)$ ein extremer Wert sein, auch $\frac{d^2 f}{ds^2}$ für alle Richtungen verschwinden (116), und dies setzt (54, (6)) voraus, daß an der Stelle a/b auch alle partiellen Differential-

und bezeichnet sie, wenn sie die beiden angeführten Eigenschaften besitzt, als *definit*; wenn sie sie nicht besitzt, als *indefinit*; wenn sie sie nur teilweise zeigt, als *semidefinit*.

Die hinreichende und notwendige Bedingung, damit F_2 definit sei, ist also $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$, und das Vorzeichen richtet sich dann nach a_{11} (oder a_{22}).

Die Form F_2 ist indefinit, wenn $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0$ ist.

Sie ist endlich semidefinit, wenn $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$; sie hat dann zwar die Eigenschaft der Zeichenbeständigkeit, wird aber Null nicht bloß für $\xi = 0$, $\eta = 0$, sondern für alle Wertverbindungen, die der Proportion $\xi : \eta = -a_{12} : a_{11}$ genügen.

In Anwendung auf das vorstehende Problem kann man also sagen, daß nur dann sicher ein extremer Wert vorhanden ist, wenn die Form

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \xi^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \xi \eta + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \eta^2 \text{ definit ist.}$$

Über den Fall der semidefiniten Form sind mehrfache Untersuchungen angestellt worden (s. den Artikel „Differential-Integralrechnung“ von A. Voss im Teil I, Bd. II der Enzykl. d. mathem. Wissensch., p. 83–86).

quotienten dritter Ordnung von $f(x, y)$ Null werden; ist dies der Fall, so kommt es weiter auf $\frac{d^4 f}{ds^4}$ an. Das Vorzeichen dieses Differentialquotienten, wenn es für alle Richtungen dasselbe bleibt, entscheidet über Maximum oder Minimum in demselben Sinne wie das Vorzeichen von $\frac{d^2 f}{ds^2}$, sobald $\frac{d^2 f}{ds^2} \neq 0$ ist. Inbetreff der Fortsetzung dieser Schlüsse braucht nur auf 117 verwiesen zu werden.

122. Kriterien für eine Funktion beliebig vieler Variablen. Die Definitionen für das Maximum und Minimum einer Funktion $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ von n (> 2) unabhängigen Variablen sind jenen für eine Funktion zweier Variablen analog; es hat die Funktion an der Stelle $x_1/x_2/\dots/x_n$ ein Maximum bzw. ein Minimum, wenn sich eine positive Zahl η angeben läßt derart, daß

$$(8) \quad f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n) < 0,$$

bzw.

$$(9) \quad f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$$

für alle Wertverbindungen $h_1/h_2/\dots/h_n$, für welche gleichzeitig

$$|h_1| < \eta, |h_2| < \eta, \dots, |h_n| < \eta,$$

ausgenommen die Wertverbindung $0/0/\dots/0$.

Wenn man sich der Terminologie, welche für zwei und drei unabhängige Variable wirklich anschauliche Bedeutung hat, allgemein bedient (49), so darf man sagen, die Bedingungen (8) und (9) stellen die Forderung, es sei $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ein Maximum bzw. ein Minimum, in welcher durch den Punkt $x_1/x_2/\dots/x_n$ gehenden Richtung man auch die Funktion verfolgen mag. Dieser Forderung wird aber nur dadurch entsprochen, daß der totale Differentialquotient (49, (11))

$$\frac{df}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cos \varphi_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cos \varphi_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cos \varphi_n$$

für alle Richtungen, also für alle Wertverbindungen von $\cos \varphi_1, \cos \varphi_2, \dots, \cos \varphi_n$ (sofern sie nur der notwendigen Bedingung $\cos^2 \varphi_1 + \cos^2 \varphi_2 + \dots + \cos^2 \varphi_n = 1$ entsprechen) den Wert Null annimmt. Daraus folgt als notwendige Bedingung für einen

extremen Wert das Gleichungssystem:

$$(10) \quad \frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0.$$

An einer Stelle, welche aus diesem Gleichungssystem sich ergibt, findet aber nur dann in jeder durch sie gehenden Richtung ein Maximum oder Minimum statt und läßt sich daher auch die Bedingung (8) oder jene (9) erfüllen, wenn der zweite totale Differentialquotient (54)

$$\begin{aligned} \frac{d^2 f}{ds^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \cos^2 \varphi_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \cos^2 \varphi_2 + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \cos^2 \varphi_n \\ &+ 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} \cos \varphi_1 \cos \varphi_3 + \dots \end{aligned}$$

für alle Richtungen *negativ*, bzw. für alle Richtungen *positiv* ist.

Man kann diesen Kriterien auch den folgenden Ausdruck geben. Weil das totale Differential df zugleich verschwindet mit dem totalen Differentialquotienten $\frac{df}{ds}$, und weil das zweite totale Differential $d^2 f$ gleiches Vorzeichen hat mit dem zweiten totalen Differentialquotienten, so gilt der Satz: *Die Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ kann einen extremen Wert nur an einer solchen Stelle erlangen, an welcher das totale Differential*

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

identisch, d. i. unabhängig von den Werten dx_1, dx_2, \dots, dx_n , verschwindet; und es hat die Funktion an einer solchen Stelle wirklich ein Maximum oder ein Minimum, wenn das zweite totale Differential

$$\begin{aligned} d^2 f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} dx_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} dx_2^2 + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} dx_n^2 \\ &+ 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} dx_1 dx_2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} dx_1 dx_3 + \dots \end{aligned}$$

*beständig, d. i. für alle Wertverbindungen $dx_1/dx_2/\dots/dx_n$ *, negativ bzw. positiv ist.*

*) Hierbei dürfen unter dx_1, dx_2, \dots, dx_n beliebig große Werte gedacht werden, weil das Vorzeichen des Ausdruckes für $d^2 f$, auf das allein es ankommt, nicht geändert wird, wenn man ihn mit dem Quadrat einer beliebig großen Zahl q multipliziert; dann aber treten an die Stelle von

$$dx_1, dx_2, \dots, dx_n$$

die Produkte

$$q dx_1, q dx_2, \dots, q dx_n,$$

Die Anwendung des zweiten Teiles dieses Satzes kann in speziellen Fällen häufig entfallen, wenn nämlich aus der Natur der Aufgabe selbst zu erkennen ist, ob es sich um ein Maximum oder ein Minimum handeln kann.

123. Beispiele. 1) Es sind die extremen Werte der Funktion

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2gx + 2hy + k$$

zu bestimmen.

Die beiden für einen extremen Wert notwendigen Bedingungengleichungen:

$$\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} = ax + by + g = 0$$

$$\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial y} = bx + cy + h = 0$$

liefern nur dann ein bestimmtes Wertsystem für x, y , wenn die Determinante

$$ac - b^2 \neq 0$$

ist, und zwar ist dieses Wertsystem

$$x_0 = \frac{bh - cg}{ac - b^2}, \quad y_0 = \frac{bg - ah}{ac - b^2};$$

ihm entspricht aber nur dann ein extremer Wert, wenn der Ausdruck

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2,$$

der hier den von x, y unabhängigen Wert

$$4(ac - b^2)$$

hat, positiv ist, wenn also

$$ac - b^2 > 0;$$

und zwar ist $f(x_0, y_0)$ ein Maximum, wenn a, c negativ, und

die beliebig groß sein können. Mit der in der Fußnote zu 121 eingeführten Terminologie drückt sich die zweite Bedingung dahin aus, daß die mit den n Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ gebildete quadratische Form

$$F_2 = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \xi_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \xi_2^2 + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \xi_n^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \xi_1 \xi_2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} \xi_1 \xi_3 + \dots$$

definit sein müsse.

ein Minimum, wenn a, c positiv sind; beachtet man, daß sich $f(x, y)$ in die Form

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (ax + by + g)x \\ &\quad + (bx + cy + h)y \\ &\quad + gx + hy + k \end{aligned}$$

bringen läßt, so ergibt sich

$$f(x_0, y_0) = gx_0 + hy_0 + k.$$

In dem Falle $ac - b^2 < 0$ hat $f(x, y)$ keinen extremen Wert.

Ist endlich $ac - b^2 = 0$, also $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ und überdies $= \frac{g}{h}$, dann fallen die beiden Bedingungsgleichungen in eine zusammen, und für Wertverbindungen x/y , welche dieser einen Gleichung genügen, wird

$$\begin{aligned} f(x, y) &= gx + hy + k = h \left(\frac{g}{h} x + y \right) + k \\ &= h \left(\frac{a}{b} x + y \right) + k = \frac{h}{b} (ax + by) + k \\ &= -\frac{h}{b} g + k = \frac{bk - hg}{b}, \end{aligned}$$

also konstant, so daß an solchen Stellen x/y die Funktion keinen extremen Wert hat.

Setzt man $z = f(x, y)$ und stellt z geometrisch dar (45), so entspricht dieser Gleichung für $ac - b^2 > 0$ ein elliptisches Paraboloid, für $ac - b^2 < 0$ ein hyperbolisches Paraboloid, für $ac - b^2 = 0$ und $\frac{b}{c} = \frac{g}{h}$ eine der xy -Ebene parallele Zylinderfläche.

2) Die extremen Werte der Funktion

$$z = e^{-x^2 - y^2} (ax^2 + by^2)$$

unter der Voraussetzung: $a > 0, b > 0$ zu bestimmen.

Den Gleichungen

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x(a - ax^2 - by^2)e^{-x^2 - y^2} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2y(b - ax^2 - by^2)e^{-x^2 - y^2} = 0$$

kann in dreifacher Weise entsprochen werden:

α) Durch $x = 0, y = 0$. Ohne eine vollständige Entwicklung der zweiten Differentialquotienten nötig zu haben, wird man

leicht erkennen, daß für diese Wertverbindung

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2a, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2b, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$$

also

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left[\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right]^2 = 4ab > 0,$$

folglich tritt hier ein Minimum ein, dessen Wert $z = 0$ ist.

β) Durch $x = 0$, $y = \pm 1$; für diese Wertverbindung ist

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \frac{a-b}{e}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{4b}{e}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$$

also

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left[\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right]^2 = -\frac{8b(b-a)}{e^2}$$

folglich findet ein Maximum statt, wenn $a < b$, und sein Wert ist $z = \frac{b}{e}$; wenn dagegen $a > b$, erlangt die Funktion an dieser Stelle weder ein Maximum, noch ein Minimum.

γ) Durch $x = \pm 1$, $y = 0$, an dieser Stelle ist

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{4a}{e}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \frac{b-a}{e}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$$

also

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left[\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right]^2 = \frac{8a(a-b)}{e^2};$$

es tritt also, wenn $a > b$, ein Maximum ein, dessen Wert $z = \frac{a}{e}$ ist, während bei $a < b$ kein Extrem stattfindet.

Bei $a = b$ stellt sich unter β) und γ) der unentschiedene Fall ein, wo $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left[\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right]^2 = 0$ ist. Setzt man $x^2 + y^2 = u^2$, so hat man es mit der Funktion

$$z = au^2 e^{-u^2}$$

zu tun, für die

$$\frac{dz}{du} = 2au e^{-u^2} (1 - u^2), \quad \frac{d^2 z}{du^2} = 2a e^{-u^2} (1 - 5u^2 + 2u^4);$$

$\frac{dz}{du}$ verschwindet für $u = 0$ und $u^2 = 1$; für diese Lösungen wird $\frac{d^2 z}{du^2} = 2a$, bzw. $= -4a$. Der Fall $u = 0$ führt wieder auf das unter α) gefundene Minimum an der Stelle $x = 0$, $y = 0$. Es wäre aber unzutreffend, zu sagen, daß z an allen Stellen des Kreises $x^2 + y^2 = 1$ ein Maximum gleich $\frac{a}{e}$ besitze; denn

zu jeder solchen Stelle gibt es in jeder noch so engen Umgebung andere — auf eben dem Kreise —, wo z den gleichen Wert $\frac{a}{c}$ hat.*)

3) Gegeben sind zwei Gerade im Raume; man soll ihren kürzesten Abstand bestimmen.

Sind

$$\frac{x-a_1}{\alpha_1} = \frac{y-b_1}{\beta_1} = \frac{z-c_1}{\gamma_1}$$

$$\frac{x-a_2}{\alpha_2} = \frac{y-b_2}{\beta_2} = \frac{z-c_2}{\gamma_2}$$

die Gleichungen der beiden Geraden, und bezeichnet man den mit $x/y/z$ gleichzeitig veränderlichen gemeinsamen Wert der ersten drei Brüche mit u , den der letzten drei mit v , so sind die Koordinaten eines Punktes der ersten Geraden als Funktionen von u , die Koordinaten eines Punktes der zweiten Geraden als Funktionen von v wie folgt dargestellt:

$$\begin{aligned} x &= \alpha_1 u + a_1 & x &= \alpha_2 v + a_2 \\ y &= \beta_1 u + b_1 & y &= \beta_2 v + b_2 \\ z &= \gamma_1 u + c_1 & z &= \gamma_2 v + c_2; \end{aligned}$$

heißt δ der Abstand der zwei durch u, v charakterisierten Punkte, so ist

$$\begin{aligned} \delta^2 &= (\alpha_1 u - \alpha_2 v + a_1 - a_2)^2 + (\beta_1 u - \beta_2 v + b_1 - b_2)^2 \\ &\quad + (\gamma_1 u - \gamma_2 v + c_1 - c_2)^2, \end{aligned}$$

und dies soll zu einem Minimum werden. Bezeichnet man die in den Klammern eingeschlossenen Polynome der Reihe nach mit A, B, C , so schreiben sich die Bedingungen für das Minimum wie folgt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\partial(\delta^2)}{\partial u} &= \alpha_1 A + \beta_1 B + \gamma_1 C = 0 \\ -\frac{1}{2} \frac{\partial(\delta^2)}{\partial v} &= \alpha_2 A + \beta_2 B + \gamma_2 C = 0; \end{aligned}$$

*) O. Stolz (Grundzüge der Differential- und Integralrechnung I, 1893, p. 211) bezeichnet Werte solcher Art als „uneigentliche“ Maxima bzw. Minima (114).

ferner ist

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial u^2} = \alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2,$$

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial v^2} = \alpha_2^2 + \beta_2^2 + \gamma_2^2,$$

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial u \partial v} = -(\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 + \gamma_1 \gamma_2),$$

daher unabhängig von u, v

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial u^2} \frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial v^2} - \left(\frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial u \partial v} \right)^2 \\ &= 4 [(\alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2)(\alpha_2^2 + \beta_2^2 + \gamma_2^2) - (\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 + \gamma_1 \gamma_2)^2] \\ &= 4 [(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)^2 + (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1)^2 + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)^2], \end{aligned}$$

also positiv; es findet hiernach wirklich ein Extrem statt und zwar ein Minimum, weil $\frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial u^2}, \frac{\partial^2(\partial^2)}{\partial v^2}$ als Quadratsummen positiv sind.

Um das Minimum selbst zu ermitteln, empfiehlt sich der folgende Vorgang. Aus den beiden Bedingungsleichungen folgt

$$\frac{A}{\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1} = \frac{B}{\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1} = \frac{C}{\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1};$$

bezeichnet man den gemeinsamen Wert dieser Brüche mit w , so ist einerseits

$$\min \partial^2 = \{(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)^2 + (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1)^2 + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)^2\} w^2,$$

andererseits hat man zur Bestimmung von w die Gleichungen

$$\begin{aligned} A - (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)w &= 0, & B - (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1)w &= 0, \\ C - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)w &= 0, \end{aligned}$$

oder mit Rücksicht auf die Bedeutung von A, B, C :

$$\alpha_1 u - \alpha_2 v - (\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)w = a_2 - a_1$$

$$\beta_1 u - \beta_2 v - (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1)w = b_2 - b_1$$

$$\gamma_1 u - \gamma_2 v - (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)w = c_2 - c_1;$$

hieraus folgt aber:

$$\begin{aligned} w &= \frac{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & a_1 - a_2 \\ \beta_1 & \beta_2 & b_1 - b_2 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & c_1 - c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1 \\ \beta_1 & \beta_2 & \gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{(a_1 - a_2)(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) + (b_1 - b_2)(\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1) + (c_1 - c_2)(\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)}{(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)^2 + (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1)^2 + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)^2}. \end{aligned}$$

Daher ist schließlich


$$\min \delta = \pm \frac{(\alpha_1 - \alpha_2)(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1) + (b_1 - b_2)(\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1) + (c_1 - c_2)(\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)}{\sqrt{(\beta_1 \gamma_2 - \beta_2 \gamma_1)^2 + (\gamma_1 \alpha_2 - \gamma_2 \alpha_1)^2 + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1)^2}},$$

wobei jenes Zeichen zu wählen ist, das den Ausdruck positiv macht.

4) In der Ebene eines gegebenen Dreiecks den Punkt zu finden, dessen Entfernungen von den Eckpunkten des Dreiecks die kleinste Summe geben.

Ist ABC (Fig. 30) das Dreieck, und bezieht man den Punkt M auf ein Polarkoordinatensystem mit A als Pol und

Fig. 30.



AB als Polarachse, so daß $AM = r$, $\angle BAM = \varphi$ seine Koordinaten sind, so ist die Größe, um deren Minimum es sich handelt,

$$\begin{aligned} S &= AM + BM + CM = r \\ &+ \sqrt{c^2 + r^2 - 2cr \cos \varphi} \\ &+ \sqrt{b^2 + r^2 - 2br \cos (A - \varphi)}; \end{aligned}$$

dabei sind a, b, c die den Ecken A, B, C gegenüberliegenden Seiten und A der Winkel an der gleichnamigen Ecke; die Wurzeln gelten als positiv.

Die Bedingungen des Minimums lauten:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial r} &= 1 + \frac{r - c \cos \varphi}{\sqrt{c^2 + r^2 - 2cr \cos \varphi}} \\ &+ \frac{r - b \cos (A - \varphi)}{\sqrt{b^2 + r^2 - 2br \cos (A - \varphi)}} = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial \varphi} &= \frac{cr \sin \varphi}{\sqrt{c^2 + r^2 - 2cr \cos \varphi}} \\ &- \frac{br \sin (A - \varphi)}{\sqrt{b^2 + r^2 - 2br \cos (A - \varphi)}} = 0; \end{aligned}$$

die zweite dieser Gleichungen wird durch $r = 0$ befriedigt. Schaltet man diese Lösung zunächst aus und drückt dann die beiden Gleichungen in den Linien der Figur aus, wobei zu beachten ist, daß, sofern $BD \perp AM$ und $CE \perp AM$,

$$\begin{aligned} r - c \cos \varphi &= AM - AD = -MD, \\ c \sin \varphi &= BD, \\ r - b \cos (A - \varphi) &= AM - AE = -ME \\ b \sin (A - \varphi) &= CE, \end{aligned}$$

so lauten sie folgendermaßen:

$$1 - \frac{MD}{BM} - \frac{ME}{CM} = 0, \quad 1 - \frac{BD}{BM} - \frac{CE}{CM} = 0,$$

oder bei trigonometrischer Deutung der Verhältnisse:

$$\cos BMD + \cos CME = 1, \quad \sin BMD - \sin CME = 0;$$

aus der zweiten Gleichung folgt

$$BMD = CME$$

und hiermit aus der ersten

$$BMD = CME = 60^\circ,$$

daher

$$BMC = 120^\circ.$$

Da man ebenso hätte von dem Eckpunkte B oder C ausgehen können, so ergibt sich, daß die Lage des Punktes M , bei welcher S ein Minimum ist, gekennzeichnet wird durch

$$BMC = CMA = AMB = 120^\circ.$$

Einen Punkt von solcher Beschaffenheit gibt es aber nur dann, wenn jeder Winkel des Dreiecks kleiner ist als 120° ; er liegt dann im Innern des Dreiecks und wird erhalten als Schnittpunkt dreier Kreisbogen, welche die Seiten des Dreiecks zu Sehnen haben und über diesen Sehnen den Peripheriewinkel von 120° fassen.

Nun nehmen wir die oben bemerkte Lösung $r = 0$ auf und fragen, wann dieser ein Minimum von S entspricht. Um dies zu entscheiden, entwickeln wir S unter der Voraussetzung, daß r im Vergleich zu b, c sehr klein, nach Potenzen von r und erhalten:

$$\begin{aligned} S &= r + c \sqrt{1 + \left(\frac{r}{c}\right)^2} - 2 \frac{r}{c} \cos \varphi + b \sqrt{1 + \left(\frac{r}{b}\right)^2} - 2 \frac{r}{b} \cos(A - \varphi) \\ &= r + c \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{c}\right)^2 - \frac{r}{c} \cos \varphi - \frac{1}{8} \left(\left(\frac{r}{c}\right)^2 - 2 \frac{r}{c} \cos \varphi\right)^2 + \dots \right\} \\ &+ b \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{b}\right)^2 - \frac{r}{b} \cos(A - \varphi) - \frac{1}{8} \left(\left(\frac{r}{b}\right)^2 - 2 \frac{r}{b} \cos(A - \varphi)\right)^2 + \dots \right\} \\ &= b + c + (1 - \cos \varphi - \cos(A - \varphi))r \\ &\quad + \left\{ \frac{\sin^2 \varphi}{c} + \frac{\sin^2(A - \varphi)}{b} \right\} \frac{r^2}{2} - \dots \\ &= b + c + \left(1 - 2 \cos \frac{A}{2} \cos \left(\frac{A}{2} - \varphi\right)\right)r \\ &\quad + \left\{ \frac{\sin^2 \varphi}{c} + \frac{\sin^2(A - \varphi)}{b} \right\} \frac{r^2}{2} - \dots; \end{aligned}$$

$b + c$ ist aber derjenige Wert von S , welcher $r = 0$ entspricht, und er stellt ein Minimum dar, wenn

$$S - (b + c) = \left\{ 1 - 2 \cos \frac{A}{2} \cos \left(\frac{A}{2} - \varphi \right) \right\} r \\ + \left\{ \frac{\sin^2 \varphi}{c} + \frac{\sin^2 (\frac{A}{2} - \varphi)}{b} \right\} \frac{r^2}{2} + \dots$$

für ein genügend kleines r beständig positiv bleibt, während φ das Intervall $(0, 2\pi)$ durchläuft; r sei insbesondere so klein festgesetzt, daß das Glied mit der ersten Potenz die Summe aller übrigen dem Betrage nach übertrifft.

Ist $A < 120^\circ$, $\frac{A}{2} < 60^\circ$, also $2 \cos \frac{A}{2} > 1$, so kann durch Wahl von φ der Koeffizient von r nach Belieben positiv wie negativ gemacht werden, dann stellt somit $b + c$ keinen extremen Wert dar.

Ist $A = 120^\circ$, also $2 \cos \frac{A}{2} = 1$, so ist der Koeffizient von r im allgemeinen positiv, verschwindet jedoch für $\varphi = \frac{A}{2}$; trotzdem bleibt die Differenz $S - (b + c)$ auch an dieser Stelle positiv vermöge des nun maßgebenden Gliedes mit r^2 , das positiv ist.

Ist $A > 120^\circ$, also $2 \cos \frac{A}{2} < 1$, so behält der Koeffizient von r für alle Werte von φ das positive Vorzeichen, also auch $S - (b + c)$.

In den beiden letzten Fällen, und es sind das gerade diejenigen, welche die erste Lösung ausschließt, ist also A die gesuchte Lage des Punktes M , für welche S ein Minimum ist.

Daß bei diesem Problem überhaupt nur ein Minimum entstehen kann, geht daraus hervor, daß man S zwar beliebig groß, aber nicht beliebig klein machen kann.

5) Es sind n Punkte M_i ($i = 1, 2, \dots, n$) im Raume gegeben und jedem derselben ist eine positive Zahl m_i zugeordnet. Man soll jenen Punkt S bestimmen, für welchen die Summe der mit den Zahlen m_i multiplizierten Quadrate der Entfernungen SM_i ein Minimum ist.

Sind $x_i/y_i/z_i$ die auf ein rechtwinkliges System bezogenen Koordinaten von M_i , $x/y/s$ die Koordinaten eines beliebigen

Punktes S , so ist S so zu bestimmen, daß

$$T = \sum_1^n m_i [(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2]$$

ein Minimum werde; die Bedingungen hierfür lauten:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 2 \sum m_i (x - x_i) = 2 \{ x \sum m_i - \sum m_i x_i \} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = 2 \sum m_i (y - y_i) = 2 \{ y \sum m_i - \sum m_i y_i \} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial z} = 2 \sum m_i (z - z_i) = 2 \{ z \sum m_i - \sum m_i z_i \} = 0;$$

demnach hat der verlangte Punkt die Koordinaten:

$$x = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}, \quad y = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}, \quad z = \frac{\sum m_i z_i}{\sum m_i}.$$

Bei Interpretation der Resultate vom Standpunkte der Mechanik ist hiermit gezeigt, daß der Schwerpunkt eines Systems materieller Punkte derjenige Punkt ist, in bezug auf welchen das polare Trägheitsmoment des Punktsystems den kleinsten Wert hat.

Obwohl hier von vornherein nur die Möglichkeit eines Minimums einzusehen ist, so mag doch die analytische Begründung dafür angegeben werden; es ist

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 2 \sum m_i$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 T}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial y} = 0,$$

daher

$$d^2 T = 2 \sum m_i (dx^2 + dy^2 + dz^2),$$

und da dies eine wesentlich positive Größe ist, so hat T an der gefundenen Stelle tatsächlich ein Minimum (122).

6) Zu zeigen, daß die Funktion

$$z = x^2 + xy + y^2 + \frac{a^2}{x} + \frac{a^2}{y}$$

für $x = y = \frac{a}{\sqrt[3]{3}}$ den minimalen Wert $3\sqrt[3]{3}a^2$ erlangt.

7) Die Funktion $z = x^3 + y^3 - 3axy$ ($a > 0$) hat für $x = y = a$ das Minimum $-a^3$.

8) Die Funktion $v = (2ax - x^2)(2by - y^2)$ erreicht an der Stelle $x = a$, $y = b$ ihr Maximum a^2b^2 .

124. Extreme Werte bei singulärem Verhalten der Differentialquotienten. Die in 121 und 122 entwickelte Theorie hat zur wesentlichen Voraussetzung die Existenz eigentlicher partieller Differentialquotienten in bezug auf die einzelnen Variablen, wenigstens in der Umgebung der in Betracht gezogenen Stelle. Eine Funktion mehrerer Variablen kann aber auch einen extremen Wert aufweisen an einer Stelle, an welcher solche Differentialquotienten nicht bestehen; die Entscheidung über einen derartigen Fall bedarf immer einer besonderen Untersuchung.

Es sei beispielsweise

$$z = c + \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2},$$

und die Quadratwurzel gelte als *positive* GröÙe. Die partiellen Differentialquotienten von z , nämlich

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y-b}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}},$$

verlieren an der Stelle $x=a$, $y=b$ ihre Bedeutung. Setzt man aber $x=a+h$, $y=b+k$ und bezeichnet die durch diesen Punkt und a/b bestimmte Richtung mit S , mit φ , ψ ihre Richtungswinkel, so ist der totale Differentialquotient von z an der Stelle $a+h/b+k$

$$\frac{dz}{ds} = \frac{h \cos \varphi + k \cos \psi}{\sqrt{h^2 + k^2}};$$

er ändert sein Vorzeichen, wenn h , k zugleich es ändern, d. h. wenn man auf S von einer Seite des Punktes a/b auf die andere übergeht. Deshalb gehört zu a/b ein extremer Wert und derselbe ist

$$z = c;$$

als der kleinste unter allen Werten von z ist er ein Minimum.

§ 3. Maxima und Minima von Funktionen mehrerer abhängiger Variablen.

125. Begriff der relativen Extreme und ihre Bestimmung. Wenn von den extremen Werten einer Funktion $f(x, y, z)$ dreier Variablen in dem bisher besprochenen Sinne die Rede ist, so kommen dabei alle Werte der Funktion in Betracht, welche sie in ihrem Definitionsbereich R annimmt.

Faßt man jedoch nur solche Werte der Funktion $f(x, y, z)$ ins Auge, welche zu Verbindungen $x/y/z$ gehören, die der *Bedingungsgleichung*

$$\varphi(x, y, z) = 0$$

Genüge leisten, und stellt die Frage nach den extremen unter diesen Werten, so handelt es sich um ein von dem vorhergehenden verschiedenes Problem.

Im ersten Falle galten die Variablen x, y, z als unabhängig, und ihr Gebiet war der ganze Raum R . In dem neuen Falle sind die Variablen abhängig voneinander, indem durch die Bedingungsgleichung $\varphi(x, y, z) = 0$ etwa z als Funktion von x, y darstellbar ist; ihr Gebiet ist eine den Raum R durchsetzende Fläche (45). Man bezeichnet extreme Werte der ersten Art als *absolute Extreme*, extreme Werte der zweiten Art als *relative* oder *bedingte Extreme*.*)

Würde neben der oben aufgestellten Bedingung den Wertverbindungen $x/y/z$, für welche $f(x, y, z)$ in Betracht gezogen wird, auch noch die weitere

$$\psi(x, y, z) = 0$$

auferlegt, so wäre die Beschränkung weitergehend als vorhin; jetzt könnten mittels $\varphi(x, y, z) = 0$ und $\psi(x, y, z) = 0$ etwa y, z als Funktionen von x dargestellt werden, und das Gebiet der Variablen wäre eine den Raum R durchsetzende Kurve (45).

Weiteren Bedingungen aber dürfen die Variablen x, y, z nicht unterworfen werden.

Die Bestimmung relativer Extreme werde nun *an einer stetigen Funktion $f(x, y, z, u)$ von vier Variablen* erklärt, die *zwei Bedingungsgleichungen*:

$$(1) \quad \begin{cases} \varphi(x, y, z, u) = 0 \\ \psi(x, y, z, u) = 0 \end{cases}$$

unterworfen sind.

Der eine Weg bestünde darin, daß man mit Hilfe der Gleichungen (1) zwei der Variablen, z. B. z, u , durch die beiden andern, x, y , ausdrückt und diese Ausdrücke in $f(x, y, z, u)$ einträgt; dadurch geht f in eine Funktion der unabhängigen

*) Vgl. betreffs dieser Bezeichnungen auch 114.

Variablen x, y über, die nunmehr nach früheren Methoden auf ihre absoluten Extreme zu untersuchen ist.

Handelt es sich allgemein um eine Funktion von n Variablen, die $r (< n)$ Bedingungsgleichungen unterworfen sind, so würde durch den angedeuteten Eliminationsprozeß die Aufgabe auf die Bestimmung der absoluten Extreme einer Funktion von $n - r$ unabhängigen Variablen zurückgeführt.

Die Elimination ist indessen nicht immer ausführbar und ergibt in anderen Fällen eine unbequeme Rechnung.

Es empfiehlt sich daher das folgende, von Lagrange*) zuerst angegebene Verfahren. Man denke sich die Elimination von z, u in $f(x, y, z, u)$ vollzogen; dann wird auch das totale Differential

$$(2) \quad df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial u} du$$

bloß Funktion von dx, dy sein; um ihm diese Darstellung zu geben, benutze man die aus den Bedingungsgleichungen (1) gezogene Folgerung (49):

$$(3) \quad \begin{cases} 0 = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz + \frac{\partial \varphi}{\partial u} du, \\ 0 = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy + \frac{\partial \psi}{\partial z} dz + \frac{\partial \psi}{\partial u} du. \end{cases}$$

Mit Hilfe der Gleichungen (3) lassen sich in der Tat dz, du aus (2) eliminieren; die Elimination kann in der Weise vollzogen werden, daß man die Gleichungen (3) mit *unbestimmten Multiplikatoren* λ, μ multipliziert, zu (2) addiert, wodurch

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) dy \\ + \left(\frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial z} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) dz + \left(\frac{\partial f}{\partial u} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial u} \right) du$$

erhalten wird, und daß man nun nachträglich λ, μ aus den Gleichungen

$$(4) \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial z} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial u} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial u} = 0 \end{cases}$$

*) Théorie des fonctions analytiques, 1797, 1813.

bestimmt; mit diesen Werten von λ, μ ist dann tatsächlich

$$(5) \quad df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) dy$$

nur mehr Funktion von dx, dy .

An einer Stelle aber, an welcher f , als Funktion der unabhängigen Variablen x, y aufgefaßt, einen extremen Wert hat, verschwindet das totale Differential unabhängig von den Werten von dx, dy (122); an einer solchen Stelle ist also

$$(6) \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

Damit hiernach die Funktion $f(x, y, s, u)$ unter Einhaltung der Bedingungen (1) einen extremen Wert erlange, müssen die Werte von x, y, s, u und die Werte der Multiplikatoren λ, μ so gewählt werden, daß

$$(7) \quad \begin{cases} \varphi(x, y, s, u) = 0 \\ \psi(x, y, s, u) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial s} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial s} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial s} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial u} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial u} = 0 \end{cases}$$

sei; in der Tat sind diese 6 (allgemein $r + n$) Gleichungen zur Bestimmung der genannten 6 (bzw. $n + r$) Größen gerade ausreichend.

Die vier letzten Gleichungen des Systems (7) wären aber die notwendigen Bedingungen für die *absoluten* Extreme der Funktion

$$f(x, y, s, u) + \lambda \varphi(x, y, s, u) + \mu \psi(x, y, s, u),$$

wenn man μ, λ als konstante Zahlen voraussetzt. Man kann mithin den Satz aussprechen: *Die Bedingungen dafür, daß die Funktion f unter Einhaltung der Gleichungen $\varphi = 0, \psi = 0$ zwischen ihren Argumenten einen extremen Wert erlange, sind*

die nämlichen wie die Bedingungen für absolut extreme Werte der mit den Konstanten λ, μ gebildeten Funktion $f + \lambda\varphi + \mu\psi$.

Die hierin enthaltene Regel für die Behandlung von Problemen über bedingte Extreme wird als *Methode der Multiplikatoren* bezeichnet.

Wenn auch die Kenntnis der Multiplikatoren nicht notwendig ist und kein unmittelbares Interesse bietet, so empfiehlt sich ihre Mitbestimmung doch in vielen Fällen um der Symmetrie der Rechnung willen.

Ob an einer aus den Gleichungen (7) hervorgehenden Stelle $x/y/z/u$ die Funktion f wirklich einen größten oder kleinsten Wert erreicht, ist in angewandten Fällen zumeist aus der Natur der Aufgabe zu erkennen; sollte ein Zweifel hierüber bestehen, so müßte das zweite Differential d^2f zur Entscheidung herangezogen werden, aber wieder in der Art, daß auch den Bedingungsgleichungen Rechnung getragen wird. Zu diesem Zwecke hätte man die betreffende Wertverbindung $x/y/z/u$ in die Gleichungen (3) einzuführen, sodann dz, du durch dx und dy auszudrücken und diese Werte nebst $x/y/z/u$ in d^2f einzutragen; fällt d^2f verschieden von Null aus und ist sein Vorzeichen unabhängig von dx, dy , so ist durch dieses Vorzeichen die Frage in der bekannten Weise gelöst.

126. Beispiele. 1) Die kürzeste Entfernung eines gegebenen Punktes von einer gegebenen Ebene zu bestimmen.

Der Punkt sei durch die Koordinaten $x_0/y_0/z_0$ und die Ebene durch die Gleichung

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

gegeben. Als diejenige Funktion, deren Minimum zu bestimmen ist, kann

$$\delta^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

gewählt werden; die durch x, y, z zu erfüllende Bedingung lautet

$$Ax + By + Cz + D = 0;$$

demnach kommt es auf das absolute Minimum der Funktion

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 - 2\lambda(Ax + By + Cz + D)$$

an; die Bedingungen hierfür lauten:

$$x - x_0 - \lambda A = 0$$

$$y - y_0 - \lambda B = 0$$

$$z - z_0 - \lambda C = 0.$$

Verbindet man sie mit der Bedingungsgleichung, so ergibt sich zur Bestimmung von λ die Gleichung:

$$\lambda(A^2 + B^2 + C^2) + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0,$$

woraus

$$\lambda = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}.$$

Setzt man diesen Wert in die obigen drei Gleichungen ein, so ergibt sich die Stelle $x/y/z$, welcher das Minimum entspricht, also der Fußpunkt des von $x_0/y_0/z_0$ auf die Ebene gefällten Lotes.

Hier war aber die Frage nach der kürzesten Entfernung selbst gestellt; um diese zu finden, setze man in dem Ausdruck für δ^2 anstelle von $x - x_0$, $y - y_0$, $z - z_0$ die aus den obigen Gleichungen fließenden Werte; dadurch ergibt sich:

$$\min \delta^2 = \lambda^2(A^2 + B^2 + C^2)$$

und nach Eintragung des Wertes für λ :

$$\min \delta = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

wobei der Wurzel jenes Zeichen beizulegen ist, welches den ganzen Ausdruck positiv macht.

Die analytische Begründung dafür, daß der gefundene Wert ein Minimum ist, ergibt sich aus der Betrachtung des zweiten Differentials von δ^2 , welches

$$2(dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

und nach Berücksichtigung der Bedingungsgleichung

$$2\left(dx^2 + dy^2 + \left(\frac{A dx + B dy}{C}\right)^2\right)$$


lautet und wesentlich positiv ist.

2) Aus einer rechteckigen Tafel von gegebenem Inhalt a^2 , aber von zu wählender Form, sind an den vier Ecken gleiche quadratförmige Ausschnitte zu machen derart, daß nach Auf-

biegen des Restes längs der punktierten Linien (Fig. 31) ein parallelepipedischer Hohlraum von größtmöglichem Volumen entsteht.

Bezeichnet man die Seitenlängen der Tafel mit y , z , die Seite eines Ausschnitts mit x , so ist das Volumen des Parallel-

Fig. 31.



epipeds

$$v = x(y - 2x)(z - 2x);$$

dasselbe soll unter Einhaltung der Forderung

$$yz = a^2$$

ein Maximum werden; nach Entwicklung des Ausdrucks für v unter Rücksichtnahme auf diese Forderung kommt die Aufgabe zurück auf die Bestimmung des Maximums von

$$v = 4x^3 - 2x^2(y + z) + a^2x,$$

wenn die Bedingungsgleichung

$$yz - a^2 = 0$$

hinzutritt.

Soll nun die Funktion

$$4x^3 - 2x^2(y + z) + a^2x + \lambda(yz - a^2)$$

ein absolutes Extrem erlangen, so ist dazu notwendig, daß

$$12x^2 - 4x(y + z) + a^2 = 0$$

$$-2x^2 + \lambda z = 0$$

$$-2x^2 + \lambda y = 0$$

sei; aus den beiden letzten Gleichungen und der Bedingungsgleichung ergibt sich

$$y = z = a,$$

die Tafel ist also quadratförmig zu wählen; die erste Gleichung verwandelt sich hiermit in

$$12x^2 - 8ax + a^2 = 0,$$

woraus sich für x die beiden Werte

$$x_1 = \frac{a}{6}, \quad x_2 = \frac{a}{2}$$

ergeben.

Was den zweiten Wert, $\frac{a}{2}$, anlangt, so bildet er die obere Grenze der mit der Natur der Aufgabe überhaupt verträglichen Werte von x , — denn das zulässige Intervall von x ist $(0, \frac{a}{2})$ — und schon aus diesem Grunde entfällt die Frage, ob der ihm entsprechende Wert von v ein extremer ist; $x_2 = \frac{a}{2}$ bedeutet ein Zerschneiden der Tafel in vier gleiche Quadrate.

Der erste Wert, $\frac{a}{6}$, gibt den größten Wert von v ,

$$\max v = \frac{2}{27} a^3.$$

Es geht dies wohl aus der Aufgabe selbst hervor, weil v nicht beliebig groß gemacht werden kann, läßt sich aber auch analytisch begründen; die zweiten Differentialquotienten von v sind nämlich:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= 24x - 4(y + z), & \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= 0, & \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} &= 0, \\ \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial z} &= 0, & \frac{\partial^2 v}{\partial z \partial x} &= -4x, & \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} &= -4x, \end{aligned}$$

daher das zweite totale Differential an der Stelle

$$x = \frac{a}{6}, \quad y = z = a$$

gleich

$$-4adx^2 - \frac{4}{3} adzdx - \frac{4}{3} adxdy:$$

dasselbe nimmt jedoch, wenn man die aus der Bedingungs-
gleichung $yz - a^2 = 0$ hervorgehende Beziehung

$$zdy + ydz = 0$$

berücksichtigt, die sich an der Stelle $y = z = a$ auf $dy + dz = 0$ reduziert, den Ausdruck an

$$-4adx^2$$

und ist somit eine wesentlich negative Größe.

3) Es sind die extremen Werte der Durchmesser der auf ihren Mittelpunkt als Ursprung eines rechtwinkligen Koordinatensystems bezogenen Zentralfläche zweiter Ordnung

$$Ax^2 + A'y^2 + A''z^2 + 2Byz + 2B'zx + 2B''xy + F = 0$$

zu bestimmen.

Bezeichnet man den zu dem Punkte $x/y/z$ der Fläche gehörigen Halbmesser mit r , mit a, b, c die Kosinus seiner Richtungswinkel, so ist

$$x = ar, \quad y = br, \quad z = cr;$$

durch diese Transformation ergibt sich aus der Gleichung der Fläche die folgende:

$$-\frac{F}{r^3} = Aa^2 + A'b^2 + A''c^2 + 2Bbc + 2B'ca + 2B''ab;$$

mit r zugleich wird auch $-\frac{F}{r^3}$ ein extremer Wert; infolgedessen kommt es auf die extremen Werte von

$$f(a, b, c) = Aa^2 + A'b^2 + A''c^2 + 2Bbc + 2B'ca + 2B''ab$$

an unter Einhaltung der Bedingungsgleichung

$$a^2 + b^2 + c^2 = 1.$$

Bildet man mittels des Multiplikators $-\lambda$ die Funktion

$$f(a, b, c) - \lambda(a^2 + b^2 + c^2 - 1),$$

so gelten für deren absolute Extreme die Bedingungen:

$$(\alpha) \quad \begin{cases} (A - \lambda)a + B'b + B'c = 0 \\ B''a + (A' - \lambda)b + Bc = 0 \\ Ba + Bb + (A'' - \lambda)c = 0; \end{cases}$$

die Koexistenz dieser Gleichungen erfordert, da die triviale Lösung $a = b = c = 0$ vermöge der Bedingungsgleichung ausgeschlossen ist, daß

$$(\beta) \quad \begin{vmatrix} A - \lambda & B' & B \\ B'' & A' - \lambda & B \\ B & B & A'' - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

sei. Durch diese kubische Gleichung ist der Multiplikator λ bestimmt; jedem seiner drei Werte entspricht vermöge der Gleichungen (α) und der Bedingungsgleichung $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ ein Wertsystem a, b, c , und diese Wertsysteme führen zu den extremen Werten von r^3 .

Diese selbst lassen sich in folgender Weise bestimmen. Multipliziert man die Gleichungen (α) der Reihe nach mit a, b, c , so gibt ihre Summe

$$f(a, b, c) - \lambda(a^2 + b^2 + c^2) = 0,$$

woraus mit Rücksicht auf die Bedingungsgleichung

$$\lambda = f(a, b, c) = -\frac{F}{r^2}$$

folgt; dies in (β) eingetragen führt zu der Gleichung:

$$(\gamma) \quad \begin{vmatrix} A + \frac{F}{r^2} & B'' & B' \\ B'' & A' + \frac{F}{r^2} & B \\ B' & B & A'' + \frac{F}{r^2} \end{vmatrix} = 0,$$

welche die extremen Werte von r^2 gibt. (Achsenbestimmung einer Fläche zweiter Ordnung.)

Für die spezielle Fläche

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + 2xy - 1 = 0$$

lautet die Gleichung (β)

$$(1 - \lambda)^3 - 2(1 - \lambda) = 0$$

und gibt die Wurzeln

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 1 + \sqrt{2}, \quad \lambda_3 = 1 - \sqrt{2};$$

setzt man $\frac{1}{r^2}$ an die Stelle von λ , so ergeben sich die extremen Werte:

$$r_1 = 1, \quad r_2 = \sqrt{-1 + \sqrt{2}}, \quad r_3 = \sqrt{-1 - \sqrt{2}},$$

wovon der dritte imaginär ist. Die den Werten von λ entsprechenden Gleichungssysteme (α) sind

$$\begin{array}{lll} b = 0 & -a\sqrt{2} + b = 0 & a\sqrt{2} + b = 0 \\ a + c = 0 & a - b\sqrt{2} + c = 0 & a + b\sqrt{2} + c = 0 \\ & b - c\sqrt{2} = 0 & b + c\sqrt{2} = 0 \end{array}$$

und geben in Verbindung mit $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ die (zueinander senkrechten) Achsenrichtungen

$$\begin{array}{lll} a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} & a_2 = \frac{1}{2} & a_3 = \frac{1}{2} \\ b_1 = 0 & b_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} & b_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ c_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} & c_2 = \frac{1}{2} & c_3 = \frac{1}{2}; \end{array}$$

die vorgelegte Fläche ist hiernach ein einschaliges Hyperboloid mit den reellen Halbachsen $r_1 = 1$, $r_2 = \sqrt{-1 + \sqrt{2}}$; die imaginäre Achse hat die Richtungskosinus a_3, b_3, c_3 .

4) Es sind n Punkte M_i ($i = 1, 2, \dots, n$) im Raume gegeben, und jedem derselben ist eine positive Zahl m_i zugeordnet. Man soll diejenigen Ebenen bestimmen, bezüglich deren die Summe der mit den Zahlen m_i multiplizierten Quadrate der Abstände der Punkte M_i extreme Werte annimmt.

Legt man ein rechtwinkliges Koordinatensystem zugrunde, bezeichnet mit $x_i/y_i/z_i$ die Koordinaten von M_i und schreibt die Gleichung der Ebene in der Hesseschen Normalform

$$(\alpha) \quad a\xi + b\eta + c\xi - p = 0,$$

in welcher a, b, c die Richtungskosinus des Lotes zur Ebene bedeuten, so daß

$$(\beta) \quad a^2 + b^2 + c^2 = 1$$

ist, so verlangt die Aufgabe, die Parameter a, b, c, p der Ebene so zu bestimmen, daß

$$T = \sum m_i (x_i a + y_i b + z_i c - p)^2$$

einen extremen Wert annimmt, unter Berücksichtigung der Bedingungsgleichung (β) .

Für die absoluten Extreme der Funktion

$$T - \lambda(a^2 + b^2 + c^2 - 1)$$

bestehen die folgenden Bedingungen*):

$$\sum m x (x a + y b + z c - p) - \lambda a = 0$$

$$\sum m y (x a + y b + z c - p) - \lambda b = 0$$

$$\sum m z (x a + y b + z c - p) - \lambda c = 0$$

$$\sum m (x a + y b + z c - p) = 0,$$

welche mit Zuhilfenahme der Abkürzungen

$$\sum m x^2 = A \quad \sum m y^2 = A' \quad \sum m z^2 = A''$$

$$\sum m y z = B \quad \sum m z x = B' \quad \sum m x y = B''$$

auch in folgender Anordnung geschrieben werden können:

$$(\gamma) \quad \begin{cases} (A - \lambda)a + B'b + B'c - p \sum m x = 0 \\ B'a + (A' - \lambda)b + Bc - p \sum m y = 0 \\ B'a + Bb + (A'' - \lambda)c - p \sum m z = 0 \\ a \sum m x + b \sum m y + c \sum m z - p \sum m = 0; \end{cases}$$

*) Der Summationsbuchstabe i bei m, x, y, z soll von hier ab unterdrückt werden.

bringt man die letzte dieser Gleichungen mit (α) in Verbindung, so entsteht

$$a\left(\xi - \frac{\Sigma mx}{\Sigma m}\right) + b\left(\eta - \frac{\Sigma my}{\Sigma m}\right) + c\left(\xi - \frac{\Sigma mz}{\Sigma m}\right) = 0,$$

woraus hervorgeht, daß die gesuchten Ebenen durch den Punkt mit den Koordinaten

$$\frac{\Sigma mx}{\Sigma m} \quad \frac{\Sigma my}{\Sigma m} \quad \frac{\Sigma mz}{\Sigma m}$$

d. h. durch den Schwerpunkt des Systems der materiellen Punkte M_i mit den Massen m_i hindurchgehen (123, (5)). Transformiert man das Koordinatensystem nach diesem Punkte als neuen Ursprung, so wird $p = 0$ und es verschwinden die Summen Σmx , Σmy , Σmz ; heißen A_1 , A_1' , A_1'' , B_1 , B_1' , B_1'' die neuen Werte von A , A' , ..., so gehen die Gleichungen (γ) über in:


$$(\gamma_1) \quad \begin{cases} (A_1 - \lambda)a + B_1''b + B_1'c = 0 \\ B_1''a + (A_1' - \lambda)b + B_1c = 0 \\ B_1'a + B_1b + (A_1'' - \lambda)c = 0. \end{cases}$$

Von da an stimmt die Aufgabe mit der vorigen überein, d. i. mit der Achsenbestimmung einer Fläche zweiter Ordnung, deren Gleichung

$$A_1\xi^2 + A_1'\eta^2 + A_1''\xi^2 + 2B_1\eta\xi + 2B_1'\xi\xi + 2B_1''\xi\eta + F = 0$$

lautet; sie hat also wie diese drei Lösungen. (Zentralellipsoid, Schwerpunkthauptachsen.)

5) Ein gleichschenkliges Trapez von gegebenem Flächeninhalt q (Fig. 32) soll so gestaltet werden, daß die Summe aus der Grundlinie und den Schenkeln möglichst klein sei (trapezförmiges Durchflußprofil mit kleinstem benetzten Umfang).



Bezeichnet man die Grundlinie mit x , die Schenkel mit y , ihren Böschungswinkel mit θ , so handelt es sich um das Minimum von

$$(\alpha) \quad x + 2y,$$

wenn

$$(\beta) \quad (x + y \cos \theta) y \sin \theta = q.$$

Bildet man daraus die Funktion

$$x + 2y - \lambda[(x + y \cos \theta)y \sin \theta - q],$$

so lauten die Bedingungen für deren absolutes Minimum:

$$1 - \lambda y \sin \theta = 0$$

$$2 - \lambda(x \sin \theta + y \sin 2\theta) = 0$$

$$- \lambda y(x \cos \theta + y \cos 2\theta) = 0;$$

die Lösungen $\lambda = 0$, $y = 0$ der letzten sind durch die beiden ersten ausgeschlossen, folglich verbleibt von der dritten

$$x \cos \theta + y \cos 2\theta = 0,$$

während die zweite geschrieben werden kann

$$x \sin \theta + y \sin 2\theta = \frac{2}{\lambda};$$

daraus berechnet sich

$$y = \frac{\begin{vmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos \theta & \cos 2\theta \\ \sin \theta & \sin 2\theta \end{vmatrix}} = \frac{2 \cos \theta}{\lambda \sin \theta},$$

womit aus der ersten erhalten wird

$$2 \cos \theta = 1, \quad \cos \theta = \frac{1}{2}, \quad \theta = 60^\circ.$$

Hieraus berechnet sich weiter unter Zuziehung von (β)

$$x = y = \frac{2}{3} \sqrt{q\sqrt{3}}$$

und das Minimum von α

$$2\sqrt{q\sqrt{3}}.$$

6) Die Funktion $u = x^2 y^3 z^4$ erreicht für Werte der Variablen, die der Bedingung $2x + 3y + 4z = a$ ($a > 0$) genügen, bei $x = y = z = \frac{a}{9}$ das Maximum $\left(\frac{a}{9}\right)^9$.

7) Die extremen Werte der Funktion $u = a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2$ bei Vorhandensein der Bedingungen:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \quad lx + my + nz = 0$$

ergeben sich aus der in bezug auf u quadratischen Gleichung:

$$\frac{l^2}{a^2 - u} + \frac{m^2}{b^2 - u} + \frac{n^2}{c^2 - u} = 0;$$

der eine davon ist ein Minimum, der andere ein Maximum; das Verhältniß der zugehörigen Werte der Variablen ist:

$$x : y : z = \frac{l}{a^2 - u} : \frac{m}{b^2 - u} : \frac{n}{c^2 - u}.$$

8) Das Minimum der Funktion $u = x^2 + y^2 + z^2$ für Werte der Variablen zu ermitteln, die die Bedingungen

$$ax + by + cz - 1 = 0$$

$$a'x + b'y + c'z - 1 = 0$$

erfüllen. (Geometrisch heißt dies die kürzeste Entfernung des Ursprungs von der Schnittlinie zweier Ebenen bestimmen).

$$\min u = \frac{(a - a')^2 + (b - b')^2 + (c - c')^2}{(bc' - b'c)^2 + (ca' - c'a)^2 + (ab' - a'b)^2}.$$

9) Ein Dreieck von gegebenem Umfang so zu gestalten, daß es bei der Rotation um eine seiner Seiten einen Doppelkegel von möglichst großem Volumen beschreibt. (Die in der Rotationsachse liegende Seite muß $\frac{2}{3}$ jeder der beiden anderen betragen.)

Sechster Abschnitt.

Anwendung der Differential-Rechnung auf die Untersuchung von Kurven und Flächen.

A. Ebene Kurven.

§ 1. Die Tangente und die Normale.

127. Analytische Darstellung der ebenen Kurven und ihre Einteilung. Die Lage eines Punktes M in der Ebene ist durch zwei Zahlen bestimmt, im rechtwinkligen Koordinatensystem, das wir zunächst zugrunde legen, durch die *Abszisse* x und die *Ordinate* y . Sind x, y variabel und als eindeutige stetige Funktionen*) einer Hilfsvariablen oder eines *Parameters* u gegeben:

$$(1) \quad x = \varphi(u), \quad y = \psi(u),$$

so beschreibt, während u das Intervall, für welches diese Funktionen definiert sind, durchläuft, der Punkt M eine Kurve in der Ebene des Koordinatensystems, eine *ebene Kurve* oder eine *Plankurve*. Die Gleichungen (1) heißen die *parametrischen Gleichungen* der Kurve. Einem besonderen Werte von u entspricht ein bestimmter Punkt der Kurve, der mit $M(u)$ oder $M(x/y)$ bezeichnet werden soll.

Es kann indessen auch unmittelbar y als eindeutige stetige Funktion von x gegeben sein:

$$(2) \quad y = f(x);$$

und dann beschreibt M eine Kurve, indem x stetig das Intervall durchläuft, auf welchem f gegeben ist.

Der Zusammenhang zwischen den variablen Koordinaten kann aber auch durch eine Gleichung von der Gestalt

$$(3) \quad F(x, y) = 0$$

*) Über die Natur dieser Funktionen werden weiterhin noch andere einschränkende Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Differenzierbarkeit gemacht werden, ohne daß dies immer ausdrücklich hervorgehoben würde.

bestimmt sein, vermöge deren sowohl y als Funktion von x wie auch umgekehrt x als Funktion von y aufgefaßt werden kann; hält man an dem ersteren fest, so kann noch y eine eindeutige oder eine mehrdeutige Funktion vorstellen; in letzterem Falle entspricht jedem Zweige der Funktion (57) auch ein *Zweig der Kurve*.

Die Untersuchung des Verlaufs einer ebenen Kurve kommt also vom Standpunkte der Analysis zurück auf die Betrachtung des Verlaufs einer Funktion einer stetigen Variablen, die explizite oder implizite gegeben ist, oder auf die Betrachtung der gleichzeitigen Änderungen zweier solcher Funktionen.

Die parametrische Darstellung (1) ist für allgemeine Untersuchungen die geeignetste. Sie kann aus den beiden anderen Darstellungsformen gewonnen werden, indem man x einer passend gewählten Funktion einer Hilfsvariablen u gleichsetzt, diese in (2), respektive (3) an Stelle von x einführt, wodurch auch y , explizite und implizite, als Funktion von u gegeben ist.

Umgekehrt ergibt sich aus der parametrischen Darstellung (1) eine der beiden anderen Darstellungsformen, indem man zwischen den beiden Gleichungen (1) u eliminiert.

Für die *Einteilung der Kurven* ist die Gleichungsform $F(x, y) = 0$ maßgebend.

Ist $F(x, y)$ eine algebraische Funktion, so heißt die Kurve algebraisch; insbesondere läßt sich dann immer bewirken, daß $F(x, y)$ eine ganze Funktion von bestimmtem Grade n sei (13); alsdann wird die durch die Gleichung dargestellte Kurve eine *algebraische Kurve n -ter Ordnung* genannt. Die Ordnung bildet den wesentlichsten Einteilungsgrund der algebraischen Linien. Die Gerade als algebraische Linie erster und die Kegelschnitte als algebraische Linien zweiter Ordnung sind aus den Elementen der analytischen Geometrie bekannt. Darüber hinaus pflegt man von höheren algebraischen Linien zu sprechen.

Eine Kurve, deren Gleichung in x, y nicht algebraisch ist, wird als *transzendente Kurve* bezeichnet.*) Bei der unüber-

*) Die Einteilung in algebraische und transzendente Kurven stammt von *Descartes*, einem der Begründer der analytischen Untersuchungsmethode in der Geometrie; die Namen gab *Leibniz*. Bis dahin sprach man, um den Unterschied hervorzuheben, von geometrischen und mecha-

sehbaren Mannigfaltigkeit der möglichen Gleichungsformen ist an eine Einteilung der transzendenten Linien nicht zu denken; spezielle Erzeugungsweisen haben zu Gruppen solcher Linien geführt.

Die parametrische Darstellung gestattet nicht unmittelbar zu entscheiden, ob die Linie algebraisch oder transzendent sei.

128. Die Tangente in rechtwinkligen Koordinaten. Hat man aus der Gleichung oder den Gleichungen der Kurve eine Anzahl zusammengehöriger Werte x/y bestimmt, so ist damit eine Anzahl von Punkten der Kurve gegeben, die jedoch, wenn sie nicht nahe genug aneinander liegen, eine sichere Vorstellung von dem Verlaufe derselben nicht zu bieten vermögen.

Genaueren Aufschluß darüber vermittelt der Differentialquotient von y in bezug auf x , welcher die Richtung der *Tangente* an die Kurve in jedem ihrer Punkte anzugeben gestattet. Sein Vorzeichen läßt erkennen, ob die Kurve bei wachsendem x steigt oder fällt, und seine absolute Größe zeigt an, wie rasch dieses Steigen oder Fallen an der betreffenden Stelle vor sich geht (22, 36).

Zudem ist die Tangente diejenige unter den Geraden, welche durch den betreffenden Punkt der Kurve gehen, der sich die Kurve in der Umgebung des Punktes am engsten anschließt. Um dies zu zeigen, nehmen wir auf der Kurve einen Punkt $M(x/y)$ an und legen durch ihn eine Gerade; ihre Gleichung sei

$$(4) \quad A(\xi - x) + B(\eta - y) = 0;$$

von dieser Geraden hat ein anderer an M sehr nahe liegender Punkt $M_1(x + \Delta x/y + \Delta y)$ der Kurve den Abstand

$$\delta = \frac{A\Delta x + B\Delta y}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

die Wurzel im Nenner mit dem entsprechenden Zeichen genommen. Sind nun x, y solche Funktionen eines Parameters u ,

nischen Linien. Die Einteilung der algebraischen Linien nach der Ordnung rührt von *Newton* her. — Eine sehr reichhaltige Übersicht über die bisher untersuchten algebraischen und transzendenten Linien gab *G. Loria* in dem Werke: *Spezielle algebraische und transzendente Kurven der Ebene, Theorie und Geschichte*. Deutsch von *F. Schütte*, Leipzig 1902, 1911.

daß sie sich von der Stelle x/y aus nach der Taylorschen Formel entwickeln lassen, so ist (92, (11))

$$\Delta x = dx + \frac{d^2x}{1 \cdot 2} + \dots$$

$$\Delta y = dy + \frac{d^2y}{1 \cdot 2} + \dots,$$

und hiermit wird

$$\delta = \frac{A dx + B dy + \frac{1}{1 \cdot 2} (A d^2x + B d^2y) + \dots}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Im allgemeinen ist also δ von der Ordnung der Größe du welche die Änderungen $\Delta x, \Delta y$ von x, y herbeigeführt hat, und die wir als die erste Ordnung festsetzen wollen. Nur dann ist δ von höherer Ordnung, wenn

$$A dx + B dy = 0$$

oder

$$A : B = dy : -dx;$$

die diesem Verhältnisse entsprechende Gerade (4), d. i.

$$(5) \quad (\xi - x) dy - (\eta - y) dx = 0,$$

ist also unter allen diejenige, welcher die Kurve in der Umgebung von M am nächsten kommt; es ist dies aber die Tangente, weil ihr Richtungskoeffizient $\frac{dy}{dx}$ der Differentialquotient von y in bezug auf x ist.

Ist die Kurve durch das Gleichungspaar (1) bestimmt, so ist

$$dx = \varphi'(u) du, \quad dy = \psi'(u) du$$

und es lautet die Gleichung der Tangente im Punkte x/y

$$(6) \quad \eta - y = \frac{\psi'(u)}{\varphi'(u)} (\xi - x);$$

war die Kurve durch (2) dargestellt, so hat man

$$dy = f'(x) dx$$

und als Gleichung der Tangente

$$(7) \quad \eta - y = f'(x) (\xi - x);$$

für eine durch (3) gegebene Kurve endlich ist vermöge

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$$

das Verhältnis

$$dx : dy = - \frac{\partial F}{\partial y} : \frac{\partial F}{\partial x}$$

und somit

$$(8) \quad (\xi - x) \frac{\partial F}{\partial x} + (\eta - y) \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

die Gleichung der Tangente, $-\frac{F'_x}{F'_y}$ ihr Richtungskoeffizient.

Nimmt der Richtungskoeffizient $\frac{dy}{dx}$ der Tangente für einen Punkt der Kurve den Wert Null an, so ist die Tangente dortselbst der Abszissenachse parallel. Unter diesen Punkten befinden sich auch diejenigen, für welche y einen extremen Wert erreicht (117).

Hört der Richtungskoeffizient in einem Punkte der Kurve auf definiert zu sein, konvergiert er aber bei Annäherung an diesen Punkt (von einer oder von beiden Seiten) gegen ∞ , so ist die Tangente in diesem Punkte parallel der Ordinatenachse. Unter diesen Punkten befinden sich auch solche, in welchen x einen extremen Wert annimmt.

Während $\frac{dy}{dx}$ in den Fällen, welchen die Gleichungen (6) und (7) entsprechen, nur von einer Variablen abhängt, sind in dem zu (8) gehörigen Falle zu seiner Bestimmung beide Koordinaten des Punktes der Kurve erforderlich; er wird unbestimmt, für solche Punkte, für welche F'_x und F'_y zugleich verschwinden.




Fig. 33.

129. Beispiele. 1) In einem Büschel von Kreisen, welche die Gerade XX' (Fig. 33) in einem Punkte O berühren, werden die durch einen festen Punkt A dieser Geraden gehenden Durchmesser gezogen; der Ort der Endpunkte dieser Durchmesser ist analytisch darzustellen. — Die so erzeugte Kurve heißt *Strophoide*.*)

Wählt man XX' zur Abszissenachse und O zum Ursprung, so hat jener Kreis des Büschels, dessen Mittelpunkt C die

*) Die Erfindung der Kurve reicht in das 17. Jahrhundert zurück, der Name kommt 1846 zum erstenmal in einer Abhandlung *Montuicis* in den *Nouv. Ann. vor*.

Ordinate $OC = c$ besitzt, die Gleichung

$$x^2 + y^2 = 2cy;$$

ist a die Abszisse von A , so kommt dem durch A laufenden Durchmesser dieses Kreises die Gleichung

$$y = -\frac{c}{a}x + c$$

zu; läßt man beide Gleichungen gelten, so bedeuten x, y die Koordinaten der gemeinsamen Punkte M, N , und es ergibt sich die Ortskurve dieser Punkte durch Elimination des von Kreis zu Kreis veränderlichen c zwischen diesen Gleichungen. Ihre Gleichung ist demnach

$$(9) \quad (x^2 + y^2)x - a(x^2 - y^2) = 0.$$

Es ist dies eine algebraische Gleichung dritten Grades (13, I), die Strophoide somit eine *algebraische Kurve dritter Ordnung*.

Die Auflösung nach y gibt

$$y = \pm x \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$$

und bestimmt zwei durch das Vorzeichen unterschiedene Zweige $AMOE$ und $ADOB$, von denen jeder das Spiegelbild des andern bezüglich der x -Achse ist. Da y nur so lange reell ist, als x in dem Intervall $(-a, a)$ verbleibt, so liegt die Kurve vollständig zwischen den beiden Geraden $x = -a$ und $x = a$; bei $x = -a$ hört der Ausdruck für y auf, bestimmt zu sein, für $\lim x = -a + 0$ aber wird $\lim y = \pm \infty$. An der anderen Grenze des Intervalls, $x = a$, treffen die beiden Zweige zusammen, da hier $y = 0$ ist; sie treffen aber auch in der Mitte des Intervalls, an der Stelle $x = 0$, zusammen, da auch hier $y = 0$ ist.

Aus

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{a^2 - ax - x^2}{(a+x)\sqrt{(a+x)(a-x)}}$$

folgt, daß an der Stelle

$$x = +\frac{a}{2}(\sqrt{5} - 1)$$

die Tangente an jeden der beiden Zweige parallel ist zur Abszissenachse — die andere Stelle $-\frac{a}{2}(\sqrt{5} + 1)$, an welcher $\frac{dy}{dx}$ verschwindet, fällt außerhalb des Intervalles $(-a, a)$ —;

bei dem positiven Zweige wird an dieser Stelle y zu einem Maximum, bei dem negativen zu einem Minimum, weil bei dem ersteren die Werte von $\frac{dy}{dx}$ in dem Intervalle $(-a, a)$ das Wertgebiet $(+\infty, 0, -\infty)$, bei dem zweiten das Wertgebiet $(-\infty, 0, +\infty)$ durchlaufen; daraus geht zugleich hervor, daß an der Stelle $a/0$, wo die beiden Zweige zusammentreffen, sie eine zur Ordinatenachse parallele Tangente haben.

An der Stelle $x=0$ hat $\frac{dy}{dx}$ für den positiven Ast den Wert $+1$, für den negativen Ast den Wert -1 , so daß die beiden Äste der Kurve sich hier unter einem rechten Winkel durchschneiden; man nennt einen solchen Punkt der Kurve einen *Knotenpunkt*.

Um die Kurve parametrisch darzustellen, setze man

$$y = ux;$$

mit dieser Substitution geht (9) über in

$$x^3(1+u^2) - ax^2(1-u^2) = 0;$$

neben der zweifach zählenden Lösung $x=0$ folgt hieraus:

$$(10) \quad \begin{cases} x = a \frac{1-u^2}{1+u^2} \\ y = a \frac{u(1-u^2)}{1+u^2} \end{cases}$$

Es erscheinen somit x, y als *rationale* Funktionen des Parameters u ; eine algebraische Kurve, welche eine solche Darstellung gestattet, nennt man eine *Unikursalkurve*; sie wird in *einem* Zuge beschrieben, wenn man den Parameter das Gebiet der reellen Zahlen durchlaufen läßt. Im vorliegenden Falle ist der Verlauf folgender, wenn $a > 0$ ist.

Geht u durch $(-\infty, -1)$, so beginnt x/y mit $-a/+\infty$ und endet mit $0/0$, es wird BO beschrieben; geht u weiter durch $(-1, 0)$, so beginnt x/y mit $0/0$ und endet mit $a/0$, und weil dabei y negativ bleibt, so wird ODA beschrieben; geht u weiter durch $(0, +1)$, so beginnt x/y mit $a/0$ und schließt mit $0/0$, und weil dabei y positiv bleibt, so wird AMO beschrieben; geht endlich u durch $(+1, +\infty)$, so beginnt x/y mit $0/0$ und schließt mit $-a/-\infty$, es wird OE beschrieben. Jedem Punkte der Kurve entspricht nur ein und jedem ein

anderer Wert des Parameters, nur dem Punkte O entsprechen deren zwei, nämlich $-1, +1$; demgemäß ergibt sich in jedem Punkte der Kurve nur eine Tangente, im Punkte O aber sind deren zwei, und zwar folgt aus

$$\frac{dx}{du} = -a \frac{4u}{(1+u^2)^2}, \quad \frac{dy}{du} = a \frac{1-4u^2-u^4}{(1+u^2)^2}$$

der Richtungskoeffizient der Tangente

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1-4u^2-u^4}{4u},$$

der für $u = -1$ den Wert -1 , für $u = 1$ den Wert $+1$ annimmt in Übereinstimmung mit dem früheren Resultate.

Man erkennt aus der angewandten Substitution, daß der u entsprechende Punkt der Kurve ihr Schnittpunkt mit der Geraden $y = ux$ ist.

2) Aus dem Endpunkte O des Durchmessers OA eines gegebenen Kreises (Fig. 34) wird nach der Tangente BC im anderen Endpunkte A der Strahl OE gezogen, welcher den Kreis in D schneidet; man mache $OM = DE$ und bestimme den Ort des Punktes M analytisch. — Die betreffende Kurve heißt *Zissoide des Diokles*.*)

Wird O zum Ursprung, OA zur Abszissenachse des Koordinatensystems gewählt, der Halbmesser des Kreises mit a bezeichnet, so folgt aus der Ähnlichkeit der Dreiecke OPM , DAE :

$$AE = \frac{y}{x} 2a;$$

aus der Ähnlichkeit der Dreiecke OPM , DAE :


$$AD = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} 2a;$$

wendet man also auf das rechtwinklige Dreieck ADE , in welchem die dritte Seite $DE = OM = \sqrt{x^2 + y^2}$ ist, den Pythagoreischen Satz an, so entsteht nach entsprechender Umformung die Gleichung der Kurve:

$$(11) \quad (x^2 + y^2)x = 2ay^2.$$

*) Im 2. oder 3. vorchristlichen Jahrhundert.

Fig. 34.



Man hat es also wieder mit einer algebraischen Kurve dritter Ordnung zu tun. Die Auflösung

$$y = \pm x \sqrt{\frac{x}{2a-x}}$$

zeigt, daß x auf das Intervall $(0, 2a)$ beschränkt ist und daß für $\lim x = 2a - 0$ sich $\lim y = \pm \infty$ ergibt. Die beiden Äste, welche im Punkte $0/0$ zusammentreffen, haben hier OX zur gemeinsamen Tangente, weil

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{4a-x}{2a-x} \sqrt{\frac{x}{2a-x}}$$

für $x = 0$ nur den einen Wert 0 annimmt; einen Kurvenpunkt von dieser Art bezeichnet man als *Spitze*.

Mittels der Substitution

$$y = ux$$

ergibt sich wie im vorigen Beispiele die parametrische Darstellung

$$(12) \quad \begin{cases} x = \frac{2au^2}{1+u^2} \\ y = \frac{2au^3}{1+u^2}, \end{cases}$$

so daß auch die Zissoide eine Unikursalkurve ist. Sie wird in dem Sinne QOR beschrieben, während u das Intervall $(-\infty + \infty)$ durchläuft.

3) Die durch die Gleichung

$$(13) \quad x^3 - 3axy + y^3 = 0 \quad (a > 0)$$

gekennzeichnete Kurve ist auf ihren Verlauf zu untersuchen.

— Die Kurve führt den Namen *Cartesisches Blatt*.*)

Die durch Gleichung (13) definierte Funktion y ist schon zweimal Gegenstand der Untersuchung gewesen. In 58, 2) ist gezeigt worden, daß sie, sofern nur die reellen Werte ins Auge gefaßt werden, eindeutig ist in den Intervallen $(-\infty, 0)$ und $(a\sqrt[3]{4}, +\infty)$, während sie dreiwertig ist im Intervall $(0, a\sqrt[3]{4})$ von x . In 120, 2) wiederum hat sich ergeben, daß sie für $x = a\sqrt[3]{2}$ ein Maximum hat im Betrage $y = a\sqrt[3]{4}$. Beachtet man ferner, daß die Gleichung (13) keine Änderung erfährt

*) Zuerst erwähnt von Descartes 1638.

bei Vertauschung von x mit y , so folgt, daß x die nämliche Funktion von y ist wie y Funktion von x ; demnach ist auch x einwertig in den Intervallen $(-\infty, 0)$ und $(a\sqrt[3]{4}, +\infty)$, und dreiwertig in dem Intervalle $(0, a\sqrt[3]{4})$ von y , und erlangt an der Stelle $y = a\sqrt[3]{2}$ den Maximalwert $x = a\sqrt[3]{4}$. Überhaupt folgt aus dem letzten Umstande *Symmetrie* der Kurve in bezug auf die Halbierungslinie des Winkels XOY , (Fig. 35).

Mit Hilfe der Substitution
 $y = ux$ gibt die Gleichung (13):

$$(14) \quad \begin{cases} x = \frac{3au}{1+u^3} \\ y = \frac{3au^2}{1+u^3} \end{cases}$$

Jedem Werte von u entspricht ein anderes Wertepaar x/y ; eine Ausnahme jedoch machen die beiden Werte $u = 0$ und $u = \infty$, indem ihnen ein und dasselbe Wertepaar $0/0$ zugeordnet ist; infolgedessen geht die Kurve zweimal durch den Ursprung; um die Richtungen, in welchen der Durchgang erfolgt, festzustellen, bilde man

$$\frac{dx}{du} = 3a \frac{1-2u^3}{(1+u^3)^2}, \quad \frac{dy}{du} = 3a \frac{u(2-u^3)}{(1+u^3)^2}$$

und daraus

$$\frac{dy}{dx} = \frac{u(2-u^3)}{1-2u^3};$$

für $u = 0$ nimmt dies den Wert 0 und für $\lim u = \infty$ den Grenzwert ∞ an, so daß das eine Mal die Abszissenachse, das zweite Mal die Ordinatenachse berührt wird.


Die Kurve wird in dem Sinne $DOCB OA$ beschrieben, wenn der Parameter u nacheinander die Intervalle

$$(-1, -\infty), \quad (+\infty, 0), \quad (0, -1)$$

durchläuft, und zwar entspricht dem ersten Intervalle DO , dem zweiten $OCBO$, dem dritten OA .

130. Fortsetzung. 4) *Rollkurven*. Eine sehr umfassende, durch ein gemeinsames Erzeugungsprinzip zusammengehaltene Kategorie von Linien sind die *Rollkurven* oder *Rouletten*; es

Fig. 35.



sind dies im allgemeinen transzendente, in manchen besonderen Fällen auch algebraische Linien. Für die Technik, insbesondere für die Theorie und Konstruktion von Bewegungsmechanismen, sind die Rollkurven von hervorragender Bedeutung.

Das Erzeugungsprinzip in seiner allgemeinsten Fassung besteht in Folgendem: In einer festen Ebene S , die Trägerin einer beliebigen Kurve s , der *Polbahn*, ist, bewegt sich eine zweite in sich starre Ebene Σ derart, daß eine in ihr liegende beliebige Kurve σ , die *Polkurve*, auf der Polbahn abrollt; jeder Punkt M von Σ beschreibt dabei in S eine Kurve, die man eine *Rollkurve* nennt. Einer momentanen Lage von Σ entspricht ein Punkt A als Berührungspunkt von Polbahn und Polkurve, der momentane *Drehpol*, und ein Punkt M der Rollkurve.

Ist die Polbahn eine *Gerade*, die Polkurve ein *Kreis*, so nennt man die Rollkurve eine *Zykloide*, und zwar, je nachdem der beschreibende Punkt auf dem Kreise selbst, innerhalb oder außerhalb desselben liegt, eine *gemeine*, *verlängerte* oder *verkürzte* Zykloide.*)

Sind Polbahn und Polkurve Kreise, so bezeichnet man die entstandenen Kurven wohl auch als *Trochoiden*, häufiger jedoch auch als Zykloiden, aber mit einem Zusatz, der sich zunächst nur auf die gegenseitige Lage der beiden Kreise bezieht: liegt der rollende Kreis (als Linie) *außerhalb* des ruhenden, so spricht man von *Epizykloiden*, dagegen von *Hypozykloiden*, wenn der rollende Kreis *innerhalb* des ruhenden sich befindet. Zu dieser Haupteinteilung kommt noch eine Untereinteilung, die mit der Lage des beschreibenden Punktes zum rollenden Kreise zusammenhängt und zu denselben drei Benennungen führt, die bei den Zykloiden schlechtweg unterschieden worden sind.

Über diese zwei Hauptgattungen von Rollkurven soll zunächst nicht hinausgegangen werden. Nun zu ihrer analytischen Darstellung und deren Diskussion.

*) Neben den beiden letzteren Benennungen sind auch die andern: geschweifte und geschlungene Zykloide in Verwendung (s. G. Scheffers, Besondere transzendente Kurven, Enzykl. d. mathem. Wissensch., Bd. III 3, p. 194). Der Name Zykloide wird auf Galilei (1640) zurückgeführt, einen der ersten, der sich mit der Untersuchung der gemeinen Zykloide beschäftigte.

a) **Zykloiden.** Polbahn sei die Gerade $X'X$ (Fig. 36), Polkurve der Kreis K_0 , der durch Rollen um den Wälzungswinkel u in die Lage K gelangt. Der beschreibende Punkt, der ursprünglich die Lage M_0 bzw. $M_0^{(1)}$, $M_0^{(2)}$ hatte, befindet sich jetzt in M bzw. $M^{(1)}$, $M^{(2)}$. Bezeichnet man seine Entfernung vom jeweiligen Mittelpunkt C_0 bzw. C mit b , den Radius des Kreises mit a , so ist das Erzeugungsgesetz durch den Ansatz

$$OB = \text{arc } MB = au$$

gekennzeichnet. Wählt man also $X'X$ als Abszissenachse und legt die Ordinatenachse durch C_0 , so findet man aus der Figur, die dienötigen Konstruktionslinien für den Punkt $M^{(1)}$ enthält:

$$(15) \quad \begin{aligned} y &= a - b \cos u \\ x &= au - b \sin u \end{aligned}$$

als parametrische Gleichungen der Zykloiden; bei $b < a$ ist es die verlängerte, $M_0^{(1)}N^{(1)}$, bei $b > a$ die verkürzte, $M_0^{(2)}N^{(2)}$, bei $b = a$ die gemeine, M_0N :

$$(15^*) \quad \begin{aligned} x &= a(u - \sin u) \\ y &= a(1 - \cos u). \end{aligned}$$


Wegen der Periodizität der trigonometrischen Funktionen bestehen die Zykloiden aus unendlich vielen gleichen Ästen, deren einer erhalten wird, wenn man u das Intervall $(0, 2\pi)$ durchlaufen läßt.

Daß es transzendente Kurven sind, erkennt man durch Elimination von u ; sie führt bei den Gleichungen (15) auf

$$x = a \text{Arc cos } \frac{a-y}{b} - b \sqrt{1 - \left(\frac{a-y}{b}\right)^2}.$$

Bei der gemeinen Zykloide variiert y zwischen 0 und $2a$, bei der verlängerten zwischen $a - b$ und $a + b$, bei der verkürzten zwischen $-(b - a)$ und $b + a$.

Fig. 36.



Aus (15) ergibt sich $\frac{dx}{du} = y$; daraus folgt, daß bei der verkürzten Zyklode dort, wo sie die Abszissenachse schneidet, x einen extremen Wert annimmt, die Tangente also parallel ist der Ordinatenachse.

Nimmt man $\frac{dy}{du} = b \sin u$ hinzu, so findet sich

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b \sin u}{a - b \cos u}$$

als Richtungskoeffizient der Tangente und

$$(16) \quad \eta - y = \frac{b \sin u}{a - b \cos u} (\xi - x)$$

als deren Gleichung; insbesondere lautet diese für die gemeine Zyklode

$$(16^*) \quad \eta - y = \cotg \frac{u}{2} (\xi - x).$$

b) *Epi- und Hypozykloiden*. Polbahn sei der Kreis K mit dem Mittelpunkt O und dem Radius R (Fig. 37), Polkurve der Kreis k_0 mit dem Mittelpunkt C_0 und dem Radius r , M_0 der

beschreibende Punkt im Abstände a vom Mittelpunkte.


Aus der Anfangslage komme der letztere Kreis durch Abrollen um den Winkel v in die Lage k , der Berührungsradius habe dabei eine Drehung um den Winkel u erfahren; dieser letztere soll als Parameter verwendet werden. Das Erzeugungsprinzip ist durch

$$Ru = rv$$

bestimmt, wodurch die Gleichheit der Bögen BA_0 und BA ausgedrückt ist. Mit Benutzung der in der Figur angebrachten Hilfskonstruktion, aus der sich für den Dreieckswinkel QCM der Ausdruck $\frac{R+r}{r} u - \frac{\pi}{2}$ ergibt, finden sich die Gleichungen der *Epi- und Hypozykloiden*:

$$(17) \quad \begin{aligned} x &= (R + r) \cos u - a \cos \frac{R+r}{r} u \\ y &= (R + r) \sin u - a \sin \frac{R+r}{r} u; \end{aligned}$$

Fig. 37.



bei $a < r$ ist es die verlängerte, bei $a > r$ die verkürzte, bei $a = r$ die gewöhnliche Epizykloide.

Es bedarf nur der Zeichenänderung bei r und a , um zu den Gleichungen der *Hypozykloiden* zu kommen:

$$(18) \quad \begin{aligned} x &= (R - r) \cos u + a \cos \frac{R-r}{r} u \\ y &= (R - r) \sin u - a \sin \frac{R-r}{r} u; \end{aligned}$$

auch hier sind die obigen drei Fälle zu unterscheiden.

Ist das Verhältniß der Radien $R:r$ rational, so kehrt der rollende Kreis nach einer bestimmten Anzahl von Abwälzungen wieder in seine ursprüngliche Lage zurück, die Zykloide besteht aus einer endlichen Anzahl gleicher Äste und ist algebraisch. Ist das Verhältniß aber irrational, so kehrt der rollende Kreis niemals in seine Anfangslage zurück, die Anzahl der Äste ist unbegrenzt, die Zykloide transzendent.

Zur Illustration die folgenden drei Beispiele.

Die gewöhnliche Epizykloide, bei der $r = R$ ist, hat die parametrischen Gleichungen

$$\begin{aligned} x &= 2r \cos u - r \cos 2u \\ y &= 2r \sin u - r \sin 2u \end{aligned}$$

und nach der Translation $x = r + \xi$, $y = \eta$ des Koordinatensystems die Gleichungen:

$$\begin{aligned} \xi &= 2r \cos u (1 - \cos u) \\ \eta &= 2r \sin u (1 - \sin u); \end{aligned}$$

eliminiert man zwischen beiden den Parameter u , so kommt man zu der Gleichung:

$$(19) \quad (\xi^2 + \eta^2)^2 + 4r\xi(\xi^2 + \eta^2) - 4r^2\eta^2 = 0,$$

diese Epizykloide ist also eine algebraische Kurve 4. Ordnung (Kardioide).

Die gewöhnliche Hypozykloide, bei der $r = \frac{R}{2}$, hat die Gleichungen:

$$\begin{aligned} x &= R \cos u \\ y &= 0; \end{aligned}$$

dieselben stellen den in der Abszissenachse liegenden Durch-

messer des ruhenden Kreises dar. Rollt also auf der Innenseite eines Kreises ein zweiter Kreis vom halben Radius des ersten ab, so beschreibt jeder seiner Umfangspunkte einen Durchmesser des ersten Kreises.

Die gewöhnliche Hypozykloide, bei der $r = \frac{R}{4}$ ist, hat die parametrischen Gleichungen

$$x = \frac{3R}{4} \cos u + \frac{R}{4} \cos 3u$$

$$y = \frac{3R}{4} \sin u - \frac{R}{4} \sin 3u$$

und wenn man die Funktionen des dreifachen Winkels auf solche des einfachen zurückführt:

$$x = R \cos^3 u$$

$$y = R \sin^3 u;$$

Elimination von u liefert dann

$$(20) \quad x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = R^{\frac{2}{3}},$$

in rationaler Form:

$$(20^*) \quad (x^3 + y^3 - R^3)^2 + 27 R^3 x^2 y^2 = 0;$$

diese Hypozykloide ist hiernach eine algebraische Kurve 6. Ordnung (Astroide).

131. Fortsetzung. 5) Aus einem Punkte x_0/y_0 an eine gegebene Kurve $f(x, y) = 0$ die Tangenten zu führen.

Der Berührungspunkt x/y einer jeden solchen Tangente hat den Gleichungen

$$f(x, y) = 0,$$

$$(x_0 - x)f'_x + (y_0 - y)f'_y = 0$$

zu genügen, deren erste ausdrückt, daß er der Kurve angehört, deren zweite aussagt, daß die Tangente in ihm durch x_0/y_0 geht. Die gemeinsamen Lösungen beider Gleichungen bestimmen die Berührungspunkte der gesuchten Tangenten.

Ist die Kurve algebraisch von n -ter Ordnung, so ordne man sie nach den Gliedern gleicher Dimension derart, daß

$$f(x, y) = \varphi_n(x, y) + \varphi_{n-1}(x, y) + \cdots + \varphi_0(x, y) = 0,$$

wobei $\varphi_r(x, y)$ eine homogene Funktion r -ten Grades bedeutet.

Alsdann ist

$$f'_x = \varphi'_n(x) + \varphi'_{n-1}(x) + \cdots + \varphi'_1(x)$$

$$f'_y = \varphi'_n(y) + \varphi'_{n-1}(y) + \cdots + \varphi'_1(y)$$

und die abgeleiteten Funktionen sind je um einen Grad niedriger als die ursprünglichen.

Die Gliedergruppe höchster Dimensionen in $xf'_x + yf'_y$ ist

$$x\varphi'_n(x) + y\varphi'_n(y),$$

und dies kommt zufolge des Eulerschen Satzes über homogene Funktionen (56) gleich

$$n\varphi_n(x, y),$$

wofür wegen der Kurvengleichung

$$-n[\varphi_{n-1}(x, y) + \varphi_{n-2}(x, y) + \cdots + \varphi_0(x, y)]$$

gesetzt werden kann. Hiernach ist, wenn

$$f(x, y) = 0$$

eine algebraische Kurve n -ter Ordnung bedeutet, die Gleichung

$$(x_0 - x)f'_x + (y_0 - y)f'_y = 0$$

in bezug auf x, y von der $n - 1$ -ten Ordnung, stellt also für sich betrachtet eine algebraische Kurve $n - 1$ -ter Ordnung dar, deren Schnittpunkte mit der gegebenen die Berührungspunkte der aus x_0/y_0 an diese gezogenen Tangenten bedeuten. Nach dem Satze von Bézout aber gibt eine Kurve n -ter mit einer Kurve $n - 1$ -ter Ordnung $n(n - 1)$ Schnittpunkte; demnach gehen aus einem Punkte an eine Kurve n -ter Ordnung im allgemeinen $n(n - 1)$ Tangenten. Diese Zahl wird die Klasse der Kurve genannt, so daß eine Kurve n -ter Ordnung im allgemeinen von der $n(n - 1)$ -ten Klasse ist.

Ein anderes Verfahren, die Tangenten aus einem Punkte x_0/y_0 an eine Kurve zu ziehen, besteht darin, daß man den Strahl durch x_0/y_0 :

$$x = x_0 + ps$$

$$y = y_0 + qs$$

mit der Kurve zusammen betrachtet und das Verhältnis der Konstanten p, q aus der Bedingung sucht, unter welcher die Gleichung

$$f(x_0 + ps, y_0 + qs) = 0$$

mehrfache Lösungen nach s besitzt. Dieser Weg wird besonders bei algebraischen Linien mit Erfolg zu betrachten sein.

6) Es sind zwei Kurven durch ihre Gleichungen

$$(21) \quad \varphi(x, y) = 0 \quad \psi(x, y) = 0$$

gegeben; man soll die Bedingung aufsuchen, unter welcher beide in einem ihrer gemeinsamen Punkte auch eine gemeinsame Tangente besitzen oder einander *berühren*.

Ist x/y ein gemeinsamer Punkt, so hat die Tangente an die erste Kurve dortselbst den Richtungskoeffizienten $-\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y}$, die Tangente an die zweite Kurve den Richtungskoeffizienten $-\frac{\psi'_x}{\psi'_y}$; der gestellten Aufgabe gemäß muß $\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y} = \frac{\psi'_x}{\psi'_y}$, oder

$$(22) \quad \varphi'_x \psi'_y - \varphi'_y \psi'_x = 0$$

sein; durch Elimination von x, y zwischen den Gleichungen (21) und (22) ergibt sich die verlangte Bedingung.

So findet man beispielsweise als Bedingung dafür, daß die Parabel

$$y^2 - 2px = 0$$

und die Ellipse

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

einander berühren, die Gleichung

$$\frac{2p\alpha}{b^2} - \frac{a^2 p^2}{b^4} = 1,$$

so daß, wenn a, p, b gegeben sind, sich als Mittelpunktsabszisse der Ellipse ergibt

$$\alpha = \frac{b^2}{2p} + \frac{a^2 p}{2b^2}.$$

7) Es sind zwei Kurven durch ihre Gleichungen (21) gegeben; man soll die Bedingung aufsuchen, unter welcher sie sich in einem ihrer gemeinsamen Punkte *unter rechtem Winkel* schneiden.

Die Tangenten in dem gemeinsamen Punkte x/y , deren Richtungskoeffizienten $-\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y}$, $-\frac{\psi'_x}{\psi'_y}$ sind, sollen zueinander senkrecht stehen, daher muß $\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y} \cdot \frac{\psi'_x}{\psi'_y} + 1 = 0$ oder

$$(23) \quad \varphi'_x \psi'_x + \varphi'_y \psi'_y = 0$$

sein. Durch Elimination von x, y zwischen den Gleichungen (21) und (23) ergibt sich die verlangte Bedingung.

Soll hiernach der Kegelschnitt

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_{33} = 0, \quad (a_{33} \neq 0)$$

dessen Mittelpunkt im Ursprung liegt, von der Geraden

$$Ax + By = 0$$

unter rechtem Winkel geschnitten werden, so muß

$$(a_{11}x + a_{12}y)A + (a_{12}x + a_{22}y)B = 0$$

sein; bringt man die drei Gleichungen behufs Elimination von x, y auf die Form

$$\begin{aligned} (a_{11}x + a_{12}y)x + (a_{12}x + a_{22}y)y + a_{33} &= 0 \\ Ax + By &= 0 \\ (a_{11}A + a_{12}B)x + (a_{12}A + a_{22}B)y &= 0, \end{aligned}$$

so ergibt sich als notwendige Bedingung für ihre Koexistenz:

$$\begin{vmatrix} a_{11}x + a_{12}y & a_{12}x + a_{22}y & a_{33} \\ A & B & 0 \\ a_{11}A + a_{12}B & a_{12}A + a_{22}B & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

und hieraus die von x, y unabhängige Bedingungsgleichung

$$\begin{vmatrix} A & B \\ a_{11}A + a_{12}B & a_{12}A + a_{22}B \end{vmatrix} = 0,$$

oder

$$a_{12}A^2 - (a_{11} - a_{22})AB - a_{12}B^2 = 0,$$

durch welche also die Achsenrichtungen des Kegelschnittes bestimmt sind.

132. Fußpunktkurven. Der Ort der Fußpunkte der von einem festen Punkte auf die Tangenten einer Kurve gefällten Lote wird die *Fußpunktkurve* dieser Kurve in bezug auf den festen Punkt als *Pol* genannt.

Man kann den Pol immer durch Verschiebung des Koordinatensystems zum Ursprung machen; von dieser Voraussetzung möge im folgenden auch Gebrauch gemacht werden.

Es sei

$$(24) \quad f(x, y) = 0$$

die Gleichung der gegebenen Kurve, M ein Punkt derselben,

T die zugehörige Tangente, OP das zur ihr gefällte Lot, somit P ein Punkt der Fußpunktkurve (Fig. 38); diese kann auch als Ort des Punktes aufgefaßt werden, den der über OM als Durchmesser beschriebene Kreis mit dem Lot zur Tangente in M gemein hat.

Nun ist, wenn x, y die Koordinaten des Punktes M sind,




Fig. 38.

$$\left(\xi - \frac{x}{2}\right)^2 + \left(\eta - \frac{y}{2}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{4},$$

d. h.

$$(25) \quad \xi^2 + \eta^2 - x\xi - y\eta = 0$$

die Gleichung des Kreises, und

$$\eta = -\frac{dx}{dy}\xi, \text{ oder}$$

$$(26) \quad \xi dx + \eta dy = 0$$

die Gleichung des Lotes. Eliminiert

man also zwischen den Gleichungen (24), (25), (26) [nachdem man in (26) $dy:dx$ durch den aus (24) dafür abgeleiteten Wert ersetzt hat] x, y , so ergibt sich die Gleichung der Fußpunktkurve.

Differentiiert man die Gleichung (25) unter dem Gesichtspunkte, daß mit M auch P sich ändert, so erhält man:

$$2\xi d\xi + 2\eta d\eta - \xi dx - \eta dy - x d\xi - y d\eta = 0,$$

was sich mit Rücksicht auf (26) vereinfacht zu

$$\left(\xi - \frac{x}{2}\right) d\xi + \left(\eta - \frac{y}{2}\right) d\eta = 0,$$

und daraus ergibt sich:

$$\frac{d\eta}{d\xi} = -\frac{\xi - \frac{x}{2}}{\eta - \frac{y}{2}};$$

dies besagt aber, daß die Tangente der Fußpunktkurve in P senkrecht steht auf CQ ; folglich ist diese Tangente T_1 zugleich Tangente an den gezeichneten Hilfskreis.

Beispiele. 1) Es ist die Fußpunktkurve der Parabel $y^2 + 4ax = 0$ in bezug auf ihren Scheitel als Pol zu bestimmen.

Die Gleichungen (25) und (26) lauten hier:

$$x\xi + y\eta = \xi^2 + \eta^2,$$

$$y\xi = 2a\eta;$$

löst man sie nach x, y auf und setzt die Werte in die Parabelgleichung ein, so ergibt sich

$$(\xi^2 + \eta^2)\xi = a\eta^2$$

als Gleichung der Fußpunktkurve; diese also ist eine *Zissoide* (129, 2)).

2) Die Fußpunktkurve der gleichseitigen Hyperbel in bezug auf ihren Mittelpunkt zu bestimmen.

Die gleichseitige Hyperbel (Fig. 39), auf ihre Achsen bezogen, schreibt sich:

$$x^2 - y^2 = a^2,$$

und die Gleichungen (25) und (26) heißen jetzt:

$$x\xi + y\eta = \xi^2 + \eta^2,$$

$$x\eta + y\xi = 0;$$

durch Einsetzung der hieraus für x, y errechneten Werte in die Hyperbelgleichung entsteht

$$(22) \quad (\xi^2 + \eta^2)^2 - a^2(\xi^2 - \eta^2) = 0;$$

die Fußpunktkurve ist somit eine algebraische Kurve vierter Ordnung und heißt *Lemniskate* (des Bernoulli*).

Um ihre Form zu erkennen, führen wir den Parameter u mittels der Substitution


$$\eta = u\xi$$

ein und erhalten die parametrischen Gleichungen

$$\xi = \pm a \frac{\sqrt{1-u^2}}{1+u^2}, \quad \eta = \pm a \frac{u\sqrt{1-u^2}}{1+u^2},$$

wonach, da die Zeichen einander entsprechen, zu jedem Werte von u aus dem Intervalle $(-1, +1)$ zwei in bezug auf den Ursprung symmetrisch liegende Punkte gehören; da ferner zu entgegengesetzt gleichen Werten von u gleiche Werte von ξ , aber entgegengesetzt gleiche von η gehören, so ist die Kurve symmetrisch in bezug auf die Achsen. Eine Ausnahme machen

Fig. 39.



*) Jakob Bernoulli, Acta erudit. 1694.

die Grenzwerte -1 , $+1$ des Intervalls, indem denselben der einzige Punkt $0/0$ entspricht; die Kurve geht also zweimal durch den Ursprung.

Bildet man

$$\frac{d\xi}{du} = \pm a \frac{u(u^2 - 3)}{(1 + u^2)^2 \sqrt{1 - u^2}}, \quad \frac{d\eta}{du} = \pm a \frac{1 - 3u^2}{(1 + u^2)^2 \sqrt{1 - u^2}},$$

so ergibt sich daraus, daß ξ extreme Werte erlangt für

$$u = 0^*)$$

und zwar sind es die Werte $\xi = \pm a$, welchen $\eta = 0$ entspricht; und daß η extreme Werte annimmt für

$$u = \pm \sqrt{\frac{1}{3}},$$

und zwar sind es die Werte $\eta = \pm \frac{a}{4}\sqrt{2}$, welchen

$$\xi = \pm \frac{a}{2} \sqrt{\frac{3}{2}}$$

entsprechen; diese vier Punkte liegen auf dem Kreise $\xi^2 + \eta^2 = \frac{a^2}{2}$.

Ferner zeigt

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{1 - 3u^2}{u(u^2 - 3)},$$

daß die Kurve im Ursprunge zwei Tangenten hat; denn zu $u = -1$ gehört der Wert -1 und zu $u = +1$ der Wert $+1$ von $\frac{d\eta}{d\xi}$; der Ursprung ist also ein Knotenpunkt.

133. Die Normale. Die Gerade, welche durch einen Punkt M der Kurve senkrecht zu der Tangente daselbst gezogen wird, nennt man die *Normale* der Kurve im Punkte M .

Die allgemeine Form ihrer Gleichung ergibt sich unmittelbar aus der Gleichung 127, (5) der Tangente und lautet:

$$(27) \quad (\xi - x)dx + (\eta - y)dy = 0.$$

Die spezielle Form richtet sich wie bei der Tangente nach der Art, wie die Kurve analytisch gegeben ist, und es entsprechen

*) Die andern Stellen, an welchen $\frac{d\xi}{du}$ verschwindet, nämlich $u = \pm \sqrt{3}$, fallen außerhalb $(-1, +1)$.

den Gleichungen 127, (6), (7), (8) der Tangente der Reihe nach die folgenden Gleichungen der Normale:

$$(28) \quad \begin{cases} (\xi - x) \frac{dx}{du} + (\eta - y) \frac{dy}{du} = 0 \\ \eta - y = -\frac{1}{f'(x)} (\xi - x) \\ \frac{\xi - x}{f'_x} = \frac{\eta - y}{f'_y}. \end{cases}$$

Beispiele. 1) Für die Zykloiden

$$x = au - b \sin u$$

$$y = a - b \cos u$$

erhält man laut 130, (16) die Normalengleichung

$$\eta - y = \frac{b \cos u - a}{b \sin u} (\xi - x).$$

Setzt man darin $\eta = 0$, so ergibt sich unter Beachtung der Kurvengleichungen

$$\xi = au.$$

Die Normale geht hiernach durch den momentanen Drehpol B, Fig. 36, womit auch eine einfache Tangentenkonstruktion gegeben ist. Geometrisch ist dies daraus zu erkennen, daß das weitere Abrollen im ersten Augenblicke als ein Drehen um den momentanen Pol aufzufassen ist. Diese Bemerkung gilt für Rollkurven allgemein, also auch für die Epi- und Hypozykloiden; hiernach ist in Fig. 37 die durch M und B bestimmte Gerade die Normale und die zu ihr in M errichtete Senkrechte die Tangente.

2) Durch den Punkt x_0/y_0 zu einer gegebenen Kurve $f(x, y) = 0$ die Normalen zu führen.

Der Fußpunkt x/y jeder solchen Normale hat den Gleichungen

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 0 \\ (x_0 - x)f'_y - (y_0 - y)f'_x &= 0 \end{aligned}$$

zu genügen. Ihre gemeinsamen Lösungen bestimmen also die verlangten Normalen.

Ist die gegebene Kurve algebraisch von der Ordnung n , so ist $f(x, y)$ eine ganze Funktion n -ten Grades; f'_x, f'_y sind ebensolche Funktionen $n - 1$ -ten Grades und die höchstdimensio-

nierte Gliedergruppe in der zweiten Gleichung, $-xf'_y + yf'_x$, wieder vom n -ten Grade; die Fußpunkte der durch x_0/y_0 gehenden Normalen ergeben sich also als Schnittpunkte zweier Kurven n -ter Ordnung, ihre Anzahl ist daher im allgemeinen n^2 . Demnach gehen aus einem Punkte zu einer Kurve n -ter Ordnung im allgemeinen n^2 Normalen.

Die gegebene Kurve sei die Ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

dann lautet die zweite Gleichung, wenn $a^2 - b^2 = c^2$ gesetzt wird,

$$c^2 xy + b^2 y_0 x - a^2 x_0 y = 0,$$

und stellt eine Hyperbel dar, die durch den Ursprung des Koordinatensystems wie auch durch den gegebenen Punkt x_0/y_0 geht; bringt man die Gleichung in die Form

$$\left(x - \frac{a^2 x_0}{c^2}\right) \left(y + \frac{b^2 y_0}{c^2}\right) = -\frac{a^2 b^2 x_0 y_0}{c^4},$$

dann erkennt man weiter, daß die Hyperbel gleichseitig ist mit den Asymptoten

$$x = \frac{a^2 x_0}{c^2}, \quad y = -\frac{b^2 y_0}{c^2};$$

aus diesen Elementen ist es leicht, die Hyperbel zu konstruieren; ihre Schnittpunkte mit der Ellipse sind die Fußpunkte der Normalen zu dieser.

3) Man führe in analoger Weise wie in 132 an der Fig. 38 aus, daß der Ort der Fußpunkte der Lote, die man vom Ursprung auf die Normalen der Kurve $f(x, y) = 0$ fällt, durch Elimination von x, y zwischen dieser Gleichung und den Gleichungen

$$\begin{aligned} \xi^2 + \eta^2 - x\xi - y\eta &= 0 \\ \eta dx - \xi dy &= 0 \end{aligned}$$

erhalten wird, und bestimme diese Kurve für die Parabel in bezug auf den Scheitel, für die Ellipse in bezug auf den Mittelpunkt.

134. Tangente, Normale, Subtangente und Subnormale. Wenn man in einem Punkte M einer Kurve die Tangente und die Normale konstruiert und beide mit der Ab-

szissenachse zum Schnitte bringt, so wird die Strecke zwischen M und dem betreffenden Schnittpunkte als *Länge der Tangente* oder kurz *Tangente*, beziehungsweise als *Länge der Normale* oder *Normale* bezeichnet. Die Projektionen dieser Strecken auf der Abszissenachse nennt man *Subtangente* und *Subnormale*.


Hiernach ist in Fig. 40

$TM = T$ die Länge der Tangente,

$NM = N$ die Länge der Normale,

$TP = t$ die Subtangente,

$PN = n$ die Subnormale;



während Tangente und Normale als absolute Größen aufgefaßt werden, gelten Subtangente und Subnormale als relative Größen und sind positiv oder negativ, jenachdem die Ordnung der Buchstaben T, N der positiven oder negativen Richtung der Abszissenachse entspricht. — Man bezeichnet die vier angeführten Strecken auch als Berührungsgrößen und benützt sie vielfach zur Tangenten- und Normalenkonstruktion.

Bezeichnet man den Winkel XTM mit α , so ist $\operatorname{tg} \alpha = y'$ (22, 2), und aus dem Dreieck TPM folgt

$$(29) \quad t = \frac{y}{y'};$$

aus dem Dreieck PNM , wo Winkel $PMN = \alpha$,

$$(30) \quad n = yy';$$

mit Hilfe des Pythagoreischen Lehrsatzes ergibt sich dann:

$$(31) \quad T = \left| \sqrt{y^2 + \left(\frac{y}{y'}\right)^2} \right| = \left| \frac{y}{y'} \sqrt{1 + y'^2} \right|,$$

$$(32) \quad N = \left| \sqrt{y^2 + (yy')^2} \right| = \left| y \sqrt{1 + y'^2} \right|.$$

Beispiele. 1) Als Parabel im allgemeinen Sinne bezeichnet man jede Kurve, deren Gleichung die Form

$$y = ax^m$$

besitzt; m heißt die Ordnung der Parabel, gleichgültig ob es eine positive oder negative, ganze, gebrochene oder irrationale Zahl ist. Es ist die Subtangente für den Punkt x/y dieser Kurve zu bestimmen.

Weil $y' = max^{m-1} = \frac{my}{x}$, so ist

$$t = \frac{x}{m},$$

die Subtangente also der m -te Teil der Abszisse. Diese Eigenschaft ermöglicht bei rationalem m eine einfache Tangenten- und Normalenkonstruktion.

So ist für die gewöhnliche Parabel entweder $m = 2$ oder $m = \frac{1}{2}$, je nachdem die Ordinaten- oder die Abszissenachse Achse der Kurve ist, und dementsprechend hat man

$$t = \frac{x}{2}, \text{ bzw. } t = 2x.$$

2) Die durch die Gleichung

$$(33) \quad y = ae^{\frac{x}{a}}$$

dargestellte transzendente Kurve führt den Namen *logarithmische Linie*, weil die durch a gemessenen Abszissen die natürlichen Logarithmen der durch a gemessenen Ordinaten sind. Es soll für diese Kurve die Subtangente bestimmt werden.

Weil $y' = e^{\frac{x}{a}} = \frac{y}{a}$, so ist

$$t = a,$$

die Subtangente also konstant.

Konstruiert man aus den beiden logarithmischen Linien

$$y = ae^{\frac{x}{a}}, \quad y = ae^{-\frac{x}{a}}$$

eine neue Kurve, indem man je aus den zu einer Abszisse gehörigen Ordinaten das arithmetische Mittel bildet und als Ordinate der neuen Kurve betrachtet, so hat diese die Gleichung

$$(34) \quad y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right);$$

sie führt den Namen *Kettenlinie*.*)

*) Als Gleichgewichtsfigur eines gleichmäßig schweren, in zwei Punkten festgehaltenen Seils wurde sie fast gleichzeitig (1690—1691) von Jakob und Johann Bernoulli, Huygens und Leibniz erkannt, nachdem Galilei (1638) die Parabel dafür gehalten hatte.

Ist a positiv, so ist auch y in allen drei Gleichungen beständig positiv, und weil für die erste der logarithmischen Linien $y' = \frac{y}{a} > 0$, für die zweite $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{a} < 0$, so ist die erste mit wachsendem x fort steigend, die zweite fort fallend, und beide haben den einzigen Punkt $0/a$ gemeinsam, durch welchen auch die Kettenlinie geht (Fig. 41).

Für die Länge der Normale der Kettenlinie ergibt sich, weil

$$y' = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right) \text{ und}$$

$$\sqrt{1 + y'^2} = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) = \frac{y}{a}$$

ist, der Ausdruck

$$N = \frac{y^2}{a},$$


wonach N als dritte stetige Proportionale zu dem konstanten a und zu y konstruiert werden kann.

135. Die Tangente im Polarkoordinatensystem. Wenn es sich um die Festlegung eines einzelnen Punktes im *Polarkoordinatensysteme* handelt, so genügt es, den Radiusvektor r als eine absolute Größe zu betrachten und die Amplitude φ auf das Intervall $(0, 2\pi)$ zu beschränken, weil es bei solcher Festlegung möglich ist, jeden Punkt der Ebene durch ein einziges Wertepaar r/φ zu charakterisieren.

Will man jedoch den ganzen Inhalt einer Gleichung zwischen r und φ erschöpfen, dann ist es in vielen Fällen erforderlich, beiden Variablen das Intervall $(-\infty, +\infty)$ anzuweisen. Bezüglich der Amplitude hat dies die Bedeutung, daß der aus dem Pole gezogene veränderliche Strahl einer unbeschränkten Drehung sowohl in einem als positiv angenommenen wie auch in dem entgegengesetzten Sinne fähig sei; als positiver Drehungssinn soll der dem Drehungssinne des Uhrzeigers entgegengesetzte gelten. Ein negativer Wert von r hingegen ist so zu deuten, daß er nicht auf dem durch φ bestimmten, sondern auf dem ihm entgegengesetzten Strahle abzutragen ist.


Die Beschränkung von φ auf das Intervall $(0, 2\pi)$ ist nur dann zulässig, wenn die Gleichung φ in keiner anderen Weise denn als Argument trigonometrischer Funktionen enthält.

Fig. 41.



Die Richtung der *Tangente* an eine Kurve im Punkte M derselben (Fig. 42) wird im Polarsystem OX durch den Winkel θ bestimmt, durch welchen die Verlängerung ML des Leitstrahls bei kürzester *positiver* Drehung um M in die Tangente übergeführt wird.

Es seien r/φ die Koordinaten des Punktes M , $r + \Delta r/\varphi + \Delta\varphi$ die Koordinaten eines zweiten Punktes M_1 der gegebenen Kurve. Der Winkel θ ist der Grenzwert, welchem der Winkel $LMS = \varpi$ sich nähert, wenn M_1 auf der Kurve gegen den Punkt M konvergiert. Nun folgt aus dem Dreieck OMM_1 , in welchem die Winkel bei M , M_1 bzw. $\pi - \varpi$ und $\varpi - \Delta\varphi$ sind, daß



$$\frac{r}{r + \Delta r} = \frac{\sin(\varpi - \Delta\varphi)}{\sin \varpi};$$

daraus ergibt sich, wenn man beiderseits den Zähler vom Nenner subtrahiert,

$$\begin{aligned} \frac{r}{\Delta r} &= \frac{\sin(\varpi - \Delta\varphi)}{\sin \varpi - \sin(\varpi - \Delta\varphi)} \\ &= \frac{\sin(\varpi - \Delta\varphi)}{2 \sin \frac{\Delta\varphi}{2} \cos\left(\varpi - \frac{\Delta\varphi}{2}\right)} \end{aligned}$$

und weiter

$$\frac{r}{\Delta r} = \frac{\frac{\Delta\varphi}{2}}{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}} \frac{\sin(\varpi - \Delta\varphi)}{\cos\left(\varpi - \frac{\Delta\varphi}{2}\right)};$$

indem nun M_1 unaufhörlich dem Punkte M sich nähert, konvergiert $\Delta\varphi$ gegen den Grenzwert Null, ϖ wie schon bemerkt gegen den Grenzwert θ , $\frac{\Delta r}{\Delta\varphi}$ gegen den Differentialquotienten $\frac{dr}{d\varphi} = r'$ des Radiusvektors in bezug auf die Amplitude, und die Gleichung selbst lautet dann (16, 2):

$$(35) \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{r}{r'}.$$

Hieraus ergeben sich für $\sin \theta$ und $\cos \theta$ die Ausdrücke

$$(36) \quad \sin \theta = \frac{r}{\sqrt{r^2 + r'^2}}, \quad \cos \theta = \frac{r'}{\sqrt{r^2 + r'^2}},$$

in welchen die Wurzel wegen der bezüglich der Zählung von θ getroffenen Bestimmung mit ihrem positiven Werte zu nehmen ist.

Ist für einen außerhalb des Pols liegenden Punkt der Kurve $r' = 0$, so zeigen die Gleichungen (36), daß dann $\theta = \frac{\pi}{2}$, die Tangente also senkrecht ist zum Leitstrahl; unter diesen Punkten befinden sich auch diejenigen, in welchen r einen extremen Wert hat.

Ist r' für einen Punkt nicht definiert, der Grenzwert von r' aber bei Annäherung an diesen Punkt ∞ , so zeigt die Gleichung (35), daß $\theta = 0$; die Tangente fällt also dann mit dem Leitstrahle zusammen.


136. Beispiele. 1) Ein Punkt M bewegt sich gleichförmig auf der unbegrenzten Geraden $L'OL$ (Fig. 43) in dem durch die Ordnung dieser Buchstaben angezeigten Sinne, während die Gerade selbst sich um den festen Punkt O gleichförmig im positiven Sinne dreht; es ist die Gleichung der von M beschriebenen Kurve aufzustellen. — Die Kurve führt den Namen *archimedische Spirale*.*)

Wählt man den Punkt O als Pol und diejenige Lage des Strahls OL , welche er in dem Augenblicke annimmt, da der bewegliche Punkt durch O geht, als Polarachse — es sei dies OX —, so sind die künftigen Richtungen von OL durch positive Werte von φ , die vorangegangenen durch negative Werte von φ gekennzeichnet; ebenso ist r von da an positiv, während es vordem als negativ zu gelten hatte. Wegen der Gleichförmigkeit beider Bewegungen ist das Verhältnis ihrer von dem bezeichneten Augenblicke an gezählten Maße konstant, d. h.

$$\frac{r}{\varphi} = a$$

*) Von Archimedes (287—212 v. Chr.) erfunden und zuerst untersucht. Die vollständige Kurve, mit dem links- und dem rechtsgewundenen Zweige, findet sich zuerst bei Euler (1748).

Fig. 43.



und somit

$$(37) \quad r = a\varphi;$$

dabei bedeutet a den zum Winkel vom Bogenmaß 1 ($57^\circ, 29577\dots$) gehörigen Radiusvektor.

Die Kurve geht durch den Pol und beschreibt von da aus nach beiden Seiten unendlich viele, beständig sich erweiternde Windungen, welche gegen die zur Polarachse senkrechte Gerade OY symmetrisch angeordnet sind. Die auf einem beliebigen Strahl von dem *einen* Laufe der Kurve ausgeschnittenen Punkte, wie M, M_1, \dots und M, M', \dots , sind äquidistant und haben den gegenseitigen Abstand $2\pi a$.

Aus (37) ergibt sich $r' = a$ und infolgedessen ist

$$\operatorname{tg} \theta = \varphi;$$


auf dem positiven Laufe $OMM_1 \dots$ ist also der Winkel θ beständig spitz, beginnt mit dem Werte 0 und nähert sich mit wachsendem φ dem Grenzwerte $\frac{\pi}{2}$.

Die archimedische Spirale kann auch als Rollkurve erzeugt werden, indem ein Kreis vom Radius a (Fig. 44) als Polbahn und eine Gerade als Polkurve genommen, der beschreibende Punkt aber so gewählt wird, daß er auf derselben Seite der Polkurve liegt wie die Polbahn und den Abstand a von ihr besitzt. Ist G_0 die Anfangslage der rollenden Geraden, A_0 der momentane Drehpol, so befindet sich der beschreibende Punkt in O ; während G_0 in die Lage G abrollt, kommt der beschreibende Punkt nach M ; dabei ist $OM = BA = \text{arc } BA_0 = a\varphi$; folglich beschreibt M tatsächlich eine archimedische Spirale.

2) Für die durch die Gleichung

$$(38) \quad r\varphi = a \quad (a > 0)$$

dargestellte Kurve die Richtung der Tangente zu untersuchen.
— Wegen der Analogie ihrer Gleichung mit jener der Hyperbel,



bezogen auf ihre Asymptoten als Koordinatenachsen wird diese Kurve *hyperbolische Spirale**) genannt.

Zu positiven Werten von φ gehören positive, zu negativen negative Werte von r , infolgedessen ist die Kurve symmetrisch zu der im Pole zur Polarachse errichteten Senkrechten. Mit gegen Null konvergierendem φ wächst r ins Unendliche, mit beständig wachsendem φ nimmt r gegen die Grenze Null ab; die Kurve umgibt demnach den Pol in zwei Scharen von unbegrenzt vielen immer enger werdenden Windungen (Fig. 45).

Weil $r' = -\frac{a}{\varphi^2}$, so hat man

$$\operatorname{tg} \theta = -\varphi;$$

daraus folgt, daß für die Windungen, welche dem Intervalle $(0, +\infty)$ von φ entsprechen, θ ein stumpfer Winkel ist, der sich mit wachsendem φ der Grenze $\frac{\pi}{2}$ nähert.




Fig. 45.

3) Die Richtung der Tangente bei der durch die Gleichung

$$(39) \quad r = ae^{m\varphi}$$

dargestellten Kurve zu verfolgen. — Diese Kurve, weil die Amplituden ihrer Punkte proportional sind den Logarithmen der durch a gemessenen Radienvektoren, führt den Namen *logarithmische Spirale*.**)

Wir setzen a als positiv voraus, dann ist auch r beständig positiv. Von den Parametern a, m ist nur der letztere bestimmend für die Gestalt der Kurve; denn zwei Kurven, wie (39) und

$$r = Ae^{m\varphi},$$

die sich nur in dem ersten Parameter voneinander unterscheiden, lassen sich durch Drehung der einen um den Pol inein-

*) Von Johann Bernoulli (1710) so benannt.

**) Zuerst von Descartes (1638) untersucht, von Varignon (1704) benannt. Am eingehendsten jedoch hat Jakob Bernoulli sich mit der Kurve beschäftigt und war von ihren zahlreichen merkwürdigen Eigenschaften derart eingenommen, daß er sie auf seinen Grabstein (Münster zu Basel) setzen ließ (Eadem mutatis resurgo).

ander überführen; dreht man nämlich die zweite Kurve um den Winkel α , so hat sie in der neuen Lage die Gleichung

$$r = A e^{m(\varphi + \alpha)} = A e^{m\alpha} \cdot e^{m\varphi},$$

und nun läßt sich α immer so bestimmen, daß

$$A e^{m\alpha} = a$$


wird, daß also die zweite Kurve nach der Drehung mit der ersten zusammenfällt; man braucht nur

$$\alpha = \frac{1}{m} \ln \frac{a}{A}$$

zu nehmen.

Diese Betrachtung lehrt zugleich, daß eine perspektive Transformation der logarithmischen Spirale aus dem Pol nicht ihre Gestalt, sondern nur ihre Lage ändert, indem sie eine Drehung um den Pol um einen bestimmten Winkel bewirkt.

Fig. 46.



Indem φ positiv bleibend wächst, nimmt bei positivem m auch r beständig zu; und indem φ negativ bleibend dem absoluten Werte nach beständig wächst, konvergiert r gegen die Grenze Null; die Kurve umgibt den Pol in unzähligen Windungen, welche, im positiven Drehungssinne des Leitstrahls verfolgt, beständig sich erweitern (Fig. 46). Umgekehrt liegen die Verhältnisse bei negativem m .

Aus (39) folgt $r' = m a e^{m\varphi} = m r$, infolgedessen ist

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{m},$$

somit $\theta = \operatorname{arctg} \frac{1}{m}$ konstant. Die logarithmische Spirale schneidet demnach alle Radienvektoren unter einem und demselben Winkel.

4) Unter dem Namen *Sinusspiralen* faßt man die Kurven der allgemeinen Gleichungsform

$$40) \quad r^n = a^n \sin n\varphi$$

zusammen. Es befinden sich darunter sowohl algebraische als transzendente Linien; die ersteren ergeben sich bei rationalem n , weil dann $\sin n\varphi$ durch die Funktionen des einfachen Winkels

rational und in endlicher Form darstellbar ist (103); bei irrationalen n ist die Linie transzendent.*)

Perspektive Transformation aus dem Pol erzeugt immer wieder eine Kurve derselben Art.

Aus der Gleichung $r^n = a^n \cos n\varphi$ entsteht durch die Rotation $\varphi = \frac{\pi}{2n} - \psi$ wieder eine Gleichung der Form (40).

Aus (40) ergibt sich durch Differentiation

$$r^{n-1} r' = a^n \cos n\varphi$$

und daraus $\operatorname{tg} \theta = \frac{r}{r'} = \operatorname{tg} n\varphi$, woraus $\theta = n\varphi + \kappa\pi$, die ganze Zahl κ so gewählt, daß θ in das Intervall $(0, \pi)$ fällt.

137. Tangente, Normale, Subtangente und Subnormale im Polarsystem. Verlängert man die Tangente und die Normale in einem Punkte M einer Kurve bis zum Schnitt mit jener Geraden, die in O senkrecht zum Leitstrahl OM steht, so wird die zwischen M und dem betreffenden Schnittpunkte enthaltene Strecke als *Länge der Tangente*, beziehungsweise *Länge der Normale* oder kurzweg als *Polar-*

*) Um zu zeigen, wie umfassend diese Klasse von Kurven ist, seien einige der einfachsten besonderen Fälle angeführt.

Für $n = 1$ lautet $r = a \sin \varphi$ in rechtwinkligen Koordinaten $x^2 + y^2 = ay$ und stellt einen Kreis dar:

Für $n = 2$ hat man $r^2 = a^2 \sin 2\varphi$ und in rechtwinkligen Koordinaten $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$; dies ist die Gleichung der Lemniskate, die sich aus der in 132, 2) erkannten Gleichungsform durch Rotation des Koordinatensystems um $-\frac{\pi}{4}$, also durch die Substitution $\xi = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$,

$\eta = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}$ ergibt.

Bei $n = \frac{1}{2}$ entsteht aus $\sqrt{r} = \sqrt{a} \sin \frac{\varphi}{2}$ durch den Übergang zu rechtwinkligen Koordinaten $4(x^2 + y^2)^2 + 4ax(x^2 + y^2) - a^2 y^2 = 0$, die Gleichung der Kardioide (130, (19)).

Der Fall $n = -1$ führt zu der Geraden $y = -a$.

Mit $n = -2$ kommt man von $\frac{1}{r^2} = -\frac{\sin 2\varphi}{a^2}$ zu der gleichseitigen

Hyperbel $xy = -\frac{a^2}{2}$.

Für $n = -\frac{1}{2}$ ergibt sich aus $\frac{1}{\sqrt{r}} = -\frac{\sin \frac{\varphi}{2}}{\sqrt{a}}$ in rechtwinkligen Koordinaten $y^2 = 4a(x+a)$ die Gleichung einer Parabel, bezogen auf Brennpunkt und Achse.

2) Bei der hyperbolischen Spirale

$$r\varphi = a$$

ist

$$t = -a$$

die Subtangente also konstant; hier ist demnach der Ort des Punktes T der um den Pol mit dem Radius a beschriebene Kreis.

3) Bei der logarithmischen Spirale

$$r = ae^{m\varphi}$$

ist

$$t = \frac{1}{m}r, \quad n = mr, \quad T = \frac{r}{m}\sqrt{1+m^2}, \quad N = r\sqrt{1+m^2};$$

alle vier Strecken sind also dem Radiusvektor proportional.

Der Punkt T hat bei dieser Kurve die Koordinaten

$$R = t = \frac{r}{m}; \quad \Phi = \varphi - \frac{\pi}{2};$$

eliminiert man mit Hilfe dieser Gleichungen r, φ aus der Gleichung der Kurve, so entsteht

$$R = \frac{a}{m} e^{m\left(\Phi + \frac{\pi}{2}\right)}$$

als Gleichung des Ortes von T .

Der Punkt N hat die Koordinaten

$$R = n = mr, \quad \Phi = \varphi + \frac{\pi}{2},$$

hiermit ergibt sich auf gleichem Wege

$$R = mae^{m\left(\Phi - \frac{\pi}{2}\right)}$$

als Gleichung des Ortes von N .



Sowohl der Ort von T wie der von N ist hiernach eine der zugrunde liegenden kongruente logarithmische Spirale (136, 3)).

§ 2. Asymptoten.

138. Erste Definition. Wenn die Gleichung einer Kurve in x, y beliebig große Werte einer oder beider Variablen zuläßt, so sagt man, die Kurve besitze (einen oder mehrere) *unendlich ferne Punkte* oder erstrecke sich ins Unendliche.

Als Asymptote eines unendlichen Kurvenzweiges definieren wir eine Gerade von solcher Beschaffenheit, daß ein den Zweig durchlaufender Punkt von ihr einen gegen Null abnehmenden Abstand hat.*)

Die Gerade AB ist also eine Asymptote der Kurve MC , (Fig. 48), wenn das Lot MQ bei fortschreitender Bewegung von M gegen C hin zur Grenze Null konvergiert. Mit dem Lot konvergiert auch jede in einer bestimmten anderen Richtung zu AB gezogene Strecke MR gegen Null, weil das Verhältnis $\frac{MR}{MQ}$ für alle Lagen von M dasselbe bleibt. Daher kann insbesondere statt MQ auch die zu einer Abszisse gehörige Ordinaten-differenz MR von Kurve und Asymptote zum Nachweise der letzteren verwendet werden.



In dem Falle jedoch, wo die Asymptote der Ordinatenachse parallel ist, wie in Fig. 49, ist dieser Vorgang ausgeschlossen und man wird dann zweckmäßig den Abstand MQ selbst wählen, der sich nun als die zu einer Ordinate gehörige Abszissendifferenz der Kurve und der Asymptote darstellt.

Von diesem Falle zunächst abgesehen, wird man auf Grund der aufgestellten Definition folgende Aussage machen können:

Läßt sich die Gleichung einer Kurve in die Gestalt

$$(1) \quad y = \alpha x + \beta + v$$

bringen, wobei v eine Funktion von x bedeutet, die für $\lim x = \infty$ gegen Null konvergiert, so hat die Kurve die Gerade

$$(2) \quad y = \alpha x + \beta$$

zur Asymptote.

Denn ein Punkt x/y hat von der Geraden (2) den Abstand

$$\delta = \frac{y - \alpha x - \beta}{\sqrt{1 + \alpha^2}},$$

*) In dieser Auffassung findet sich der Begriff schon bei Apollonius, der dafür auch schon den Namen gebraucht.

und gehört der Punkt der Kurve an, so ist $y - \alpha x - \beta = v$, also

$$\delta = \frac{v}{\sqrt{1 + \alpha^2}}.$$

und dies konvergiert voraussetzungsgemäß gegen Null, wenn x unbeschränkt wächst. Übrigens läßt auch die andere Auffassung die Richtigkeit der Behauptung erkennen: denn v ist die Ordinatendifferenz von Kurve und Gerade.

Die Bedingungen des obigen Satzes sind erfüllt, wenn sich y nach fallenden Potenzen von x entwickeln läßt und wenn die Entwicklung mit der ersten oder nullten Potenz anhebt; in dem letztgedachten Falle ergibt sich eine zur x -Achse parallele Asymptote.

139. Zweite Definition. Man kann bei einer ins Unendliche fortsetzbaren Kurve auch folgende Betrachtung anstellen. Verzeichnet man im Punkte M an die Kurve die Tangente, so wird diese bei unbegrenzt fortschreitender Bewegung von M auf der Kurve Richtung und Lage ändern und kann dabei einer festen Geraden als Grenze sich nähern. Ist dies der Fall, so wird diese feste Gerade als Asymptote bezeichnet. Demnach hat man die folgende Definition:

Als Asymptote erklärt man auch die Grenzlage einer Tangente bei unaufhörlich fortschreitender Bewegung des Berührungspunktes auf der Kurve.

Die Existenz einer Grenzlage der Tangente

$$\eta - y = y'(\xi - x)$$

erfordert zweierlei: es muß ihre Richtung einer bestimmten Richtung als Grenze sich nähern, also y' einen bestimmten Grenzwert besitzen, und es muß auch der Abschnitt auf der Ordinatenachse, d. i. $y - xy'$, gegen einen bestimmten Grenzwert konvergieren; nur wenn beides zutrifft, ist eine Grenzlage

$$(3) \quad y = Ax + B$$

vorhanden, und zwar ist

$$(4) \quad A = \lim y', \quad B = \lim (y - xy') \quad \text{für } x = \infty.$$

Wächst y' bei der Fortbewegung des Punktes auf der Kurve ins Unendliche und konvergiert dabei der Abschnitt auf der Abszissenachse, d. i. $x - \frac{y}{y'}$, gegen eine bestimmte Grenze c , so hat die Tangente eine zur Ordinatenachse parallele Grenzlage, die Kurve eine ebensolche Asymptote.

140. Zusammenhang beider Definitionen. Es soll nun nachgewiesen werden, daß die beiden Definitionen wohl im allgemeinen, nicht aber notwendig zu demselben Resultate führen.

Aus der Gleichung (1) der Kurve folgt

$$\frac{y}{x} = \alpha + \frac{\beta + v}{x},$$

woraus man erkennt, daß α der Grenzwert von $\frac{y}{x}$ ist, also

$$(5) \quad \alpha = \lim \frac{y}{x};$$

für $x = \infty$ und ein gleichzeitig unendlich werdendes y ist aber nach der in 110 gefundenen Regel

$$\lim \frac{y}{x} = \lim \frac{y'}{1} = \lim y',$$

daher mit Rücksicht auf (4): $\alpha = A$; die Richtungskoeffizienten der Asymptote und der Grenzlage der Tangente stimmen also überein.

Aus (1) folgt auch

$$\beta = y - \alpha x - v,$$

daher ist β der Grenzwert von $y - \alpha x$,

$$(6) \quad \beta = \lim (y - \alpha x),$$

und da nach eben bewiesenen α auch der Grenzwert von y' ist, so ist im allgemeinen der Grenzwert von $y - \alpha x$ auch der Grenzwert von $y - xy'$, d. h. $\beta = B^*$)

Nebenbei mag angemerkt werden, daß die Gleichungen (5), (6) das Verfahren angeben, nach welchem eine zur Ordinaten-

*) Ersetzt man nämlich α durch $y' + \delta$, wobei $\lim \delta = 0$, so wird $\beta = \lim [y - (y' + \delta)x] = \lim (y - xy') - \lim \delta x = B - \lim \delta x$, und nur wenn $\lim \delta x = 0$, ist $\beta = B$.
 $x = \infty$

achse *geneigte* Asymptote bei *expliziter* Gleichungsform der Kurve gefunden werden kann.

Zur Illustration des eben betrachteten *normalen* Falles diene das folgende Beispiel. Die Gleichung $xy - \alpha x^2 - \beta x = a$ kommt durch Auflösung nach y :

$$y = \alpha x + \beta + \frac{a}{x}$$

in die vorausgesetzte Form (1), die $y = \alpha x + \beta$ unmittelbar als eine Asymptote der betreffenden Kurve (Hyperbel) erkennen läßt. Andererseits ist

$$y' = \alpha - \frac{a}{x^2}, \quad y - xy' = \beta + \frac{2a}{x},$$

folglich $\lim y' = \alpha$, $\lim (y - xy') = \beta$; die Asymptote ist demnach auch Grenzlage der Tangente.

Dagegen soll das folgende Beispiel zeigen, daß es auch Ausnahmen von der Norm gibt.

Der Gleichung


$$y = \alpha x + \beta + \frac{c \sin x}{x}$$

entnimmt man sogleich, daß $y = \alpha x + \beta$ eine Asymptote der durch sie dargestellten transzendenten Kurve ist. Sie liefert ferner:

$$y' = \alpha + \frac{c \cos x}{x} - \frac{c \sin x}{x^2},$$

$$y - xy' = \beta - c \cos x + \frac{2c \sin x}{x};$$

wohl ist $\lim y' = \alpha$, aber $\lim (y - xy')$ existiert nicht, weil $c \cos x$ bei beständig wachsendem x unaufhörlich zwischen $-c$ und c schwankt. Die Kurve hat also eine Asymptote im Sinne der ersten Definition, nicht aber im Sinne der zweiten. Ihr Bild (Fig. 50) erklärt diese Tatsache; sie schlingt sich




wellenförmig um die Gerade $y = \alpha x + \beta$. Die Wellenzüge von gleicher Länge (in Projektion auf der x -Achse gleich π) werden mit absolut wachsendem x immer flacher; die *Richtung* der Tangente nähert sich jener der Geraden, aber ihr *Abschnitt* auf der Ordinatenachse schwankt unaufhörlich zwischen $\beta - c$ und $\beta + c$.

141. Zurückführung der Untersuchung der unendlich fernen Punkte auf Punkte im Endlichen. Es sei $f(x, y) = 0$ eine Kurve mit unendlich fernen Punkten. Durch Anwendung der projektiven Transformation (64, II):

$$(7) \quad x_1 = \frac{1}{x}, \quad y_1 = \frac{y}{x}$$

gehe sie in die Kurve $F(x_1, y_1) = 0$ über. Aus der Transformation geht aber hervor, daß für $x = \infty$ $x_1 = 0$ wird, daß also den unendlich fernen Punkten von f die Schnittpunkte von F mit der Ordinatenachse entsprechen (ausgenommen Punkte, die bei endlichem x ein unendliches y haben).



Aus dem unendlichen Zweig von f sei der Kurvenzweig F (Fig. 51) geworden; dann entspricht also sein Punkt $M_1(o/\alpha)$ dem unendlich fernen Punkte von f . Existiert in M_1 eine Tangente an F , so ergibt sich ihr Richtungskoeffizient β als Grenzwert des Quotienten $\frac{y_1 - \alpha}{x_1}$ für $\lim x_1 = 0$, wenn x_1/y_1 die Koordinaten eines beliebigen Punktes M_1' von F bedeuten; mithin ist

$$\frac{y_1 - \alpha}{x_1} = \beta + v,$$

wobei v eine Funktion vorstellt, die mit $\lim x_1 = 0$, also $\lim x = \infty$, zur Null konvergiert; hieraus ergibt sich

$$y_1 = \beta x_1 + \alpha + x_1 v,$$

daraus durch Rücktransformation

$$\frac{y}{x} = \frac{\beta}{x} + \alpha + \frac{v}{x}$$

und schließlich

$$y = \alpha x + \beta + v.$$

Demnach ist die Gerade $y = \alpha x + \beta$, die Transformierte der Tangente $M_1 T_1$ an F_1 , Asymptote von f , und da bei der projektiven Transformation eine Tangente als Verbindungslinie zweier unendlich nahen Punkte wieder in eine Tangente übergeht, so ist die Asymptote unter den gemachten Voraussetzungen auch Tangente im unendlich fernen Punkte von f .

Ist f eine algebraische Kurve n -ter Ordnung, so ist nach 64, II auch F eine algebraische Kurve n -ter Ordnung, und da

bei einer algebraischen Kurve in einem Punkte eines bestimmten Zweiges immer eine Tangente existiert, so folgt daraus, daß bei einer algebraischen Kurve jede Asymptote zugleich Tangente in einem unendlich fernen Punkte ist, und daß eine algebraische Kurve n -ter Ordnung im allgemeinen n Asymptoten besitzt.

Wendet man die Transformation (7) auf die im vorigen Artikel betrachtete transzendente Kurve

$$y = \alpha x + \beta + \frac{c \sin x}{x}$$

an, so ergibt sich als transformierte Kurve


$$y_1 = \alpha + \beta x_1 + c x_1^2 \sin \frac{1}{x_1},$$

die mit der Ordinatenachse den Punkt M_1 mit den Koordinaten

$$x_1 = 0, \quad y_1 = \alpha$$

gemein hat; aber eine Tangente besitzt sie dort nicht, weil

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \beta + 2c x_1 \sin \frac{1}{x_1} - c \cos \frac{1}{x_1}$$



für $x_1 = 0$ seine Bestimmtheit verliert. Die transformierte Kurve nähert sich dem Punkte M_1 in unendlich vielen immer dichter werdenden und immer flacheren Windungen, wie dies Fig. 52 nur andeutungsweise zur Anschauung bringen kann.

142. Aufsuchung zu den Koordinatenachsen paralleler Asymptoten. Bei einer in der expliziten Form $y = f(x)$ gegebenen Kurve ist es im allgemeinen leicht, etwa vorhandene Asymptoten parallel zur Ordinatenachse zu erkennen. Hört $f(x)$ für $x = a$ auf definiert zu sein und wächst es für $\lim x = a$ ins Unendliche, so ist $x = a$ eine Asymptote. Aus dem schließlichen Vorzeichen von $f(x)$ und der Art des Grenzübergangs erkennt man die Anordnung der unendlichen Zweige gegen die Asymptote. Einige Beispiele mögen dies erläutern.

Aus der aufgelösten Gleichung der Strophoide (129, 1)

$$y = \pm x \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$$

ersieht man, daß für $\lim x = -a + 0$ $y = \mp \infty$ wird; die Gerade $x = -a$ ist demnach eine Asymptote, der sich zwei unend-

liche Zweige oben und unten von rechts her nähern (Fig. 33, S. 342).

Die aufgelöste Gleichung der Zissoide (129, 2):

$$y = \pm x \sqrt{\frac{x}{2a - x}}$$

zeigt, daß $y = \pm \infty$ wird für $\lim x = 2a - 0$; die beiden unendlichen Zweige nähern sich der Asymptote $x = 2a$ von links her (Fig. 34, S. 345).

Ist die Gleichung einer Kurve in algebraischer Form dargestellt, so ordne man sie nach fallenden Potenzen von y :

$$(8) \quad y^m \varphi(x) + y^{m-1} \varphi_1(x) + y^{m-2} \varphi_2(x) + \dots = 0;$$

die zur y -Achse parallelen Asymptoten sind dann durch die Wurzeln der Gleichung

$$(9) \quad \varphi(x) = 0$$

bestimmt. Denn, schreibt man (8) in der Gestalt:

$$\varphi(x) + \frac{\varphi_1(x)}{y} + \frac{\varphi_2(x)}{y^2} + \dots = 0,$$

so ist zu erkennen, daß sie erfüllt wird durch $y = \infty$ und $\varphi(x) = 0$, und daß kein anderer Wert von x mit $y = \infty$ vereinbar ist als nur eine Wurzel von $\varphi(x) = 0$.

Die Abszissen der zur Ordinatenachse parallelen Asymptoten der Kurve (8) sind also unter denjenigen Werten von x zu suchen, für welche der Koeffizient der höchsten Potenz von y , sofern er nicht konstant ist, verschwindet.

In analoger Weise ergeben sich die zur Abszissenachse parallelen Asymptoten durch Nullsetzen des Koeffizienten der höchsten Potenz von x , sofern er von y abhängt.

Beispiele. 1) Um bei der Kurve 4. Ordnung:

$$(x^2 - 1)y^2 + 2x^2y + x^2 - 1 = 0$$

die zur y -, bzw. x -Achse parallelen Asymptoten zu erhalten, hat man $x^2 - 1$, bzw. $(y + 1)^2$ Null zu setzen. Die Kurve hat also die Asymptoten

$$x = -1, \quad x = 1, \quad y = -1,$$

die letzte zweifach zählend. Gibt man der positiven Wurzel x die Form

$$x = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{y^2}}}{1 + \frac{1}{y}},$$

so erkennt man, daß für $\lim \frac{1}{y} = +0$ sich x der Grenze 1 von links, für $\lim \frac{1}{y} = -0$ von rechts nähert; daraus ergibt sich die Anordnung der Äste gegen die zur y -Achse parallelen Asymptoten. Die Auflösung nach y , in die Form

$$y = -1 \pm \frac{\sqrt{2x^2 - 1} \mp 1}{x^2 - 1}$$

gebracht, zeigt, daß die Kurvenäste in bezug auf die zur x -Achse parallele Asymptote zu entgegengesetzten Seiten liegen (Fig. 53.)

Bei der Kurve

$$(x-1)^2 y^2 - 2xy + x + 1 = 0$$

zeigt der Koeffizient von y^2 die Asymptote $x = 1$ als doppelt-zählend an; bringt man die Lösung nach x auf die Gestalt:


$$x = 1 + \frac{1}{y} - \frac{1}{2y^2} \pm \sqrt{\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^3} + \frac{1}{4y^4}},$$

so ist zu erkennen, daß nur bei dem Grenzübergange $\lim \frac{1}{y} = +0$ x beständig reell bleibt, und daß sich dabei der obere Wert x der Grenze 1 von rechts, der untere von links nähert*); daher liegen zu beiden Seiten der Asymptote oberhalb der x -Achse Kurvenäste. Außerdem ist die x -Achse doppelt zählende Asymptote.

3) Die Kurve $x^2 y^2 - a^2 x + b^4 = 0$ ($a > 0$) hat die Ordinatenachse nicht zur Asymptote, wiewohl der Koeffizient von y^2 darauf hinweisen würde; denn aus der Lösung

$$y = \pm \sqrt{\frac{a^2 x - b^4}{x^2}}$$

*) Man beachte, um sich davon zu überzeugen, die Ordnung der verschiedenen Größen in bezug auf $\frac{1}{y}$.



ist zu ersehen, daß y erst von $x = \frac{b^4}{a^3}$ angefangen reell ist, daß sich also in unmittelbarer Nähe der Ordinatenachse überhaupt keine Kurvenpunkte befinden.

143. Aufsuchung zu den Koordinatenachsen geneigter Asymptoten. I. In 138 und 140 sind bereits Methoden angegeben worden, um geneigte Asymptoten zu finden. Sie mögen nun zunächst an einigen Beispielen erläutert werden.

1) Die allgemeine Gleichung der Kegelschnitte:

$$y^2 = 2px + (\varepsilon^2 - 1)x^2$$

(p = Halbparameter, ε = relative Exzentrizität), führt, wenn man $y = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{x} + \frac{\delta}{x^2} + \dots$ supponiert, zu dem Ansatz:

$$\alpha^2 x^2 + 2\alpha\beta x + \beta^2 + 2\alpha\gamma + \frac{2\beta\gamma}{x} + \dots = 2px + (\varepsilon^2 - 1)x^2,$$

der, da er für alle Werte von x bestehen muß, zur Folge hat:

$$\alpha^2 = \varepsilon^2 - 1, \quad \alpha\beta = p, \quad \beta^2 + 2\alpha\gamma = 0, \dots;$$

daraus ergibt sich

$$\alpha = \pm \sqrt{\varepsilon^2 - 1}, \quad \beta = \frac{p}{\pm \sqrt{\varepsilon^2 - 1}};$$

folglich sind

$$y = \pm \sqrt{\varepsilon^2 - 1} \left(x + \frac{p}{\varepsilon^2 - 1} \right)$$

die beiden Asymptoten, reell nur dann, wenn $\varepsilon > 1$ (Hyperbel). Das Vorzeichen von γ gibt dann Aufschluß über die Lage der Kurvenäste.

2) Aus der Gleichung $x^3 + y^3 = a^3$ erhält man

$$y = (a^3 - x^3)^{\frac{1}{3}} = -x \left(1 - \frac{a^3}{x^3} \right)^{\frac{1}{3}} = -x + \frac{a^3}{3x^2} - \dots,$$

ebenso

$$x = -y + \frac{a^3}{3y^2} - \dots,$$

folglich ist $y = -x$ die einzige reelle Asymptote dieser kubischen Kurve.

3) Die Gleichung $y^2 = x^2 \frac{x-1}{x-2}$ kann für genügend große x ($x > 2$) auf folgende Form gebracht werden. Zunächst ist

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{x-2} &= \frac{1-\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} + \dots\right) \\ &= 1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \dots, \end{aligned}$$


somit unter Zuhilfenahme der Binomialentwicklung

$$\begin{aligned} y &= \pm x \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} = \pm x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{7}{8x^2} + \dots \right) \\ &= \pm \left(x + \frac{1}{2} + \frac{7}{8x} + \dots \right); \end{aligned}$$

daraus geht hervor, daß die durch obige Gleichung dargestellte Kurve die beiden Asymptoten

$$y = x + \frac{1}{2}, \quad y = -x - \frac{1}{2}$$

besitzt und daß, wie aus dem Zusatzgliede $\pm \frac{7}{8x}$ hervorgeht, die Kurve sich der ersten Asymptote links von unten, rechts von oben, der zweiten links von oben, rechts von unten nähert. Außerdem wird bei dem Grenzübergange $\lim_{x \rightarrow 2} y = \pm \infty$, so daß die Kurve auch noch die Asymptote $x = 2$ hat, der sie sich von rechts her nähert (Fig. 54).



II. Wenn eine algebraische Kurve gegeben ist in der Form $F(x, y) = 0$, wo $F(x, y)$ eine rationale ganze Funktion von x, y bedeutet, so empfiehlt sich das folgende Verfahren zur Bestimmung der Asymptoten. Man ordne die linke Seite nach homogenen Gliedergruppen, mit der höchsten (n -ten) Ordnung beginnend; dividiert man dann durch x^n , so nimmt die Gleichung die Gestalt an:

$$(10) \quad u_n \left(\frac{y}{x} \right) + x^{-1} u_{n-1} \left(\frac{y}{x} \right) + x^{-2} u_{n-2} \left(\frac{y}{x} \right) + \dots = 0$$

an.

Um zunächst den Richtungskoeffizienten α einer Asymptote zu finden, hat man den Grenzwert von $\frac{y}{x}$ für $x = \infty$ zu bestimmen; die Gleichung (10) verwandelt sich durch diesen Grenzübergang in

$$(11) \quad u_n(\alpha) = 0,$$

im allgemeinen eine Gleichung n -ten Grades in bezug auf α .

Ist α eine reelle Wurzel dieser Gleichung, so hat man den Abschnitt der zugehörigen Asymptote auf der Ordinatenachse zu suchen, der sich als Grenzwert von $y - \alpha x$ ergibt; setzt man $y - \alpha x = \beta$, so folgt daraus $\frac{y}{x} = \alpha + \frac{\beta}{x}$, und führt man dies in (10) ein, indem man gleichzeitig jedes Glied mittels der Taylorsche Reihe nach Potenzen des Inkrements $\frac{\beta}{x}$ entwickelt, so ergibt sich:

$$u_n(\alpha) + x^{-1}\{u_{n-1}(\alpha) + u'_n(\alpha)\beta\} + x^{-2}\{u_{n-2}(\alpha) + u'_{n-1}(\alpha)\beta + u''_n(\alpha)\frac{\beta^2}{2}\} + \dots = 0,$$

welcher Ansatz sich mit Rücksicht darauf, daß α eine Wurzel von (10) bedeutet, vereinfacht zu:

$$(12) \quad u_{n-1}(\alpha) + u'_n(\alpha)\beta + x^{-1}\{u_{n-2}(\alpha) + u'_{n-1}(\alpha)\beta + u''_n(\alpha)\frac{\beta^2}{2}\} + \dots = 0,$$

für $\lim x = \infty$ reduziert sich diese Gleichung auf

$$(13) \quad u_{n-1}(\alpha) + u'_n(\alpha)\beta = 0,$$

woraus

$$(14) \quad \beta = -\frac{u_{n-1}(\alpha)}{u'_n(\alpha)}.$$

Sollten $u_{n-1}(\alpha)$ und $u'_n(\alpha)$ zugleich Null sein*), so beginnt die linke Seite in (12) erst mit dem Gliede in x^{-1} ; nach Forthebung dieses Faktors und Ausführung des Grenzübergangs $\lim x = \infty$ liefert (12) zur Bestimmung von β die quadratische Gleichung:

$$(15) \quad u_{n-2}(\alpha) + u'_{n-1}(\alpha)\beta + u''_n(\alpha)\frac{\beta^2}{2} = 0.$$

Hat diese zwei reelle verschiedene Wurzeln, so besitzt die Kurve zwei parallele Asymptoten vom Richtungskoeffizienten α ; hat sie zwei gleiche reelle Wurzeln, so fallen zwei Asymptoten in einer Geraden zusammen, usw.

Diese Untersuchung ist mit jeder reellen Wurzel von (11) auszuführen.

*) $u'_n(\alpha) = 0$ besagt, daß α eine mehrfache Wurzel von $u_n(\alpha) = 0$ ist.

Beispiele. 1) Bei dem Cartesischen Blatte (129, 3))

$$x^3 - 3axy + y^3 = 0$$

ist $u_3\left(\frac{y}{x}\right) = 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^3$, $u_2\left(\frac{y}{x}\right) = -3a \frac{y}{x}$; aus $1 + \alpha^3 = 0$ ergibt sich die einzige reelle Wurzel $\alpha = -1$, und zu dieser gehört

$$\beta = -\left(\frac{-3a\alpha}{3\alpha^2}\right)_{\alpha=-1} = -a;$$

somit ist $x + y + a = 0$ die Gleichung der einzigen Asymptote dieser Kurve (vgl. Fig. 35, pag. 347).

2) Für die Kurve 4. Ordnung:

$$x^2(x-y)^2 - y^2(x-y) + 1 = 0$$

ergibt sich folgende Rechnung. Es ist

$$u_4\left(\frac{y}{x}\right) = \left(1 - \frac{y}{x}\right)^2, \quad u_3\left(\frac{y}{x}\right) = -\left(\frac{y}{x}\right)^2\left(1 - \frac{y}{x}\right), \quad u_2\left(\frac{y}{x}\right) = 0;$$

Fig. 55.





Fig. 56.



$(1 - \alpha)^2 = 0$ hat die zweifache Wurzel $\alpha = 1$, und da für diese sowohl $u'_4(\alpha)$ wie $u_3(\alpha)$ verschwindet, so hat man zur Bestimmung von β die quadratische Gleichung:

$$2\beta + 2\beta^2 = 0,$$

die die Lösungen $\beta = 0$ und $\beta = -1$ gibt. Die Kurve hat also die Asymptoten $y = x$ und $y = x - 1$.


3) In Anwendung der verschiedenen hier entwickelten Methoden bestimme man die Asymptoten der folgenden Kurven:

a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$ (Fig. 55)

b) $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$ (Fig. 56)

c) $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$ (Fig. 57)

Fig. 57.



$$d) x^2y + xy^2 = a^3$$

$$e) x^3 - xy^2 + ay^2 = 0$$

$$f) x^2y^2 = a^2(x^2 + y^2)$$

$$g) x^2y^2 = a^2(x^2 - y^2)$$

$$h) xy(x^2 - y^2) = a^4.$$

144. Krumme Asymptoten. Der in 138 aufgestellte Asymptotenbegriff läßt eine Erweiterung zu, indem man ihn von der Geraden auf eine Kurve überträgt, deren Ordinaten mit wachsendem x sich von den Ordinaten der gegebenen Kurve um eine gegen Null konvergierende Größe unterscheiden.*)

Läßt sich das y einer Kurve als Funktion von x in der Form

$$(16) \quad y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n + v$$

darstellen, wobei v eine Funktion bedeutet, die bei $\lim x = \infty$ gegen Null konvergiert, so ist

$$(17) \quad y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

eine Asymptote n -ter Ordnung dieser Kurve.


Ein Beispiel hierzu gibt die Kurve 3. Ordnung

$$y = \frac{x^3 + x}{x - 1};$$

denn durch Ausführung der Division ergibt sich:

$$y = x^2 + x + 2 + \frac{2}{x - 1},$$

woraus zu entnehmen ist, daß die Kurve außer der geraden Asymptote $x = 1$ die parabolische Asymptote $y = x^2 + x + 2$ mit dem Scheitel $-\frac{1}{2} \mid \frac{7}{4}$ (118, 2) besitzt. Zugleich zeigt das Zusatzglied $\frac{2}{x - 1}$, daß bei $x < 1$ die Kurve unter, bei $x > 1$ über der Parabel liegt (Fig. 58).



*) Diese Erweiterung des Asymptotenbegriffs stammt aus späterer Zeit. Speziell von asymptotischen Parabeln wird in einer aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammenden Schrift von C. F. M. Dechaules gesprochen; die allgemeine Fassung scheint zuerst J. Stirling (1717) aufgestellt zu haben (M. Cantor, Vorles. über Gesch. d. Math., III, 1898, p. 17 u. 413).

145. Asymptoten im Polarsystem. Um für eine auf ein *Polarkoordinatensystem* bezogene Kurve

$$(18) \quad r = f(\varphi)$$

die *Asymptoten* zu bestimmen, beachte man zunächst, daß für einen unendlich fernen Punkt r unendlich wird; man hat also jene Werte von φ zu bestimmen, für welche $\lim r = \infty$ sich ergibt; die diesen Werten entsprechenden Strahlen weisen nach den unendlich fernen Punkten hin.

Sei $\varphi = \alpha$ ein solcher Wert und OU (Fig. 59) der zugehörige Strahl; entspricht diesem eine Asymptote AB , so handelt es sich noch um ihre Entfernung von OU .

Um sie zu bestimmen, falle man MP senkrecht zu OU ; aus dem rechtwinkligen Dreieck OMP folgt dann

$$MP = r \sin(\alpha - \varphi),$$

und konvergiert dieser Ausdruck für $\lim \varphi = \alpha$ gegen eine bestimmte Grenze c , so stellt diese die Entfernung der Asymptote von OU dar, so daß

$$(19) \quad c = \lim_{\varphi = \alpha} r \sin(\alpha - \varphi).$$

In dem Falle, wo OX selbst die Richtung nach dem unendlich fernen Punkte bezeichnet, ist

$$(20) \quad c = \lim_{\varphi = 0} r \sin \varphi.$$

Aus dem Vorzeichen von c schließt man, auf welcher Seite von OU die Asymptote gelegen ist; ist beispielsweise $\lim_{\varphi = \alpha} r = +\infty$ und fällt c positiv aus, so war und blieb schließlich $\alpha > \varphi$, die Asymptote liegt rechts von OU wie in der Figur; bei negativem c und unter sonst gleichen Umständen wäre sie links aufzutragen.

Beispiele. 1) Bei der hyperbolischen Spirale (136, 2)

$$r = \frac{a}{\varphi} \quad (a > 0)$$

wird $\lim r = +\infty$ für $\lim \varphi = +0$; und da

$$\lim_{\varphi = 0} r \sin \varphi = a \lim_{\varphi = 0} \frac{\sin \varphi}{\varphi} = a$$

ist, so besitzt die Kurve eine zur Polarachse parallele Asymptote im Abstände a (Fig. 60).




Fig. 59.




Fig. 60.

2) Die Kurve, deren Gleichung lautet:

$$r = \frac{a\varphi}{\varphi - 1}, \quad (a > 0)$$

hat einen unendlich fernen Punkt in der durch $\varphi = 1$ ($57^\circ \cdot 29577 \dots$) bestimmten Richtung; und da

$$\lim_{\varphi \rightarrow 1} r \sin(1 - \varphi) = -a \lim_{\varphi \rightarrow 1} \varphi \frac{\sin(\varphi - 1)}{\varphi - 1} = -a$$

ist, so hat sie eine links von dem Strahle OU im Abstände a gelegene Asymptote. Um die Anordnung der unendlichen Zweige gegen die Asymptote zu erkennen, setzen wir, unter

δ eine sehr kleine positive Größe uns vorstellend, einmal $\varphi = 1 - \delta$, ein zweites Mal $\varphi = 1 + \delta$ und finden im ersten Falle


$$\begin{aligned} r \sin(1 - \varphi) &= \frac{a(1 - \delta)}{-\delta} \sin \delta \\ &= -a(1 - \delta) \frac{\sin \delta}{\delta}, \end{aligned}$$

also $|r \sin(1 - \varphi)| < a$, weil $1 - \delta < 1$ und $\frac{\sin \delta}{\delta} < 1$ ist; der betreffende Zweig OC (Fig. 61) liegt rechts von der Asymptote AB ; im zweiten Falle ist

$$\begin{aligned} r \sin(1 - \varphi) &= \frac{a(1 + \delta)}{\delta} \sin(-\delta) = -a(1 + \delta) \frac{\sin \delta}{\delta} \\ &= -a(1 + \delta) \left(1 - \frac{\delta^2}{6} + \dots\right) = -a \left(1 + \delta - \frac{\delta^2}{6} \dots\right), \end{aligned}$$

also $|r \sin(1 - \varphi)| > a$; der betreffende Zweig DE liegt demnach links von AB .

Für positive, 1 übersteigende φ ist $r > a$ und konvergiert mit wachsendem φ gegen a als Grenzwert; für negative φ ist $r < a$ und konvergiert mit wachsendem Betrage von φ ebenfalls gegen die Grenze a ; infolgedessen beschreibt der Zweig DE unzählig viele dem Kreise vom Halbmesser a von außen beständig sich nähernde Windungen, und der Zweig OF ebensolche Windungen von innen; der genannte Kreis bildet also eine krummlinige Asymptote.




§ 3. Gestaltung einer Kurve in der Umgebung eines Punktes.

146. Konkavität, Konvexität und Wendepunkte (in rechtwinkligen Koordinaten). Eine Kurve MC (Fig. 62) sei, auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem bezogen, durch die Gleichung $y = f(x)$ gegeben. Auf ihr werde ein Punkt M_0 mit den Koordinaten x_0/y_0 ins Auge gefaßt und in demselben die Tangente M_0T_0 konstruiert, deren Richtungskoeffizient mit y'_0 bezeichnet werden möge. Die zu einer Abszisse $x = OP$ gehörige Ordinate der Kurve heiße y , die zu derselben Abszisse gehörige Ordinate der Tangente Y ; die Differenz

$$(1) \quad \delta = y - Y$$

ist eine Funktion von x , bezüglich deren vorläufig bemerkt werden kann, daß sie für $x = x_0$ verschwindet. Der Variablen x weisen wir zunächst ein Intervall $(x_0 - h, x_0 + h)$ zu, innerhalb dessen δ an keiner anderen Stelle außer x_0 Null wird, so daß die Tangente außer M_0 keinen anderen Punkt mit der Kurve gemein hat.



Für Y ergibt sich aus der Tangentengleichung

$$Y - y_0 = y'_0(x - x_0)$$

die Bestimmung

$$Y = y_0 + y'_0(x - x_0)$$

und hiermit nimmt δ den Ausdruck

$$\delta = y - y_0 - y'_0(x - x_0)$$

an.

Der Differentialquotient von δ in bezug auf x , d. i.

$$(2) \quad \delta' = y' - y'_0,$$

verschwindet gleichfalls an der Stelle $x = x_0$; die höheren Differentialquotienten von δ stimmen mit den entsprechenden Differentialquotienten von y überein, indem


$$\delta'' = y'', \quad \delta''' = y''', \dots$$

Angenommen, $\delta'' = y''$ besitze an der Stelle $x = x_0$ einen von Null verschiedenen Wert y''_0 ; ist dieser positiv, so sind die Kriterien für ein Minimum von δ an der Stelle $x = x_0$

erfüllt; da aber δ an dieser Stelle den Wert Null hat, so läßt sich eine Umgebung von x_0 feststellen, innerhalb welcher δ , die Stelle x_0 selbst ausgenommen, beständig positiv ist. Mit Rücksicht auf die Definition von δ heißt dies, es sei in dieser Umgebung $y > Y$, so daß die Punkte der Kurve *über* der Tangente liegen, d. h. auf derselben Seite der Tangente, auf welcher ein aus M_0 zur positiven Ordinatenachse parallel gezogener Halbstrahl $M_0(Y)$ verläuft. Man sagt dann, die Kurve sei in der Umgebung des Punktes M_0 , oder kurz im Punkte M_0 , *konkav nach oben* (konvex nach unten).

Ist y_0'' negativ, so sind bezüglich δ an der Stelle $x = x_0$ die Kriterien des Maximums erfüllt; und weil δ an dieser Stelle selbst Null ist, so ist es in einer angebbaren Umgebung negativ, infolgedessen $y < Y$; die Punkte der Kurve liegen dann in dieser Umgebung *unter* der Tangente oder auf entgegengesetzter Seite in bezug auf $M(Y)$; man sagt, die Kurve sei in der Umgebung von M_0 oder in M_0 selbst *konkav nach unten* (konvex nach oben).

Nun aber sei $y_0'' = 0$, hingegen y_0''' von Null verschieden. Dann hat δ an der Stelle x_0 keinen extremen Wert (116), und da es an dieser und sonst an keiner andern Stelle der betreffenden Umgebung verschwindet, so hat es zu beiden Seiten von M_0 entgegengesetzt bezeichnete Werte. Demnach ist auf der



einen Seite $y > Y$, auf der anderen $y < Y$, die Kurve also einerseits *über*, andererseits *unter* der Tangente. Einen solchen Punkt, bei dessen Überschreitung die Konkavität von einer Seite zur andern wechselt, nennt man einen *Wende- oder Inflexionspunkt*, die zugehörige Tangente eine *Wende- oder Inflectionstangente* der Kurve. Eine solche Tangente *berührt* und *schneidet* die Kurve zugleich. Geometrisch ist sie dadurch gekennzeichnet, daß sie mit der Kurve in M_0 drei vereint liegende Punkte gemein hat; der Sinn dieser Ausdrucksweise gründet sich auf die Auffassung der Tangente als Grenze einer um M_0 gedrehten Sekante $M''M_0M'$ (Fig. 63), wenn bei der Drehung die Punkte M' , M'' unaufhörlich dem Punkte M_0 sich nähern (22, 2)).

Die Beziehungen $y_0'' = 0$, $y_0''' \neq 0$ bedingen aber einen extremen Wert von $\delta' = y' - y_0'$, also auch von y' , weil y_0' konstant ist; ist daher $y_0''' < 0$, so ist y_0' ein Maximum, und ist $y_0''' > 0$, so bedeutet y_0' ein Minimum. Im Wendepunkte hat also der Richtungskoeffizient, somit auch der Neigungswinkel der Tangente gegen die positive X-Achse, einen extremen Wert.

Um alle Fälle, die möglich sind, zu erschöpfen, nehmen wir nun an, daß an der Stelle x_0 alle Differentialquotienten von δ bis zum $(p-1)$ -ten einschließlich verschwinden; von dem Vorzeichen des nächsten Differentialquotienten, von $y_0^{(p)}$, hängt dann das Verhalten der Kurve in der Umgebung von M_0 ab wie folgt (117):

Ist p gerad und $y_0^{(p)} > 0$, so ist δ an der Stelle $x = x_0$ ein Minimum, in einer angebbaren Umgebung von M_0 also $y > Y$, die Kurve konkav nach oben.

Ist p gerad und $y_0^{(p)} < 0$, so ist δ an der Stelle $x = x_0$ ein Maximum, in einer angebbaren Umgebung von M_0 also $y < Y$, die Kurve konkav nach unten.

Ist p ungerad, so hat δ an der Stelle x_0 keinen extremen Wert und der Punkt M_0 ist ein Wendepunkt.

In diesen Sätzen sind die oben entwickelten Spezialfälle $p=2$ und $p=3$ mit inbegriffen.

Soll also eine Kurve $y = f(x)$ auf etwa vorhandene Wendepunkte geprüft werden, so bilde man den zweiten Differentialquotienten $f''(x)$, und löse die Gleichung

$$f''(x) = 0$$

auf; sind Wendepunkte vorhanden, so befinden sich ihre Abszissen unter den Wurzeln dieser Gleichung; die weitere Entscheidung hat auf Grund der obigen Sätze zu erfolgen.

Weil ein Wendepunkt dadurch charakterisiert ist, daß für ihn y' einen extremen Wert annimmt, so sind auch solche Stellen x in die Betrachtung einzubeziehen, an welchen y'' unendlich wird; ändert y'' bei Überschreitung einer solchen Stelle sein Vorzeichen, so ist hier y' ein Extrem und die Kurve hat einen Wendepunkt (119, 2)).

Wenn die Kurve durch eine Gleichung der Form

$$f(x, y) = 0$$

gegeben ist, so hat man mittels der Gleichungen (57):

$$f'_x + f'_y y' = 0,$$

$$f''_{xx} + 2f''_{xy} y' + f''_{yy} y'^2 + f'_y y'' = 0$$

y'' zu bestimmen und erhält dafür den Ausdruck

$$y'' = - \frac{f''_{xx}(f'_y)^2 - 2f''_{xy}f'_x f'_y + f''_{yy}(f'_x)^2}{(f'_y)^3};$$

die Koordinaten etwa vorhandener Wendepunkte sind dann unter den Wurzeln des Gleichungenpaares

$$f(x, y) = 0, \quad f''_{xx}(f'_y)^2 - 2f''_{xy}f'_x f'_y + f''_{yy}(f'_x)^2 = 0$$

zu suchen.

Bei parametrischer Darstellung beachte man, daß nach 43, (6)

$$y'' = \frac{dx d^2 y - dy d^2 x}{dx^3}$$

ist; die zu den Wendepunkten gehörigen Parameterwerte ergeben sich also aus der Gleichung:

$$dx d^2 y - dy d^2 x = 0.$$

Beispiele. 1) Die durch die Gleichung

$$y = \sin x$$

dargestellte transzendente Kurve heißt *Sinuslinie*. Vermöge der Periodizität des Sinus genügt es, ihren Verlauf in dem Intervalle $(0, 2\pi)$ festzustellen. Aus dem Vorzeichen von

$$y'' = -\sin x,$$

das negativ ist in $(0, \pi)$, positiv in $(\pi, 2\pi)$, folgt, daß im ersten Abschnitt die Kurve konkav nach unten, im zweiten Abschnitt konkav nach oben ist; an den Stellen $0, \pi, 2\pi$ findet ein Wechsel im Vorzeichen von y'' statt, die betreffenden Punkte $0/0, \pi/0, 2\pi/0$ sind Wendepunkte und die Richtungskoeffizienten der Tangente dortselbst sind $1, -1, 1$ (Fig. 64).




Fig. 64.

2) Um die Wendepunkte der kubischen Kurve

$$y(x^3 + a^3) = a^3(a - x) \quad (\alpha)$$

zu finden, kann man den folgenden Weg einschlagen. Zweimalige Differentiation ergibt:

$$y'(x^2 + a^2) + 2xy = -a^2, \quad (\beta)$$

$$y''(x^2 + a^2) + 4xy' + 2y = 0. \quad (\gamma)$$

Da für einen Wendepunkt $y'' = 0$ ist, so hat man zur Bestimmung seiner Koordinaten und des Richtungskoeffizienten seiner Tangente die Gleichungen (α) , (β) und die folgende:

$$4xy' + 2y = 0. \quad (\gamma')$$

Elimination von y' zwischen (β) und (γ') liefert:

$$y(3x^2 - a^2) + 2a^2x = 0;$$

addiert man hierzu die mit -3 multiplizierte Gleichung (α) , so entsteht:

$$x + 4y = 3a. \quad (\delta)$$

Die Wendepunkte der Kurve (α) liegen also auf einer Geraden (allgemeine Eigenschaft kubischer Kurven).

Eliminiert man y mittels (δ) aus (α) , so ergibt sich zur Bestimmung von x die Gleichung:

$$x^3 - 3ax^2 - 3a^2x + a^3 = 0,$$

an der man alsbald erkennt, daß sie durch $x = -a$ befriedigt wird; die beiden andern Wurzeln berechnen sich aus einer quadratischen Gleichung und sind $x = a(2 + \sqrt{3})$ $x = a(2 - \sqrt{3})$; die zugehörigen y ergeben sich aus (δ) : $y = a$, $\frac{a}{4}(1 - \sqrt{3})$; $\frac{a}{4}(1 + \sqrt{3})$; (γ') endlich führt zu den Richtungs-

koeffizienten der Wendetangenten: $y' = \frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{3}-5}{8}, -\frac{3\sqrt{3}+5}{8}$.

3) Für die transzendente Kurve


$$y = be^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$$

deren Ordinaten, bei positivem b durchwegs positiv, mit wachsendem Betrage von x gegen Null konvergieren, ist

$$y' = -\frac{2bx}{a^2} e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$$

$$y'' = \frac{2b}{a^4} e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2} \{2x^2 - a^2\};$$

y'' ändert sein Vorzeichen bei Überschreitung der Stellen $x = \mp \frac{a}{\sqrt{2}}$, indem es durch Null geht; daselbst ist $y = \frac{b}{\sqrt{e}}$, $y' = \pm \frac{b}{a} \sqrt{\frac{2}{e}}$; die so bestimmten Punkte sind Wendepunkte



der Kurve (Fig. 65). Die Richtung der Wendetangenten ist also durch die aus O nach den Wendepunkten gezogenen Strahlen bestimmt.

4) Die Lemniskate

$$(x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2) = 0$$

hat nach 132, 2) die parametrische Darstellung:

$$x = \pm a \frac{\sqrt{1-u^2}}{1+u^2}$$

$$y = \pm a \frac{u\sqrt{1-u^2}}{1+u^2},$$

daraus ist weiter

$$y' = \frac{1-3u^2}{u(u^2-3)}$$

gefunden worden; differenziert man nochmals in bezug auf u , so ergibt sich

$$y'' \frac{dx}{du} = \frac{3(u^2+1)^2}{u^2(u^2-3)^2}$$

und daraus

$$y'' = \pm \frac{3(u^2+1)^2 \sqrt{1-u^2}}{au^2(u^2-3)^2};$$

zu je zwei Punkten, welche der Gleichung $y = ux$ entsprechen, also in einer durch O gehenden Geraden liegen, gehören demnach entgegengesetzt bezeichnete Werte von y'' , und da für $u = \pm 1$ y'' verschwindet, so sind die beiden Punkte der Kurve, welche in O (Fig. 39, S. 357) vereinigt liegen, Wendepunkte; einen Kurvenpunkt von dieser Beschaffenheit nennt man einen *Inflexionsknoten*.

5) Bei den Zykloiden

$$x = au - b \sin u$$

$$y = a - b \cos u$$

ergibt sich durch Ausführung des Ansatzes $dx \dot{a}^2 y - dy \dot{a}^2 x = 0$ die Gleichung

$$a \cos u - b = 0,$$

aus der $\cos u = \frac{b}{a}$ folgt und nur dann eine reelle Bestimmung für u gibt, wenn $b < a$ ist, also nur bei der verlängerten Zykloide. Ihre Wendepunkte liegen in der leicht zu konstruierenden Geraden $y = \frac{a^2 - b^2}{a}$.

6) Für die durch die Gleichung

$$y = b \left(1 - \frac{x}{a}\right)^4$$

dargestellte Kurve verschwindet

$$y'' = \frac{12b}{a^2} \left(1 - \frac{x}{a}\right)^2$$

für $x = a$; indessen ist der Punkt $a/0$ kein Wendepunkt, weil dort auch y''' verschwindet, während y'' einen von Null verschiedenen Wert hat.

7) Bei der Kurve $(y - cx)^3 = b^3 \left(1 - \frac{x}{a}\right)^5$ oder

$$y - cx + b \left(1 - \frac{x}{a}\right)^{\frac{5}{3}}$$

ist

$$y'' = \frac{10b}{9a^2} \left(1 - \frac{x}{a}\right)^{-\frac{1}{3}} = \frac{10b}{9a^2 \sqrt[3]{1 - \frac{x}{a}}}.$$

Dieser Ausdruck wird an der Stelle $x = a$ mit der endlichen Ordinate ca unendlich und ändert bei Überschreitung der Stelle sein Vorzeichen; daher ist a/ca ein Wendepunkt der Kurve.

8) Man weise nach, daß die kubischen Kurven a), c) des Beispiels 143, 3) und ebenso die Kurve in 144 nur je einen Wendepunkt, und zwar im Ursprung besitzen.

9) Man bestimme die Wendepunkte folgender Kurven:

$$a) \quad y = \frac{x^3}{a^2 + x^2}$$

$$b) \quad xy = a^2 l \frac{x}{a}$$

$$c) \quad x = (ly)^3.$$

147. Konkavität, Konvexität und Wendepunkte (in Polarkoordinaten). Auf einer Kurve MC (Fig. 66), die auf ein Polarkoordinatensystem bezogen ist, werde ein Punkt M_0 mit den Koordinaten r_0/φ_0 angenommen und in demselben an die Kurve die Tangente M_0T_0 konstruiert; sie möge mit der Verlängerung M_0L_0 des Leitstrahls den Winkel θ_0 einschließen; α_0 sei der Winkel, welchen das Lot $OP_0 = p$ vom Pol zur Tangente mit der Polarachse bestimmt. Zu einer beliebigen Amplitude φ gehöre in bezug auf die Kurve der Radiusvektor r ,




Fig. 66.

in bezug auf die Tangente M_0T_0 der Radiusvektor R ; dadurch sind zwei Punkte, M und Q , mit den Koordinaten r/φ , R/φ festgelegt. Wir befassen uns nun mit der Differenz $r - R$ oder was hier zweckmäßiger erscheint, mit der Differenz

$$(3) \quad \delta = \frac{1}{r} - \frac{1}{R},$$

welche als Funktion von φ die Eigenschaft hat, an der Stelle $\varphi = \varphi_0$ zu verschwinden.

Die Variable φ beschränken wir vorläufig auf ein so enges Intervall $(\varphi - h, \varphi + h)$, daß δ innerhalb desselben an keiner anderen Stelle verschwindet.

Aus dem rechtwinkligen Dreieck OP_0M_0 folgt:

$$(4) \quad p = r_0 \cos(\varphi_0 - \alpha_0)$$

und mit Hilfe dieses Wertes weiter aus dem Dreieck OP_0Q :

$$(5) \quad R = \frac{p}{\cos(\varphi - \alpha_0)},$$

so daß weiter

$$\delta = \frac{1}{r} - \frac{\cos(\varphi - \alpha_0)}{p};$$

daraus ergibt sich durch Differentiation in bezug auf φ

$$\delta' = -\frac{r'}{r^2} + \frac{\sin(\varphi - \alpha_0)}{p},$$

und auch der Differentialquotient δ' verschwindet für $\varphi = \varphi_0$; denn sein erster Teil nimmt den Wert $-\frac{r'_0}{r_0^2} = -\frac{1}{r_0 \operatorname{tg} \theta_0}$ (135,35)) an, und der zweite Teil erlangt wegen (4) den Wert

$$\frac{\sin(\varphi_0 - \alpha_0)}{p} = \frac{\operatorname{tg}(\varphi_0 - \alpha_0)}{r_0} = \frac{\operatorname{cotg} \theta_0}{r_0} = \frac{1}{r_0 \operatorname{tg} \theta_0}.$$

Wenn daher der zweite Differentialquotient

$$\delta'' = -\frac{r^2 r'' - 2rr'^2}{r^4} + \frac{\cos(\varphi - \alpha_0)}{p}$$

einen von Null verschiedenen Wert besitzt, so hat δ an der Stelle $\varphi = \varphi_0$ einen extremen Wert; es ist aber

$$\frac{\cos(\varphi - \alpha_0)}{p} = \frac{1}{r},$$

daher

$$\delta'' = \frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{r^5}.$$

Ist also $r_0 > 0$ und

$$r_0^2 + 2r_0'^2 - r_0 r_0'' > 0,$$

so ist δ an der Stelle $\varphi = \varphi_0$ ein Minimum, und weil es dort den Wert Null hat, so läßt sich eine Umgebung von φ_0 feststellen, innerhalb deren $\delta > 0$, also $\frac{1}{r} > \frac{1}{R}$ oder

$$r < R,$$

so daß die Punkte M der Kurve dem Pole näherliegen als die korrespondierenden Punkte Q der Tangente; man bezeichnet dann die Kurve im Punkte M_0 als *konkav gegen den Pol*.

Ist hingegen $r_0 > 0$ und

$$r_0^2 + 2r_0'^2 - r_0 r_0'' < 0,$$

so ist δ ein Maximum für $\varphi = \varphi_0$, und weil es hier den Wert Null hat, so ist es in einer entsprechend festgestellten Umgebung negativ, daher $\frac{1}{r} < \frac{1}{R}$ oder

$$r > R,$$

so daß die Kurve in dieser Umgebung vom Pole weiter entfernt ist als ihre Tangente; man bezeichnet sie dann in M_0 als *konvex gegen den Pol*.

Es bleibt noch der Fall

$$r_0^2 + 2r_0'^2 - r_0 r_0'' = 0$$

übrig; tritt dieser ein und wechselt $r^2 + 2r'^2 - rr''$ bei dem Durchgange durch φ_0 sein Vorzeichen, so ist der Punkt M_0

ein *Wendepunkt*. Zur Bestimmung der Wendepunkte einer Kurve hat man also vor allem die Gleichung

$$(6) \quad r^3 + 2r'^2 - rr'' = 0$$

in bezug auf φ aufzulösen und dann das Vorzeichen der linken Seite in der Umgebung der Wurzeln zu prüfen.

Beispiele. 1) Die hyperbolische Spirale

$$r = \frac{a}{\varphi}$$

gibt für $r^3 + 2r'^2 - rr''$ den Wert $\frac{a^3}{\varphi^3}$, der beständig positiv ist; die Kurve ist in ihrem ganzen Verlaufe konkav gegen den Pol.

2) Bei der in 145, 2) betrachteten Kurve

$$r = \frac{a\varphi}{\varphi - 1}$$

ist

$$r^3 + 2r'^2 - rr'' = a^3 \frac{(\varphi - 1)(\varphi^3 - \varphi^2 - 2)}{(\varphi - 1)^4}.$$

Das Vorzeichen dieses Ausdruckes hängt lediglich vom Zähler ab, und dieser ist positiv für alle negativen Werte von φ , daher der Kurventeil *OF* (Fig. 61) gegen den Pol beständig konkav. Im Gebiet der positiven Werte wechselt der Zähler sein Vorzeichen an der Stelle $\varphi = 1$ (Durchgang durch den unendlich fernen Punkt) und ferner an der einzigen reellen Stelle

$$\varphi_0 = 1,695 \dots (97^\circ, 11),$$

an welcher $\varphi^3 - \varphi^2 - 2$ verschwindet; und zwar ist er in dem Intervalle $(0, 1 - 0)$ positiv, der zugehörige Kurventeil *OC* gegen den Pol konkav; in dem Intervalle $(1 + 0, \varphi_0)$ negativ, der zugehörige Kurventeil *DJ* gegen den Pol konvex; von φ_0 an bleibt der Zähler positiv, der Kurventeil *JE* gegen den Pol konkav. *J* selbst ist also ein Wendepunkt der Kurve.

3) Es ist festzustellen, unter welcher Voraussetzung die parabolische Spirale (vgl. 134, 1))

$$r = a\varphi^n$$

Wendepunkte besitzt.

In diesem Falle ist

$$r^3 + 2r'^2 - rr'' = a^3 \varphi^{3n-2} (\varphi^3 + n^2 + n);$$

dies erfährt zunächst einen Zeichenwechsel bei dem Durch-

gange durch Null, wenn $2n - 2$ eine ungerade ganze Zahl oder einen Bruch mit ungeradem Zähler und Nenner bedeutet; in beiden Fällen ist aber n ein Bruch mit geradem Nenner und ungeradem Zähler, r daher nur für positive Werte von φ reell. Der Pol ist also in keinem Falle ein Wendepunkt.

Bleibt nur die Möglichkeit eines Zeichenwechsels in $\varphi^2 + n^2 + n$ übrig, und ein solcher tritt nur ein, wenn n negativ und dem Betrage nach kleiner als 1 ist, und zwar beim Überschreiten der Stellen $\varphi = \pm \sqrt{-n - n^2}$; hiernach hat z. B. die Kurve $r = \frac{a}{\sqrt{\varphi}}$ einen Wendepunkt an der Stelle $\varphi = \frac{1}{2}$ (zu der Stelle $\varphi = -\frac{1}{2}$ gehört ein imaginärer Radiusvektor), die Kurve $r = \frac{a}{\sqrt[3]{\varphi}}$ deren zwei an den Stellen $\varphi = \pm \frac{\sqrt{2}}{3}$.

§ 4. Verhalten zweier Kurven in der Umgebung eines gemeinsamen Punktes.

148. Begriff und Bedingungen einer Berührung n -ter Ordnung. Zwei Kurven C und C' (Fig. 67), auf ein und dasselbe Koordinatensystem bezogen, seien durch die Gleichungen

$$(C) \quad y = f(x)$$


$$(C') \quad y = \varphi(x)$$

gegeben; beiden Kurven sei der Punkt M_0 mit den Koordinaten x_0/y_0 gemeinschaftlich, so daß

$$(1) \quad \begin{cases} y_0 = f(x_0) \\ y_0 = \varphi(x_0). \end{cases}$$

Die nachfolgende Betrachtung erstreckt sich auf ein solches Gebiet der Variablen x , innerhalb dessen es außer x_0 keine Stelle mehr gibt, an welcher die Ordinaten beider Kurven einander gleich sind. Von den Funktionen $f(x)$, $\varphi(x)$ wird vorausgesetzt, daß sie auf dem betrachteten Gebiete endliche Differentialquotienten aller Ordnungen besitzen, die in Betracht kommen werden, und daher nach der Taylorschen Formel entwickelbar sind.

Fig. 67.



Um das Verhalten der Kurven in der Umgebung des Punktes M_0 zu untersuchen, betrachten wir den Abschnitt MN' , welchen die Kurven auf einer Sekante von bestimmter Richtung bilden, und vergleichen ihn mit dem Abstände M_0S dieser Sekante von dem Punkte M_0 ; beide Größen, MN' und M_0S , konvergieren gleichzeitig gegen die Grenze Null oder werden gleichzeitig unendlich klein, wenn der Punkt M auf der Kurve C unaufhörlich dem Punkte M_0 sich nähert; die Ordnung, in welcher MN' unendlich klein wird im Vergleiche zu M_0S , das als unendlich kleine Größe erster Ordnung gelten soll, ist maßgebend für die gegenseitige Anordnung der Kurven in der Nähe von M_0 .

Diese Kleinheitsordnung ist unter einer gewissen Voraussetzung unabhängig von der Richtung der Sekante; führt man nämlich durch M eine andere Sekante, auf welcher die Strecke MM' abgeschnitten werden möge, so ist das Verhältnis $\frac{MM'}{MN'}$ gleich dem Sinusverhältnis der Winkel $MN'M'$, $MM'N'$; wenn aber der Punkt M gegen M_0 konvergiert, so nähert sich die Verbindungsgerade der Punkte M' , N' der Tangente an die Kurve C' in M_0 , und wenn daher keine der beiden Sekantenrichtungen dieser Tangente parallel ist, so nähern sich jene Winkel und somit auch das Verhältnis ihrer Sinus endlichen Grenzen und sind daher MM' , MN' Größen gleicher Ordnung (16).

Man kann also unter der Voraussetzung, daß die Tangenten an die beiden Kurven in M_0 eine von der Ordinatenachse verschiedene Richtung haben*), die Sekante der Ordinatenachse parallel annehmen; alsdann ist

$$\overline{M'M} = \delta$$

der Unterschied der zur Abszisse

$$OP = x = x_0 + h$$

gehörigen Ordinaten der Kurven C und C' , und

$$M_0Q = P_0P = h$$

die Vergleichsgröße, deren Ordnung mit 1 festgesetzt wird.

*) Diese Voraussetzung ist schon in der oben gemachten Annahme enthalten, daß $f(x)$, $\varphi(x)$ in der betrachteten Umgebung von M_0 endliche Differentialquotienten besitzen.

Nun ergeben sich für die Ordinaten PM und PM' die Entwicklungen:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1} h + \frac{f''(x_0)}{1 \cdot 2} h^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{1 \cdot 2 \dots n} h^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta h)}{1 \cdot 2 \dots (n+1)} h^{n+1}$$

$$\varphi(x_0 + h) = \varphi(x_0) + \frac{\varphi'(x_0)}{1} h + \frac{\varphi''(x_0)}{1 \cdot 2} h^2 + \dots$$

$$+ \frac{\varphi^{(n)}(x_0)}{1 \cdot 2 \dots n} h^n + \frac{\varphi^{(n+1)}(x_0 + \theta' h)}{1 \cdot 2 \dots (n+1)} h^{n+1},$$

und daraus mit Rücksicht auf (1):

$$(2) \quad \left\{ \begin{aligned} \delta &= [f(x_0) - \varphi(x_0)] h + [f''(x_0) - \varphi''(x_0)] \frac{h^2}{1 \cdot 2} + \dots \\ &+ [f^{(n)}(x_0) - \varphi^{(n)}(x_0)] \frac{h^n}{1 \cdot 2 \dots n} \\ &+ [f^{(n+1)}(x_0 + \theta h) - \varphi^{(n+1)}(x_0 + \theta' h)] \frac{h^{n+1}}{1 \cdot 2 \dots (n+1)}. \end{aligned} \right.$$

Wenn also die Funktionen $f(x)$, $\varphi(x)$ außer (1) keine weitere Beziehung aufweisen, so ist δ eine Größe erster Ordnung, weil $\frac{\delta}{h}$ für $\lim h = 0$ gegen die endliche von Null verschiedene Grenze $f'(x_0) - \varphi'(x_0)$ konvergiert, und für dem Betrage nach genügend kleine h wechselt δ mit h zugleich das Vorzeichen; infolgedessen haben die Kurven zu beiden Seiten von M_0 entgegengesetzte Lage gegeneinander. Man bezeichnet ein solches Verhalten der Kurven als einfaches *Schneiden*.

Tritt zu (1) die weitere Beziehung

$$(3) \quad f'(x_0) = \varphi'(x_0),$$

welche besagt, daß die Kurven im Punkte M_0 dieselbe Tangente haben, so beginnt der Ausdruck für δ mit dem Gliede zweiter Ordnung, δ wird eine Größe der zweiten Ordnung und ändert innerhalb entsprechend enger Grenzen sein Vorzeichen nicht, wenn h es ändert; die Kurven haben also zu beiden Seiten von M_0 gleiche Lage gegeneinander.

Kommt zu (1) und (2) die weitere Relation

$$(4) \quad f''(x_0) = \varphi''(x_0),$$

so beginnt die Entwicklung von δ mit dem Gliede dritter Ordnung, von dieser Ordnung ist also auch δ und ändert diesmal innerhalb entsprechend enger Grenzen mit h zugleich sein Vor-

zeichnen; die Kurven haben daher zu beiden Seiten von M_0 entgegengesetzte Lage gegeneinander wie bei dem einfachen Schneiden.

Um zu einem allgemeinen Ergebnis zu gelangen, nehmen wir an, daß die Differentialquotienten der Funktionen $f(x)$, $\varphi(x)$ an der Stelle x_0 bis zur Ordnung n übereinstimmen, so daß weiter noch

$$(5) \quad f'''(x_0) = \varphi'''(x_0), \dots f^{(n)}(x_0) = \varphi^{(n)}(x_0);$$

dann reduziert sich δ auf den Ausdruck:

$$\delta = [f^{(n+1)}(x_0 + \theta h) - \varphi^{(n+1)}(x_0 + \theta' h)] \frac{h^{n+1}}{1 \cdot 2 \dots (n+1)},$$

und ist eine Größe der $(n+1)$ -ten Ordnung; denn, wofern $f^{(n+1)}(x)$, $\varphi^{(n+1)}(x)$ in dem Intervalle $(x_0 - h, x_0 + h)$ stetig verlaufen, konvergiert das Verhältnis $\frac{\delta}{h^{n+1}}$ für $\lim h = 0$ gegen die endliche von Null verschiedene Grenze

$$[f^{(n+1)}(x_0) - \varphi^{(n+1)}(x_0)] \frac{1}{1 \cdot 2 \dots (n+1)}.$$

Ist nun n ungerad, so ändert δ sein Vorzeichen nicht, wenn h es ändert, die Kurven haben also zu beiden Seiten von M_0 gleiche Lage gegeneinander; ist dagegen n gerad, so wechselt δ mit h zugleich sein Vorzeichen, die Kurven haben zu beiden Seiten von M_0 entgegengesetzte Lage gegeneinander wie beim einfachen Schneiden.

Sobald zu der Bedingung $f(x_0) = \varphi(x_0)$ noch jene (3) hinzutritt, haben die Kurven in M_0 eine gemeinsame Tangente und man sagt, daß sie einander dort *berühren*. Der Grad oder die Innigkeit der Berührung hängt ab von den weiter hinzutretenden Beziehungen. *Man bezeichnet die Berührung als eine solche von der n -ten Ordnung, wenn δ in bezug auf h von der $(n+1)$ -ten Ordnung oder der Quotient $\frac{\delta}{h^n}$ von der ersten Ordnung ist.*)*

*) Im Sinne A. Cauchy's wird die Berührung n -ter Ordnung wie folgt definiert. Man beschreibe um den gemeinsamen Punkt M_0 , in welchem die Kurven auch eine gemeinsame Tangente haben sollen, einen genügend kleinen Kreis, der sie zu einer Seite der gemeinschaftlichen Normale in den Punkten M, M' schneiden möge; die Ordnung, in welcher der Winkel MM_0M' unendlich klein wird, wenn man den Radius als unendlich Kleines erster Ordnung festsetzt, bestimmt die Ordnung der Berührung. Man vergleiche diese Definition mit der obigen.

Auf Grund dieser Definition läßt sich der folgende Satz aussprechen: *Die hinreichende und notwendige Bedingung dafür, daß die Kurven $y = f(x)$ und $y = \varphi(x)$ in einem Punkte von der Abszisse x_0 eine Berührung n -ter Ordnung aufweisen, besteht darin, daß die Ordinaten und deren Differentialquotienten bis zur n -ten Ordnung einschließlich an der Stelle x_0 einander gleich sind.*

Die Bedingungen für eine Berührung n -ter Ordnung drücken sich also analytisch in den $n + 1$ Gleichungen:

$$(6) \quad \begin{cases} f(x_0) = \varphi(x_0), & f'(x_0) = \varphi'(x_0), & f''(x_0) = \varphi''(x_0), \dots \\ & f^{(n)}(x_0) = \varphi^{(n)}(x_0) \end{cases}$$

aus.

Zu bemerken ist noch, daß mit einer Berührung von gerader Ordnung ein Schneiden der Kurven verbunden ist, und daß das einfache Schneiden als eine Berührung der 0-ten Ordnung der Definition gemäß sich darstellt.

149. Geometrische Interpretation einer Berührung n -ter Ordnung. Man kann der analytischen Definition einer Berührung n -ter Ordnung eine geometrische zur Seite stellen, zu welcher folgende Betrachtung führt.

Die beiden Kurven C, C' mögen außer dem Punkte M_0 noch n weitere Punkte M_1, M_2, \dots, M_n mit den (arithmetisch aufsteigenden) Abszissen x_1, x_2, \dots, x_n gemein haben, so daß

$$(7) \quad f(x_\lambda) = \varphi(x_\lambda) \quad (\lambda = 0, 1, 2, \dots, n).$$

Weil die Funktion $f(x) - \varphi(x)$ an den Grenzen eines jeden der Intervalle $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n)$ verschwindet, so existiert innerhalb eines jeden dieser Intervalle eine Stelle $x_0^{(1)}, x_1^{(1)}, \dots, x_{n-1}^{(1)}$ beziehungsweise, an welcher auch ihr Differentialquotient $f'(x) - \varphi'(x)$ verschwindet (36), d. h. es ist

$$(8) \quad f'(x_\lambda^{(1)}) = \varphi'(x_\lambda^{(1)}) \quad (\lambda = 0, 1, 2, \dots, n-1).$$

Weil die Funktion $f'(x) - \varphi'(x)$ an den Grenzen eines jeden der Intervalle $(x_0^{(1)}, x_1^{(1)}), (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}), \dots, (x_{n-2}^{(1)}, x_{n-1}^{(1)})$ Null ist, so gibt es innerhalb eines jeden mindestens eine Stelle $x_0^{(2)}, x_1^{(2)}, \dots, x_{n-2}^{(2)}$ beziehungsweise, an der ihr Differentialquotient $f''(x) - \varphi''(x)$ verschwindet, so daß

$$(9) \quad f''(x_\lambda^{(2)}) = \varphi''(x_\lambda^{(2)}) \quad (\lambda = 0, 1, 2, \dots, n-2).$$

Indem man diese Schlußweise wiederholt anwendet, kommt man schließlich zu einer jedenfalls in dem Bereiche der Werte x_0, x_1, \dots, x_n gelegenen Stelle $x_0^{(n)}$, an welcher auch noch

$$(10) \quad f^{(n)}(x_0^{(n)}) = \varphi^{(n)}(x_0^{(n)})$$

ist.

Wenn aber die Punkte M_1, M_2, \dots, M_n in beliebiger Weise sämtlich gegen den Punkt M_0 als Grenze sich hinbewegen, so konvergieren x_1, x_2, \dots, x_n und alle die sukzessiven Zwischenwerte $x_0^{(1)}, x_1^{(1)}, \dots; x_0^{(2)}, x_1^{(2)}, \dots; \dots, x_0^{(n)}$ gegen den Grenzwert x_0 , an der Grenze wird also laut (7), (8), (9), (10):

$$f(x_0) = \varphi(x_0), \quad f'(x_0) = \varphi'(x_0), \quad f''(x_0) = \varphi''(x_0), \dots$$

$$f^{(n)}(x_0) = \varphi^{(n)}(x_0);$$

hierdurch sind aber die Bedingungen für eine Berührung n -ter Ordnung erfüllt.

Das Ergebnis kann in dem folgenden Satze ausgesprochen werden: *Wenn zwei Kurven C und C' in einem Punkte M_0 $n + 1$ vereint liegende Punkte miteinander gemein haben, so weisen sie dort eine Berührung n -ter Ordnung auf.*

Die Ausdrucksweisen: „ $n + 1$ -punktige Berührung“ und „Berührung n -ter Ordnung“ haben also denselben Inhalt.

150. Oskulation. Von den beiden Kurven sei die eine, C , vollständig gegeben, die Gleichung der anderen, C' , enthalte aber $n + 1$ unbestimmte Konstanten oder Parameter, welche auf die Lage der Kurve in der Ebene und ihre spezielle Form von Einfluß sind.

Man kann der Kurve C' höchstens $n + 1$ voneinander unabhängige Bedingungen auferlegen; bestehen diese darin, daß für eine Abszisse x_0 ihre Ordinate und deren Ableitungen bis zur n -ten Ordnung einschließlich mit den entsprechenden auf die Kurve C bezüglichen Größen übereinstimmen sollen, so hat die Kurve C' mit der Kurve C in dem zur Abszisse x_0 gehörigen Punkte eine Berührung der n -ten, zugleich der höchstmöglichen Ordnung, welcher sie nach der Zahl ihrer Parameter im allgemeinen fähig ist. Man sagt, die Kurve C'

oskuliere die Kurve C oder stehe mit ihr in *Oskulation* im Punkte M_0 .*)

Nach den Ausführungen von 146 ist die oskulierende Kurve C' im Punkte M_0 von C die Grenze, welcher sich eine Kurve von der Gleichungsform C' nähert, die außer durch M_0 noch durch n Punkte $M_1, M_2, \dots M_n$ von C hindurchgeht, wenn die letztgenannten Punkte insgesamt gegen M_0 als Grenze konvergieren.

Da die Gleichung einer Geraden zwei Parameter enthält, so weist die oskulierende Gerade eine Berührung erster Ordnung auf; der Kreis eine solche von zweiter Ordnung, weil in der allgemeinen Gleichung des Kreises drei Parameter erscheinen; ein Kegelschnitt im allgemeinen wird, wenn er eine Kurve oskuliert, mit ihr in einer Berührung vierter Ordnung stehen, weil seine Gleichung fünf Parameter enthält.

Es kann in einzelnen Punkten der Kurve C geschehen, daß nach Erfüllung der zur Oskulation mit C' erforderlichen Bedingungen auch noch die Ableitungen der Ordinate von der $(n+1)$ -ten Ordnung, eventuell noch höhere Ableitungen für beide Kurven übereinstimmen; an solchen Stellen von C findet dann eine Berührung von höherer Ordnung statt, als es im allgemeinen möglich ist; man sagt, es bestehe hier *Superoskulation*.

151. Die oskulierende Gerade. Um für die Kurve
(C) $y = f(x)$

im Punkte M mit den Koordinaten x, y die oskulierende Gerade
(C') $\eta = a\xi + b$

zu bestimmen, bilde man die Gleichungen

$$y = ax + b$$

$$y' = a,$$

welche aus (C') hervorgehen, wenn man in bezug auf ξ diffe-

*) Diese Deutung des Wortes Oskulation, die auf Lagrange zurückgehen dürfte, ist in der Literatur mehr verbreitet als die andere, vornach man von Oskulation bei jeder Berührung höherer als der ersten Ordnung spricht. Vgl. H. v. Mangoldt, Anwendung der Diff.- u. Integr.-R., Enzykl. d. math. Wiss., III 3, p. 19.

rentiiert und sodann in beiden Gleichungen ξ durch x , η , η' durch die aus (C) gefundenen Werte y , y' ersetzt. Hieraus ergibt sich

$$\begin{aligned} a &= y' \\ b &= y - xy'; \end{aligned}$$

somit ist

$$(C') \quad \eta - y = y'(\xi - x)$$

die Gleichung der oskulierenden Geraden.

Oskulierende Gerade in einem Punkte einer Kurve ist demnach die Tangente.

Superoskulation findet statt, wenn auch höhere Differentialquotienten aus (C) und (C') übereinstimmen; nun folgt aus (C') $\eta'' = 0$, daher muß, soll Superoskulation bestehen, der Punkt M auf (C) so gewählt sein, daß $y'' = 0$ ist. Diese Bedingung erfüllt beispielsweise ein Wendepunkt; darum ist eine Wendetangente superoskulierend, und zwar in einer Berührung zweiter Ordnung, sofern nicht auch noch höhere Differentialquotienten von y verschwinden.

152. Der Oskulationskreis. Unter den eine Kurve in einem Punkte oskulierenden Linien ist der Kreis von größter Wichtigkeit; da nämlich oskulierende Linien in einer Zeichnung selbst auf eine ziemlich beträchtliche Umgebung des Berührungspunktes nur sehr wenig voneinander abweichen, so kann man sich von der Gestalt einer Kurve in der Umgebung einer Stelle durch Konstruktion des oskulierenden Kreises am bequemsten eine Vorstellung verschaffen.

An die Kurve

$$(C) \quad y = f(x)$$

ist im Punkte M mit den Koordinaten x , y der Oskulationskreis zu legen. Schreibt man seine Gleichung in der Form

$$(\xi - \alpha)^2 + (\eta - \beta)^2 = r^2$$

und differentiiert dieselbe zweimal nacheinander in bezug auf ξ :

$$(11) \quad \begin{cases} \xi - \alpha + (\eta - \beta)\eta' = 0 \\ 1 + \eta'^2 + (\eta - \beta)\eta'' = 0, \end{cases}$$

so hat man nur in den letzten drei Gleichungen $\xi - x$ zu setzen und an die Stelle von η , η' , η'' die aus (C) gefolgerten

Werte y, y', y'' treten zu lassen, um die zur Bestimmung der Parameter des Oskulationskreises führenden Gleichungen:

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$$

$$x - \alpha + (y - \beta)y' = 0$$

$$1 + y'^2 + (y - \beta)y'' = 0$$

zu erhalten. Aus denselben ergibt sich sukzessive

$$(12) \quad \begin{cases} \beta = y + \frac{1 + y'^2}{y''} \\ \alpha = x - \frac{(1 + y'^2)y'}{y''} \\ r = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} \end{cases}$$

Der Oskulationskreis, der durch die Parameter (12) bestimmt ist, hat mit der Kurve im Punkte M im allgemeinen eine Berührung zweiter Ordnung und eine solche ist mit einem Schneiden verbunden; Kurve und Oskulationskreis haben also zu beiden Seiten des Berührungspunktes entgegengesetzte Lage gegeneinander.

Weil für den Oskulationskreis und die Kurve in M die zweiten Differentialquotienten der Ordinate einander gleich sind, also auch im Vorzeichen übereinstimmen, so wendet hier der Oskulationskreis seine Konkavität nach derselben Seite wie die Kurve.

Wenn zwei Kurven C und C' in einem Punkte M sich nach der zweiten oder einer höheren Ordnung berühren, so haben sie hier einen gemeinschaftlichen Oskulationskreis, weil sie in den Stücken, welche die Parameter des Oskulationskreises bedingen, übereinstimmen.

Ist für die Kurve C im Punkte M $y'' = 0$, so werden die Parameter des Oskulationskreises, nämlich die Koordinaten α, β seines Mittelpunktes und der Radius r unendlich; der Kreis degeneriert in die Tangente der Kurve in M ; dies ist beispielsweise auch dann der Fall, wenn der Punkt M Inflexionspunkt ist; in der Tat wurde auch gezeigt (151), daß die Inflexionstangente eine Berührung zweiter Ordnung aufweist.

Beispiel. Es sei

$$y = ax^2 + 2bx + c$$

die gegebene Kurve — eine Parabel, deren Achse der Ordinatenachse parallel ist —, und für den Punkt, dessen Abszisse x ist, sei der Oskulationskreis zu bestimmen.

Setzt man die Werte für y ,

$$y' = 2ax + 2b$$

$$y'' = 2a$$

in die Formeln (12) ein, so ergeben sich als Parameter des Oskulationskreises:

$$\alpha = -\frac{4(ax+b)^2 + b}{a}$$

$$\beta = \frac{6(ax+b)^2 + 2(ac-b^2) + 1}{2a}$$

$$r = \frac{[1 + 4(ax+b)^2]^{\frac{3}{2}}}{2a}.$$

Für den Punkt M als Punkt der Parabel ist, weil $y'' = 2a$,

$$y''' = 0;$$

für denselben Punkt, als dem Oskulationskreise angehörig, ergibt sich der dritte Differentialquotient der Ordinate, indem man die zweite Gleichung (11) nochmals differentiiert und η , η' , η'' durch y , y' , y'' ersetzt, also aus der Gleichung

$$3y'y'' + (y - \beta)\eta''' = 0;$$

η''' hat demnach auch den Wert Null, wenn

$$y'y'' = 4a(ax+b) = 0$$

ist, also für $x = -\frac{b}{a}$, wofür $y = c - \frac{b^2}{a}$; im Scheitel der Parabel (118, 2)) und nur hier findet demnach Superoskulation statt, und die Parameter des bezüglichen Oskulationskreises sind:

$$\alpha = -\frac{b}{a}; \quad \beta = \frac{2(ac-b^2) + 1}{2a}, \quad r = \frac{1}{2a}.$$

§ 5. Die Länge eines Kurvenbogens und das Bogendifferential.

153. Definition der Länge eines Kurvenbogens. Der Begriff der *Länge eines Kurvenbogens* gründet sich auf die Vorstellung, daß es möglich sei, einem biegsamen nicht dehn-

baren Faden die Form des Bogens zu geben und ihn dann auszuspannen; in diesem Zustande gestattet er die Vergleichung mit einer Längeneinheit, was zur Bestimmung seiner Länge führt; diese Länge wird auch als Länge des Bogens erklärt.

Diese Vorstellung läßt sich aber nicht analytisch verwerten. Um daher den Begriff der analytischen Behandlung zugänglich zu machen, bedarf er einer von jener Vorstellung unabhängigen Definition, die aber notwendig zu der allein direkt ausführbaren Messung gerader Linien zurückleiten muß. Wir formulieren diese Definition folgendermaßen:

Ein Kurvenbogen besitzt dann eine Länge, wenn die Länge eines von dem einen Endpunkte des Bogens zum anderen verlaufenden Sehnenpolygons einem bestimmten Grenzwerte sich nähert, sobald die Zahl der Seiten beständig wächst und jede einzelne Seite der Grenze Null zustrebt; dieser Grenzwert soll dann als Länge des Kurvenbogens erklärt werden.

Der Nachweis, daß der Grenzwert besteht, sobald gewisse Bedingungen erfüllt sind, fällt in das Gebiet der Integralrechnung. Wir nehmen für die Kurven, welche wir in Betracht ziehen werden, diesen Grenzwert und somit den Begriff der Länge als vorhanden an.

154. Das Bogendifferential in rechtwinkligen Koordinaten. Es sei


$$(1) \quad y = f(x)$$

die Gleichung einer gegebenen, auf rechtwinklige Koordinaten bezogenen Kurve MC (Fig. 68); die Länge s des Bogens M_0M , welcher von einem festen Punkte M_0 und einem variablen Punkte M mit der Abszisse x begrenzt wird, ist eine eindeutige Funktion von x :

$$(2) \quad s = F(x).$$

Obwohl wir diese Funktion nicht kennen, sind wir imstande, ihren Differentialquotienten in bezug auf x auf Grund der Gleichung der Kurve zu bestimmen.

Der Abszisse $x + h = OP'$ entspreche der Punkt M' der Kurve und der Bogen $MM' = \Delta s$ sei eiförmig gekrümmt in



dem Sinne, daß er beständig nach derselben Seite konkav ist. Konstruiert man in den Punkten M und M' die Tangenten MT und $M'T'$, so begrenzen diese mit der Sehne MM' ein Dreieck $MM'Q$, und nach einem schon von Archimedes benützten Axiom ist

$$MM' < \Delta s < MQ + QM';$$

da ferner $MQ + QM' < MR + RM'$, so ist in verstärktem Maße

$$MM' < \Delta s < MR + RM'.$$

Nun ist (38, (2))

$$\begin{aligned} MM' &= \sqrt{MN^2 + NM'^2} = \sqrt{h^2 + \{f(x+h) - f(x)\}^2} \\ &= h\sqrt{1 + f'(x+\theta h)^2}; \end{aligned}$$

$$(3) \quad MR' = MN \cdot \sec NMT = h\sqrt{1 + f'(x)^2};$$

und weiter, wenn $f(x)$ an der Stelle x auch einen endlichen zweiten Differentialquotienten hat,

$$\begin{aligned} R'M' &= NM' - NR' = f(x+h) - f(x) - MN \cdot \operatorname{tg} NMT \\ &= hf'(x) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x + \theta h) - hf'(x) = \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x + \theta h), \end{aligned}$$

wobei θ, ϑ unbestimmte positive echte Brüche bedeuten; durch Einsetzung dieser Ausdrücke verwandelt sich die obige Relation in

$$(4) \quad h\sqrt{1 + f'(x + \theta h)^2} < \Delta s < h\sqrt{1 + f'(x)^2} + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x + \theta h),$$

woraus

$$\sqrt{1 + f'(x + \theta h)^2} < \frac{\Delta s}{h} < \sqrt{1 + f'(x)^2} + \frac{h}{2} f''(x + \theta h).$$

Unter der Voraussetzung, daß sich eine Umgebung von x angeben läßt, innerhalb welcher $f'(x)$ stetig sich ändert, konvergieren die beiden äußeren Ausdrücke für $\lim h = 0$ gegen die gemeinsame Grenze $\sqrt{1 + f'(x)^2}$, und dies ist auch der Grenzwert des eingeschlossenen Quotienten, also der Differentialquotient des Bogens in bezug auf die Abszisse, so daß

$$(5) \quad \frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + f'(x)^2}.$$

Die Quadratwurzel ist positiv zu nehmen, wenn die Anordnung so getroffen ist, daß der Bogen s mit der Abszisse x zugleich wächst und abnimmt.

Durch Multiplikation mit dx ergibt sich daraus das *Bogendifferential in rechtwinkligen Koordinaten*

$$(6) \quad ds = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx;$$

demselben kann eine allgemeinere Form verliehen werden, wenn man $f'(x)$ durch den Quotienten $\frac{dy}{dx}$ der Differentiale ersetzt; es wird dann

$$(7) \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2};$$

während die Formel (6) zu gebrauchen sein wird, so oft die Kurve in der Form (1) gegeben ist, kommt (7) zur Anwendung, wenn x, y als Funktionen eines Parameters u dargestellt sind.

Die geometrische Bedeutung des Bogendifferentials (6) geht aus der Gleichung (3) unmittelbar hervor; es drückt jenen Abschnitt der Tangente im Punkte M aus, welcher sich auf der Abscissenachse in dieselbe Strecke $PP' = dx$ projiziert, wie der Bogen MM' selbst.

Für diesen Bogen aber folgt aus (4), daß

$$\Delta s < \sqrt{1 + f'(x)^2} dx + \frac{f''(x + \theta dx)}{1 \cdot 2} dx^2;$$

verbindet man diese Beziehung mit (6) durch Subtraktion, so ergibt sich

$$\Delta s - ds < \frac{f''(x + \theta dx)}{1 \cdot 2} dx^2;$$

daß also, dx als unendlich kleine Größe erster Ordnung angesehen, Δs und ds selbst Größen erster Ordnung bedeuten, deren Unterschied jedoch eine Größe mindestens der zweiten Ordnung ist. Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß das Verhältnis aus dem Bogen Δs und dem Bogendifferential ds den Grenzwert 1 besitzt.

Denselben Grenzwert hat auch der Quotient aus dem Bogen Δs und der zugehörigen Sehne $MM' = c$; denn aus dem oben angeführten Werte für MM' und der Relation (4) folgt

$$1 < \frac{\Delta s}{c} < \sqrt{\frac{1 + f'(x)^2}{1 + f'(x + \theta h)^2}} + \frac{h}{2} \cdot \frac{f''(x + \theta h)}{\sqrt{1 + f'(x + \theta h)^2}};$$

der Ausdruck rechts konvergiert aber für $\lim h = 0$ gegen die Grenze 1, daher ist bei demselben Grenzübergange auch

$$(8) \quad \lim \frac{\Delta s}{c} = 1;$$

dies führt zu dem weiteren Schlusse, daß auch der Unterschied zwischen dem Bogen und der Sehne eine Größe mindestens der zweiten Ordnung in bezug auf h oder dx ist.

Wird auf einem Kreise vom Radius 1 ein Bogen begrenzt, dessen Zentriwinkel δ (im Bogenmaß) als Unendlichkleines erster Ordnung aufgefaßt wird, so hat man


$$\Delta s = \delta, \quad c = 2 \sin \frac{\delta}{2} = \delta - \frac{\delta^3}{24} + \dots$$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{c} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} = 1, \quad \Delta s - c = \frac{\delta^3}{24} - \dots$$

155. Das Bogendifferential in Polarkoordinaten.

Von der Beziehung (8) wollen wir Gebrauch machen, um für eine auf ein Polarkoordinatensystem bezogene Kurve die Auf-

Fig. 69.



gabe zu lösen, den Differentialquotienten des Bogens in bezug auf die Amplitude zu bestimmen.

Sei s die Länge des Bogens M_0M (Fig. 69), der in einem festen Punkte M_0 beginnend bei dem variablen Punkte M mit den Koordinaten r, φ endet; über den Bogen $MM' = \Delta s$, dessen Endpunkt M' die Amplitude $\varphi + \Delta \varphi$ hat, machen wir eine ähnliche Voraussetzung wie

im vorigen Artikel und sprechen sie hier dahin aus, daß derselbe gegen den Pol entweder beständig konkav oder beständig konvex sei; die Sehne MM' dieses Bogens werde wieder mit c und der Winkel $LM'M'$, welchen sie mit der Verlängerung des Radiusvektors bildet, mit ω bezeichnet.

Aus der Formel (8) folgt nun, daß auch

$$\lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta \varphi} = \lim \frac{c}{\Delta \varphi},$$

d. h. daß

$$\frac{ds}{d\varphi} = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{c}{\Delta\varphi}.$$

Aus dem Dreieck OMM' aber ergibt sich

$$c : r = \sin \Delta\varphi : \sin(\omega - \Delta\varphi);$$

daraus ist

$$c = r \frac{\sin \Delta\varphi}{\sin(\omega - \Delta\varphi)}$$

und weiter

$$\frac{c}{\Delta\varphi} = r \frac{\frac{\sin \Delta\varphi}{\Delta\varphi}}{\sin(\omega - \Delta\varphi)};$$

für $\lim \Delta\varphi = 0$ konvergiert $\frac{\sin \Delta\varphi}{\Delta\varphi}$ gegen die Grenze 1 und ω gegen den Winkel Θ , welchen die Tangente MT mit der Verlängerung des Radiusvektors einschließt (135); demnach ist

$$\lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{c}{\Delta\varphi} = \frac{r}{\sin \Theta},$$

und hiermit

$$(9) \quad \frac{ds}{d\varphi} = \frac{r}{\sin \Theta},$$

und wenn man für $\sin \Theta$ den Wert aus 135 (36) einträgt,

$$(10) \quad \frac{ds}{d\varphi} = \sqrt{r^2 + r'^2}.$$

Daraus erhält man für das *Bogendifferential in Polarkoordinaten* den Ausdruck

$$(11) \quad ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi,$$

der auch in der Gestalt

$$(12) \quad ds = \sqrt{(r d\varphi)^2 + dr^2}$$

geschrieben werden kann.

Die geometrische Bedeutung des Bogendifferentials aber ergibt sich am einfachsten aus der Formel (9), derzufolge

$$ds = \frac{r}{\sin \Theta} d\varphi$$

ist; danach ist das Bogendifferential durch einen Kreisbogen vom Halbmesser $\frac{r}{\sin \Theta}$ und vom Zentriwinkel $d\varphi$ darstellbar.

Wenn man also OP senkrecht zur Tangente MT und MR

keiten in der Änderung des Winkels τ zu jener des Bogens s als *Maß der Krümmung* oder kurzweg als *Krümmung* der Kurve im Punkte M . Bezeichnet man die Krümmung mit k , so ist hiernach

$$(2) \quad k = \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \tau}{\Delta x}}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}} = \frac{\frac{d\tau}{dx}}{\frac{ds}{dx}},$$

wofür auch kürzer geschrieben werden kann

$$(3) \quad k = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \tau}{\Delta s} = \frac{d\tau}{ds}.$$

Man nennt das Differential des Winkels τ den *Kontingenzwinkel* des zu dx gehörigen Bogenelements, weil $d\tau$ bis auf unendlich kleine Größen höherer Ordnung als dx den Winkel bestimmt, welchen die Tangenten in den Endpunkten dieses Bogenelements miteinander einschließen. Damit ist die von dem Koordinatensystem unabhängige Definition gewonnen, die *Krümmung einer Kurve in einem Punkte sei der Quotient aus dem Kontingenzwinkel durch das zugehörige Bogendifferential an der betreffenden Stelle der Kurve* oder der Grenzwert, dem der Quotient aus dem Winkel $\Delta \tau$ der Tangenten in M und M' durch den Bogen MM' selbst bei beständiger Annäherung von M' an M zustrebt.

Aus der Gleichung (3) folgt:

$$(4) \quad ds = \frac{1}{k} d\tau;$$


dies besagt, daß das Bogendifferential und daher bis auf Größen höherer Ordnung auch das Bogenelement MM' selbst als Bogen eines Kreises vom Halbmesser $\frac{1}{k}$ und vom Zentriwinkel $d\tau$ angesehen werden kann. Bezeichnet man den Halbmesser dieses Kreises mit ρ und seine Krümmung in irgend einem Punkte mit k_1 , so ist (Fig. 71)

$$\Delta s_1 = \rho \Delta \tau_1,$$

daher

$$k_1 = \lim_{\Delta s_1} \frac{\Delta \tau_1}{\Delta s_1} = \frac{1}{\rho}$$

Fig. 71.



und vermöge

$$(5) \quad \varrho = \frac{1}{k}$$

ist

$$k = k_1;$$

d. h. der betrachtete Kreis hat in allen seinen Punkten dieselbe Krümmung, wie sie der Kurve im Punkte M zukommt. Aus diesem Grunde wird sein Radius ϱ , welcher das Reziprok der Krümmung bedeutet, *Krümmungsradius der Kurve im Punkte M* genannt.

Trägt man (Fig. 70) ϱ auf der Normale in M vom Punkte M aus nach derjenigen Seite ab, nach welcher die Kurve konkav ist, und beschreibt man aus dem so erhaltenen Punkte Ω einen Kreis vom Halbmesser ϱ in der Ebene der Kurve, so wird der dem Punkte M zunächst gelegene Bogen dieses Kreises sich nur sehr wenig von den angrenzenden Bogenelementen der Kurve unterscheiden; man bezeichnet den so gezeichneten Kreis als den *Krümmungskreis* und seinen Mittelpunkt Ω als den *Krümmungsmittelpunkt* der Kurve im Punkte M .

157. Darstellung in rechtwinkligen Koordinaten. Der analytische Ausdruck für den Krümmungshalbmesser ergibt sich auf Grund der Gleichungen (2) und (5) wie folgt. Aus (1) erhält man

$$\frac{d\tau}{dx} = \frac{y''}{1 + y'^2},$$

nach 154, (5) ist

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + y'^2};$$

daraus folgt die Krümmung

$$(6) \quad k = - \frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

und der Krümmungshalbmesser

$$(7) \quad \varrho = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''}.$$

Hierzu ist folgendes zu bemerken. Die Zählung des Bogens s soll derart erfolgen, daß er mit der Abszisse x zugleich wächst; dann ist die Quadratwurzel in dem Ausdrucke (7) positiv (154) und das Vorzeichen von ϱ stimmt mit jenem von y'' überein. Es ergibt sich also unter dieser Voraussetzung ϱ positiv in einem

Punkte, in welchem die Kurve konkav nach oben, und negativ in einem Punkte, wo sie konkav nach unten ist (146). In einem Wendepunkte ist $y'' = 0$, der Krümmungsradius wird dort unendlich, die Krümmung Null, der Krümmungskreis geht in eine Gerade, die Wendetangente, über.

Die eben getroffene Festsetzung kommt auf dasselbe hinaus wie die folgende. Man lasse die *positive Richtung der Tangente* der wachsenden Abszisse entsprechen und erzeuge aus ihr die *positive Richtung der Normale* durch positive Drehung um einen Rechten; dann soll die Krümmung und der Krümmungsradius positiv oder negativ sein, je nachdem der Krümmungsmittelpunkt auf die positive oder die negative Normale zu liegen kommt.

Bezeichnet man die Koordinaten des Krümmungsmittelpunktes mit x_0/y_0 , den Winkel der positiven Normale mit der positiven Abszissenachse mit ν , so ist unter allen Umständen, d. h. bei jeder Anordnung der Figur

$$(8) \quad \begin{cases} x_0 - x = \rho \cos \nu, \\ y_0 - y = \rho \sin \nu; \end{cases}$$

da ferner $\nu = \tau \pm \frac{\pi}{2}$, je nachdem τ spitz oder stumpf, so ist

$$\operatorname{tg} \nu = -\frac{1}{y'},$$

somit ergibt sich

$$\sin \nu = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}}, \quad \cos \nu = -\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}},$$

die Wurzel positiv, weil $\sin \nu$ positiv ist; hiermit und mit Benutzung von (7) hat man aus (8):

$$(9) \quad \begin{cases} x_0 = x - \frac{(1 + y'^2)y'}{y''}, \\ y_0 = y + \frac{1 + y'^2}{y''}. \end{cases}$$

Die Vergleichung der Formeln (7) und (9) mit jenen 152, (12) führt zu dem Satze: *Der Krümmungskreis einer Kurve in einem ihrer Punkte stimmt mit dem Oskulationskreise überein.*

Aus diesem Zusammenhang ergeben sich die folgenden geometrischen Beziehungen zwischen dem Krümmungskreis und der Kurve. Da die Oskulation in der Regel eine Berührung

der zweiten Ordnung ist, so befindet sich die Kurve in hinreichender Nähe des Kurvenpunktes M auf einer Seite desselben innerhalb, auf der andern Seite außerhalb des Krümmungskreises. Nur in Punkten, wo Superoskulation stattfindet und diese von ungerader Ordnung ist, liegt die Kurve in der *beiderseitigen*, entsprechend begrenzten Umgebung innerhalb oder außerhalb des Krümmungskreises; man bezeichnet solche Punkte als *Scheitel* der Kurve.

Die Formeln (6), (7) und (9) sind unter der Annahme abgeleitet worden, daß die Abszisse x als unabhängige Variable gelte. Um die Formeln für eine beliebige unabhängige Variable zu erhalten, braucht man nur wieder von der Formel (3) auszugehen und y' durch den Quotienten $\frac{dy}{dx}$ der Differentiale zu ersetzen. Dann erhält man aus

$$\tau = \text{Arctg } \frac{dy}{dx}$$

durch Differentiation

$$d\tau = \frac{\frac{dx d^2y - dy d^2x}{dx^3}}{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} = \frac{dx d^2y - dy d^2x}{dx^3 + dy^2};$$

ferner ist laut 154, (7)

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2},$$

daher nach (3) und (5):

$$(6^*) \quad k = \frac{dx d^2y - dy d^2x}{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}$$

und

$$(7^*) \quad \varrho = \frac{(dx^2 + dy^2)^{\frac{3}{2}}}{dx d^2y - dy d^2x}.$$

Aus

$$\text{tg } \nu = - \frac{dx}{dy}$$

erhält man weiter

$$\sin \nu = \frac{dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}, \quad \cos \nu = - \frac{dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$$

und hiermit auf Grund von (8):

$$(9^*) \quad \begin{cases} x_0 = x - \frac{(dx^2 + dy^2) dy}{dx d^2y - dy d^2x} \\ y_0 = y + \frac{(dx^2 + dy^2) dx}{dx d^2y - dy d^2x} \end{cases}$$

In allen diesen Formeln hat die Quadratwurzel das nämliche Vorzeichen wie dx zu bekommen, damit $\sin \nu$ positiv sei; das Differential der unabhängigen Variablen, also des Parameters, wird dabei immer als positiv angesehen.

Ist die Kurve in der Form $f(x, y) = 0$ gegeben, so ersetze man in (7) und (9) y' und y'' durch die aus 57, (9) und (10) resultierenden Werte und erhält so die Formeln:

$$(7^{**}) \quad \varrho = \frac{(f_x^2 + f_y^2)^{\frac{3}{2}}}{-f_{xx}f_y^2 + 2f_{xy}f_xf_y - f_{yy}f_x^2}$$

$$(9^{**}) \quad \begin{cases} x_0 = x - \frac{(f_x^2 + f_y^2)f_x}{f_{xx}f_y^2 - 2f_{xy}f_xf_y + f_{yy}f_x^2} \\ y_0 = y - \frac{(f_x^2 + f_y^2)f_y}{f_{xx}f_y^2 - 2f_{xy}f_xf_y + f_{yy}f_x^2} \end{cases}$$

Der invariante Charakter des Krümmungshalbmessers, der geometrisch unmittelbar einleuchtet, ist an der Form (7*) leicht zu erweisen. Wendet man nämlich auf dieselbe die orthogonale Transformation (67, (2))

$$\begin{aligned} x &= a_1x_1 + b_1y_1 + c_1 & a_1^2 + a_2^2 &= 1 & a_1^2 + b_1^2 &= 1 \\ y &= a_2x_1 + b_2y_1 + c_2 & b_1^2 + b_2^2 &= 1 & a_2^2 + b_2^2 &= 1 \\ & & a_1b_1 + a_2b_2 &= 0 & a_1a_2 + b_1b_2 &= 0 \end{aligned}$$

an, so wird

$$\begin{aligned} dx &= a_1dx_1 + b_1dy_1, & dy &= a_2dx_1 + b_2dy_1, \\ d^2x &= a_1d^2x_1 + b_1d^2y_1, & d^2y &= a_2d^2x_1 + b_2d^2y_1, \end{aligned}$$

daraus

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 &= dx_1^2 + dy_1^2 \\ \left| \frac{dx \, dy}{d^2x \, d^2y} \right| &= \left| \frac{a_1 b_1}{a_2 b_2} \right| \left| \frac{dx_1 \, dy_1}{d^2x_1 \, d^2y_1} \right| \end{aligned}$$

infolgedessen verwandelt sich der bezeichnete Ausdruck für ϱ in

$$\frac{(dx_1^2 + dy_1^2)^{\frac{3}{2}}}{\mathcal{A}(dx_1 d^2y_1 - dy_1 d^2x_1)},$$

und da der Modul \mathcal{A} der Transformation den Wert $+1$ oder -1 hat, so ist die Invarianz des absoluten Wertes erwiesen; das Vorzeichen hängt in der Tat vom Koordinatensystem ab.

158. Der Krümmungsmittelpunkt als letzter Schnitt zweier benachbarten Normalen. Der Krümmungsmittelpunkt kann geometrisch noch in anderer Weise charakterisiert werden. *Es ist nämlich der Krümmungsmittelpunkt zu dem Punkte M die Grenze, gegen welche sich der Schnittpunkt der Normale in M mit der Normale in M' hinbewegt, wenn M' auf der Kurve unaufhörlich dem Punkte M sich nähert.*

Wir wollen dies gleich unter der allgemeinen Voraussetzung nachweisen, daß x, y als Funktionen eines Parameters u gegeben sind. Dann ist die linke Seite der Gleichung der Normale im Punkte M (133, (27)):

$$(10) \quad (\xi - x)dx + (\eta - y)dy = 0$$

nach Unterdrückung des Faktors du eine Funktion von ξ, η, u und werde als solche durch $V(\xi, \eta, u)$ bezeichnet, so daß an Stelle von (10) geschrieben werden kann:

$$(11) \quad V(\xi, \eta, u) = 0;$$

die Normale in M' , welchem Punkte der Parameter $u + \Delta u$ zukommen möge, ist durch

$$(12) \quad V(\xi, \eta, u + \Delta u) = 0$$

dargestellt. An die Stelle der Gleichungen (11) und (12) können auch (11) und

$$(13) \quad \frac{V(\xi, \eta, u + \Delta u) - V(\xi, \eta, u)}{\Delta u} = 0$$

gesetzt werden. Aus diesen wäre der Schnittpunkt der beiden Normalen zu bestimmen; da es sich aber um seine Grenzlage handelt, so lasse man in (13) Δu gegen Null konvergieren; dadurch geht diese Gleichung über in

$$\frac{\partial V(\xi, \eta, u)}{\partial u} = 0,$$

oder aber in

$$(13^*) \quad d_u V(\xi, \eta, u) = 0$$

und diese bestimmt mit (11) zusammen den Grenzpunkt. Seine Koordinaten ergeben sich also aus

$$(14) \quad \begin{cases} (\xi - x)dx + (\eta - y)dy = 0 \\ (\xi - x)d^2x + (\eta - y)d^2y = dx^2 + dy^2 \end{cases}$$

durch Auflösung in bezug auf ξ und η ; diese liefert aber

$$\xi = x - \frac{(dx^2 + dy^2)dy}{dx dy^2 - dy^2 dx}$$

$$\eta = y + \frac{(dx^2 + dy^2)dx}{dx dy^2 - dy^2 dx},$$

Werte, die in der Tat mit den in (9*) gefundenen Koordinaten des Krümmungsmittelpunktes übereinstimmen. Dabei ist die Voraussetzung gemacht, daß

$$\left| \frac{dx \, dy}{dx^2 dy^2} \right| \neq 0,$$

daß also der Punkt x/y nicht Wendepunkt sei (146). Für einen solchen wird der unendlich ferne Punkt der Normale Krümmungsmittelpunkt.

159. Die Evolute einer Kurve. Evolventen. Der Ort der Krümmungsmittelpunkte einer gegebenen Kurve ist eine neue Kurve, welche man als *Evolute* der gegebenen bezeichnet, während diese eine *Evolvente* von jener genannt wird. Die Namen sind in gewissen Eigenschaften dieser Linien begründet, welche alsbald nachgewiesen werden sollen.

Was zunächst die Gewinnung der Gleichung der Ortskurve der Krümmungsmittelpunkte oder der Evolute anlangt, so ist folgendes zu bemerken. Ist die Kurve in einer der Formen $y = F(x)$ oder $f(x, y) = 0$ gegeben, so hat man zwischen ihrer Gleichung und den beiden Gleichungen (9), beziehungsweise (9**), die Koordinaten x, y zu eliminieren, um die Beziehung zwischen x_0, y_0 , d. i. die Gleichung der Evolute zu erhalten. Wenn hingegen die Kurve durch einen Parameter, also in der Form $x = \varphi(u)$, $y = \psi(u)$ dargestellt ist, so hat man zwischen diesen und den beiden Gleichungen (9*) die Variablen x, y, u zu eliminieren, um zu demselben Ziele zu gelangen.

Um die charakteristischen Eigenschaften der Evolute zu erweisen, gehen wir von den Gleichungen (14) aus, welche zwischen den Koordinaten x/y eines Punktes der gegebenen Kurve und den Koordinaten x_0/y_0 des Krümmungsmittelpunktes,

also des ihm zugeordneten Punktes der Evolute, die folgenden Beziehungen zum Ausdruck bringen:

$$\begin{aligned}(x_0 - x)dx + (y_0 - y)dy &= 0, \\ (x_0 - x)d^2x + (y_0 - y)d^2y &= dx^2 + dy^2.\end{aligned}$$

Differentiiert man die erste dieser Gleichungen, so ergibt sich zunächst

$$(dx_0 - dx)dx + (dy_0 - dy)dy + (x_0 - x)d^2x + (y_0 - y)d^2y = 0,$$

und dies reduziert sich im Hinblick auf die zweite Gleichung auf

$$(15) \quad dx_0 dx + dy_0 dy = 0,$$

woraus

$$(16) \quad \frac{dy_0}{dx_0} = - \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Diese Gleichung besagt, daß die Tangenten in zusammengehörigen Punkten der gegebenen Kurve und ihrer Evolute senkrecht aufeinander stehen; da nun der Punkt x_0/y_0 in der Normale des Punktes x/y liegt, so folgt daraus der Satz: *Die Normalen der gegebenen Kurve sind Tangenten der Evolute.*

Aus den Gleichungen 157, (8):

$$\begin{aligned}x_0 - x &= \rho \cos \nu \\ y_0 - y &= \rho \sin \nu,\end{aligned}$$

welche die Beziehungen zwischen den Koordinaten, dem Krümmungshalbmesser und dem Richtungswinkel der Normale eines Punktes der gegebenen Kurve und den Koordinaten des zugeordneten Punktes der Evolute darstellen, erhält man durch Differentiation:

$$\begin{aligned}dx_0 - dx &= d\rho \cos \nu - \rho \sin \nu d\nu \\ dy_0 - dy &= d\rho \sin \nu + \rho \cos \nu d\nu;\end{aligned}$$

bildet man die Summe dieser Gleichungen, nachdem man sie vorher quadriert hat, unter Rücksichtnahme auf (15), so entsteht:

$$dx_0^2 + dy_0^2 + dx^2 + dy^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\nu^2;$$

nun ist aber $dx_0^2 + dy_0^2$ das Quadrat des Bogendifferentials ds_0 der Evolute, $dx^2 + dy^2$ das Quadrat der zugeordneten Bogendifferentials ds der gegebenen Kurve; da ferner der Winkel ν

der Normale mit der Abszissenachse dem Betrage nach um ebensoviel sich ändert wie der Winkel τ der Tangente, so ist $d\nu^2 = d\tau^2$; daher läßt sich die letzte Gleichung in der Form

$$ds_0^2 + ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\tau^2$$

schreiben, und da mit Rücksicht auf die Formeln 156, (3), (5)

$\rho = \frac{ds}{d\tau}$ ist, so reduziert sie sich auf

$$ds_0^2 = d\rho^2,$$

woraus

$$(17) \quad ds_0 = \pm d\rho.$$

In zusammengehörigen Punkten der Evolute und der gegebenen Kurve haben die Funktionen, welche den Bogen der ersteren und den Krümmungshalbmesser der letzteren ausdrücken, dem Betrage nach gleiche Differentiale, bei demselben Differential der unabhängigen Variablen.

Von den beiden Vorzeichen gilt das obere oder untere, je nachdem s_0 und ρ in gleichem oder im entgegengesetzten Sinne sich ändern.

Solange ein und dasselbe, z. B. das positive Vorzeichen gilt, können sich die Funktionen s_0 und ρ nur um eine Konstante unterscheiden (38); also ist dann

$$s_0 = \rho + c;$$

wendet man diese Gleichung auf den Anfangspunkt Ω_1 der Zählung für die Bögen der Evolute an, welchem auf der gegebenen Kurve C (Fig. 72) der Punkt M_1 mit dem Krümmungsradius ρ_1 entsprechen möge, so lautet sie:


$$0 = \rho_1 + c$$

und gibt in Verbindung mit der obigen:

$$(18) \quad s_0 = \rho - \rho_1.$$

Hiernach ist ein Bogen $\Omega_1\Omega$ der Evolute gleich der Differenz der in seinen Endpunkten endigenden Krümmungsradien $M_1\Omega_1$, $M\Omega$ der gegebenen Kurve, vorausgesetzt, daß der Krümmungsradius von M_1 bis M in gleichem Sinne sich ändert.

Weil die Bestimmung von ρ nur Differentiationen erfordert, so ist es zufolge der Beziehung (18) möglich, einen



beliebigen Bogen der Evolute einer gegebenen Kurve bloß mit Hilfe der Differentialrechnung zu bestimmen.

Auf die durch (18) ausgedrückte Eigenschaft gründen sich die Namen Evolute und Evolvente. Befestigt man nämlich einen biegsamen, nicht dehnbaren Faden von der Länge $\varrho = M\Omega$ mit dem einen Endpunkte in Ω , legt ihn an den Bogen $\Omega\Omega_1$ so an, daß er ihn bei Ω_1 in tangentialer Richtung verläßt, so kommt der andere Endpunkt des Fadens nach M_1 . Wird nun der Faden bei fortwährender Spannung von der Kurve $\Omega\Omega_1$ abgewickelt, so beschreibt sein freier Endpunkt den Bogen M_1M der gegebenen Kurve. Auf die Evolute ist also der Faden *aufgewickelt* und die Evolvente entsteht durch seine *Abwicklung*.

Auch jeder andere Punkt des Fadens Ω_1M_1 und seiner Fortsetzung über M_1 hinaus beschreibt eine Linie, die wie C die Eigenschaft hat, auf der Richtung des Fadens überall senkrecht zu sein. Zu einer Kurve, als Evolute aufgefaßt, gehören also unzählich viele Evolventen. Über ihr System wird in der Integralrechnung des näheren gesprochen werden.

Treffen Evolute und Evolvente in einem Punkte Ω_2 zusammen, so ist

$$\Omega_1M_1 = \text{arc } \Omega_1\Omega_2$$

$$\Omega M = \text{arc } \Omega\Omega_2$$

usw.

Diese Gleichungen charakterisieren die Kurve M_1M als eine Evolvente der Kurve $\Omega_1\Omega$.

Hat die gegebene Kurve einen Wendepunkt, so ist die zugehörige Normale Tangente der Evolute in einem unendlich fernen Punkte, also Asymptote derselben. Erlangt der Krümmungsradius der gegebenen Kurve in einem Punkte einen extremen Wert, so ist die Normale in diesem Punkte Tangente an zwei Äste der Evolute und diese weist also eine Spitze auf.

160. Beispiele, betreffend die Bestimmung von Krümmungsradien, Krümmungsmittelpunkten und Evoluten. 1) Für die Parabel $y^2 = 2px$ ist $y' = \frac{p}{y}$, $y'' = -\frac{p}{y^3}$ und hiermit ergibt sich der Krümmungshalbmesser, je nachdem

man ihn durch die Ordinate oder durch die Abszisse ausdrückt:

$$\varrho = \frac{(p^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}{p^3}, \quad \varrho = \frac{(p + 2x)^{\frac{3}{2}}}{p^{\frac{3}{2}}};$$

vom Vorzeichen, das für $y > 0$ negativ und für $y < 0$ positiv ausfällt, ist dabei abgesehen worden.

Die Ausführung der Gleichungen 157, (9) gibt:

$$x_0 = p + 3x$$

$$y_0 = -\frac{y^3}{p^2};$$

eliminiert man mit Zuhilfenahme der Kurvengleichung x und y , so kommt man zu der Gleichung

$$y_0^2 = \frac{8}{27p} (x_0 - p)^3,$$


welche die Evolute darstellt; diese ist also eine algebraische Kurve von der dritten Ordnung und führt den Namen semikubische oder Neilsche Parabel (134, 1).

Der Krümmungsradius hat im Scheitel den kleinsten Wert $= p$; der Punkt $p/0$ ist also eine Spitze der Evolute.

Weil $x_0 - x = 2\left(x + \frac{p}{2}\right)$ die Projektion der Strecke $M\Omega$ (Fig. 73) auf der Abszissenachse und $x + \frac{p}{2}$ die Projektion der Strecke QM der Normale zwischen der Leitlinie RR' und dem Punkte M auf derselben Achse ist, so ist auch $M\Omega = 2QM$. Man erhält demnach den Krümmungshalbmesser eines Punktes der Parabel durch Verdoppelung des Abschnittes der Normale, welcher durch die Leitlinie der Parabel gebildet wird.

Der Bogen $S\Omega$ der Neilschen Parabel, als Differenz zwischen $M\Omega$ und OS , hat den Ausdruck $\frac{(p^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}{p^3} - p$.*)

Fig. 73.



*) Dies ist das erste Beispiel einer algebraischen Berechnung eines Kurvenbogens, von Neil 1657 (Philos. Trans. 1673) ausgeführt.

2) Aus der bekannten Konstruktion der *Ellipse* mittels zweier mit den Radien a, b beschriebenen konzentrischen Kreise (Fig. 74) ergibt sich folgende Darstellung derselben. Wählt man den Winkel $BOK = \varphi$, welchen der Halbmesser OK , aus dem sich der Punkt M der Ellipse ableitet, mit der kleinen

Achse einschließt, als veränderlichen Parameter, so drücken sich die Koordinaten OP, PM vom M wie folgt aus:

$$(20) \quad \begin{cases} x = a \sin \varphi \\ y = b \cos \varphi; \end{cases}$$

man nennt φ die *exzentrische Anomalie* des Punktes M .

Auf Grund dieser Gleichungen ergibt die Formel 157, (7*) den Krümmungsradius (seinem absoluten Werte nach)

$$\rho = \frac{[a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 \varphi]^{\frac{3}{2}}}{ab},$$

woraus sich seine extremen Werte unmittelbar erkennen lassen: der größte für $\varphi = 0$ gleich $\frac{a^2}{b}$, der kleinste für $\varphi = \frac{\pi}{2}$ gleich $\frac{b^2}{a}$; man konstruiert sie, indem man zu $A'B$ die Senkrechten $A'D$ und BE errichtet, wodurch $OD = \frac{a^2}{b}$ und $OE = \frac{b^2}{a}$ erhalten wird.

In Ausführung der Formeln 157, (9*) findet man ferner:

$$x_0 = \frac{a^2 - b^2}{a} \sin^3 \varphi$$

$$y_0 = -\frac{a^2 - b^2}{b} \cos^3 \varphi;$$


wird zur Abkürzung

$$\frac{a^2 - b^2}{a} = OA - OE = OA_0 = a_0$$

$$\frac{a^2 - b^2}{b} = OD - BO = OB_0 = b_0$$

gesetzt und φ eliminiert, so folgt

$$(21) \quad \left(\frac{x_0}{a_0}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y_0}{b_0}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$$



als Gleichung der Evolute der Ellipse. Es ist eine aus vier gleichen Quadranten von der Form A_0B_0 zusammengesetzte Kurve mit vier Spitzen; auf rationale Form gebracht lautet ihre Gleichung:

$$\left\{ \left(\frac{x_0}{a_0} \right)^2 + \left(\frac{y_0}{b_0} \right)^2 - 1 \right\}^3 = -27 \left(\frac{x_0}{a_0} \right)^2 \left(\frac{y_0}{b_0} \right)^2$$

und läßt erkennen, daß es eine Kurve sechster Ordnung ist.

Die Länge des Quadranten A_0B_0 der Evolute ergibt sich als Differenz zwischen dem größten und kleinsten Krümmungshalbmesser, ist also gleich $\frac{a^2 - b^2}{ab}$.

Setzt man in den Ausdrücken für a_0, b_0 an Stelle von b das Produkt $b\sqrt{-1}$, so daß

$$a_0 = \frac{a^2 + b^2}{a} = \alpha_0, \quad b_0 = \frac{a^2 + b^2}{b\sqrt{-1}} = -\beta_0\sqrt{-1}$$

wird, so geht die Gleichung (21) über in

$$\left(\frac{x_0}{\alpha_0} \right)^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{y_0}{\beta_0} \right)^{\frac{2}{3}} = 1,$$

und dies stellt die Evolute der Hyperbel von den Halbachsen a, b dar, weil durch den gleichen Prozeß die Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

der Ellipse in die Gleichung der Hyperbel sich verwandelt.

3) Bei dem Cartesischen Blatt (129, 3) und Fig. 35 daselbst)

$$x^3 - 3axy + y^3 = 0$$

ist die Frage nach dem Krümmungsradius im Ursprung insofern unbestimmt, als sich dort zwei Äste der Kurve schneiden; wegen der Symmetrie in bezug auf die Halbierende des Koordinatenwinkels haben aber beide dort dieselbe Krümmung; es ist also gleichgültig, für welchen Ast man ρ bestimmt. Wir wählen dazu den Ast, der die Abszissenachse berührt, haben es also mit dem Punkt

$$x = 0, \quad y = 0, \quad y' = 0$$

zu tun und brauchen für ihn nurmehr y'' zu bestimmen. Nun gibt zweimalige sukzessive Differentiation der Kurvengleichung

$$x^3 - ay - axy' + y^3y' = 0$$

$$2x - 2ay' - axy'' + 2yy'^2 + y^3y'' = 0;$$

die erste dieser Gleichungen wird durch die obigen Werte tatsächlich befriedigt, die zweite aber liefert keine Bestimmung für y'' ; differenziert man sie nochmals:

$$2 - 3ay'' - axy''' + 2y'^3 + 6yy'y'' + y^3y''' = 0,$$

so gibt dies für den betrachteten Punkt $y'' = \frac{2}{3a}$, folglich

$$\rho = \frac{3a}{2}.$$

4) Für die Lemniskate (132, 2))

$$(x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2) = 0$$

in den Berührungspunkten der Doppeltangenten den Krümmungsradius zu bestimmen.

Die Lemniskate hat zwei Doppeltangenten, das sind Gerade, welche sie zweimal an verschiedenen Stellen berühren; beide sind der x -Achse parallel. Man bekommt ihre Berührungspunkte, indem man in der nach x differenzierten Kurvengleichung:

$$2(x^2 + y^2)(x + yy') - a^2(x - yy') = 0$$

$y' = 0$ setzt und hierauf aus beiden x, y rechnet; man erhält für den Punkt im ersten Quadranten — und es genügt, diesen allein zu betrachten —

$$x = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{3}{2}}, \quad y = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}, \quad y' = 0.$$

Um sein y'' zu finden, hat man in dem Ergebnis der zweiten Differentiation:

$$4(x + yy')^2 + 2(x^2 + y^2)(1 + y'^2 + yy'') - a^2(1 - y'^2 - yy'') = 0$$

diese Werte einzusetzen und bekommt so $y'' = -\frac{3\sqrt{2}}{2a}$; mithin ist

$$\rho = -\frac{a\sqrt{2}}{3}.$$

5) Die Bedingung, unter welcher ρ oder

$$\rho^2 = \frac{(1 + y'^2)^2}{y''^2}$$

einen extremen Wert erlangt, ergibt sich durch Nullsetzen der Ableitung $\frac{d(\rho^2)}{dx}$ und lautet, wenn man von Wendepunkten gleich absieht:

$$3y'y''^2 - (1 + y'^2)y''' = 0.$$

Zu demselben Resultat führt die Forderung, daß der Oskulationskreis superoskuliere; denn differenziert man die zweite Gleichung (11), 152:

$$1 + \eta'^2 + (\eta - \beta)\eta'' = 0$$

nochmals und eliminiert hierauf β , so ergibt sich

$$3\eta'\eta''^2 - (1 + \eta'^2)\eta''' = 0,$$

was sofort in die obige Gleichung übergeht, wenn man die Berührungsbedingungen einführt.

In jedem Punkte also, wo der Krümmungsradius einen extremen Wert annimmt, findet Superoskulation statt. Als *Scheitel* soll aber ein solcher Punkt nur dann bezeichnet werden, wenn die Superoskulation von ungerader Ordnung ist.

6) Für die gemeine Zykloide (130, a) ergibt sich auf Grund der Gleichungen

$$x = a(u - \sin u)$$

$$y = a(1 - \cos u)$$

mit Zuhilfenahme derselben Formeln wie im Beispiel 2) zunächst der absolute Wert des Krümmungshalbmessers

$$\rho = 4a \sin \frac{u}{2};$$

da die Länge der Normale $N = MA = 2a \sin \frac{u}{2}$ (Fig. 75) ist, so wird der Krümmungshalbmesser durch Verdoppelung der Normale erhalten.

Weiter findet man

$$x_0 = a(u + \sin u)$$


$$y_0 = -a(1 - \cos u);$$

wird eine Translation des Koordinatensystems ausgeführt gemäß den Gleichungen

$$x_0 = x'_0 + \pi a$$

$$y_0 = y'_0 - 2a,$$

Fig. 75.



so hat man für die neuen Koordinaten die Ausdrücke:

$$x'_0 = a(u - \pi + \sin u) = a(u - \pi - \sin(u - \pi))$$

$$y'_0 = a(1 + \cos u) = a(1 - \cos(u - \pi)),$$

oder, wenn noch $u - \pi = u'$ gesetzt wird:

$$x'_0 = a(u' - \sin u')$$

$$y'_0 = a(1 - \cos u').$$

Daraus geht hervor, daß die Evolute der gemeinen Zykloide eine ihr kongruente Zykloide ist, gegen sie verschoben im Sinne der x -Achse um πa , im Sinne der Ordinatenachse um $-2a$.

Die Länge des Bogens OC_0 der Evolute ist gleich dem Unterschiede der Krümmungsradien in C und O ; der erste ist $4a$, der zweite 0 , daher $\text{arc } OC_0 = \text{arc } OC = 4a$ und $\text{arc } OCB = 8a$.

161. Fortsetzung. Krümmungsmittelpunkte der Rollkurven. Als Beispiel einer infinitesimal-geometrischen Betrachtung wollen wir die Bestimmung des Krümmungshalbmessers und Krümmungsmittelpunktes einer Rollkurve vornehmen, eine Aufgabe zugleich, die wegen ihrer Allgemeinheit und Tragweite von Bedeutung ist.

Bezüglich der Definition der Rollkurven sei auf 130 verwiesen. Der Betrachtung braucht aber nicht eine „beliebige“ Polbahn und Polkurve zugrunde gelegt, sie darf vielmehr auf den Fall beschränkt werden, daß beide Linien Kreise sind. Denn, um für einen Punkt einer beliebigen Rollkurve den Krümmungsmittelpunkt zu bestimmen, kann man Polbahn und Polkurve durch ihre Oskulationskreise im momentanen Drehpol ersetzen, das Resultat des infinitesimalen Abrollens, soweit die Krümmung in Betracht kommt, wird dadurch nicht geändert.

In Fig. 76 seien K_1 der feste, K der bewegliche Kreis, O_1, O ihre Mittelpunkte, A_0 der momentane Drehpol. Bei einer Fortsetzung der rollenden Bewegung wird der Punkt A des beweglichen Kreises auf den Punkt A_1 des festen zu liegen kommen; dabei ist

$$A_0A = A_0A_1 = A\sigma$$

und kommt AO in die Verlängerung von O_1A_1 ; man kann

diese Endlage auch durch Translation der Figur K um die Strecke AA_1 und nachherige Drehung um die Summe $\Delta\omega + \Delta\omega_1$ der Winkel bei O und O_1 bewerkstelligen; hierbei kommt P zuerst nach Q , so daß PQ parallel und gleich AA_1 , und hierauf nach P' durch Drehung von Q um A_1 durch den ebengenannten Winkel. Das Element $PP' = \Delta s$ der Bahn kann aber bis auf Größen höherer Kleinheitsordnung als Kreisbogen vom Radius A_0P und dem Zentriwinkel $\Delta\omega + \Delta\omega_1$ gerechnet werden. Da ferner der *Beginn* der Bewegung als Rotation um A_0 erscheint, so ist ihre *Anfangsrichtung* senkrecht zu A_0P , daher ist PA_0 die Normale der Bahn im Punkte P . In gleicher Weise ist $P'A_1$ die Normale in P' , folglich der Schnittpunkt Ω der beiden letztgenannten Linien der Krümmungsmittelpunkt der Bahn im Punkte P . Bezeichnet man den Winkel bei Ω mit $\Delta\tau$, so ist der Krümmungsradius

$$\varrho = \frac{\Delta s}{\Delta\tau} = \frac{p(\Delta\omega + \Delta\omega_1)}{\Delta\tau}$$

wenn $A_0P = p$ gesetzt wird. Wenn weiter $A_0O = R$, $A_0O_1 = R_1$, Winkel $PA_0O = \theta$, und wenn aus Ω der Kreisbogen A_1B beschrieben wird, so hat man:

$$\Delta\omega = \frac{\Delta\sigma}{R}, \quad \Delta\omega_1 = \frac{\Delta\sigma}{R_1}$$


und bis auf Größen höherer Ordnung:

$$\Delta\tau = \frac{A_1B}{\Omega A_0} = \frac{\Delta\sigma \cdot \cos \theta}{\varrho - p};$$

dies alles in den obigen Ausdruck eingesetzt, gibt:

$$\varrho = \frac{\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1}\right) p(\varrho - p)}{\cos \theta},$$

Fig. 76.



162. Darstellung in Polarkoordinaten. Die Bestimmung des Krümmungshalbmessers und Krümmungsmittelpunktes für eine auf ein Polarsystem bezogene Kurve gestaltet sich folgendermaßen.

Die Tangente MT des betrachteten Punktes M (Fig. 78) mit den Koordinaten r/φ bilde mit der Verlängerung des Radiusvektors den Winkel θ , mit der Polarachse den Winkel τ ; vermöge der Beziehung

$$\tau = \theta + \varphi$$

ist der Kontingenzwinkel

$$d\tau = d\theta + d\varphi;$$

und da $\theta = \arctg \frac{r}{r'}$ (135), weiter:

$$d\tau = \frac{r'^2 - rr''}{r^2 + r'^2} d\varphi + d\varphi = \frac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{r^2 + r'^2} d\varphi;$$

ferner ergab sich für das Bogendifferential der Ausdruck (155, (11))

$$ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\varphi.$$

Mithin ist der Krümmungshalbmesser


$$(24) \quad \rho = \frac{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}{r^2 + 2r'^2 - rr''}$$

(vgl. 65, 1), woselbst dieser Ausdruck aus jenem für rechtwinklige Koordinaten auf analytischem Wege, durch Transformation der Variablen, abgeleitet wurde; er ergibt sich, falls man die Wurzel im Zähler positiv nimmt, positiv oder negativ, je nachdem die Kurve im Punkte M gegen den Pol konkav oder konvex ist (147).

Der erstere dieser beiden Fälle liegt der Fig. 78 zugrunde; die nach der konkaven Seite der Kurve gezogene Normale schließt mit der Leitstrahlverlängerung den Winkel $\theta + \frac{\pi}{2}$ ein; wird ρ von M aus nach dieser Seite abgetragen, so ergibt sich der Krümmungsmittelpunkt Ω , dessen Koordinaten r_0/φ_0 sein mögen. Durch Projizieren des Linienzuges $O\Omega M$ auf den Radiusvektor ergibt sich die Gleichung:

$$(25) \quad r_0 \cos(\varphi_0 - \varphi) - \rho \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = r,$$

Fig. 78.



und durch Projizieren auf die zum Leitstrahl senkrechte Gerade ΩQ die Gleichung


$$(26) \quad r_0 \sin(\varphi_0 - \varphi) - \varrho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Aus diesen Gleichungen erhält man unter Zuziehung von (24) und 135, (36):

$$(27) \quad \begin{cases} r_0 \cos(\varphi_0 - \varphi) = \frac{(r'^2 - rr'')r}{r^3 + 2r'^2 - rr''} \\ r_0 \sin(\varphi_0 - \varphi) = \frac{(r^3 + r'^2)r'}{r^3 + 2r'^2 - rr''} \end{cases}$$

zur Bestimmung von r_0, φ_0 .

Eliminiert man zwischen den Gleichungen (27) und der Gleichung der zugrundeliegenden Kurve r, φ , so ergibt sich die Polargleichung der Evolute.



Die Gleichungen (27) bleiben auch dann aufrecht, wenn die Kurve in M gegen den Pol konvex, ϱ also negativ ist (Fig. 79); dann nämlich schließt die nach der konkaven Seite gezogene Normale mit der Verlängerung des Radiusvektors

den Winkel $\theta - \frac{\pi}{2}$ ein und an die Stelle von (25), (26) treten die Gleichungen:

$$r_0 \cos(\varphi_0 - \varphi) - (-\varrho) \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = r$$

$$r_0 \sin(\varphi_0 - \varphi) - (-\varrho) \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = 0,$$

die sich aber mit ihnen decken.

163. Beispiele. 1) Bei der archimedischen Spirale (136, 1))

$$r = a\varphi$$

hat man für den Krümmungshalbmesser den Ausdruck:

$$\varrho = \frac{(r^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}{2a^2 + r^2}$$

und für den Krümmungsmittelpunkt die Gleichungen:

$$r_0 \cos(\varphi_0 - \varphi) = \frac{a^2 r}{2a^2 + r^2}$$

$$r_0 \sin(\varphi_0 - \varphi) = \frac{(a^2 + r^2)a}{2a^2 + r^2}.$$

Aus den letzteren ergibt sich

$$r_0^2 = \frac{r^4 + 3a^2r^2 + a^4}{r^4 + 4a^2r^2 + 4a^4} a^2;$$

daraus geht hervor, daß r_0 zwischen den Grenzen $\frac{a}{2}$ und a gelegen ist, die untere Grenze für $r=0$ annimmt und der oberen für $\lim r = \infty$ sich nähert; infolgedessen ist die Evolute der archimedischen Spirale zwischen den beiden Kreislinien $r = \frac{a}{2}$ und $r = a$ eingeschlossen und nähert sich der letzteren asymptotisch.

Die Konstruktion des Krümmungsmittelpunktes kann nach der in 161 für Rollkurven entwickelten allgemeinen Methode geschehen.

2) Die logarithmische Spirale (136, 3))

$$r = ae^{m\varphi} \quad (a > 0)$$

hat den Krümmungshalbmesser

$$\rho = r\sqrt{1+m^2},$$

und für den Krümmungsmittelpunkt gelten die Gleichungen:

$$\begin{aligned} r_0 \cos(\varphi_0 - \varphi) &= 0 \\ r_0 \sin(\varphi_0 - \varphi) &= mr, \end{aligned}$$

aus welchen sich zunächst

$$\varphi_0 - \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

ergibt, je nachdem m positiv oder negativ ist; hiermit liefert die zweite

$$r_0 = \pm mr.$$

Die Elimination von r, φ gibt

$$r_0 = \pm mae^{m\left(\varphi_0 \mp \frac{\pi}{2}\right)};$$

setzt man $\pm mae^{\mp m\frac{\pi}{2}} = A$, so schreibt sich diese Gleichung

$$r_0 = Ae^{n\varphi_0}$$

und läßt erkennen, daß die Evolute der logarithmischen Spirale eine ihr kongruente Kurve ist.

3) Bei den Sinusspiralen (136, 4))

$$r^n = a^n \sin n\varphi$$

gestaltet sich die Bestimmung von φ am einfachsten, wenn

man auf ds und $d\tau$ zurückgeht. Wie nämlich an der zitierten Stelle gefunden wurde, ist $\theta = n\varphi + \kappa\pi$, folglich

$$d\tau = d\theta + d\varphi = (n+1)d\varphi;$$

ferner $r' = r \cotg n\varphi$, demzufolge

$$ds = \frac{r d\varphi}{\sin n\varphi}$$

und

$$\varrho = \frac{ds}{d\tau} = \frac{r}{(n+1) \sin n\varphi};$$

Da nun $|\sin n\varphi| = \sin \theta$ und $\varrho \sin \theta$ die Projektion des Krümmungsradius auf den Leitstrahl bedeutet, so steht diese Pro-

jektion zum Leitstrahl selbst in dem Verhältnis $1 : (n+1)$. Dasselbe Verhältnis hat also der Krümmungsradius zur Normalenlänge, woraus sich seine einfachste Konstruktion ergibt.

Man wende dieses Ergebnis auf die Lemniskate, Kardioiden, Parabel und gleichseitige Hyperbel als Sonderfälle der Sinusspirale an.

4) Die gemeinsame Polargleichung der Kegelschnittlinien lautet:

$$(28) \quad r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi};$$

dabei dient ein Brennpunkt F (Fig. 80) als Pol, die Brennpunktsachse als Polarachse und p bedeutet den Halbparameter, ε die numerische Exzentrizität, welche ein echter Bruch, die Einheit, ein unechter Bruch ist bzw. bei der Ellipse, der Parabel und der Hyperbel; $\varepsilon = 0$ entspricht der Kreis.

Mit Hilfe der Ableitungen


$$r' = \frac{p \varepsilon \sin \varphi}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^2},$$

$$r'' = \frac{p \varepsilon (\varepsilon + \cos \varphi + \varepsilon \sin^2 \varphi)}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^3}$$

ergibt sich der Krümmungshalbmesser

$$\varrho = p \left\{ \frac{\sqrt{1 + 2\varepsilon \cos \varphi + \varepsilon^2}}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \right\}^3.$$

Fig. 80.



Weil die Kurve konkav ist gegen den Pol, so bildet ihre Normale mit der Verlängerung des Radiusvektors den Winkel $\theta + \frac{\pi}{2}$, mit dem Radiusvektor selbst also den Winkel

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \theta$$

und es ist somit

$$\cotg \psi = \tg \theta = \frac{r}{r'} = \frac{1 + \varepsilon \cos \varphi}{\varepsilon \sin \varphi},$$

woraus

$$\sin \psi = \frac{\varepsilon \sin \varphi}{\sqrt{1 + 2\varepsilon \cos \varphi + \varepsilon^2}}, \quad \cos \psi = \frac{1 + \varepsilon \cos \varphi}{\sqrt{1 + 2\varepsilon \cos \varphi + \varepsilon^2}}.$$

Hiernach ist zunächst

$$\varrho = \frac{p}{\cos^2 \psi}.$$

Bezeichnet man ferner die Länge der Normale MN mit N , so folgt aus dem Dreieck NFM :

$$\frac{N}{r} = \frac{\sin \varphi}{\sin(\varphi - \psi)},$$

und da

$$\sin(\varphi - \psi) = \sin \varphi \cos \psi - \sin \psi \cos \varphi = \frac{\sin \varphi}{\sqrt{1 + 2\varepsilon \cos \varphi + \varepsilon^2}},$$

so ist

$$N = p \frac{\sqrt{1 + 2\varepsilon \cos \varphi + \varepsilon^2}}{1 + \varepsilon \cos \varphi} = \frac{p}{\cos \psi}.$$

Demnach hat man auch

$$\varrho = \frac{N}{\cos^2 \psi}$$


und kann auf Grund dieser Gleichung ϱ und somit auch den Krümmungsmittelpunkt leicht konstruieren, indem man NQ senkrecht zu MN und hierauf $Q\Omega$ senkrecht zu MF führt; es ist dann $M\Omega = \varrho$ und Ω der Krümmungsmittelpunkt.

§ 7. Die singulären Punkte ebener Kurven.

164. Die einfachen Singularitäten algebraischer Kurven. Wenn die Ordinate y als eindeutige stetige Funktion von x definiert ist und an der Stelle x_0 einen vollständigen endlichen Differentialquotienten besitzt, so heißt der Punkt x_0/y_0 ein *gewöhnlicher Punkt* der betreffenden Kurve. Das geo-

metrische Merkmal eines solchen Punktes M_0 (Fig. 81) besteht darin, daß die Kurve in demselben eine Tangente $T'T''$ besitzt und daß die Strahlen M_0M' , M_0M'' , welche ihn mit beiderseits nahe benachbarten Punkten M' , M'' verbinden, mit den Strahlen M_0T' , M_0T'' kleine Winkel, miteinander also

Fig. 81.



einen nahezu gestreckten Winkel einschließen. Diese Merkmale bleiben auch bestehen, wenn M_0 ein Wendepunkt ist.

Zu besonderen Erscheinungen ist dann Anlaß gegeben, wenn y oder sein Differentialquotient oder beide zugleich für einzelne Werte von x aufhören definiert zu sein, oder wenn y als mehrdeutige Funktion von x gegeben ist.

Wir fassen zunächst den letzten Fall ins Auge und nehmen an, eine algebraische Kurve n -ter Ordnung sei durch die Gleichung

$$(1) \quad f(x, y) = 0$$

gegeben, deren linke Seite eine ganze Funktion von x, y (13) ist.

Ist m ($\leq n$) der Grad der Gleichung in bezug auf y , so entsprechen jedem besonderen Werte von x m Werte von y , die reell oder imaginär sein können. Sind sie sämtlich untereinander verschieden und erteilt man dem x einen genügend kleinen Zuwachs h , so werden auch die zu $x + h$ gehörigen Werte von y untereinander verschieden sein und den früheren sehr nahe liegen, in der Weise, daß jedem Werte y der ersten Gruppe ein bestimmter Wert der zweiten Gruppe sich wird zuordnen lassen, der sich umsoweniger von ihm unterscheidet, je kleiner h angenommen ward. In solcher Weise lassen sich die Wurzeln y der Gleichung (1) nach dem Prinzip der Stetigkeit zu Funktionszweigen zusammenstellen, und jedem Funktionszweige entspricht ein Zweig der algebraischen Kurve; die geometrische Darstellung berücksichtigt nur die *reellen Zweige*, indessen können auch die *imaginären Zweige* in dieser Darstellung in gewissem Sinne zum Ausdruck gelangen.

Stellt

$$(2) \quad y = \varphi(x)$$

einen für einen Bereich von x reellen Zweig von (1) und (3)

$$y = \psi(x)$$

einen anderen zumindest in demselben Bereich reellen Zweig dar, so werden diese beiden gemeinsame Punkte aufweisen, sofern die Gleichung

$$\varphi(x) = \psi(x)$$

innerhalb jenes Bereichs reelle Wurzeln besitzt; ist x_0 eine solche Wurzel, so ist

$$\varphi(x_0) = \psi(x_0) = y_0$$

eine doppelte zu x_0 gehörige Wurzel von (1), die beiden Äste (2), (3) schneiden sich in (x_0/y_0) oder berühren einander dort (Fig. 82a) und b)); die erste Erscheinung bezeichnet man als Selbstdurchschnitt oder *Knotenpunkt*, die zweite als *Selbstberührung* des ganzen durch (1) dargestellten Gebildes.

Bedeutet

$$y = \varphi(x)$$

einen Zweig, welcher beispielsweise in dem Intervalle $(-\infty, x_0)$ komplexe und in dem Intervalle $(x_0, +\infty)$ reelle Werte von y gibt, also nur in dem letzteren Intervalle reell ist, so gehört zu ihm notwendig ein anderer Zweig

$$y = \psi(x)$$

mit denselben Reellitätsverhältnissen, weil in einer Gleichung mit reellen Koeffizienten komplexe Wurzeln immer paarweise vorkommen; und da die Paare konjugiert sind, so haben $\varphi(x)$, $\psi(x)$ in dem Intervalle $(-\infty, x_0)$ die Formen

$$\omega_1(x) + i\omega_2(x)$$


$$\omega_1(x) - i\omega_2(x),$$

wobei $\omega_1(x)$, $\omega_2(x)$ stetige reelle Funktionen bedeuten; an der Stelle x_0 werden beide Funktionen reell in der Weise, daß $\omega_2(x_0) = 0$ wird; in demselben Augenblicke wird

$$y_0 = \varphi(x_0) = \psi(x_0) = \omega_1(x_0),$$


so daß die reellen Teile der Zweige im Punkte x_0/y_0 zugleich beginnen. Dies kann, wie in Fig. 83, so geschehen, daß der Punkt M_0 den Charakter eines gewöhnlichen Punktes aufweist,

Fig. 82.



und er würde sich als solcher auch analytisch zu erkennen geben, wenn man in der Gleichung (1) x statt y als abhängige Variable auffaßte. Schließen sich die reellen Teile der Zweige in anderer Weise zusammen, so geschieht dies immer so, daß sie hier eine und dieselbe Tangente haben (Fig. 84 a) und b)); die Erscheinung, welche dadurch zustande kommt, heißt *Spitze**) der Kurve (1), und zwar *Spitze erster Art*, wenn sie die Form a) hat, und *Spitze zweiter Art* oder *Schnabelspitze* im Falle b).

Daß die reellen Teile der Zweige nicht mit verschiedenen Tangenten von M_0 ausgehen können, läßt sich folgendermaßen



erkennen. Es ist eben gezeigt worden, daß bei einer algebraischen Kurve mit mehrwertigem y dort, wo ein reeller Ast beginnt, notwendig zugleich ein *zweiter* beginnen müsse. Differenziert man die Gleichung (1) nach x , wodurch

$$f'_x + f'_y y' = 0$$

erhalten wird, und eliminiert man zwischen dieser Gleichung und (1) y , so ergibt sich wieder eine algebraische Gleichung:

$$F(x, y') = 0,$$

die den Verlauf der Tangente bei (1) darstellt; faßt man hier y' als Ordinate auf, so kommt man wieder zu einer algebraischen Kurve. Dem Zweige φ (Fig. 84) entspricht ein Zweig φ' dieser neuen Kurve und ebenso dem Zweige ψ ein Zweig ψ' , und hätten φ, ψ in M_0 verschiedene Tangenten, so begännen die zugehörigen Zweige von $F(x, y') = 0$ bei x_0 an verschiedenen Stellen wie in Fig. 85, eine Erscheinung, die oben bei einer algebraischen Kurve als unmöglich erkannt wurde.

*) Für die Spitze sind auch die Benennungen *Rückkehrpunkt* und *stationärer Punkt* gebräuchlich, von der geometrischen Anschauung hergeleitet, daß ein die Kurve stetig durchlaufender Punkt dort angekommen umkehren, vorher einen Augenblick stillstehen muß.

Ist der Zweig

$$y = \varphi(x)$$

im ganzen Verlaufe imaginär, hat also $\varphi(x)$ beständig die Form:

$$u(x) + iv(x),$$

- wobei $u(x)$, $v(x)$ reelle Funktionen bedeuten, so gehört zu ihm aus bereits angeführten Gründen ein zweiter imaginärer Zweig

$$y = \psi(x)$$

derart, daß $\psi(x)$ die Form

$$u(x) - iv(x)$$

hat, so daß die zu einem speziellen Werte von x gehörigen Werte von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ jedesmal konjugiert komplex sind. Hat nun die Gleichung

$$v(x) = 0$$

reelle Wurzeln und ist x_0 eine solche, so wird für sie sowohl $\varphi(x)$ wie $\psi(x)$ reell und überdies

$$\varphi(x_0) = \psi(x_0) = u(x_0) = y_0,$$

so daß die imaginären Zweige den vereinzelt *reellen* Punkt x_0/y_0 gemein haben; ein solcher Punkt wird als *isolierter* oder *konjugierter Punkt*, auch als Einsiedlerpunkt der Kurve (1) bezeichnet.

Damit sind die einfachsten besonderen Erscheinungen angedeutet, welche bei algebraischen Kurven auftreten können. Man gibt den Punkten, welche hier als Knotenpunkt (oder Selbstberührungspunkt), Spitze und isolierter Punkt*) bezeichnet worden sind, den gemeinsamen Namen *singuläre Punkte**)*, welchen Namen alle Punkte erhalten, in welchen eine Kurve ein anderes Verhalten zeigt als das bei dem gewöhnlichen Punkte beschriebene.

Knotenpunkte und Spitzen treten auch bei transzendenten Kurven auf.

*) Man zählt mitunter auch den Wendepunkt zu den singulären Punkten.

**) Nach *M. Cantors* Vorles. über Gesch. d. Mathematik III (1901) p. 795, kommt diese Bezeichnung vermutlich zum ersten Male in einem aus 1740 stammenden Werke von *J. P. de Gua de Malves* vor.

165. Analytische Charakteristik der singulären Punkte. Um die Natur eines Punktes x_0/y_0 , welcher dem durch (1) dargestellten Gebilde angehört, festzustellen, schlagen wir folgenden Weg ein.

Durch Translation des Koordinatensystems werde die Gleichung (1) derart transformiert, daß der Punkt x_0/y_0 Ursprung wird; die bezüglichen Transformationsgleichungen lauten:

$$x = x_0 + \xi \quad y = y_0 + \eta$$

und die transformierte Gleichung (100, (41)):

$$f(x_0 + \xi, y_0 + \eta) = f(x_0, y_0) + f'_x \xi + f'_y \eta + \frac{1}{2} (f''_{xx} \xi^2 + 2f''_{xy} \xi \eta + f''_{yy} \eta^2) + \dots = 0,$$

oder aber, weil $f(x_0, y_0) = 0$ ist:

$$(4) \quad f'_x \xi + f'_y \eta + \frac{1}{2} (f''_{xx} \xi^2 + 2f''_{xy} \xi \eta + f''_{yy} \eta^2) + \dots = 0.$$

Die Abszissen der Schnittpunkte, welche die durch den neuen Ursprung, also durch den betrachteten Punkt M_0 der Kurve, gelegte Gerade

$$(5) \quad \eta = t\xi$$

mit der Kurve bestimmt, ergeben sich aus der Gleichung

$$(6) \quad (f'_x + tf'_y)\xi + \frac{1}{2} (f''_{xx} + 2f''_{xy}t + f''_{yy}t^2)\xi^2 + \dots = 0.$$

Sind f'_x, f'_y nicht gleichzeitig Null, so hat diese Gleichung $\xi = 0$ zur einfachen Wurzel, die Gerade (5) also mit der Kurve in M_0 im allgemeinen nur einen Punkt gemein, und man bezeichnet daher M_0 als *einfachen Punkt* der Kurve. Nur wenn man den Richtungskoeffizienten t so bestimmt, daß

$$(7) \quad f'_x + f'_y t = 0$$

wird, hat die Gerade (5) in M_0 mit der Kurve mindestens zwei vereinigt liegende Punkte gemein und ist Tangente der Kurve in diesem Punkte; der Punkt ist damit zugleich als gewöhnlicher Punkt gekennzeichnet. Aus (7) ergibt sich, wenn $f'_y \neq 0$,

$$t = -\frac{f'_x}{f'_y}$$

und hiermit

$$(8) \quad f'_x \xi + f'_y \eta = 0$$

als Gleichung der Tangente (128, (8)). Mit Rücksicht auf (4) kann also der Satz ausgesprochen werden: *Geht eine algebraische Kurve durch den Ursprung des Koordinatensystems und ist dieser ein einfacher Punkt derselben, so erhält man durch Nullsetzen der Gliedergruppe erster Ordnung unmittelbar die Gleichung der Tangente im Ursprung.*

Wäre $f'_y = 0$, dagegen $f'_x \neq 0$, so ersetze man t durch $\frac{1}{\tau}$ und findet $\tau = 0$, so daß $\xi = 0$ oder die Ordinatenachse zur Tangente wird.

Wir gehen nun zu dem Falle über, wo gleichzeitig

$$(9) \quad f'_x = 0 \quad f'_y = 0$$

ist; wenn nicht auch alle drei Differentialquotienten zweiter Ordnung zugleich verschwinden, so beginnt nunmehr die Gleichung (6) mit einem Gliede zweiten Grades in bezug auf ξ und lautet allgemein:

$$(10) \quad \left\{ \begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 2} (f''_{xx} + 2f''_{xy}t + f''_{yy}t^2) \xi^2 \\ & + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} (f'''_{xx} + 3f'''_{xy}t + 3f'''_{yy}t^2 + f'''_{yyy}t^3) \xi^3 + \dots = 0; \end{aligned} \right.$$

sie hat $\xi = 0$ zur zweifachen Wurzel, die Gerade (5) schneidet also die Kurve im Punkte M_0 zweifach, mit anderen Worten: sie schneidet dort zwei — reelle oder imaginäre — Äste der Kurve, und deshalb wird nun M_0 ein *zweifacher* oder ein *Doppelpunkt* der letzteren genannt. Für diejenigen Geraden, deren Richtungskoeffizient die Bedingung

$$(11) \quad f''_{xx} + 2f''_{xy}t + f''_{yy}t^2 = 0$$

erfüllt, fallen in M_0 mehr als zwei Punkte der Kurve zusammen, diese Geraden sind die Tangenten an die durch M_0 verlaufenden Kurvenzweige.

In betreff der Wurzeln der Gleichung (11) sind aber mehrere Fälle zu unterscheiden.

a) Ist die Diskriminante

$$f''_{xx}f''_{yy} - f''_{xy}^2 < 0,$$

so hat (11) zwei verschiedene reelle Lösungen, durch M_0 gehen zwei reelle Zweige mit verschiedenen Tangenten, M_0 ist also ein *Knotenpunkt* (Fig. 82, a).

b) Ist die Diskriminante

$$f''_{x_0} f''_{y_0} - f''_{x_0 y_0}^2 = 0,$$

so besitzt (11) zwei gleiche reelle Lösungen, die beiden durch M_0 laufenden Kurvenzweige haben hier eine gemeinsame Tangente; dies kann verschiedene Erscheinungen an der Kurve bedingen: einen *Selbstberührungspunkt* (Fig. 82, b)) oder eine *Spitze* (Fig. 84) oder einen *isolierten Punkt*.*) Ob das eine oder das andere zutrifft, muß eine weitere Untersuchung feststellen. Gibt es zu beiden Seiten von M_0 reelle Werte von x und y , so ist Selbstberührung vorhanden; sind nur zu einer Seite von M_0 reelle y oder reelle x vorhanden, so hat man es mit einer Spitze zu tun — ob mit einer der ersten oder der zweiten Art, darüber entscheidet die Richtung der Konkavität der beiden Äste in M_0 (146) —; gibt es in der Umgebung von M_0 auf keiner Seite reelle y , so ist M_0 ein isolierter Punkt.

c) Ist endlich die Diskriminante

$$f''_{x_0} f''_{y_0} - f''_{x_0 y_0}^2 > 0,$$

so hat (11) imaginäre Wurzeln und es gehen durch M_0 zwei imaginäre Kurvenzweige, M_0 ist also ein *isolierter Punkt*.

An dieser Stelle genüge der Hinweis auf die Analogie zwischen den Kriterien eines Doppelpunktes der Kurve $f(x, y) = 0$

*) Daß in einem isolierten Punkte eine reelle Tangente existieren kann, ist analytisch so zu erkennen. Sind

$$y = u(x) + iv(x)$$

$$y = u(x) - iv(x)$$

zwei konjugiert imaginäre Zweige, so ist für einen isolierten Punkt x_0, y_0 , der aus diesen Zweigen sich ergibt,

$$v(x_0) = 0;$$

die Tangenten an diesen Punkt im neuen Koordinatensysteme haben die Gleichungen

$$\eta = (u'(x_0) + iv'(x_0))\xi$$

$$\eta = (u'(x_0) - iv'(x_0))\xi;$$

im allgemeinen sind diese Tangenten imaginär: sie werden reell und fallen gleichzeitig zusammen, wenn

$$v'(x_0) = 0,$$

wenn also x_0 eine mehrfache Wurzel der Gleichung $v(x) = 0$ ist.

und denjenigen für einen extremen Wert der Funktion $f(x, y)$ (121); später wird diese Analogie eine geometrische Deutung erfahren.

Ersetzt man in (11) t durch den Wert aus (5), so ergibt sich für das System der beiden Tangenten im Punkte M_0 die Gleichung:

$$(12) \quad f''_{x_0} \xi^2 + 2f''_{x_0 y_0} \xi \eta + f''_{y_0} \eta^2 = 0.$$

Würden im Punkte M_0 auch die drei Differentialquotienten zweiter Ordnung, nicht aber auch alle vier Differentialquotienten dritter Ordnung verschwinden, so ergäbe eine der obigen analoge Erwägung, daß der Punkt M_0 ein *dreifacher* Punkt der Kurve sei und daß das System der Tangenten in diesem Punkte die Gleichung

$$(13) \quad f'''_{x_0} \xi^3 + 3f'''_{x_0 y_0} \xi^2 \eta + 3f'''_{x_0 y_0^2} \xi \eta^2 + f'''_{y_0^3} \eta^3 = 0$$

habe. Bezüglich dieser Tangenten gibt die Diskussion der kubischen Gleichung (13) oder der Gleichung

$$f'''_{x_0} + 3f'''_{x_0 y_0} t + 3f'''_{x_0 y_0^2} t^2 + f'''_{y_0^3} t^3 = 0$$

Aufschluß, welche die Richtungskoeffizienten bestimmt; der größeren Zahl zu unterscheidender Fälle entspricht eine größere Mannigfaltigkeit von Formen dreifacher Punkte.

Aus der geführten Untersuchung sind folgende Ergebnisse zusammenzufassen:

Die singulären Punkte einer Kurve $f(x, y) = 0$ befriedigen außer der Gleichung der Kurve selbst auch noch die Gleichungen $f'_x = 0$ und $f'_y = 0$.

Geht eine algebraische Kurve durch den Ursprung, so belehrt der Grad der Gliedergruppe niedrigster Dimension darüber, ein wievielfacher Punkt der Kurve der Ursprung ist; diese Gliedergruppe gleich Null gesetzt bestimmt das System der Tangenten im Ursprung.

Das erläuterte Verfahren ist auch auf transzendente Kurven anwendbar, sofern die Funktion $f(x, y)$, welche die linke Seite der auf Null reduzierten Kurvengleichung bildet, in einem Punkte x_0/y_0 , welcher den Gleichungen $f = 0$, $f'_x = 0$, $f'_y = 0$ zugleich genügt, die Taylorsche Entwicklung zuläßt.

Ist eine Kurve mit Hilfe eines Parameters u dargestellt, also in der Form

$$x = \varphi(u) \quad y = \psi(u)$$

gegeben, dann hat die Prüfung auf singuläre Punkte mit der Aufsuchung solcher Punkte x, y zu beginnen, welche mehreren verschiedenen Werten des Parameters u zugleich entsprechen; das weitere entscheidet die Untersuchung des Quotienten $\frac{\varphi'(u)}{\psi'(u)}$, welcher die Richtung der Tangente bestimmt, in dem betreffenden Punkte. (Vgl. 129, 1) bis 3), 132, 2).)

166. Beispiele. 1) Aus der Gleichung des Cartesischen Blattes

$$x^3 - 3axy + y^3 = 0$$

ist unmittelbar zu entnehmen, daß der Ursprung Doppelpunkt ist mit den Tangenten $x = 0, y = 0$; die Kurve bildet also dort einen Knoten, der die Koordinatenachsen zu Tangenten hat. (Vgl. 129, 3) und Fig. 35; die drei Zweige der Kurve sind AOB, OCB, OD ; der erste trifft mit dem zweiten in B , der zweite mit dem dritten in O zu einem gewöhnlichen Punkte zusammen.)

Daß die Kurve außerdem keinen anderen singulären Punkt hat, geht daraus hervor, daß die Gleichungen

$$x^3 - 3axy + y^3 = 0 \quad 3x^2 - 3ay = 0 \quad -3ax + 3y^2 = 0$$

außer $0/0$ keine andere gemeinsame Lösung besitzen.

2) Die Lemniskate

$$(x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2) = 0$$

hat den Ursprung zum Doppelpunkt, und die Tangenten dasselbst sind durch

$$x^2 - y^2 = 0$$

bestimmt; sie sind reell und einzeln durch

$$x - y = 0 \quad x + y = 0$$

dargestellt; folglich ist der Ursprung Knotenpunkt und die Tangenten in ihm halbieren die Winkel der Koordinatenachsen (vgl. 132, 2) und Fig. 39).

3) Die Zissoide

$$(x^2 + y^2)x = 2ay^2 \quad (a > 0)$$

hat im Ursprung einen Doppelpunkt, die Tangenten in demselben sind durch

$$y^2 = 0$$

bestimmt, fallen also beide mit der Abszissenachse zusammen; da nur zu positiven Werten von x reelle Werte von y gehören, so ist der Doppelpunkt eine Spitze, und zwar eine der ersten Art, weil vermöge der Symmetrie der Kurve in bezug auf die Abszissenachse die beiden Äste zu verschiedenen Seiten der Tangente im Rückkehrpunkte liegen (vgl. 129, 2) und Fig. 34).

4) Die Kurve fünfter Ordnung, welche durch die Gleichung

$$(y - x^3)^2 - x^5 = 0$$

dargestellt ist, hat im Ursprung einen Doppelpunkt; denn nach Entwicklung der Potenz ist y^2 das Glied niedrigster Dimension. Die Gleichung


$$y^2 = 0$$

bestimmt die Tangenten, die beide mit der Abszissenachse zusammenfallen. Man erkennt unmittelbar, daß zu negativen x kein reelles y gehört, wohl aber zu allen positiven, infolgedessen ist der Doppelpunkt eine Spitze. Die Auflösung

$$y = x^3(1 \pm \sqrt{x})$$

läßt erkennen, daß es eine Spitze der zweiten Art ist; denn solange $0 < x < 1$, sind beide Werte von y positiv, liegen also beide Äste der Kurve über der Abszissenachse; erst bei $x = 1$ tritt der zum unteren Zeichen gehörige Ast unter die Abszissenachse, wo er dann verbleibt, während der andere beständig über ihr liegt.

Der untere Ast hat an der Stelle $x = \frac{64}{225}$ einen Wendepunkt und erreicht bei $x = \frac{16}{25}$ seine größte Ordinate $y = \frac{256}{3125}$ (Fig. 86).



5) Die Fußpunktkurve (132) der Ellipse $a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$ in bezug auf den Mittelpunkt als Pol ist eine Kurve vierter Ordnung mit der Gleichung:

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2.$$

Der Ursprung ist ein Doppelpunkt der Kurve und die Tangenten in ihm sind durch

$$a^2x^2 + b^2y^2 = 0$$

bestimmt; da die linke Seite eine Zerlegung in reelle lineare Faktoren nicht zuläßt, so ist der Doppelpunkt ein isolierter Punkt.

Die Entstehung dieses Punktes ist, solange man bloß die reellen Tangenten der Ellipse im Auge behält, geometrisch nicht zu erklären; nimmt man aber die imaginären Asymptoten der Ellipse als Tangenten in den unendlich fernen imaginären Punkten hinzu, so klärt sich das Auftreten des isolierten Punktes auf.*)

6) Die Kurve fünfter Ordnung

$$2y^5 - 5xy^3 + x^5 = 0$$

hat, da das Glied niedrigster Dimension vom dritten Grade ist, im Ursprung einen dreifachen Punkt; die Tangenten in demselben sind durch

$$xy^2 = 0$$

bestimmt, eine davon ist die Ordinatenachse, die zwei übrigen fallen in die Abszissenachse.

Über die Gestaltung der Kurve gibt die Einführung des Parameters u mittels der Gleichung

$$y = ux$$

*) Wenn man die in 148 zur Bestimmung der Asymptoten einer algebraischen Kurve vorgeschriebene Rechnung durchführt, so erhält man für die Ellipse die beiden imaginären Asymptoten

$$y = \pm \frac{b}{a} ix$$

und für die durch den Ursprung zu ihnen gelegten, ebenfalls imaginären Lote die korrespondierenden Gleichungen

$$y = \pm \frac{a}{b} ix;$$

in der Tat ist nun

$$x = 0, \quad y = 0$$

der gemeinsame Fußpunkt dieser Lote und daher ein Punkt der Kurve.


bequemsten Aufschluß; man erhält so die Darstellung:

$$x^2 = \frac{5u^2}{2u^5 + 1}$$

$$y^2 = \frac{5u^4}{2u^5 + 1},$$

aus welcher die zentrale Symmetrie der Kurve hervorgeht. In dem Intervalle $(0, +\infty)$ von u bleiben x, y endlich und ihre Werte beginnen und enden mit $0/0$; die Kurve beschreibt also im ersten und dritten Quadranten je eine Schleife. In dem Intervalle

$(0, -\sqrt[5]{\frac{1}{2}})$ sind x, y reell, beginnen mit $0/0$ und enden mit unendlichen Werten; die Kurve hat die Gerade $y = -\sqrt[5]{\frac{1}{2}} x$, welche mit der positiven Abszissenachse den negativen Winkel von $41^\circ 2, 4' \dots$ einschließt, zur Asymptote. In dem Intervalle $(-\sqrt[5]{\frac{1}{2}}, -\infty)$ bleiben x, y imaginär (Fig. 87).



7) Von den Zykloiden (130, a)

$$x = au - b \sin u$$

$$y = a - b \cos u$$

zeigt die gemeine, $b = a$, überall dort, wo sie die Abszissenachse trifft, also bei $u = 2\pi$ ($x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), Spitzen, denn für diese Stellen wird

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin u}{1 - \cos u}$$


unbestimmt und wächst bei Annäherung an dieselben ins Unendliche $(+\infty, -\infty)$; es treffen hier die Äste mit gemeinsamer, zur Abszissenachse normaler Tangente zusammen.

Bei der verkürzten Zykloide, $b > a$, treten Knotenpunkte auf, deren Menge und Lage von dem Größenverhältnis $b : a$ abhängt. Unter allen Umständen bilden sich Knotenpunkte an den Stellen $u = 2\pi$ aus, und es genügt, den ersten davon

zu bestimmen; sein Parameter ergibt sich als die von Null verschiedene kleinste Lösung der Gleichung

$$au - b \sin u = 0,$$

die geometrisch durch den Schnitt der Sinuslinie mit dem Strahl vom Richtungskoeffizienten $\frac{a}{b}$, Fig. 88, bestimmt ist (in der Figur ist das Verhältnis $\frac{a}{b}$ so groß angenommen, daß der



Strahl nach rechts hin keinen weiteren Schnittpunkt mit der Sinuslinie ergibt). Hat man den Wert von u durch ein Näherungsverfahren bestimmt, so gibt seine Einsetzung in y

die Ordinate des Knotenpunktes und die Einsetzung in

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b \sin u}{a - b \cos u} \quad \text{und} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-b \sin u}{a - b \cos u}$$

die Richtungskoeffizienten der beiden Tangenten.

Die verlängerte Zykloide weist keine singulären Punkte, hingegen Wendepunkte auf (146, 5)).

8) Man prüfe folgende Kurven auf singuläre Punkte:

$$\alpha) (x^2 + y^2)(x - a)^2 - b^2 x^2 = 0$$

$$\beta) x^4 - 2ay^3 - 2a^2 x^2 + a^4 = 0$$

$$\gamma) ay^2 = (x - a)^2(x - b)$$

$$\delta) x^4 - 2ax^2y - axy^2 + a^2y^2 = 0.$$

167. Endpunkt und Eckpunkt. Bei transzendenten Kurven können neben den bisher besprochenen noch andere Singularitäten auftreten, deren algebraische Kurven nicht fähig sind. Erscheinungen solcher Art sind der *Endpunkt* und die *Ecke*.

Als Endpunkt bezeichnet man einen Punkt, in welchem die Kurve abbricht. Bei einer algebraischen Kurve tritt ein solcher Punkt nie auf, weil dort, wo ein Zweig endet, notwendig ein zweiter enden muß, wodurch eine Spitze sich ausbildet.

Als Eckpunkt bezeichnet man einen Punkt, in welchem zwei Äste enden und voneinander verschiedene Tangenten selbst besitzen. Der analytische Grund, weshalb diese Erschei-

nung bei einer algebraischen Kurve nicht auftreten kann, ist nach den Ausführungen in 164 der nämliche, der für die Unmöglichkeit eines Endpunktes bei einer solchen Kurve erkannt worden ist.

In einem Endpunkte kann nur von einem einseitigen Differentialquotienten der Ordinate die Rede sein, in einem Eckpunkte muß zwischen dem vorwärts und rückwärts genommenen Differentialquotienten unterschieden werden (20).

Beispiele. 1) Bei der transzendenten Kurve

$$y = e^{\frac{1}{x}}$$

ist die Ordinate im Ursprung nicht definiert; da jedoch

$$\lim_{x=-0} e^{\frac{1}{x}} = 0 \qquad \lim_{x=+0} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

ist, so nimmt man an, der zu negativen Abszissen gehörige Kurvenast entspringe im Ursprung; der zu positiven Abszissen gehörige Ast dagegen hat die Ordinatenachse zur Asymptote. Hiernach hat der erstgenannte Ast im Ursprung einen Endpunkt; die Tangente in diesem Punkte ergibt sich mittels

$$y' = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}};$$

da (110) $\lim_{x=-0} y' = 0$, so fällt sie mit der Abszissenachse zusammen.

Weil ferner $\lim_{x=\pm\infty} y = 1$, so ist die Gerade $y = 1$ Asymptote für beide Kurvenäste.

Der linke Ast hat, wie man aus

$$y'' = \frac{2x+1}{x^3} e^{\frac{1}{x}}$$

erkennt, an der Stelle $x = -\frac{1}{2}$ einen Wendepunkt (Fig. 89).



2) Bei der transzendenten Kurve

$$y = \frac{x}{1+e^x}$$

ist die Ordinate im Ursprung gleichfalls nicht definiert; es ist aber

$$\lim_{x=\pm 0} y = 0$$

und so nimmt man denn an, daß sowohl der Ast mit negativen, wie der mit positiven Abszissen im Ursprung beginnt.



Die Richtung der Tangenten an diese Äste ergibt sich ohne Zuhilfenahme des Differentialquotienten direkt durch Untersuchung von

$$\frac{y}{x} = \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}},$$

und da $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{y}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{y}{x} = 0$, so hat der erstgenannte Ast die Halbierungslinie des Winkels $X'OY'$, der andere die Abszissenachse zur Tangente; die Kurve bildet sonach im Ursprung eine Ecke mit dem stumpfen Winkel von 135° (Fig. 90).

§ 8. Einhüllende Kurven.

168. Begriff und analytische Bestimmung der Einhüllenden. Es sei $f(x, y, u)$ eine eindeutige stetige Funktion der Argumente x, y, u ; die Gleichung

$$(1) \quad f(x, y, u) = 0$$

stellt dann ein einfach unendliches System, eine Schar ebener Kurven oder ein *Kurvenkontinuum* dar; mit der Festsetzung eines besonderen Wertes für u wird ein Element des Kontinuums, d. i. eine einzelne Kurve der Schar herausgehoben.

Wir nehmen zunächst an, die Gleichung (1) sei algebraisch sowohl in bezug auf x, y wie in bezug auf den Parameter u und bezüglich des letzteren vom Grade p . Erteilt man x, y besondere Werte x_0, y_0 und löst die Gleichung

$$f(x_0, y_0, u) = 0$$

nach u auf, so erhält man die Parameter jener Kurven des

Systems, welche durch den Punkt x_0/y_0 gehen; ist die Zahl der reellen unter diesen Kurven $q (\leq p)$, so sagt man, die Ebene werde durch das Kurvensystem im Punkte x_0/y_0 q -fach bedeckt. Ist die Bedeckung in allen Punkten der Ebene gleich vielfältig, so bedeckt das Kurvensystem die Ebene gleichförmig.

Wenn dagegen die Multiplizität der Bedeckung wechselt, so teilt sich die Ebene in Regionen, die durch Kurven voneinander geschieden werden; und diese Kurven sind es, welche uns nun beschäftigen werden.

Bei dem Übergange von einer Region zur benachbarten ändert sich die Zahl der reellen Wurzeln u , und da bei einer algebraischen Gleichung mit reellen Koeffizienten immer gleichzeitig zwei Wurzeln aus dem reellen ins komplexe Gebiet oder umgekehrt übergehen und im Augenblicke des Überganges reell und gleich werden, so unterscheiden sich die Multiplizitätsfaktoren der Bedeckung zweier benachbarten Regionen um eine gerade Zahl und an der Begrenzung der Regionen werden mindestens zwei Wurzeln der Gleichung (1) einander gleich.

Daraus geht schon hervor, daß man, um die Grenzlinien der Gebiete zu erhalten, nur die Bedingung aufzustellen hat, unter welcher die Gleichung (1) nach u aufgelöst mehrfache Wurzeln ergibt; diese Bedingung erhält man aber, wenn man zwischen den beiden Gleichungen

$$(2) \quad \begin{cases} f(x, y, u) = 0 \\ f'_u(x, y, u) = 0 \end{cases}$$

u eliminiert; das Resultat dieser Elimination wird die Diskriminante der Gleichung (1) in bezug auf u genannt und soll symbolisch durch

$$(3) \quad \text{Dskr}_u f(x, y, u) = 0$$

dargestellt werden. Man kann sich dieses Eliminationsresultat auch durch die erste der beiden Gleichungen (2) vertreten denken, wenn darin für u jene Funktion von x, y gesetzt wird, welche die Auflösung der zweiten Gleichung liefert.

Im Sinne dieser Ableitung ist die Gleichung (3) der Ort solcher Punkte der Ebene, für welche die Gleichung (1) eine mehrfache Wurzel für u ergibt. Zu diesen Punkten gehören aber auch die mehrfachen Punkte der Kurven des Systems;

denn da durch einen solchen Punkt eine und dieselbe Kurve des Systems mehrere Male hindurchgeht, so gibt für ihn die Gleichung (1) notwendig mehrere gleiche Lösungen in bezug auf u .

Wenn also die Kurven des Systems mehrfache Punkte besitzen, so ist der geometrische Ort dieser Punkte mit in dem geometrischen Gebilde enthalten, welches die Gleichung (3) darstellt, unter Umständen bedeutet die Gleichung (3) diesen Ort allein.

Um die volle Bedeutung dieser Gleichung, damit zugleich ihren Inhalt für den Fall kennen zu lernen, wenn die Kurven des Systems singuläre Punkte nicht aufweisen, gehen wir auf den geometrischen Sinn der Gleichungen (2) näher ein.

Bei feststehendem u stellt die erste eine spezielle Kurve des Systems vor. Die linke Seite der zweiten Gleichung ist der Grenzwert des Quotienten

$$\frac{f(x, y, u + h) - f(x, y, u)}{h}$$

für $\lim h = 0$; nun bestimmen die beiden Gleichungen

$$(4) \quad \begin{cases} f(x, y, u) = 0 \\ f(x, y, u + h) = 0 \end{cases}$$

zusammen die Schnittpunkte der Kurve u mit jener $u + h$, und

$$(5) \quad f(x, y, u + h) - f(x, y, u) = 0$$

ist die Gleichung einer dritten Kurve, welche auch durch diese Schnittpunkte geht und daher, soweit es sich um diese handelt, statt der zweiten Gleichung in (4) genommen werden kann; vermöge 38 aber kann (5) weiter ersetzt werden durch

$$hf'_u(x, y, u + \theta h) = 0$$

oder schließlich, weil $h \neq 0$, durch

$$(5^*) \quad f'_u(x, y, u + \theta h) = 0,$$

wobei θ einen positiven echten Bruch bedeutet. Demnach sind die Schnittpunkte der beiden Kurven (4) des Systems durch das Gleichungspaar

$$\begin{aligned} f(x, y, u) &= 0 \\ f'_u(x, y, u + \theta h) &= 0 \end{aligned}$$

bestimmt. Hält man die erste Kurve fest und läßt die zweite sich ihr unaufhörlich nähern, indem man h zur Grenze Null

führt, so bewegen sich die Schnittpunkte auf der ersten Kurve im allgemeinen gegen gewisse Grenzlagen hin, und diese *Grenspunkte* oder *letzten Schnittpunkte* auf der Kurve u sind durch die Gleichungen

$$f(x, y, u) = 0$$

$$f'_u(x, y, u) = 0$$

bestimmt. Der Ort dieser Grenzpunkte, durch diese selben Gleichungen, jedoch bei variablem u dargestellt, ist eine Kurve, welche man als *Einhüllende*, *Umhüllungslinie* oder *Envelope**) des Kurvensystems (1) bezeichnet, während man die Kurven dieses Systems die *Eingehüllten* nennt. Besteht die Kurvenschar, wie dies bei kinematischen Problemen häufig vorkommt, aus den verschiedenen Lagen einer bewegten, an sich starren Linie, so pflegt man die Einhüllende auch mit dem Namen *Hüllbahn* zu belegen.

Damit ist der volle Inhalt der Gleichung (3), wenn sie ein geometrisches Gebilde vertritt, erkannt: dieses Gebilde setzt sich zusammen aus dem Orte mehrfacher Punkte der Kurven des Systems und aus ihrer Einhüllenden, oder es bedeutet auch nur das eine oder nur das andere. Die Entscheidung darüber, welcher von diesen Fällen zutrifft, wird sich aus einem Satze des nächsten Artikels ergeben.

Vorher mögen noch einige Bemerkungen hinzugefügt werden.

Die Ergebnisse beschränken sich nicht nur auf den Fall algebraischer Gleichungen, sie gelten, sobald $f(x, y, u)$ und die in Betracht gekommenen Ableitungen dieser Funktion stetig sind in einem Bereiche, welchem die Punkte der Kurven angehören.

Dem Sinne der Herleitung gemäß existiert eine Kurve (3) nur dann, wenn die Gleichung (1) in bezug auf den Parameter u zum mindesten vom zweiten Grade ist, die Ebene also durch die Kurvenschar im allgemeinen wenigstens doppelt bedeckt wird. Tritt u linear auf, so daß (1) die Gestalt erhält:

$$(6) \quad \varphi(x, y) + u\psi(x, y) = 0,$$

*) Von G. Monge herstammende Bezeichnung. Vgl. die durch Liouville 1850 besorgte Ausgabe seiner „Application de l'Analyse à la Géométrie“, p. 80.

so ergibt die Differentiation nach u

$$\psi(x, y) = 0$$

und dies hat weiter auch

$$\varphi(x, y) = 0$$

zur Folge; die beiden letzten Gleichungen bestimmen eine Anzahl von Punkten und durch diese Punkte gehen alle Kurven des Systems (6); ihr Komplex vertritt also das Gebilde (3). In der Tat bilden die Kurven (6) ein Büschel, das die Ebene durchaus einfach und nur in den genannten Punkten mehrfach, und zwar unendlich vielfach, bedeckt.

Haben die Kurven (1) keine singulären Punkte, so bedeutet (3) nur die Einhüllende. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (1) ein System von Geraden ist.

Man kann die Gleichungen (2) auch als analytische Bestimmung des Gebildes (3) ansehen, indem man x, y als Funktionen von u auffaßt; dann ergeben sich zur Bestimmung des Richtungskoeffizienten

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{du}}{\frac{dx}{du}}$$

der Tangente in einem Punkte dieses Gebildes die Gleichungen:

$$f'_u + f'_x \frac{dx}{du} + f'_y \frac{dy}{du} = 0$$

$$f''_{u^2} + f''_{ux} \frac{dx}{du} + f''_{uy} \frac{dy}{du} = 0,$$

deren erste sich vermöge der zweiten Gleichung in (2) reduziert, so daß man schließlich zu dem gedachten Zwecke die Gleichungen hat:

$$f'_x \frac{dx}{du} + f'_y \frac{dy}{du} = 0$$

$$f''_{ux} \frac{dx}{du} + f''_{uy} \frac{dy}{du} = -f''_{u^2};$$

diese aber geben eine Bestimmung für $\frac{dx}{du}$ und $\frac{dy}{du}$ nur dann, wenn die Determinante

$$(7) \quad \begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ f''_{ux} & f''_{uy} \end{vmatrix}$$

nicht identisch Null ist.

169. Beziehung zwischen der Einhüllenden und den Eingehüllten. Die Einhüllende steht zu den Eingehüllten in einer geometrischen Beziehung, welche sich in folgendem Satze ausspricht: *Die Einhüllende berührt jede Eingehüllte in deren Grenzpunkten.*

Für einen Punkt x/y der Kurve u des Systems ergibt sich der Richtungskoeffizient der Tangente aus der Gleichung

$$(8) \quad f'_x + f'_y \frac{dy}{dx} = 0;$$

ist der Punkt Grenzpunkt, so gehört er auch der Einhüllenden an, erfüllt die Gleichung $f'_u = 0$, und der Richtungskoeffizient der Tangente an die Einhüllende in ihm folgt nach der unter (3) gemachten Bemerkung aus der Gleichung

$$(9) \quad f'_x + f'_y \frac{dy}{dx} + f'_u \left(\frac{du}{dx} \right) = 0,$$

in welcher $\left(\frac{du}{dx} \right)$ den vollständigen Differentialquotienten von u , das jetzt Funktion von x, y ist, in bezug auf x bedeutet; vermöge $f'_u = 0$ aber stimmt die Gleichung (9) mit (8) und infolgedessen auch im Grenzpunkte x/y die Tangente an die Einhüllende mit der Tangente an die Eingehüllte überein.

Zwischen der Ortskurve der mehrfachen Punkte und den Kurven des Systems findet Berührung im allgemeinen nicht statt; nur ausnahmsweise kann jene Ortskurve auch Einhüllende sein.

Sind die Linien des Systems (1) Gerade, so bilden sie die Tangenten der Einhüllenden. Jede Kurve läßt hiernach zwei Auffassungen zu: als Ort von Punkten und als Einhüllende von Geraden. Die Evolute einer Kurve kann hiernach ebenso wohl als Ort ihrer Krümmungsmittelpunkte wie als Einhüllende ihrer Normalen erklärt werden (159).

170. Fall zweier voneinander abhängigen Parameter. Enthält die Gleichung des Kurvensystems zwei Parameter u, v , so daß sie die Form

$$(10) \quad f(x, y, u, v) = 0$$

hat, und besteht zwischen den Parametern eine Gleichung

$$(11) \quad \varphi(u, v) = 0,$$

so kann man, wenn es nicht leicht angeht, den einen Parameter mittels (11) durch den anderen auszudrücken und aus (10) zu beseitigen, den folgenden Weg einschlagen.

Man betrachte u als den unabhängigen Parameter; dann gibt die Differentiation von (10) nach ihm das Resultat:

$$f'_u + f'_v \frac{dv}{du} = 0;$$

der Differentialquotient $\frac{dv}{du}$ aber ergibt sich mittels (11) aus

$$\varphi'_u + \varphi'_v \frac{dv}{du} = 0;$$

vollzieht man seine Elimination, so kommt die Gleichung

$$(12) \quad \begin{vmatrix} f'_u & f'_v \\ \varphi'_u & \varphi'_v \end{vmatrix} = 0$$

zustande. Die Elimination von u, v zwischen den drei Gleichungen (10), (11), (12) liefert das durch (3) bezeichnete Gebilde.

Ähnlich hätte man vorzugehen, wenn n durch $n - 1$ Gleichungen verbundene Parameter vorhanden wären.

171. Beispiele. 1) Die Evolute der Parabel $y^2 = 2px$ als Einhüllende der Normalen ergibt sich in folgender Weise. Die Gleichung der Normale im Punkte x/y

$$\eta - y = -\frac{y}{p}(\xi - x),$$

auf die Form

$$y^3 - 2p(\xi - p)y - 2p^2\eta = 0$$

gebracht, enthält nur den Parameter y ; bildet man die Diskriminante in bezug auf diesen, so entsteht


$$-\frac{8p^3}{27}(\xi - p)^3 + p^4\eta^2 = 0$$

oder

$$\eta^2 = \frac{8}{27p}(\xi - p)^3$$

als Gleichung der Evolute (160, 1). Die Evolute teilt die Ebene in zwei Gebiete, wovon das eine, dem der Punkt P_2 (Fig. 91) angehört, durch die Normalen der Parabel dreifach, das andere,

Fig. 91.



in welchem P_1 liegt, einfach bedeckt wird; in den Punkten P der Evolute selbst findet dreifache Bedeckung statt, jedoch so, daß zwei der Normalen in eine zusammenfallen. Hierin liegt die Bedeutung der Evolute für das Normalenproblem der Grundkurve.

2) Eine Strecke AB (Fig. 92) von konstanter Länge a gleitet mit ihren Endpunkten auf den Schenkeln eines rechten Winkels; es ist ihre Einhüllende zu bestimmen.

Macht man die Schenkel des rechten Winkels zu Koordinatenachsen, bezeichnet mit p die Länge des aus O auf AB gefällten Lotes und mit u seinen Neigungswinkel gegen OX , so ist

$$x \cos u + y \sin u - p = 0$$

die Gleichung der Geraden AB ; da aber $p = OA \cos u = a \sin u \cos u$, so nimmt diese Gleichung, wenn alle Bedingungen der Aufgabe ausgedrückt werden, die endgültige Form

$$x \cos u + y \sin u - a \sin u \cos u = 0$$

an. Differenziert man sie in bezug auf den Parameter, so entsteht:

$$-x \sin u + y \cos u - a(\cos^2 u - \sin^2 u) = 0$$

und diese Gleichung stellt wieder eine Gerade dar, welche die AB im Grenzpunkte schneidet; schreibt man sie in der Gestalt

$$-(x - a \sin u) \sin u + (y - a \cos u) \cos u = 0,$$

so erkennt man, daß diese Gerade auf AB normal steht und durch den Punkt C geht, welcher die vierte Ecke des über AOB verzeichneten Rechtecks bildet.


Löst man die beiden vorhandenen Gleichungen nach x, y auf, so kommt

$$x = a \sin^3 u$$

$$y = a \cos^3 u;$$

zum Zwecke der Elimination von u erhebe man beides zur Potenz $\frac{2}{3}$ und bilde die Summe; dadurch entsteht

$$(13) \quad x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$$



als Gleichung der Einhüllenden. Diese ist eine Kurve sechster Ordnung und identisch mit der 130, 6) unter den algebraischen Hypozykloiden erkannten *Astroide*.

3) Aus den Punkten einer gegebenen Parabel als Mittelpunkten werden Kreise beschrieben, welche durch den Scheitel der Parabel gehen; es soll die Einhüllende dieser Kreise bestimmt werden.

Ist $y^2 + 4ax = 0$ die Gleichung der gegebenen Parabel und bezeichnet man die Koordinaten des Mittelpunktes eines der Kreise mit α, β , so lautet die Gleichung des Kreises

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y = 0,$$

wobei jedoch

$$\beta^2 + 4a\alpha = 0$$

sein muß. Differenziert man beide Gleichungen nach α , so entsteht:

$$x + y \frac{d\beta}{d\alpha} = 0$$

$$2\alpha + \beta \frac{d\beta}{d\alpha} = 0$$

und hieraus durch Elimination des Differentialquotienten:

$$\beta x - 2ay = 0;$$

die schließliche Elimination von α, β zwischen dieser und den beiden ersten Gleichungen gibt als Einhüllende:

$$(x^2 + y^2)x = 2ay^2,$$

also die Zissoide (129, 2) und 132, 1)); es ist leicht, den Zusammenhang dieser Zissoide mit derjenigen nachzuweisen, welche sich als Fußpunktkurve der nämlichen Parabel in bezug auf den Scheitel als Pol ergibt.

4) Über den zu einer festen Richtung parallelen Sehnen eines gegebenen Kreises als Durchmessern werden Kreise beschrieben; es ist ihre Einhüllende zu bestimmen.

Wählt man den Mittelpunkt des Kreises zum Ursprung und den zu den Sehnen konjugierten Durchmesser zur Abszissenachse, so hat ein Kreis des Systems die Gleichung

$$(x - \alpha)^2 + y^2 = \beta^2,$$

wobei

$$\alpha^2 + \beta^2 = r^2,$$

wenn r der Halbmesser des gegebenen Kreises ist. Eliminiert man aus der ersten Gleichung β mit Hilfe der zweiten, so lautet jene:

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x + 2\alpha^2 - r^2 = 0$$

und enthält nurmehr einen Parameter; differentiiert man nach diesem, so ergibt sich

$$x = 2\alpha;$$

dies ist die Gleichung einer zur Ordinatenachse parallelen Geraden, welche die Grenzpunkte aus dem Kreise, also seine Berührungspunkte mit der Einhüllenden ausschneidet; die Gleichung der letzteren erhält man durch Elimination von α zwischen den beiden letzten Gleichungen, sie lautet:

$$\frac{x^2}{2r^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1$$

und stellt eine Ellipse dar, welche den in der Ordinatenachse liegenden Durchmesser des gegebenen Kreises zur kleinen Achse und die Endpunkte des dazu senkrechten Durchmessers zu Brennpunkten hat.

Aber nicht alle Kreise des Systems stehen mit der Ellipse in reeller Berührung; eine solche findet vielmehr nur so lange statt, als die Gerade $x = 2\alpha$ den Kreis schneidet, solange also

$$2\alpha \leq \alpha + \beta$$

oder

$$\alpha^2 \leq r^2 - \alpha^2$$

oder schließlich

$$|\alpha| \leq \frac{r}{\sqrt{2}};$$

der kleinste wirklich berührende Kreis hat demnach die Mittelpunktsabszisse $\frac{r}{\sqrt{2}}$ und den Radius $\frac{r}{\sqrt{2}}$; alle kleineren Kreise haben mit der Ellipse nur ideelle (imaginäre) Doppelberührung; die kleinsten unter diesen sind die Nullkreise um die Brennpunkte.

5) Es ist die Einhüllende des Kurvensystems

$$x^2 + (x + a)(y - u)^2 - ax^2 = 0$$

zu bestimmen, wenn u der veränderliche Parameter ist.

Wenn man nach diesem differentiirt, so entsteht

$$(x + a)(y - u) = 0,$$

und wenn man mit Hilfe dessen u aus obiger Gleichung eliminiert, so ergibt sich das Gebilde

$$x^2(x - a) = 0,$$

das aus der doppelt gelegten Ordinatenachse und aus der Geraden

$$x = a$$

besteht.

Bezeichnet man die linke Seite der vorgelegten Gleichung mit $f(x, y, u)$, so ist

$$f'_u = -2(x + a)(y - u)$$

$$f'_x = 3x^2 + (y - u)^2 - 2ax$$

$$f'_y = 2(x + a)(y - u)$$

$$f''_{ux} = -2(y - u)$$

$$f''_{uy} = -2(x + a);$$

für $y = u$, $x = 0$ verschwindet die Determinante 168, (7) identisch, es verschwinden aber auch f'_x, f'_y ; daher ist die Ordinatenachse nicht Einhüllende, sondern Ortslinie von mehrfachen Punkten. Für $y = u$, $x = a$ hingegen sind f'_x, f'_y nicht gleichzeitig Null, die Gerade $x = a$ ist somit Einhüllende.

Die vorgelegte Gleichung stellt ein System von Strophoiden (129, 1) dar, welche sich nur durch ihre Lage gegen die Abscissenachse unterscheiden (Fig. 93); GG' ist ihre gemeinsame Asymptote, YY' der Ort ihrer Doppelpunkte und HH' die Einhüllende.




Fig. 93.

6) Die Einhüllende der Bahnen zu bestimmen, die ein Punkt beschreibt, wenn er von O aus unter verschiedenen Elevationen mit gegebener Geschwindigkeit v geworfen wird.

7) Es ist die Einhüllende der Kurven

$$\left(\frac{x}{a}\right)^m + \left(\frac{y}{b}\right)^m = 1$$

zu bestimmen, deren Parameter a, b der Gleichung genügen:

$$a^n + b^n = c^n.$$

Die Spezialisierung der Exponenten führt zu einer Reihe bemerkenswerter Einzelfälle, worunter sich auch anderweitig schon besprochene Linien befinden.

8) Die Einhüllende (Hüllbahn) eines festen Kreisdurchmessers beim Abrollen des Kreises auf einer festen Geraden zu ermitteln.

9) Zu den Tangenten (Normalen) der Parabel $y^2 = 2px$ werden in den Punkten, wo sie die Abszissenachse schneiden, Lote errichtet; es ist die Einhüllende dieser Lote zu suchen und zu konstruieren.


10) Aus den Punkten einer gegebenen Ellipse werden Kreise beschrieben, die durch deren Mittelpunkt gehen; es ist ihre Einhüllende zu bestimmen (vgl. 166, 5)).

172. Fortsetzung. Brennlinsen. Als physikalisch wichtige Anwendung der Theorie der Einhüllenden seien abschließend die *Brennlinsen* vorgeführt. Wenn ein ebenes Strahlensystem an einer gegebenen Grenzkurve nach den bekannten physikalischen Gesetzen reflektiert, beziehungsweise gebrochen wird, so besitzt das aus diesem Vorgange entstehende neue Strahlensystem im allgemeinen eine Einhüllende, und diese belegt man mit dem Namen der *Brennlinie* des betreffenden Vorgangs. Je nachdem es sich um Reflexion oder Refraktion handelt, unterscheidet man die Brenn- oder *kaustischen* Linien auch als *Kata-* und *Diakaustiken*.

An erster Stelle soll der einfachste Fall behandelt werden, der sich ergibt, wenn das Strahlensystem ein Strahlenbüschel und die Grenzlinie eine Gerade ist. Wählt man diese als Ordinatenachse und legt die Abszissenachse durch den Scheitel F des Büschels (Fig. 94), dessen Abstand von der Grenzlinie mit c bezeichnet werden möge, so hat ein Strahl FA , der unter dem Winkel α einfällt, nach der Reflexion den Neigungswinkel $\pi - \alpha$ gegen die Abszissenachse, und es lautet mit Benutzung der Abkürzung $\operatorname{tg} \alpha = u$ die Gleichung des reflektierten Strahls

$$y + u(x - c) = 0,$$

Fig. 94.



seine Einhüllende ist also nach der zu Gleichung (6), 168 gemachten Bemerkung durch die Gleichungen

$$x = c, \quad y = 0$$

bestimmt, d. h. *die reflektierten Strahlen gehen durch den Spiegel-punkt zu F in bezug auf die Grenzlinie YY'.*

Findet Brechung statt mit dem Brechungsexponenten n und heißt β der Brechungswinkel desselben Strahls FA , so gilt jedesmal die Beziehung

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n.$$

Die Gleichung des gebrochenen Strahls in der Hesseschen Normalform lautet:

$$x \cos \left(\frac{\pi}{2} + \beta \right) + y \sin \left(\frac{\pi}{2} + \beta \right) - c \operatorname{tg} \alpha \cos \beta = 0$$

und mit Rücksicht auf obige Gleichung ausgeführt:

$$-x \sin \beta + y \cos \beta - \frac{nc \sin \beta \cos \beta}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 \beta}} = 0.$$

Differentiiert man sie in bezug auf β , so entsteht

$$-x \cos \beta - y \sin \beta - \frac{nc(\cos^2 \beta - \sin^2 \beta + n^2 \sin^4 \beta)}{(1 - n^2 \sin^2 \beta)^{\frac{3}{2}}} = 0.$$

Durch Auflösung beider Gleichungen in bezug auf x, y ergibt sich

$$x = - \frac{nc \cos^3 \beta}{(1 - n^2 \sin^2 \beta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$y = \frac{nc(1 - n^2) \sin^3 \beta}{(1 - n^2 \sin^2 \beta)^{\frac{3}{2}}}$$

und hieraus folgt zunächst

$$\frac{x}{nc} = - \frac{\cos^3 \beta}{(1 - n^2 \sin^2 \beta)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\sqrt{1 - n^2} y}{nc} = \frac{(1 - n^2)^{\frac{3}{2}} \sin^3 \beta}{(1 - n^2 \sin^2 \beta)^{\frac{3}{2}}},$$

erhebt man beides auf die Potenz $\frac{2}{3}$, so findet sich durch Summierung als Gleichung der Einhüllenden:


$$\left(\frac{x}{nc} \right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{\sqrt{1 - n^2} y}{nc} \right)^{\frac{2}{3}} = 1.$$

Bei $n < 1$, also bei einer Brechung vom Lote, ist dies die Gleichung der Evolute einer gewissen Ellipse, zu der hiernach

die gebrochenen Strahlen normal sind; bei einer Brechung zum Lote, wobei $n > 1$, ist es die Evolutengleichung einer bestimmten Hyperbel, welche demnach die gebrochenen Strahlen rechtwinklig durchschneidet; in beiden Fällen ist der Scheitel F des ursprünglichen Strahlenbüschels ein Brennpunkt des betreffenden Kegelschnitts, und von diesem kommt jedesmal nur

Fig. 95.

Fig. 96.



ein Teil, hier der links von der Grenzlinie liegende, in Betracht. Die Figuren 95 und 96 bringen die Fälle $n = \frac{2}{3}$ und $n = \frac{3}{2}$ zur Anschauung.

Nun gehe das Strahlensystem, um das Problem allgemeiner zu fassen, rechtwinklig von einer gegebenen Kurve F aus und werde an einer ebenfalls gegebenen in derselben Ebene liegenden Kurve C reflektiert (Fig. 97), bzw. gebrochen (Fig. 98).

Betrachten wir zuerst den Fall der *Reflexion*. Um zu dem Strahl $A'A$ den reflektierten zu konstruieren, kann man so vorgehen, daß man aus A den Kreis K' verzeichnet, der F in A' berührt, auf diesem Kreise den Spiegelpunkt B zu A' in bezug auf die Tangente T zu C in A bestimmt, so ist damit ein Punkt gefunden, der mit A den reflektierten Strahl bestimmt. Zugleich sind aber A' und B die Grenzpunkte, die der Kreis K' mit dem benachbarten aus dem so konstruierten Kreissystem ergibt, also Punkte der Einhüllenden dieses Systems und die Brennnlinie die Evolute jenes Teils dieser Einhüllenden, der die Punkte B angehören. Es ergibt sich also zur Auf-

und somit ein Punkt der Einhüllenden der Kreisschar K'' . Dies ergibt sich aus folgender Hilfsbetrachtung, die zugleich den Fall des Strahlenbüschels erledigt, das an einer Geraden gebrochen wird.

Man denke sich aus den Punkten der Geraden YY' (Fig. 94a) zwei Scharen von Kreisen, K' und K'' , beschrieben, die erste mit der Gleichung

$$x^2 + (y - b)^2 = b^2 + c^2,$$

die zweite mit der Gleichung

$$x^2 + (y - b)^2 = \frac{b^2 + c^2}{n^2},$$

wobei c die konstante Strecke FO bedeutet und b variabel ist. Zur Bestimmung der Einhüllenden der zweiten Kreisschar bilde man durch Differentiation nach b die Gleichung

$$-(y - b) = \frac{b}{n^2},$$

so bestimmt dieselbe die Lage der Sehne, die die Grenzpunkte verbindet, und zwar ist

$$y = b - \frac{b}{n^2}$$


ihre Gleichung. Konstruktiv wird diese Sehne dadurch erhalten, daß man den in dem Lote $A''D$ zu YY' liegenden Punkt B' auf K' aus A nach B'' auf K'' projiziert und nun durch B'' das Lot $B''E$ zu YY' zieht. Denn es ist

$$\begin{aligned} OE &= OA - EA = OA - B''A \sin \beta = OA - \frac{FA}{n} \sin \beta \\ &= OA - \frac{OA}{n \sin \alpha} \sin \beta = b - \frac{b}{n^2}. \end{aligned}$$

In Fig. 98 vertritt T die Stelle von YY' und FA' die Stelle von A' .

Das Ergebnis der Untersuchung geht also dahin, daß die Brennnlinie des Vorgangs die Evolute eines Teiles der Einhüllenden jener Kreise ist, die aus den Einfallspunkten der Strahlen beschrieben sind mit Radien, die durch Vervielfachung der Strecken AA' mit $\frac{1}{n}$ entstehen.

Fig. 94a.



Die Elimination von b zwischen den Gleichungen

$$\begin{aligned} x^2 + (y - b)^2 &= \frac{b^2 + c^2}{n^2} \\ -(y - b) &= \frac{b}{n^2} \end{aligned}$$

führt tatsächlich zu der Gleichung eines Zentralkegelschnitts:

$$\frac{n^2 x^2}{c^2} + \frac{n^2 y^2}{(1 - n^2)c^2} = 1,$$

als dessen Evolute sich die oben gefundene diakaustische Linie ergibt.

B. Raumkurven und krumme Flächen.

§ 1. Tangente und Normalebene einer Raumkurve.

Die erste Krümmung oder Flexion.

173. Analytische Darstellung der Kurven im Raume. Sind die veränderlichen rechtwinkligen Koordinaten x, y, z eines Punktes M im Raume als eindeutige stetige Funktionen einer Hilfsvariablen, des Parameters, u gegeben:

$$(1) \quad x = x(u) \quad y = y(u) \quad z = z(u),$$

so beschreibt, während u seinen Bereich stetig durchläuft, der Punkt M eine *Kurve im Raume*, sofern nicht eine der drei Funktionen beständig den Wert Null hat; in letzterem Falle würde in einer der Koordinatenebenen eine Kurve beschrieben werden. Von den Funktionen $x(u), y(u), z(u)$ setzen wir weiter noch voraus, daß sie bis zu Gliedern der jeweiligen erforderlichen Ordnung nach der Taylorschen Formel entwickelbar seien.

Besteht zwischen den drei Funktionen eine lineare Identität mit konstanten Koeffizienten

$$Ax(u) + By(u) + Cz(u) + D \equiv 0,$$

so liegen alle Punkte der Kurve in einer Ebene, die Kurve ist eine *Plankurve*; findet eine derartige Beziehung nicht statt, so heißt die Kurve eine *Raumkurve*.

Zwei von den Gleichungen (1) für sich betrachtet (127), z. B.

$$y = y(u), \quad z = z(u),$$

bestimmen eine Kurve in der ys -Ebene; dieselbe wird gleichzeitig mit der Raumkurve von dem Fußpunkte des Lotes aus M auf die ys -Ebene beschrieben, ist also die *Projektion* der Raumkurve auf dieser Ebene. Diese Projektion kann, wenn man u eliminiert, auch durch *eine* Gleichung der Form $\varphi(y, s) = 0$ dargestellt werden; verfährt man mit den anderen Paaren aus (1) ebenso, so ergeben sich drei Gleichungen

$$\varphi(y, s) = 0$$

$$\psi(s, x) = 0$$

$$\chi(x, y) = 0,$$

welche die drei Projektionen der Raumkurve bestimmen; zur Charakterisierung der Raumkurve reichen aber *zwei* von diesen Gleichungen hin, die dritte ist jedesmal eine Folge der beiden anderen. Dies stimmt mit der geometrischen Tatsache überein, daß eine Linie im Raume durch zwei Projektionen (auf nicht parallele Ebenen) bestimmt ist. Jede der vorstehenden drei Gleichungen kann aber auch als Gleichung des zur betreffenden Koordinatenebene normalen projizierenden Zylinders aufgefaßt werden und in diesem Sinne bestimmt das Gleichungspaar

$$(2) \quad \begin{cases} \psi(x, s) = 0 \\ \varphi(y, s) = 0 \end{cases}$$

die Kurve als Durchschnitt zweier Zylinder, wovon der eine parallel zur y -Achse, der andere parallel zur x -Achse ist.

Die Gleichungen (2) können aber so angesehen werden, als wären sie hervorgegangen aus zwei Gleichungen von der Form:

$$(3) \quad \begin{cases} f(x, y, s) = 0 \\ F(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

indem einmal y , ein zweites mal x eliminiert wurde; jede dieser Gleichungen bestimmt s als Funktion von x, y und repräsentiert eine Fläche (45); die Raumkurve erscheint so als Durchschnitt zweier Flächen im allgemeinen gegeben.


Damit sind die drei gewöhnlichen Arten der analytischen Darstellung einer Linie im Raume überhaupt, im besonderen einer Raumkurve, erledigt. Für allgemeine Untersuchungen ist die erste Art den anderen vorzuziehen.

Beispiele. 1) Wenn ein Punkt um eine feste Gerade gleichförmig rotiert und gleichzeitig parallel zu dieser Geraden gleichförmig fortschreitet, so heißt die von ihm ausgeführte Gesamtbewegung eine *schraubende Bewegung* oder Schraubung. Die dabei beschriebene Linie wird *gemeine Schraubenlinie* (Helix) genannt.

Wird die feste Gerade zur z -Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems genommen und die x -Achse durch eine Lage M_0 (Fig. 99) des beweglichen Punktes gelegt, dessen Abstand von der festen Geraden $= a$ sei; so ist für eine neue Lage M , welche aus M_0 durch Rotation um den Winkel u und durch eine fortschreitende Bewegung von der Größe z hervorging,

$$\frac{z}{au} = k,$$

wo k eine Konstante bedeutet; auf Grund dessen sind



(4)

$$x = a \cos u$$

$$y = a \sin u$$

$$z = bu$$

die Gleichungen der Kurve, wobei $b = ka$ gesetzt wurde. Das dem Werte $u = 2\pi$ entsprechende z heißt die *Ganghöhe* der Schraubenlinie; ihr Ausdruck ist also $2\pi b$.

Durch Elimination von u zwischen je zweien der Gleichungen (4) erhält man:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$x = a \cos \frac{z}{b}$$

$$y = a \sin \frac{z}{b};$$

die Projektion der Kurve auf der xy -Ebene ist ein Kreis; die Kurve liegt auf einem Kreiszylinder, der als Schraubenzylinder bezeichnet wird. Die beiden anderen Projektionen sind kongruente transzendente Kurven.

2) Das Gleichungspaar

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$$

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

bestimmt eine Raumkurve als Durchschnitt einer Kugel vom Radius $2a$ um den Ursprung mit einem Kreiszylinder vom Radius a , der die ys -Ebene längs der s -Achse berührt. Die zweite dieser Gleichungen gibt zugleich deren Projektion auf

Fig. 100 a.





Fig. 100 b.



der xy -Ebene. Für die beiden anderen Projektionen erhält man durch Elimination von x , bzw. y die Gleichungen:

$$(5) \quad \begin{cases} z^4 = 4a^2(z^2 - y^2) \\ z^2 + 2a(x - 2a) = 0; \end{cases}$$

die erste gehört zu einer Kurve 4. Ordnung, welche im Ursprung einen Knotenpunkt mit den Tangenten $z + y = 0$, $z - y = 0$ hat und symmetrisch ist zu beiden Achsen (Fig. 100 a); die zweite entspricht einer Parabel (Fig. 100 b)*).

174. Die Tangente. Auf einer Raumkurve sei ein Punkt M mit dem Parameterwerte u und den Koordinaten $x/y/z$ gegeben; es werde auf ihr ein zweiter Punkt M' angenommen, dem der Parameterwert $u + h$ zugehört; seine Koordinaten seien $x + \Delta x/y + \Delta y/z + \Delta z$. Durch die beiden Punkte ist eine Gerade bestimmt, deren Gleichungen lauten:

$$\frac{\xi - x}{\Delta x} = \frac{\eta - y}{\Delta y} = \frac{\zeta - z}{\Delta z};$$

die Kosinus der Winkel, welche die Richtung MM' in dieser Geraden mit den positiven Achsenrichtungen bildet, sind durch die Quotienten

$$\frac{\Delta x}{c}, \quad \frac{\Delta y}{c}, \quad \frac{\Delta z}{c}$$

* Von der Parabel hat nur der innerhalb des Kreises enthaltene Teil reelle Bedeutung; der übrige Teil heißt *parasitisch*.

bestimmt, wobei

$$c = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

und die Wurzel positiv genommen werden soll, wenn die Punktfolge M, M' dem Wachsen des u entspricht. Mit stetig gegen Null abnehmendem h , also bei beständiger Annäherung des Punktes M' an den Punkt M , konvergieren diese Kosinus gegen bestimmte Grenzen, und zwar ist

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{c} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{h}}{\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta z}{h}\right)^2}} \\ &= \frac{\frac{dx}{du}}{\sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2}} \end{aligned}$$

und ähnlich die beiden anderen. Dadurch ist also eine Grenzlage der durch M und einen zweiten Punkt der Kurve gelegten Geraden bestimmt, die man als *Tangente* der Kurve im Punkte M definiert. Werden die Winkel, welche die dem wachsenden u entsprechende Richtung der Tangente mit den positiven Achsenrichtungen bildet, mit α, β, γ bezeichnet, so ist hiernach:

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{\frac{dx}{du}}{\sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2}} \\ \cos \beta &= \frac{\frac{dy}{du}}{\sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2}} \\ \cos \gamma &= \frac{\frac{dz}{du}}{\sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2}} \end{aligned} \quad (6)$$

und es lauten die *Gleichungen der Tangente*:

$$\begin{aligned} \frac{\xi - x}{\cos \alpha} &= \frac{\eta - y}{\cos \beta} = \frac{\zeta - z}{\cos \gamma} \\ \text{oder} \\ \frac{\xi - x}{\frac{dx}{du}} &= \frac{\eta - y}{\frac{dy}{du}} = \frac{\zeta - z}{\frac{dz}{du}}. \end{aligned} \quad (7)$$

Die Formeln (6) und die Gleichungen (7) sind unmittelbar anwendbar, wenn die Kurve parametrisch dargestellt ist. Um auch die anderen Darstellungsformen einzubeziehen, führe man an Stelle der Differentialquotienten Differentiale ein, was in (6) durch Multiplikation von Zähler und Nenner mit du erfolgt; dann hat man:

$$(6^*) \quad \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}} \\ \cos \beta &= \frac{dy}{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}} \\ \cos \gamma &= \frac{dz}{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}} \end{aligned}$$

und es lauten die Gleichungen (7):

$$(7^*) \quad \frac{\xi - x}{dx} = \frac{\eta - y}{dy} = \frac{\zeta - z}{dz}.$$

Ist die Kurve durch das Gleichungspaar (2) oder durch jenes (3) gegeben, so lassen sich zwei der Differentiale linear durch das dritte ausdrücken; im Falle (3) kann man auch folgendermaßen vorgehen. Durch Differentialbildung ergibt sich:

$$f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz = 0$$

$$F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0$$

und hieraus folgt:

$$dx : dy : dz = \begin{vmatrix} f'_y & f'_z \\ F'_y & F'_z \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} f'_x & f'_z \\ F'_x & F'_z \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ F'_x & F'_y \end{vmatrix};$$

bedient man sich für diese aus den partiellen Differentialquotienten gebildeten Determinanten der von Donkin vorgeschlagenen Bezeichnung

$$\begin{vmatrix} f'_y & f'_z \\ F'_y & F'_z \end{vmatrix} = \frac{\partial(f, F)}{\partial(y, z)} \text{ usw.,}$$

so können die Gleichungen der Tangente so geschrieben werden:

$$(7^{**}) \quad \frac{\xi - x}{\frac{\partial(f, F)}{\partial(y, z)}} = \frac{\eta - y}{\frac{\partial(f, F)}{\partial(z, x)}} = \frac{\zeta - z}{\frac{\partial(f, F)}{\partial(x, y)}}.$$

Beispiele. 1) Für die Schraubenlinie erhält man auf Grund der Gleichungen (4) und der Formeln (6) die Richtungskosinus der Tangente:

$$\cos \alpha = -\frac{a \sin u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a \cos u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}};$$

der Winkel mit der positiven Richtung der z -Achse ist also konstant; sein Komplement, d. i. der Neigungswinkel der Tangente mit der xy -Ebene, wird der *Steigungswinkel* der Schraubenlinie genannt.

Die Gleichungen der Tangente lauten dann mit Rücksicht auf (4):

$$\frac{\xi - x}{-y} = \frac{\eta - y}{x} = \frac{\zeta - z}{b};$$

für die Spur S (Fig. 99) der Tangente auf der xy -Ebene ergeben sich hieraus, indem man $\zeta = 0$ setzt, die Koordinaten:

$$\xi = x + \frac{yz}{b}$$

$$\eta = y - \frac{xz}{b};$$

demnach ist

$$PS^2 = (\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 = \frac{(x^2 + y^2)z^2}{b^2} = a^2 u^2$$

und

$$PS = au = \text{arc } PM_0.$$

Der Ort der Tangenten einer Raumkurve ist eine krumme Fläche und heißt die *Tangentenfläche* der Kurve. Ihre Spur auf der xy -Ebene ist der Ort der Punkte S ; für die Schraubenlinie ist diese Spur durch die letzte Gleichung als eine *Evolvente* jenes Kreises charakterisiert, in welchen sich die Schraubenlinie auf der xy -Ebene projiziert (159).

2) Bei der in 173, 2) betrachteten Kurve ist

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4a^2,$$

$$F(x, y, z) = x^2 - 2ax + y^2,$$

$$\frac{\partial(f, F)}{\partial(y, z)} = -4yz, \quad \frac{\partial(f, F)}{\partial(z, x)} = 4z(x - a), \quad \frac{\partial(f, F)}{\partial(x, y)} = 4ay,$$

und unter beständiger Rücksichtnahme auf die Gleichungen (5) der Kurve erhält man hieraus:

$$\cos \alpha = -\frac{yz}{a\sqrt{4a^2 - x^2}}, \quad \cos \beta = \frac{z(x - a)}{a\sqrt{4a^2 - x^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{y}{\sqrt{4a^2 - x^2}};$$

hiernach hat man beispielsweise für den Punkt $a/a/a\sqrt{2}$ der Kurve:

$$\cos \alpha = -\sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \cos \beta = 0, \quad \cos \gamma = \sqrt{\frac{1}{3}},$$

und es ist hierdurch die Richtung der Tangente im Sinne des abnehmenden x bestimmt, wie aus dem Vorzeichen von $\frac{\partial(f, F)}{\partial(y, z)}$ zu erkennen ist.

Für den Punkt $2a/0/0$ hören die Formeln auf bestimmte Bedeutung zu haben; es ist dies ein singulärer Punkt der Kurve, wie auch ihre Projektion auf der yz -Ebene (Fig. 100b) es erkennen ließ.

Die Gleichungen der Tangente im Punkte $x/y/z$ sind:

$$\frac{\xi - x}{-yz} = \frac{\eta - y}{z(x-a)} = \frac{\zeta - z}{ay}.$$

175. Bogendifferential einer Raumkurve. Die in 153 aufgestellte Definition der Länge eines ebenen Kurvenbogens läßt sich auch auf eine Raumkurve ausdehnen. Wir definieren die *Länge eines Bogens* M_0M einer *Raumkurve* als den Grenzwert eines in diesem Bogen von M_0 bis M verlaufenden Sehnenzuges bei beständig wachsender Zahl der Sehnen und Abnahme jeder einzelnen gegen die Grenze Null.

Dieser Definition zufolge ist der Differentialquotient der Funktion s von u , welche die Bogenlänge ausdrückt, der Grenzwert des Quotienten aus der Sehne $MM' = c$ durch die zugehörige Änderung h von u für $\lim h = 0$, d. h. es ist:

$$\frac{ds}{du} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}}{h};$$

denn diese Sehne kann als Seite des Sehnenzuges von M_0 bis M' , also als Änderung der Länge des Sehnenzuges in M_0M bei dem Fortschreiten von M zu M' aufgefaßt werden. Führt man die Division mit h unter der Wurzel aus und vollzieht dann den Grenzübergang, so ergibt sich

$$(8) \quad \frac{ds}{du} = \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2}.$$

Geschieht die Zählung des Bogens so, daß er mit u zugleich wächst, so ist die Quadratwurzel positiv zu nehmen.

Daraus erhält man durch Multiplikation mit du das *Bogendifferential*, das, wenn die unabhängige Variable nicht ersichtlich gemacht wird, die Formel hat:

$$(9) \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}.$$

Hiermit gestatten die Formeln 174, (6*) für die Richtungskosinus der Tangente die Schreibweise:

$$(10) \quad \cos \alpha = \frac{dx}{ds}, \quad \cos \beta = \frac{dy}{ds}, \quad \cos \gamma = \frac{dz}{ds}.$$

Bei allgemeinen Untersuchungen empfiehlt es sich, der Einfachheit der Formeln wegen, den von einem festen Punkte M_0 an gezählten Bogen s als Parameter zu wählen; ist wirklich eine solche Darstellung der Koordinaten x, y, z als Funktionen von s möglich, so bedeuten die rechten Seiten in (10) Differentialquotienten; im andern Falle sind sie als Quotienten von Differentialen bezüglich einer und derselben Variablen aufzufassen.

Aus den Gleichungen (10) ergibt sich, bei der zuletzt angeführten Auffassung, die eigentliche geometrische Bedeutung von ds ; da nämlich

$$dx = ds \cos \alpha, \quad dy = ds \cos \beta, \quad dz = ds \cos \gamma,$$

so stellt ds jene Strecke der Tangente vor, die vom Kurvenpunkte $x/y/z$ bis zum Nachbarpunkte $x + dx/y + dy/z + dz$ der Tangente reicht.

Beispiel. Das Bogendifferential der Schraubenlinie ergibt sich nach Formel (8) aus den Gleichungen 173, (4):

$$ds = \sqrt{a^2 + b^2} du;$$

diese Differentialformel kann aber nur eine Folge einer endlichen Gleichung

$$s = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot u + C$$

sein, in welcher C eine Konstante bedeutet. Zählt man den Bogen von M_0 (Fig. 99) an, so werden s und u zugleich Null sein, daher ist dann auch $C = 0$ und

$$s = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot u.$$

Beachtet man, daß

$$\text{arc } M_0 P = au$$

$$PM = bu$$

ist, so ist hiernach

$$\text{arc } M_0 M = \sqrt{\text{arc } M_0 P^2 + MP^2}.$$

Dieser Zusammenhang, der auf den pythagoreischen Satz hinweist, wird unmittelbar verständlich, wenn man beachtet, daß der Schraubenbewegung auf dem Zylinder eine geradlinige Bewegung auf seiner Abwicklung entspricht.

176. Die Normalebene. Die durch den Punkt M einer Raumkurve senkrecht zur Tangente gelegte Ebene wird *Normalebene* der Kurve in M genannt. Ihre Gleichung folgt unmittelbar aus den Gleichungen der Tangente und lautet:

$$(11) \quad (\xi - x) \frac{dx}{du} + (\eta - y) \frac{dy}{du} + (\xi - z) \frac{dz}{du} = 0,$$

wenn u der Parameter ist, durch welchen die Koordinaten ausgedrückt sind, oder:

$$(11^*) \quad (\xi - x)dx + (\eta - y)dy + (\xi - z)dz = 0$$

oder endlich:

$$(\xi - x) \frac{\partial(f, F)}{\partial(y, z)} + (\eta - y) \frac{\partial(f, F)}{\partial(z, x)} + (\xi - z) \frac{\partial(f, F)}{\partial(x, y)} = 0,$$

wenn die Kurve durch die Gleichungen 173, (3) gegeben ist; diese letzte Gleichung kann mit Rücksicht auf die Bedeutung der Koeffizienten auch in der folgenden Gestalt geschrieben werden:

$$(11^{**}) \quad \begin{vmatrix} \xi - x & \eta - y & \xi - z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \end{vmatrix} = 0.$$

Beispiel. Aus den Gleichungen der Tangente an die Kurve 173, (5), die in 174, 2) abgeleitet worden sind, ergibt sich die Gleichung der Normalebene im Punkte $x/y/z$:

$$-ys(\xi - x) + z(x - a)(\eta - y) + ay(\xi - z) = 0$$

und nach vollzogener Reduktion

$$-ys\xi + z(x - a)\eta + ay\xi = 0.$$


Alle Normalebenen gehen hier also durch einen festen Punkt, den Mittelpunkt der Kugel, eine Beziehung, die für jede *sphärische* Raumkurve zurecht besteht.

177. Die erste Krümmung oder Flexion. Wenn eine Gerade, in welcher eine Richtung als positiv gewählt ist, eine Bewegung in der Ebene ausführt, so ist die Größe der dabei vollzogenen Drehung durch die Endlagen der Geraden bestimmt*); ihr Maß ist der Winkel der positiven Richtungen dieser Endlagen.

Bei einer Bewegung der Geraden im Raume reicht die Kenntnis der Endlagen nicht aus. Um hier die Größe der Drehung zu messen, kann man sich einer Kugel bedienen; ein aus dem Mittelpunkte derselben parallel zur positiven Richtung der Geraden gezogener Halbstrahl vollführt dieselbe Drehung und beschreibt auf der Kugeloberfläche einen Kurvenbogen; die Länge dieses Bogens, gemessen durch den Halbmesser der Kugel, welcher also als Längeneinheit dient, ist das natürliche Maß für die Größe der räumlichen Drehung der Geraden.

Diese von Gauß eingeführte Betrachtungsweise wenden wir auf die Tangenten einer Raumkurve M_0C (Fig. 101) an. Die Kurve $\mathfrak{X}_0\mathfrak{X}\mathfrak{X}'$, welche der Parallelstrahl $O\mathfrak{X}$ zur positiven

Fig. 101.



Tangentenrichtung MT auf der Kugeloberfläche beschreibt, wird die *sphärische Indikatrix* der Tangenten genannt und bildet eine in der beschriebenen Weise erzeugte *sphärische Abbildung* der Raumkurve selbst.

Setzt man

$$M_0M = s, \quad MM' = \Delta s$$

$$\mathfrak{X}_0\mathfrak{X} = \tau, \quad \mathfrak{X}\mathfrak{X}' = \Delta\tau,$$

und bezeichnet mit $u, u + h$ die Parameterwerte der Punkte M, M' , durch welche zugleich auch die Punkte $\mathfrak{X}, \mathfrak{X}'$ bestimmt sind, so ist

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{h} = \frac{ds}{du}$$

*) Wenigstens bis auf etwaige volle Umdrehungen und wenn die Drehung fortwährend in einem Sinne erfolgt.

die Geschwindigkeit der Änderung des Bogens und

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta \tau}{h} = \frac{d\tau}{ds}$$

die gleichzeitige Geschwindigkeit der Drehung der Tangente bei gleichförmiger Änderung von u ; das Verhältnis der zweiten Geschwindigkeit zur ersten, also den Bruch

$$\frac{\frac{d\tau}{ds}}{\frac{du}{ds}} = \frac{d\tau}{du},$$

definiert man als *erste Krümmung* oder *Flexion**) der Raumkurve im Punkte M ; den Halbmesser ρ eines Kreises von dieser Krümmung bezeichnet man als *Krümmungshalbmesser* oder als Radius der ersten Krümmung der Kurve in M und hat hiernach

$$(12) \quad \frac{1}{\rho} = \frac{d\tau}{ds}.$$

Nun hat der Punkt \mathfrak{A} , da der Halbmesser der Kugel die Längeneinheit ist, die Koordinaten:

$$\xi = \cos \alpha, \quad \eta = \cos \beta, \quad \zeta = \cos \gamma,$$

dahaus folgt als Bogendifferential der Indikatrix:

$$d\tau = \sqrt{(d \cos \alpha)^2 + (d \cos \beta)^2 + (d \cos \gamma)^2}$$

und hiermit ergibt sich:

$$(13) \quad \frac{1}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{d \cos \alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \gamma}{ds}\right)^2}.$$

Ist s der Parameter, durch welchen die Koordinaten ausgedrückt sind, so wird auf Grund der Formeln 175, (10):

$$(14) \quad \frac{1}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{d^2 x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2}\right)^2}.$$

Die Flexion wird als eine absolute Größe betrachtet; die Wurzel in den Formeln (13) und (14) ist daher positiv zu nehmen.

*) Die Terminologie ist nicht einheitlich. Mitunter wird die im nächsten Artikel behandelte Torsion auch als Flexion bezeichnet, z. B. Enzykl. der mathem. Wissensch., Band III 3, p. 78. Wir schließen uns L. Bianchi, *Lezioni di geometria differenziale*, Pisa 1893 (2. Aufl. 1902), deutsch von M. Lukat, Leipzig 1899, an.

Je kleiner das Bogenelement MM' , um so genauer kann die räumliche Drehung der Tangente bei dem Übergange von M zu M' durch den Winkel der beiden Tangenten $MT, M'T'$, welchen man den *Kontingenzwinkel* des Bogenelements MM' nennt, gemessen werden; aus diesem Grunde bezeichnet man auch das Bogendifferential $d\tau$ der Indikatrix mit dem Namen Kontingenzwinkel und definiert wie bei einer ebenen Kurve (156) die *Flexion als Quotienten aus dem Kontingenzwinkel durch das zugehörige Bogendifferential der Kurve*.

Die einzige reelle Linie, bei welcher die Flexion in allen Punkten Null ist, ist die Gerade. Denn soll $\frac{1}{\varrho} \equiv 0$ sein, so muß laut (14) beständig

$$\frac{d^2x}{ds^2} = 0, \quad \frac{d^2y}{ds^2} = 0, \quad \frac{d^2z}{ds^2} = 0,$$

also

$$\frac{dx}{ds} = a, \quad \frac{dy}{ds} = b, \quad \frac{dz}{ds} = c,$$

also weiter

$$x = as + a', \quad y = bs + b', \quad z = cs + c'$$

sein; diese Gleichungen, in welchen a, a', \dots willkürliche Konstanten bedeuten, stellen aber alle Geraden des Raumes dar.

Beispiele. 1) Die Richtungskosinus der Tangente an eine gemeine Schraubenlinie sind (174, 1):

$$\cos \alpha = -\frac{a \sin u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a \cos u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

das Bogendifferential (175):

$$ds = \sqrt{a^2 + b^2} du;$$

hieraus ergibt sich

$$\frac{d \cos \alpha}{ds} = -\frac{a \cos u}{a^2 + b^2}, \quad \frac{d \cos \beta}{ds} = -\frac{a \sin u}{a^2 + b^2}, \quad \frac{d \cos \gamma}{ds} = 0;$$

demnach ist

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

und $\varrho = a + \frac{b^2}{a}$. Es hat also die Schraubenlinie auf einem Kreiszylinder in allen Punkten dieselbe Flexion und ihr Krümmungshalbmesser ist um so größer im Vergleich zum Halbmesser des Schraubenzylinders, je größer b oder je größer der Steigungswinkel.

2) Um für den Punkt $P(0/0/2a)$ der Raumkurve 173, 2):

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$$

$$x^2 + y^2 = 2ax$$

den Krümmungsradius zu finden, hat man folgende Rechnung anzulegen. Durch zweimalige Differentiation nach s erhält man:

$$x \frac{dx}{ds} + y \frac{dy}{ds} + z \frac{dz}{ds} = 0$$

$$(x - a) \frac{dx}{ds} + y \frac{dy}{ds} = 0$$

$$\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dz}{ds}\right)^2 + x \frac{d^2x}{ds^2} + y \frac{d^2y}{ds^2} + z \frac{d^2z}{ds^2} = 0$$

$$\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + (x - a) \frac{d^2x}{ds^2} + y \frac{d^2y}{ds^2} = 0;$$

mit Berücksichtigung von $\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dz}{ds}\right)^2 = 1$ und der daraus folgenden Beziehung

$$\frac{dx}{ds} \frac{d^2x}{ds^2} + \frac{dy}{ds} \frac{d^2y}{ds^2} + \frac{dz}{ds} \frac{d^2z}{ds^2} = 0$$

ergeben sich für den Punkt P die Werte:

$$\frac{dx}{ds} = 0 \quad \frac{dy}{ds} = 1 \quad \frac{dz}{ds} = 0$$

$$\frac{d^2x}{ds^2} = \frac{1}{a} \quad \frac{d^2y}{ds^2} = 0 \quad \frac{d^2z}{ds^2} = -\frac{1}{2a},$$

daraus

$$\frac{1}{\rho} = \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{4a^2}} \quad \text{und} \quad \varphi = \frac{2a}{\sqrt{5}}.$$

§ 2. Oskulationsebene einer Raumkurve. Die zweite Krümmung oder Torsion.

178. Die Oskulationsebene. Durch den Punkt M der Raumkurve mit den Koordinaten $x/y/z$ und dem Parameterwert u werde eine Ebene gelegt,

$$(1) \quad (\xi - x) \cos a + (\eta - y) \cos b + (\zeta - z) \cos c = 0$$

sei ihre Gleichung; a, b, c sind die Richtungswinkel des Lotes zur Ebene.

Ein dem Punkte M benachbarter Punkt M' der Kurve gehöre zum Parameterwert $u + h$ und habe die Koordinaten $x_1/y_1/z_1$; dann ist

$$\begin{aligned} x_1 &= x + \frac{dx}{du}h + \frac{d^2x}{du^2}\frac{h^2}{2} + \varepsilon_1 \\ (2) \quad y_1 &= y + \frac{dy}{du}h + \frac{d^2y}{du^2}\frac{h^2}{2} + \varepsilon_2 \\ z_1 &= z + \frac{dz}{du}h + \frac{d^2z}{du^2}\frac{h^2}{2} + \varepsilon_3. \end{aligned}$$

Die Entfernung dieses Punktes von jener Ebene ist

$$\begin{aligned} \delta &= \left(\frac{dx}{du} \cos a + \frac{dy}{du} \cos b + \frac{dz}{du} \cos c \right) h \\ &+ \left(\frac{d^2x}{du^2} \cos a + \frac{d^2y}{du^2} \cos b + \frac{d^2z}{du^2} \cos c \right) \frac{h^2}{2} + E; \end{aligned}$$

dabei bedeutet E , als lineare Form der $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, ebenso wie diese eine Größe dritter Ordnung in bezug auf h .

Mit h wird, solange die Ebene keine besonderen Bedingungen erfüllt, δ zugleich unendlich klein, und zwar von der ersten Ordnung, ändert daher mit h zugleich sein Vorzeichen, die Ebene *schneidet* die Kurve.

Wenn jedoch die Stellung der Ebene eine solche ist, daß

$$(3) \quad \frac{dx}{du} \cos a + \frac{dy}{du} \cos b + \frac{dz}{du} \cos c = 0,$$

so wird δ mit h unendlich klein, aber nunmehr von der zweiten Ordnung, ändert daher innerhalb entsprechend enger Grenzen sein Vorzeichen nicht, wenn h es wechselt. Da mit Rücksicht auf die Formeln 174, (6) für eine solche Ebene vermöge (3) die Beziehung

$$\cos \alpha \cos a + \cos \beta \cos b + \cos \gamma \cos c = 0$$

besteht, so geht die Ebene durch die Tangente in M und heißt daher eine *Tangentialebene* der Kurve im Punkte M .

Erfüllt die Ebene neben der Relation (3) auch noch die:

$$(4) \quad \frac{d^2x}{du^2} \cos a + \frac{d^2y}{du^2} \cos b + \frac{d^2z}{du^2} \cos c = 0,$$

so reduziert sich für sie δ auf E , also im allgemeinen auf eine Größe der dritten Ordnung, so daß es mit h zugleich das Vor-

zeichen wechselt. Durch die Bedingungen (3) und (4) ist die Ebene (1) *eindeutig* bestimmt, und diese ausgezeichnete unter den Tangentialebenen wird *Oskulations-* oder *Schmiegeebene* der Kurve in M genannt; nach der eben gemachten Bemerkung liegt die Kurve beiderseits von M und in der nächsten Umgebung dieses Punktes zu verschiedenen Seiten dieser Ebene, sie wird von ihr berührt und geschnitten.

Aus den Gleichungen (3), (4) folgt:

$$(5) \quad \cos a = \kappa \begin{vmatrix} \frac{dy}{du} & \frac{dz}{du} \\ \frac{d^2y}{du^2} & \frac{d^2z}{du^2} \end{vmatrix}, \quad \cos b = \kappa \begin{vmatrix} \frac{dz}{du} & \frac{dx}{du} \\ \frac{d^2z}{du^2} & \frac{d^2x}{du^2} \end{vmatrix},$$

$$\cos c = \kappa \begin{vmatrix} \frac{dx}{du} & \frac{dy}{du} \\ \frac{d^2x}{du^2} & \frac{d^2y}{du^2} \end{vmatrix}$$

und κ ist, bis auf das Vorzeichen, vermöge der Beziehung $\cos^2 a + \cos^2 b + \cos^2 c = 1$, als reziproke Quadratwurzel aus der Quadratsumme der drei Determinanten bestimmt; durch Einsetzung dieser Werte in (1) ergibt sich die Gleichung der Oskulationsebene:

$$(6) \quad \begin{vmatrix} \xi - x & \eta - y & \zeta - z \\ \frac{dx}{du} & \frac{dy}{du} & \frac{dz}{du} \\ \frac{d^2x}{du^2} & \frac{d^2y}{du^2} & \frac{d^2z}{du^2} \end{vmatrix} = 0.$$

In Analogie mit der bei der Berührung zweier Plankurven gebrauchten Ausdrucksweise (148) kann man sagen, eine Tangentialebene habe mit der Kurve eine Berührung erster und die Oskulationsebene eine solche der zweiten Ordnung.

179. Superoskulierende Ebenen. Geometrische Definitionen der Oskulationsebene. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in einzelnen Punkten der Kurve die Berührung der Oskulationsebene von höherer als der zweiten Ordnung ist; man sagt dann, es bestehe hier *Superoskulation*. Es wird insbesondere eine Berührung der dritten Ordnung eintreten, wenn bei weiter fortgesetzter Entwicklung in (2) in dem Ausdrücke

für δ auch das Glied dritter Ordnung verschwindet, wenn also die Kosinus (5) auch noch die Bedingung

$$\frac{d^3x}{du^3} \cos a + \frac{d^3y}{du^3} \cos b + \frac{d^3z}{du^3} \cos c = 0$$

erfüllen, d. h. wenn für den betreffenden Punkt

$$(7) \quad \Delta = \begin{vmatrix} \frac{dx}{du} & \frac{dy}{du} & \frac{dz}{du} \\ \frac{d^2x}{du^2} & \frac{d^2y}{du^2} & \frac{d^2z}{du^2} \\ \frac{d^3x}{du^3} & \frac{d^3y}{du^3} & \frac{d^3z}{du^3} \end{vmatrix} = 0$$

ist. Weil in diesem Falle δ von der vierten Ordnung ist, verhält sich eine solche Oskulationsebene zur nächsten Umgebung der Kurve wie eine gewöhnliche Tangentialebene und wird eine *stationäre Oskulationsebene* genannt. Die Gleichung (7) kann dazu dienen, die Parameterwerte der Punkte mit stationärer Oskulationsebene zu bestimmen.

Für eine ebene Kurve ist die Gleichung (7) identisch erfüllt; denn, gilt für jeden Punkt der Kurve

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

so ist auch für jeden

$$A \frac{dx}{du} + B \frac{dy}{du} + C \frac{dz}{du} = 0$$

$$A \frac{d^2x}{du^2} + B \frac{d^2y}{du^2} + C \frac{d^2z}{du^2} = 0$$

$$A \frac{d^3x}{du^3} + B \frac{d^3y}{du^3} + C \frac{d^3z}{du^3} = 0$$

und die Gleichung (7) drückt eine notwendige Folge dieser drei Gleichungen aus.

Es mag bemerkt werden, daß man in den Gleichungen (5), (6), (7) die Differentialquotienten auch durch die betreffenden Differentiale ersetzen oder statt u auch s als Parameter verwenden kann.

Neben die analytische Definition der Oskulationsebene als einer Ebene, welche mit der Kurve eine Berührung mindestens zweiter Ordnung hat, lassen sich auch geometrische Definitionen stellen. Zunächst die folgende: *Die Oskulationsebene im Punkte M ist die Grenze einer Tangentialebene, welche außer M noch*

einen zweiten gegen M sich bewegenden Punkt M' mit der Kurve gemein hat.

Drückt man nämlich die Forderung aus, daß der Punkt (2) der Ebene (1) angehöre, wenn deren Kosinus der Beziehung (3) entsprechen, so kommt man zunächst zu der Gleichung:

$$\left(\frac{d^2x}{du^2} \cos a + \frac{d^2y}{du^2} \cos b + \frac{d^2z}{du^2} \cos c \right) \frac{h^2}{2} + E = 0;$$

dividiert man durch $\frac{h^2}{2}$ und läßt dann h gegen Null konvergieren, so ergibt sich wegen $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2E}{h^2} = 0$ folgende, die Grenzlage der Ebene charakterisierende Gleichung:

$$\frac{d^2x}{du^2} \cos a + \frac{d^2y}{du^2} \cos b + \frac{d^2z}{du^2} \cos c = 0,$$

welche mit (4) übereinstimmt und also tatsächlich zur Oskulationsebene führt.

Beachtet man, daß laut 174 die Tangente in M die Grenzlage einer Geraden ist, welche außer M noch einen zweiten dem M unaufhörlich sich nähernden Punkt mit der Kurve gemein hat, so kommt man zu der weiteren Definition: *Die Oskulationsebene in M ist die Grenzlage einer Ebene, welche mit der Kurve neben M noch zwei weitere gleichzeitig gegen M konvergierende Punkte gemein hat.* Zwischen Oskulationsebene und Kurve findet also mindestens drei-, unter Umständen mehr als dreipunktige Berührung statt.

180. Beispiele. 1) Für den Punkt $x/y/z$ der Schraubenlinie

$$x = a \cos u$$

$$y = a \sin u$$

$$z = bu$$

schreibt sich die Gleichung der Oskulationsebene zunächst in der Form

$$\begin{vmatrix} \xi - x & \eta - y & \xi - z \\ -y & x & b \\ -x & -y & 0 \end{vmatrix} = 0$$

und lautet nach vollzogener Entwicklung

$$by\xi - bx\eta + a^2\xi - a^2z = 0;$$

die Spur SS' dieser Ebene in der xy -Ebene, $by\xi - bx\eta - a^2z = 0$, ist also parallel dem Radius OP (Fig. 102).

Der Umstand, daß die eben entwickelte Gleichung der Schmiegungeebene auch in bezug auf die Koordinaten x, y, z des Berührungspunktes linear ist, hat seine besondere geometrische Bedeutung. Betrachtet man nämlich $\xi/\eta/\zeta$ als fest, so besagt er: Die Berührungspunkte der durch einen festen

Punkt an eine gemeine Schraubenlinie gelegten Schmiegungeebenen liegen in einer Ebene.

2) Für den Punkt $P(0/0/2a)$ (Fig. 100a) der Kurve

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$$

$$x^2 + y^2 = 2ax,$$

schreibt sich mit Hilfe der in 177, 2) für diesen Punkt gefundenen Werte der Differentialquotienten die Oskulationsebene

$$\begin{vmatrix} \xi & \eta & \xi - 2a \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{a} & 0 & -\frac{1}{2a} \end{vmatrix} = 0;$$

entwickelt gibt dies

$$\xi + 2\zeta = 4a$$

und läßt erkennen, daß die Schmiegungeebene in dem betrachteten Punkte parallel zur y -Achse ist und daß ihre Spur in der zx -Ebene mit der Tangente an die Parabel, welche die gleichnamige Kurvenprojektion bildet, übereinstimmt.

Daß diese Schmiegungeebene stationär ist, ergibt sich, wenn man zu dem an der zitierten Stelle entwickelten Gleichungssystem

$$x \frac{dx}{ds} + y \frac{dy}{ds} + z \frac{dz}{ds} = 0$$

$$(x - a) \frac{dx}{ds} + y \frac{dy}{ds} = 0$$

$$1 + x \frac{d^2x}{ds^2} + y \frac{d^2y}{ds^2} + z \frac{d^2z}{ds^2} = 0$$

$$\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 + (x - a) \frac{d^2x}{ds^2} + y \frac{d^2y}{ds^2} = 0$$

$$\frac{dx}{ds} \frac{d^2x}{ds^2} + \frac{dy}{ds} \frac{d^2y}{ds^2} + \frac{dz}{ds} \frac{d^2z}{ds^2} = 0$$

die durch weitere Differentiation der drei letzten entstehenden Gleichungen

$$\begin{aligned} x \frac{d^2 x}{ds^2} + y \frac{d^2 y}{ds^2} + z \frac{d^2 z}{ds^2} &= 0 \\ -\frac{dz}{ds} \frac{d^2 z}{ds^2} + (x-a) \frac{d^2 x}{ds^2} + y \frac{d^2 y}{ds^2} &= 0 \\ \left(\frac{d^2 x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2}\right)^2 + \frac{dx}{ds} \frac{d^2 x}{ds^2} + \frac{dy}{ds} \frac{d^2 y}{ds^2} + \frac{dz}{ds} \frac{d^2 z}{ds^2} &= 0 \end{aligned}$$

hinzufügt und nun die Koordinaten von P einführt; man findet so:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{ds} &= 0 & \frac{dy}{ds} &= 1 & \frac{dz}{ds} &= 0 \\ \frac{d^2 x}{ds^2} &= \frac{1}{a} & \frac{d^2 y}{ds^2} &= 0 & \frac{d^2 z}{ds^2} &= -\frac{1}{2a} \\ \frac{d^3 x}{ds^3} &= 0 & \frac{d^3 y}{ds^3} &= -\frac{5}{4a^2} & \frac{d^3 z}{ds^3} &= 0, \end{aligned}$$

Werte, deren Determinante tatsächlich Null ist.

181. Hauptnormale und Binormale. Die Normalebene im Punkte $x/y/z$:

$$(8) \quad (\xi - x) \frac{dx}{ds} + (\eta - y) \frac{dy}{ds} + (\zeta - z) \frac{dz}{ds} = 0$$

und die Oskulationsebene:

$$\begin{aligned} (\xi - x) \begin{vmatrix} \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2 y}{ds^2} & \frac{d^2 z}{ds^2} \end{vmatrix} + (\eta - y) \begin{vmatrix} \frac{dz}{ds} & \frac{dx}{ds} \\ \frac{d^2 z}{ds^2} & \frac{d^2 x}{ds^2} \end{vmatrix} \\ + (\zeta - z) \begin{vmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \\ \frac{d^2 x}{ds^2} & \frac{d^2 y}{ds^2} \end{vmatrix} &= 0 \end{aligned}$$

schneiden sich in einer Geraden, welche, zur Tangente senkrecht, die *Hauptnormale* der Kurve im Punkte M heißt.

Die zu dieser Geraden durch M senkrecht gelegte Ebene, als *rektifizierende Ebene* der Kurve in M bezeichnet, geht durch die Tangente und schneidet die Normalebene nach einer Geraden, welche, ebenfalls senkrecht zur Tangente, die *Binormale**)

*) Diese Bezeichnung hat B. de Saint-Venant in der für die geschichtliche Entwicklung der Theorie der Raumkurven wichtigen Abhandlung im Journ. de l'école polyt., cah. 30 (1845) eingeführt.

der Kurve im Punkte M genannt wird. Die Gleichung der rektifizierenden Ebene lautet:

$$(10) \quad (\xi - x) \frac{d^2x}{ds^2} + (\eta - y) \frac{d^2y}{ds^2} + (\zeta - z) \frac{d^2z}{ds^2} = 0;$$

denn wegen

$$\frac{dx}{ds} \cdot \frac{d^2x}{ds^2} + \frac{dy}{ds} \cdot \frac{d^2y}{ds^2} + \frac{dz}{ds} \cdot \frac{d^2z}{ds^2} = 0^*)$$

ist die Ebene (10) senkrecht zur Normalebene (8), und wegen

$$\begin{aligned} & \frac{d^2x}{ds^2} \begin{vmatrix} \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \end{vmatrix} + \frac{d^2y}{ds^2} \begin{vmatrix} \frac{dz}{ds} & \frac{dx}{ds} \\ \frac{d^2z}{ds^2} & \frac{d^2x}{ds^2} \end{vmatrix} + \frac{d^2z}{ds^2} \begin{vmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \\ \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \end{vmatrix} \equiv 0 \end{aligned}$$

ist sie senkrecht zur Oskulationsebene (9), erfüllt also tatsächlich die ihr auferlegten Bedingungen.

Als positiv setzen wir in der Hauptnormale diejenige Richtung fest, welche von M aus nach jener Seite der rektifizierenden Ebene (10) verläuft, auf welcher sich die Kurve in der Umgebung von M befindet; die Winkel dieser Richtung mit den positiven Achsenrichtungen seien mit λ, μ, ν bezeichnet. Um ihre Kosinus darzustellen, führen wir folgende Betrachtung durch. Der Abstand des Punktes M' (178, (2)) von der Ebene (10):

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{\left[\left(\frac{d^2x}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2z}{ds^2} \right)^2 \right]^{\frac{h^2}{2}} + E}{\sqrt{\left(\frac{d^2x}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2z}{ds^2} \right)^2}} \\ &= \frac{h^2}{2} \sqrt{\left(\frac{d^2x}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2z}{ds^2} \right)^2} + E, \end{aligned}$$

*) Diese in 177, 2) schon benützte Beziehung ergibt sich durch Differentiation der Relation

$$\left(\frac{dx}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 + \left(\frac{dz}{ds} \right)^2 = 1$$

in bezug auf s .

wo E' wieder eine Größe dritter Ordnung in bezug auf h bedeutet, fällt bei entsprechend kleinem h positiv aus, wenn man die Quadratwurzel mit dem positiven Zeichen nimmt. Bei dem gleichen Vorzeichen der Wurzel muß dann auch der Abstand eines Punktes $\xi/\eta/\zeta$, der von M aus in der positiven Richtung der Hauptnormale liegt, von der Ebene (10) d. i.

$$\frac{(\xi - x) \frac{d^2 x}{ds^2} + (\eta - y) \frac{d^2 y}{ds^2} + (\zeta - z) \frac{d^2 z}{ds^2}}{\sqrt{\left(\frac{d^2 x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2}\right)^2}}$$

positiv ausfallen; für einen solchen Punkt ist auch


$$(\xi - x) \cos \lambda + (\eta - y) \cos \mu + (\zeta - z) \cos \nu$$

positiv und stellt denselben Abstand dar; folglich hat man (177, (14)):

$$\begin{aligned} \cos \lambda &= \frac{\frac{d^2 x}{ds^2}}{\sqrt{\left(\frac{d^2 x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2}\right)^2}} = \rho \frac{d^2 x}{ds^2}, \\ \cos \mu &= \frac{\frac{d^2 y}{ds^2}}{\sqrt{\left(\frac{d^2 x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2}\right)^2}} = \rho \frac{d^2 y}{ds^2}, \\ \cos \nu &= \frac{\frac{d^2 z}{ds^2}}{\sqrt{\left(\frac{d^2 x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2 z}{ds^2}\right)^2}} = \rho \frac{d^2 z}{ds^2}, \end{aligned} \quad (11)$$

die Wurzel positiv genommen.

Es bleibt jetzt noch übrig, in der Binormale die positive Richtung festzusetzen. Dies soll so geschehen, daß die positiven Richtungen der Tangente MT , der Hauptnormale MH und der Binormale MB ein dem Dreikant der positiven Halbachsen OX , OY , OZ gleichstimmiges, d. h. ein solches Dreikant bilden, welches sich mit dem letztgenannten durch Translation und Rotation zur Deckung bringen läßt (Fig. 102a). Die Winkel, welche die positive Richtung der Binormale mit den positiven Achsenrichtungen bildet, mögen mit φ , ψ , χ bezeichnet werden.



Das von der positiven Tangente, Hauptnormale, Binormale und den sie verbindenden Ebenen: Normalebene, Schmiegungebene und rektifizierende Ebene gebildete Dreikant ist für die Untersuchung der Raumkurven von fundamentaler Bedeutung. Man nennt es das den Kurvenpunkt *begleitende Dreikant*.

Trägt man von M aus auf MT , MH , MB je die Längeneinheit ab, so sind die Koordinatendifferenzen der Endpunkte dieser Strecken $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$; $\cos \lambda$, $\cos \mu$, $\cos \nu$; $\cos \varphi$, $\cos \psi$, $\cos \chi$ beziehungsweise, und das sechsfache Volumen des Tetraeders, welches jene vier Punkte zu Ecken hat, kommt gleich

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \cos \lambda & \cos \mu & \cos \nu \\ \cos \varphi & \cos \psi & \cos \chi \end{vmatrix};$$

ein auf dieselbe Weise mittels der positiven Koordinatenhalbachsen konstruiertes Tetraeder hat den sechsfachen Rauminhalt

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

und da beide Tetraeder gleich und gleichstimmig sind, so ist

$$(12) \quad \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \cos \lambda & \cos \mu & \cos \nu \\ \cos \varphi & \cos \psi & \cos \chi \end{vmatrix} = 1.$$

Jedes Element dieser Determinante ist der ihm adjungierten Unterdeterminante gleich. Entwickelt man nämlich beispielsweise nach den Elementen der dritten Zeile, so folgt

$$\begin{aligned} & \cos \varphi (\cos \beta \cos \nu - \cos \gamma \cos \mu) + \cos \psi (\cos \gamma \cos \lambda - \cos \alpha \cos \nu) \\ & + \cos \chi (\cos \alpha \cos \mu - \cos \beta \cos \lambda) = 1; \end{aligned}$$

vergleicht man dies mit

$$\cos^2 \varphi + \cos^2 \psi + \cos^2 \chi = 1,$$

so ergibt sich, da beide Gleichungen für alle Lagen des Dreikants $M(THB)$ bestehen müssen, daß

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \cos \beta \cos \nu - \cos \gamma \cos \mu \\ \cos \psi &= \cos \gamma \cos \lambda - \cos \alpha \cos \nu \\ \cos \chi &= \cos \alpha \cos \mu - \cos \beta \cos \lambda; \end{aligned}$$

ebenso wird der Beweis für die anderen Elemente geführt.

Setzt man in den letzten Gleichungen für die Richtungskosinus der Tangente und Hauptnormale die dafür bereits bestimmten Werte ein (175, (10) und 181, (11)), so ergeben sich schließlich auch die Richtungskosinus der positiven Binormale:

$$(13) \quad \begin{aligned} \cos \varphi &= \varrho \begin{vmatrix} \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \end{vmatrix} \\ \cos \psi &= \varrho \begin{vmatrix} \frac{dz}{ds} & \frac{dx}{ds} \\ \frac{d^2z}{ds^2} & \frac{d^2x}{ds^2} \end{vmatrix} \\ \cos \chi &= \varrho \begin{vmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Sie sind, bis auf die Entscheidung über das Vorzeichen, bereits als Richtungskosinus der Oskulationsebene in 178, (5) gefunden worden.

182. Die zweite Krümmung oder Torsion. Die Änderung in der *Stellung der Oskulationsebene* kann durch die Änderung in der *Richtung der Binormale* gemessen werden, weil die Binormale zur Oskulationsebene normal ist. Die Bewegung der Binormale wird aber wieder mit Hilfe ihrer *sphärischen Indikatrix* zu beurteilen sein, wie dies bei der Tangente schon geschah (177).

Sind \mathfrak{B} , \mathfrak{B}' die zu den Punkten M , M' gehörigen Punkte der sphärischen Indikatrix, also die Endpunkte der zu den positiven Binormalen MB , $M'B'$ parallelen Radien der Einheitskugel, und setzt man (die zugehörige Figur wäre konform der Fig. 101):

$$\begin{aligned} M_0M &= s & MM' &= \Delta s \\ \mathfrak{B}_0\mathfrak{B} &= \theta, & \mathfrak{B}\mathfrak{B}' &= \Delta\theta, \end{aligned}$$

so ist

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{h} = \frac{ds}{du}$$

die Geschwindigkeit der Änderung des Bogens und

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{h} = \frac{d\theta}{du}$$

die gleichzeitige Geschwindigkeit der Drehung der Oskulationsebene bei gleichförmiger Änderung von u ; das Verhältnis beider Geschwindigkeiten, und zwar:

$$\frac{\frac{d\theta}{du}}{\frac{ds}{du}} = \frac{d\theta}{ds},$$

definiert man als *zweite Krümmung* oder *Torsion**) der Kurve im Punkte M ; den Halbmesser T eines Kreises, welcher eine der Torsion gleiche Krümmung hat, nennt man *Torsionshalbmesser* und hat hiernach den Ansatz:

$$(14) \quad \frac{1}{T} = \frac{d\theta}{ds}.$$

Nun hat der Punkt \mathfrak{B} , wenn der Mittelpunkt der Einheitskugel mit dem Ursprung zusammenfällt, die Koordinaten:

$$\xi = \cos \varphi \quad \eta = \cos \psi \quad \zeta = \cos \chi;$$

demnach ist $d\theta$ als Bogen-differential der Indikatrix der Binormale:

$$d\theta = \pm \sqrt{(d \cos \varphi)^2 + (d \cos \psi)^2 + (d \cos \chi)^2}$$

und daraus

$$(15) \quad \frac{1}{T} = \pm \sqrt{\left(\frac{d \cos \varphi}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \psi}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \chi}{ds}\right)^2}.$$

Für sehr nahe aneinander liegende Punkte M, M' kommt $d\theta$ sehr nahe dem Neigungswinkel der Oskulationsebenen in M, M' ; diesen Winkel bezeichnet man als *Torsionswinkel****) zum Kurvenelement MM' . In diesem Sinne kann die *Torsion* als *Quotient aus dem Torsionswinkel durch das zugehörige Bogen-differential erklärt werden*.

Um zu erkennen, daß es berechtigt ist, die Torsion als eine relative Größe aufzufassen, erinnern wir uns der in 178

*) Auch die Bezeichnungen *Windung*, *Schmiegun*g sind gebräuchlich. Vgl. hierzu die Fußnote p. 477. Wegen des Vorhandenseins der zweiten Krümmung oder „Windung“ nennt man die Raumkurven auch *gekrümmte Linien*.

**) Auch als Windungs- oder Schmiegunswinkel.

festgestellten Tatsache, daß die Kurve von der Oskulationsebene — wenn diese nicht stationär ist — berührt *und* geschnitten wird. Ein Auge, das in der Hauptnormale sich befindet und in deren positiver Richtung gegen die Kurve blickt, sieht die Oskulationsebene als Gerade $T'T$, und die Kurve bietet ihm in der Umgebung von M eines der Bilder in Fig. 103a, b; bei a) geht ein von links nach rechts bewegter Punkt absteigend, bei b) aufsteigend durch die Oskulationsebene, wenn er M durchschreitet. Diese zwei Fälle sind es, welche sich durch die Vorzeichen $+$ und $-$ in einer noch festzusetzenden Weise werden unterscheiden lassen. Man spricht im Falle a) von einer rechtsgewundenen, im Falle b) von einer linksgewundenen Kurve. Die Verhältnisse kehren sich um, wenn die positive Tangente von rechts nach links verläuft.

Fig. 103 a.





Fig. 103 b.



ebene, wenn er M durchschreitet. Diese zwei Fälle sind es, welche sich durch die Vorzeichen $+$ und $-$ in einer noch festzusetzenden Weise werden unterscheiden lassen. Man spricht im Falle a) von einer rechtsgewundenen, im Falle b) von einer linksgewundenen Kurve. Die Verhältnisse kehren sich um, wenn die positive Tangente von rechts nach links verläuft.

183. Die Formeln von Frenet. Man kann die Flexion

$$\frac{1}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{d \cos \alpha}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \beta}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \gamma}{ds}\right)^2}$$

als Geschwindigkeit der Richtungsänderung der Tangente und der Torsion

$$\frac{1}{T} = \pm \sqrt{\left(\frac{d \cos \varphi}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \psi}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \chi}{ds}\right)^2}$$

als Geschwindigkeit der Stellungsänderung der Oskulationsebene bei gleichförmiger Änderung des Bogens auffassen, und jede dieser Geschwindigkeiten erscheint der Formel gemäß zusammengesetzt aus drei rechtwinkligen Komponenten: die Flexion aus:

$$\frac{d \cos \alpha}{ds}, \quad \frac{d \cos \beta}{ds}, \quad \frac{d \cos \gamma}{ds},$$

die Torsion aus:

$$\frac{d \cos \varphi}{ds}, \quad \frac{d \cos \psi}{ds}, \quad \frac{d \cos \chi}{ds}.$$

Man kann noch ein drittes Krümmungsmaß aufstellen, indem man in analoger Weise die Richtungsänderung der Hauptnormale an der Einheitskugel mißt und mit der Bogenlänge

der Kurve in Beziehung setzt; die Komponenten dieses Krümmungsmaßes, das man als *ganze Krümmung* bezeichnet (es heiße für den Augenblick $\frac{1}{G}$), sind

$$\frac{d \cos \lambda}{ds}, \quad \frac{d \cos \mu}{ds}, \quad \frac{d \cos \nu}{ds}.$$

Alle diese Komponenten lassen sich wie folgt einzeln bestimmen.

Aus den Formeln 181, (11) in Verbindung mit 175, (10) ergibt sich sogleich:

$$(I) \quad \frac{d \cos \alpha}{ds} = \frac{\cos \lambda}{\varrho}, \quad \frac{d \cos \beta}{ds} = \frac{\cos \mu}{\varrho}, \quad \frac{d \cos \gamma}{ds} = \frac{\cos \nu}{\varrho}.$$

Differentiiert man die Gleichungen:

$$\cos^2 \varphi + \cos^2 \psi + \cos^2 \chi = 1$$

$$\cos \alpha \cos \varphi + \cos \beta \cos \psi + \cos \gamma \cos \chi = 0,$$

deren zweite die Tatsache ausdrückt, daß Tangente und Binormale zueinander senkrecht sind, in bezug auf s und nimmt gleich Rücksicht auf (I), so wird:

$$\cos \varphi \frac{d \cos \varphi}{ds} + \cos \psi \frac{d \cos \psi}{ds} + \cos \chi \frac{d \cos \chi}{ds} = 0$$

$$\frac{1}{\varrho} (\cos \lambda \cos \varphi + \cos \mu \cos \psi + \cos \nu \cos \chi)$$

$$+ \cos \alpha \frac{d \cos \varphi}{ds} + \cos \beta \frac{d \cos \psi}{ds} + \cos \gamma \frac{d \cos \chi}{ds} = 0;$$

das erste Glied der zweiten dieser Gleichungen entfällt, weil Hauptnormale und Binormale einen rechten Winkel bilden, und dann ergibt sich aus dem homogenen Gleichungspaar mit Beachtung dessen, was bezüglich der Determinante 181, (12) festgestellt worden ist:

$$\frac{d \cos \varphi}{ds} = \kappa \begin{vmatrix} \cos \psi \cos \chi \\ \cos \beta \cos \gamma \end{vmatrix} = \kappa \cos \lambda$$

$$\frac{d \cos \psi}{ds} = \kappa \begin{vmatrix} \cos \chi \cos \varphi \\ \cos \gamma \cos \alpha \end{vmatrix} = \kappa \cos \mu$$

$$\frac{d \cos \chi}{ds} = \kappa \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \psi \\ \cos \alpha \cos \beta \end{vmatrix} = \kappa \cos \nu;$$

die Quadratsumme dieser Gleichungen führt zu

$$\kappa = \pm \sqrt{\left(\frac{d \cos \varphi}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \psi}{ds}\right)^2 + \left(\frac{d \cos \chi}{ds}\right)^2} = \frac{1}{T},$$

demnach hat man endgültig:

$$(II) \quad \frac{d \cos \varphi}{ds} = \frac{\cos \lambda}{T} \quad \frac{d \cos \psi}{ds} = \frac{\cos \mu}{T} \quad \frac{d \cos \chi}{ds} = \frac{\cos \nu}{T}.$$

Aus der Determinante 181, (12) folgt schließlich:

$$\cos \lambda = \cos \psi \cos \gamma - \cos \chi \cos \beta,$$

daraus weiter durch Differentiation nach s unter Rücksichtnahme auf (I) und (II):

$$\frac{d \cos \lambda}{ds} = \frac{\cos \psi \cos \gamma - \cos \chi \cos \mu}{\varrho} + \frac{\cos \mu \cos \gamma - \cos \nu \cos \beta}{T}.$$

und vermöge der erwiesenen Eigenschaft jener Determinante:

$$\frac{d \cos \lambda}{ds} = -\frac{\cos \alpha}{\varrho} - \frac{\cos \varphi}{T};$$

nach Analogie dieser Formel hat man also:

$$(III) \quad \begin{cases} \frac{d \cos \lambda}{ds} = -\frac{\cos \alpha}{\varrho} - \frac{\cos \varphi}{T}, & \frac{d \cos \mu}{ds} = -\frac{\cos \beta}{\varrho} - \frac{\cos \psi}{T}, \\ \frac{d \cos \nu}{ds} = -\frac{\cos \gamma}{\varrho} - \frac{\cos \chi}{T}. \end{cases}$$

Die Quadratsumme dieser letzten Gruppe von Gleichungen führt zu folgender Beziehung zwischen den drei Krümmungsmaßen:

$$\frac{1}{G^2} = \frac{1}{\varrho^2} + \frac{1}{T^2},$$

vermöge deren der ganzen Krümmung neben der Flexion und Torsion keine selbständige Stellung zukommt.

Die neun Formeln (I), (II), (III), nach ihrem Urheber die Frenetschen *Formeln* genannt*), enthalten die Bewegungsgesetze des begleitenden Dreikants, und da sich in diesen die Eigenschaften einer speziellen Raumkurve ausdrücken, so sind die Frenetschen Formeln für die Kurventheorie von grundlegender Bedeutung. Auch bei einer ebenen Kurve kann von

*) Häufig auch als Serretsche Formeln bezeichnet; F. Frenet hatte sie 1847 als Doktordissertation bei der Toulouser Fakultät eingereicht, P. Serret sie unabhängig von ihm gefunden und 1851 im Journal von Crelle veröffentlicht, wo 1852 auch Frenets Arbeit erschien.

einem begleitenden Dreikant gesprochen werden; seine Bewegungen sind aber von einfacherer Art, weil die eine Kante, die Binormale, ihre Richtung beibehält; man sieht daher von dieser Kante und den zwei durch sie gehenden Seitenflächen ab und richtet die Aufmerksamkeit nur auf das Winkelkreuz aus Tangente und Normale.

184. Das Vorzeichen der Torsion. Durch Ausführung der Formeln (II) auf Grund von 181, (11) und (13) erhält man:

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{ds} \begin{vmatrix} \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \end{vmatrix} + \rho \begin{vmatrix} \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \end{vmatrix} &= \frac{\rho}{T} \frac{d^2x}{ds^2} \\ \frac{d\rho}{ds} \begin{vmatrix} \frac{dz}{ds} & \frac{dx}{ds} \\ \frac{d^2z}{ds^2} & \frac{d^2x}{ds^2} \end{vmatrix} + \rho \begin{vmatrix} \frac{dz}{ds} & \frac{dx}{ds} \\ \frac{d^2z}{ds^2} & \frac{d^2x}{ds^2} \end{vmatrix} &= \frac{\rho}{T} \frac{d^2y}{ds^2} \\ \frac{d\rho}{ds} \begin{vmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} \end{vmatrix} + \rho \begin{vmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} \end{vmatrix} &= \frac{\rho}{T} \frac{d^2z}{ds^2}; \end{aligned}$$

multipliziert man diese Gleichungen der Reihe nach mit $\frac{d^2x}{ds^2}, \frac{d^2y}{ds^2}, \frac{d^2z}{ds^2}$ und bildet die Summe, so erhält $\frac{d\rho}{ds}$ zum Koeffizienten eine Determinante dritten Grades, welche zwei gleiche Reihen hat und daher Null ist; rechts ist die Formel 177, (14) zu beachten; man findet so:

$$(16) \quad \frac{1}{T} = -\rho^2 \begin{vmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} & \frac{dz}{ds} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \\ \frac{d^2x}{ds^2} & \frac{d^2y}{ds^2} & \frac{d^2z}{ds^2} \end{vmatrix}.$$

Daraus folgt, daß die Torsion das entgegengesetzte Vorzeichen der Determinante Δ hat, von welcher in 179 schon die Rede war; dort ergab sich auch, daß in einem Punkte mit stationärer Oskulationsebene diese Determinante verschwindet, in einem solchen Punkte hat also die Torsion den Wert Null und wechselt bei dem Durchgange durch denselben das Vorzeichen. Dieses Verhalten erinnert an den Wendepunkt einer

Plankurve, dem auch die Eigenschaft zukommt, die Krümmung Null zu haben und Punkte entgegengesetzter Krümmung zu scheiden.

Das beständige Verschwinden der Torsion hat nach (15) zur Folge, daß

$$\frac{d \cos \varphi}{ds} = 0, \quad \frac{d \cos \psi}{ds} = 0, \quad \frac{d \cos \chi}{ds} = 0,$$

daß sonach $\cos \varphi$, $\cos \psi$, $\cos \chi$ konstant sind; es kommt diese Eigenschaft also nur einer ebenen Kurve zu; demnach ist eine ebene Kurve im Raume dadurch gekennzeichnet, daß in allen ihren Punkten $\mathcal{A} = 0$ ist.

Ersetzt man in der linken Seite der Gleichung

$$(\xi - x) \cos \varphi + (\eta - y) \cos \psi + (\zeta - z) \cos \chi = 0$$

der Oskulationsebene ξ , η , ζ durch die Koordinaten eines Punktes, welcher von dieser Ebene in der positiven Binormalenrichtung abweicht oder auf ihrer positiven Seite liegt, so ergibt sich dessen Abstand δ positiv, im anderen Falle negativ; wählt man als solchen Punkt den Punkt M' der Kurve, zu welchem der Bogen $s + h$ gehört und dessen Koordinaten demnach

$$x_1 = x + \frac{dx}{ds} h + \frac{d^2x}{ds^2} \frac{h^2}{2} + \frac{d^3x}{ds^3} \frac{h^3}{6} + \varepsilon_1$$

$$= x + h \cos \alpha + \frac{h^2}{2\rho} \cos \lambda + \frac{h^3}{6} \frac{d^3x}{ds^3} + \varepsilon_1$$

$$y_1 = y + \frac{dy}{ds} h + \frac{d^2y}{ds^2} \frac{h^2}{2} + \frac{d^3y}{ds^3} \frac{h^3}{6} + \varepsilon_2$$

$$= y + h \cos \beta + \frac{h^2}{2\rho} \cos \mu + \frac{h^3}{6} \frac{d^3y}{ds^3} + \varepsilon_2$$

$$z_1 = z + \frac{dz}{ds} h + \frac{d^2z}{ds^2} \frac{h^2}{2} + \frac{d^3z}{ds^3} \frac{h^3}{6} + \varepsilon_3$$

$$= z + h \cos \gamma + \frac{h^2}{2\rho} \cos \nu + \frac{h^3}{6} \frac{d^3z}{ds^3} + \varepsilon_3$$

sind, so ist sein Abstand:

$$\delta = \frac{h^3}{6} \left(\frac{d^3x}{ds^3} \cos \varphi + \frac{d^3y}{ds^3} \cos \psi + \frac{d^3z}{ds^3} \cos \chi \right) + E,$$

unter E wie unter ε_1 , ε_2 , ε_3 Größen vierter Ordnung in bezug

auf h verstanden; mit Benutzung der Formeln 181, (13) und 184, (16) setzt sich dies um in:

$$(17) \quad \delta = \frac{\rho h^2}{6} \Delta + E = -\frac{h^2}{6\rho T} + E.$$

Und nun sieht man, daß für $\frac{1}{T} > 0$ und bei Verfolgung der Kurve im Sinne des wachsenden Bogens der Punkt M' von der positiven zur negativen Seite der Oskulationsebene übergeht (Fig. 103a), für $\frac{1}{T} < 0$ von der negativen zur positiven Seite (Fig. 103b). Dies die Zeichenbestimmung der Torsion, die mit den Frenetschen Formeln im Einklang steht.

185. Beispiele. 1) Für die gemeine Schraubenlinie

$$x = a \cos u$$

$$y = a \sin u$$

$$z = bu$$

ist aus früheren Beispielen bereits bekannt:

$$\frac{ds}{du} = \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$\rho = \frac{a^2 + b^2}{a};$$

ferner berechnet sich:

$$\frac{dx}{ds} = \frac{dx du}{ds} = -\frac{a \sin u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \frac{dy}{ds} = \frac{a \cos u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \frac{dz}{ds} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\frac{d^2x}{ds^2} = \frac{d^2x}{du^2} \left(\frac{du}{ds}\right)^2 = -\frac{a \cos u}{a^2 + b^2}, \quad \frac{d^2y}{ds^2} = -\frac{a \sin u}{a^2 + b^2}, \quad \frac{d^2z}{ds^2} = 0$$

$$\frac{d^3x}{ds^3} = \frac{d^3x}{du^3} \left(\frac{du}{ds}\right)^3 = \frac{a \sin u}{(a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{d^3y}{ds^3} = -\frac{a \cos u}{(a^2 + b^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{d^3z}{ds^3} = 0.$$

Mit Hilfe dieser Elemente findet man




Fig. 104.

$$\cos \lambda = -\cos u$$

$$\cos \mu = -\sin u$$

$$\cos \nu = 0;$$

die positive Richtung MH der Hauptnormale (Fig. 104), ist also dem OP entgegengesetzt.

Ferner hat man für die positive Richtung MB der Binormale die Kosinus:

$$\cos \varphi = \frac{b \sin u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \psi = -\frac{b \cos u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \chi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}};$$

die Binormale bildet demnach mit der z -Achse einen konstanten Winkel.

Endlich ist

$$A = \frac{a^2 b}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \begin{vmatrix} -\sin u & \cos u & 1 \\ -\cos u & -\sin u & 0 \\ \sin u & -\cos u & 0 \end{vmatrix} = \frac{a^2 b}{(a^2 + b^2)^{3/2}}$$

und daraus berechnet sich die ebenfalls konstante Torsion:

$$\frac{1}{T} = -\frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Ihr Vorzeichen ist das entgegengesetzte von b ; nach den getroffenen Festsetzungen ist bei $b > 0$ die Schraubenlinie links, bei $b < 0$ rechts gewunden.

2) Die gemeine Schraubenlinie ist ein besonderer Fall der *allgemeinen zylindrischen Schraubenlinie*, einer Kurve, welche die Erzeugenden einer beliebigen Zylinderfläche unter einem konstanten Winkel ω schneidet. Macht man die z -Achse des Koordinatensystems den Erzeugenden der Zylinderfläche parallel, so sind alle zylindrischen Schraubenlinien durch die Beziehung

$$\cos \gamma = \cos \omega = \text{konst.}$$

charakterisiert, welche aussagt, daß die Tangente mit der z -Achse beständig denselben Winkel einschließt. Aus dieser Beziehung folgt

$$\frac{d \cos \gamma}{ds} = 0$$

und hieraus vermöge der letzten Frenetschen Formel der Gruppe (I), 183,

$$\cos \nu = 0;$$

damit gibt die letzte Formel der Gruppe (II) $\frac{d \cos \chi}{ds} = 0$, also

$$\cos \chi = \text{konst.};$$

und die letzte Formel der Gruppe (III) führt hiermit zu

$$\frac{\rho}{T} = \text{konst.}$$

Die letzten drei Ergebnisse haben folgende geometrische Bedeutung: Bei allen zylindrischen Schraubenlinien ist die Hauptnormale senkrecht zur Erzeugenden der Zylinderfläche, die Binormale zur Erzeugenden unter einem konstanten Winkel

geneigt und das Verhältnis der beiden Krümmungen im ganzen Verlauf der Kurve konstant.

Über dieses Verhältnis sowie über den Zusammenhang zwischen Flexions- und Torsionshalbmesser einer allgemeinen Schraubenlinie und dem Krümmungsradius des Normalschnitts der Zylinderfläche, auf der die Schraubenlinie liegt, gibt der folgende Rechnungsgang Aufschluß.*)

P_0M (Fig. 105) sei die Schraubenlinie, P_0P die Leitlinie des zur z -Achse parallelen Zylinders, P_0 der gemeinsame Anfangspunkt der Bögen s , σ beider Linien, deren positive Richtungen übereinstimmen sollen. Die Koordinaten von P seien als Funktionen des Bogens σ dargestellt:

$$x = x(\sigma), \quad y = y(\sigma);$$

dann ist

$$x'^2 + y'^2 = 1$$

und der Krümmungsradius der Leitlinie in P (157, (7*))

$$\bar{\rho} = \frac{1}{x'y'' - y'x''},$$

wobei sich die angezeigten Differentiationen auf σ beziehen; zufolge der Identität

$$(x'^2 + y'^2)(x''^2 + y''^2) - (x'x'' + y'y'')^2 = (x'y'' - y'x'')^2$$

und weil aus $x'^2 + y'^2 = 1$ folgt $x'x'' + y'y'' = 0$, ist auch

$$\bar{\rho} = \frac{1}{\sqrt{x''^2 + y''^2}}.$$

Des weiteren ergibt sich aus $dx^2 + dy^2 + dz^2 = ds^2$ durch Division mit ds^2

$$\frac{d\sigma}{ds} = \sin \gamma = \sin \omega.$$

Aus den Gleichungen der Schraubenlinie

$$x = x(\sigma), \quad y = y(\sigma), \quad z = \sigma \cotg \omega$$


folgt nun:

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds} = \frac{dx}{d\sigma} \sin \gamma = x' \sin \omega$$

$$\cos \beta = y' \sin \omega$$

$$\cos \gamma = \cos \omega;$$

*) G. Scheffers in der Enzykl. d. mathem. Wissensch., III. 3, p. 242.



$$d \cos \alpha = x'' \sin \omega d\sigma = x'' \sin^2 \omega ds$$

$$d \cos \beta = y'' \sin^2 \omega ds$$

$$d \cos \gamma = 0;$$

daraus

$$\frac{1}{\varrho} = \sqrt{(x''^2 + y''^2)} \sin^2 \omega = \frac{\sin^2 \omega}{\bar{\varrho}}$$

und

$$\varrho = \frac{\bar{\varrho}}{\sin^2 \omega}.$$

Die letzte Gleichung der Gruppe III führt auf

$$0 = -\frac{\cos \gamma}{\varrho} - \frac{\cos \chi}{T}$$

woraus sich ergibt:

$$T = -\frac{\varrho \sin \omega}{\cos \omega} = -\frac{\bar{\varrho}}{\sin \omega \cos \omega}.$$

Demnach ist

$$\frac{\varrho}{T} = -\cotg \omega.$$

Das Vorzeichen von T hängt davon ab, ob ω spitz oder stumpf ist.

Es sei noch auf die besondere Eigenschaft der Tangentenfläche der allgemeinen Schraubenlinie hingewiesen, daß alle ihre Erzeugenden gegen eine feste Ebene gleich geneigt sind; man nennt sie wegen dieser Eigenschaft eine *Böschungsfäche*. Umgekehrt kann man schließen, daß jede abwickelbare Fläche, die eine Böschungsfäche ist, zur Gratlinie eine Schraubenlinie besitzt.

§ 3. Tangenten und Tangentialebenen, Normalen und Normalebene einer krummen Fläche.

186. Analytische Darstellung krummer Flächen. Diejenige analytische Darstellung einer krummen Fläche, welcher wir zunächst begegnet sind (45) — sie ist die in älterer Zeit fast ausschließlich gebrauchte — besteht darin, daß im rechtwinkligen Koordinatensysteme z als Funktion der Variablen x, y gegeben ist:

$$(1) \quad z = f(x, y).$$

Wo wir im Folgenden von dieser Darstellung Gebrauch machen, setzen wir voraus, daß die Funktion f nach der Taylorsche

Formel entwickelbar sei, mindestens bis zu den Gliedern zweiter Ordnung, daß sie also vollständige Differentialquotienten der ersten zwei Ordnungen besitze, für welche wir die allgemein üblichen Bezeichnungen gebrauchen werden:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = p, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = q; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = r, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = s, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = t.$$

Allgemeiner als (1) ist die Gleichungsform:

$$(2) \quad F(x, y, z) = 0,$$

welche z als implizite Funktion von x, y bestimmt; die Ableitung der Differentialquotienten von z auf Grund dieser Gleichung ist in 59 erläutert worden.

Zu einer dritten Darstellungsweise gelangt man, von der geometrischen Erzeugung einer krummen Fläche durch stetige Bewegung und eventuell gleichzeitige Formänderung einer Kurve ausgehend. Wenn die Koordinaten x, y, z eines veränderlichen Punktes M als stetige Funktionen eines Parameters u gegeben sind, so beschreibt M , indem u seinen Bereich stetig durchläuft, eine Kurve; und enthalten jene Funktionen noch einen zweiten Parameter v , bezüglich dessen sie ebenfalls stetig sind, so beschreibt die Kurve, während v das ihm zugehörige Intervall stetig durchläuft, eine krumme Fläche. Demnach ist auch durch drei Gleichungen von der Form

$$(3) \quad x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v)$$

eine Fläche dargestellt.

Erteilt man in (3) dem u einen festen Wert, so stellen sie eine Kurve dar, welche der Fläche angehört oder ihr aufgeschrieben ist und die man kurzweg die Kurve u nennen kann.

Aber auch einem festen Werte von v entspricht bei variablem u eine Kurve auf der Fläche, welche die Kurve v heißen soll.

Im Grunde dieser Auffassung erscheint die Fläche mit zwei Scharen von Linien, gekennzeichnet durch $u = \text{konst.}$ und $v = \text{konst.}$, überzogen, und jeder ihrer Punkte als Schnitt zweier dieser Linien, jede einer der Scharen angehörig. Man nennt die Linien *Parameterlinien*, u, v auch *krummlinige Koordinaten*.

Die zuletzt erklärte Darstellungsweise krummer Flächen ist durch Gauß*) in die Flächentheorie eingeführt und ausgebildet worden; sie hat sich für tiefer gehende Untersuchungen als die geeignetste erwiesen.

Von der Darstellung (3) gelangt man durch Elimination von u, v zu der Form (2) und, falls hier Lösung nach z möglich ist, zu der Form (1).

Neben der Beziehung einer Fläche auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem ist die Darstellung in räumlichen Polarkoordinaten φ, θ, r am gebräuchlichsten; die Transformation der ersteren Koordinaten in die letzteren geschieht (68, I) mittels der Gleichungen:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta.$$

187. Einige Flächengattungen und ihre analytische Darstellung. 1. Als Beispiel der unmittelbaren Darstellung in rechtwinkligen Koordinaten seien die Gleichungen der *Flächen zweiten Grades* angeführt, wenn diese auf ihre Hauptachsen als Koordinatenachsen und ihre Hauptebenen als Koordinatenebenen bezogen werden.

Das *allgemeine Ellipsoid*: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Spezielle Fälle davon sind die Rotationsellipsoide (wenn zwei der Größen a, b, c gleich sind) und die Kugel (wenn alle drei gleich sind).

Die *Hyperboloide*, und zwar das einschalige: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, das zweischalige: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, darunter die Rotationshyperboloide als besondere Fälle ($a = b$ und die z -Achse Rotationsachse).

Die *Paraboloide*, und zwar das elliptische: $\frac{2z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$, das hyperbolische: $\frac{2z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$; bei $a = b$ ist das erste ein Rotationsparaboloid, heißt das zweite gleichseitig.

*) Disquisitiones generales circa superficies curvas, 1827. Deutsch von A. Wangerin in Ostwalds Klassikern (Nr. 5).

Der *allgemeine Kegel*: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$, der bei $a = b$ in die spezielle Form des Kreis- oder Rotationskegels übergeht.

Die *Zylinder*, deren Gleichungen bei der gewählten Anordnung des Koordinatensystems gleichlautend sind mit den Gleichungen jener Linien zweiter Ordnung, die als Leitlinien dienen.

2. *Regelflächen*. Als Regelfläche, Linienfläche oder geradlinige Fläche wird jede Fläche bezeichnet, die durch Bewegung einer Geraden erzeugt werden kann.

Legt man durch einen festen Punkt Parallele zu den Erzeugenden einer Regelfläche, so ist deren Ort im allgemeinen ein Kegel, den man den *Leit- und Richtkegel* der Regelfläche nennt. Erfüllen die Parallelen eine Ebene, so nennt man diese eine *Leit- oder Richtebene*. Zu den Regelflächen gehören auch die Kegel und Zylinder; bei einem Kegel ist der Richtkegel ihm selbst kongruent, bei einem Zylinder reduziert er sich auf eine Gerade.

Unter den Flächen zweiten Grades bietet das einschalige Hyperboloid das Beispiel einer Regelfläche mit einem Richtkegel, der ebenfalls vom zweiten Grade ist, das hyperbolische Paraboloid das Beispiel einer Regelfläche mit zwei Richtebenen, die beim gleichseitigen aufeinander senkrecht stehen.


Die Regelflächen zerfallen in zwei Klassen.

a) Geschieht die Bewegung der erzeugenden Geraden so, daß zwei unmittelbar benachbarte Lagen *einen* festen Punkt im Endlichen oder einen festen Punkt im Unendlichen oder einen während der Bewegung stetig veränderlichen *Punkt gemein haben*, so heißt die beschriebene Fläche eine *abwickelbare Regelfläche*. Im ersten der drei unterschiedenen Fälle haben alle Erzeugenden denselben Punkt im Endlichen gemein, es entsteht eine Kegelfläche. Im zweiten Falle gehen alle durch denselben festen Punkt im Unendlichen, d. h. sie sind untereinander parallel, die beschriebene Fläche ist eine Zylinderfläche. Bei diesen beiden Flächenformen ist die Bezeichnung „abwickelbar“ ohne weiteres verständlich.

Einer besonderen Erörterung bedarf der *dritte Fall*. Hier beschreibt der veränderliche Punkt eine Linie, die eine Plan-

kurve ist bei Vorhandensein einer Richtebeane und eine Raumkurve bei Vorhandensein eines Richtkegels. Beidemal sind die Erzeugenden Tangenten der Linie, ihr Ort im ersten Falle eine Ebene, im zweiten Falle eine abwickelbare Fläche; die Linie ihre *Gratlinie* oder *Rückkehrkante*. Jede Erzeugende zerfällt durch den Berührungspunkt mit der Gratlinie in zwei Halbstrahlen, die Fläche dementsprechend in zwei *Mäntel*, die in der Gratlinie zusammenstoßen, welche als scharfe Kante der Fläche in die Erscheinung tritt.

Die parametrischen Gleichungen der abwickelbaren Fläche von gegebener Gratlinie ergeben sich in folgender Weise. Die Koordinaten ξ, η, ζ eines Punktes M der Gratlinie G (Fig. 106) und der von diesem Punkt und einem festen Anfangs-



punkt M_0 begrenzte Bogen s seien als Funktionen eines ersten Parameters u bestimmt und auf der Tangente in M werde der Punkt P so bestimmt, daß $M_0P = v$ sei, wobei v als zweiter Parameter dienen soll; dann ist P ein allgemeiner Punkt der Fläche und seine Koordinaten stellen sich mit Hilfe der genannten Größen wie folgt dar:

$$\begin{aligned}
 x &= \xi + (v - s) \frac{d\xi}{ds} \\
 y &= \eta + (v - s) \frac{d\eta}{ds} \\
 z &= \zeta + (v - s) \frac{d\zeta}{ds}
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Bei konstantem s (somit konstantem u) sind dies die Gleichungen einer Erzeugenden, bei konstantem v die Gleichungen der vom Punkte P bei Abwicklung der Strecke v von der Gratlinie beschriebenen Kurve: die Erzeugenden und diese Kurven sind die Parameterlinien.

Als Beispiel sei die abwickelbare Fläche vorgeführt, deren Gratlinie die gemeine Schraubenlinie ist; man nennt sie die *abwickelbare Schraubenfläche*. Ihre Gleichungen lauten bei der in 173 gewählten Anordnung mit Benützung der in 174 und

175 gefundenen Resultate, wenn man noch zur Abkürzung $\sqrt{a^2 + b^2} = c$ setzt:

$$\begin{aligned} x &= a(u \sin u + \cos u) - \frac{av \sin u}{c} \\ (5) \quad y &= a(\sin u - u \cos u) + \frac{av \cos u}{c} \\ z &= \frac{bv}{c}. \end{aligned}$$

Bei konstantem v bleibt auch z konstant, die v -Linien sind somit die ebenen Schnitte der Fläche parallel zur xy -Ebene.

b) Bewegt sich die Erzeugende so, daß zwei benachbarte Lagen sich kreuzen, so heißt die von ihr beschriebene Fläche eine *nichtabwickelbare* oder *windschiefe Regelfläche*. In jeder Erzeugenden gibt es dann einen Punkt, der der unmittelbar benachbarten Erzeugenden am nächsten ist; man nennt ihn den Zentralpunkt der Erzeugenden und den Ort der Zentralpunkte die *Striktionslinie*, auch *Kehllinie* der nichtabwickelbaren Regelfläche. Überträgt man die Vorstellung des „Nächstliegenden“ auf die erstbesprochene Gattung von Regelflächen, so kommt man zur Gratlinie.

Unter den Flächen zweiten Grades gibt es zwei windschiefe Regelflächen: das einschalige Hyperboloid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, seine Striktionslinie ist der Hauptschnitt $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (Kehlellipse); das hyperbolische Paraboloid $\frac{2z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$, seine Striktionslinie ist der Hauptschnitt $0 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$, der in ein Geradenpaar zerfällt.

Eine spezielle Klasse von windschiefen Regelflächen sind die *Konoidflächen*, Linienflächen mit einer Richtebene und einer Leitgeraden, entstanden also durch Gleiten einer beweglichen Geraden längs einer festen, wobei die bewegliche Gerade während ihrer drehenden Bewegung einer festen Ebene parallel bleibt. Je nachdem die Leitgerade zur Richtebene geneigt oder senkrecht ist, spricht man von einem *schiefen* oder *geraden* Konoid. Verlegt man beim geraden Konoid die Richtebene in

die xy -Ebene, die Leitgerade in die z -Achse, so nimmt seine Gleichung die Form

$$(6) \quad z = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

an; denn einem konstanten z entspricht ein (oder auch mehrere) konstantes $\frac{y}{x}$, jeder Schnitt parallel zur xy -Ebene ist eine (eventuell mehrere) die z -Achse schneidende Gerade.

Zwei besondere Konoide sollen hier angeführt werden: das *Schraubenkonoid*, auch als gewöhnliche oder flachgängige Schraubenfläche oder als Wendelfläche bezeichnet, und das *Zylindroid*.

Bei dem ersteren wird die Führung der Geraden vervollständigt durch eine um die z -Achse beschriebene Schraubenlinie; sind $x = a \cos u$, $y = a \sin u$, $z = bu$ deren Gleichungen, so gibt die Elimination von u zwischen der dritten und der aus den zwei ersten folgenden $\frac{y}{x} = \operatorname{tg} u$ die Gleichung des Schraubenkonoids:

$$(7) \quad z = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x}.$$

Als Zylindroid bezeichnet man die durch die Gleichung

$$(8) \quad z = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

bestimmte Fläche; daß sie ein Konoid ist, erkennt man nach Abkürzung der rechten Seite durch x^2 . Durch die Substitution $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ ergibt sich

$$z = \sin 2\varphi$$

und das läßt einmal erkennen, daß z das Intervall $(-1, 1)$ durchläuft und daß zur weiteren Führung der Erzeugenden eine Kurve auf einem Zylinder vom Radius 1 benutzt werden kann, die in der Abwicklung in zwei Gängen der Sinuslinie besteht (vgl. auch 45).

3. *Schraubenflächen*. Jede Fläche, die durch eine schraubende Bewegung einer Linie erzeugt wird, heißt eine Schraubenfläche. Außer der erzeugenden Linie ist auch das Verhältnis der fortschreitenden Bewegung zur Drehbewegung für die Gestalt der Fläche maßgebend; seinen Wert b bezeichnet man als den *Parameter* der Schraubenfläche.


Die Achse der schraubenden Bewegung werde als z -Achse gewählt, die erzeugende Linie C (Fig. 107) sei durch die Gleichungen

$$(9) \quad \begin{aligned} \xi &= v \cos \alpha \\ \eta &= v \sin \alpha \\ \zeta &= \psi(v) \end{aligned}$$

gegeben, wobei auch α von v abhängt; C' sei ihre Projektion auf der xy -Ebene. Jeder Punkt M von C vollführt eine schraubende Bewegung, indem er sich um einen bestimmten Winkel φ nach Q dreht und gleichzeitig um eine diesem

Winkel proportionale Strecke $b\varphi$ parallel der z -Achse verschiebt; er kommt dadurch in die Lage P . Sind x, y, z die Koordinaten dieses allgemeinen Punktes der Schraubenfläche, so hat man dafür die Ansätze:

$$\begin{aligned} x &= v \cos(\alpha + \varphi) \\ y &= v \sin(\alpha + \varphi) \\ z &= \zeta + b\varphi, \end{aligned}$$



und setzt man $\alpha + \varphi = u$, $-b\alpha + \psi(v) = f(v)$, so ergeben sich die parametrischen Gleichungen der Schraubenfläche:

$$(10) \quad \begin{aligned} x &= v \cos u \\ y &= v \sin u \\ z &= bu + f(v). \end{aligned}$$

Durch Elimination von u, v erhält man daraus die andere Darstellung:

$$(11) \quad z = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x} + f(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

Ist die erzeugende Linie eine die z -Achse normal schneidende Gerade, so sind

$$\begin{aligned} \xi &= v \cos \alpha \\ \eta &= v \sin \alpha \\ \zeta &= b\alpha \end{aligned}$$

deren Gleichungen, wenn man annimmt, daß die x -Achse eine Lage der Erzeugenden bildet; es ist dann $f(v) = -b\alpha + b\alpha = 0$ und daher

$$z = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x}$$

die Gleichung der Fläche, der früher schon unter den Konoiden angeführten gewöhnlichen Schraubenfläche.

Die Erzeugende sei ferner eine die z -Achse unter einem schiefen Winkel schneidende, gegen die xy -Ebene unter dem Winkel θ geneigte Gerade; die Fläche, die dabei entsteht, wird *schiefe* oder *scharfgängige Schraubenfläche* genannt. Die Gleichungen der Erzeugenden sind

$$\begin{aligned}x &= v \cos \alpha \\y &= v \sin \alpha \\z &= b\alpha + k(r - v),\end{aligned}$$

wenn man $\operatorname{tg} \theta = k$ setzt und den Radius r eines um die z -Achse gelegten Kreiszylinders als Konstante einführt; aus ihnen ergibt sich $f(v) = -b\alpha + b\alpha + k(r - v) = k(r - v)$ und hiermit die Gleichung der Fläche:

$$(12) \quad z = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x} + k(r - \sqrt{x^2 + y^2}).$$

4. *Rotationsflächen*. Die Rotationsflächen, entstanden durch Drehung beliebiger starrer Linien um feste, mit ihnen verbundene Achsen, bilden eine Klasse der *zyklischen Flächen*, worunter man Flächen versteht, auf welchen sich eine einfach unendliche Schar von Kreisen befindet. Hier sind es die Kreise, die von den einzelnen Punkten der erzeugenden Linie beschrieben werden und die, in parallelen Ebenen liegend, Parallelkreise genannt werden.

Den Schraubenlinien gegenüber unterscheidet sich das Erzeugungsgesetz durch den Entfall der fortschreitenden Bewegung, der sich durch $b = 0$ ausdrückt; hierdurch geht denn auch aus der allgemeinen Gleichung der Schraubenflächen die allgemeine Gleichung der Rotationsflächen bei Annahme der z -Achse als Rotationsachse hervor:

$$(13) \quad z = f(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

Unter den Flächen zweiten Grades bieten die als Rotationsflächen hervorgehobenen Spezialformen Beispiele hierzu.

188. Die Tangentialebene als Ort der Tangenten. Es sei M mit den Koordinaten $x/y/z$ ein Punkt der Fläche (1), P seine Projektion auf der xy -Ebene; durch M werde

auf der Fläche eine beliebige Kurve C gezogen, welche sich in der xy -Ebene in die durch P laufende Linie von der Gleichung

$$(14) \quad \varphi(x, y) = 0$$

projizieren möge. Nimmt man auf C einen zweiten Punkt M' an — seine Koordinaten seien:

$$(15) \quad \begin{aligned} x_1 &= x + h \\ y_1 &= y + k \\ z_1 &= z + ph + qk + \varepsilon, \end{aligned}$$

wobei ε eine Größe bedeutet, die in bezug auf h, k im allgemeinen von der zweiten Ordnung ist, — und verbindet ihn mit M , so hat die Gerade MM' bei beständiger Annäherung von M' an M die Tangente MT an die Kurve C im Punkte M zur Grenzlage; gleichzeitig nähert sich die Projektion von MM' auf der xy -Ebene der Tangente an die Kurve (14) im Punkte P als Grenze, und diese Tangente hat den aus (14) bestimm-
baren Richtungskoeffizienten

$$(16) \quad \omega = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k}{h}.$$

Man nennt die Tangente MT an die Kurve C auch *eine Tangente der Fläche* im Punkte M ; ihre Gleichungen ergeben sich aus den Gleichungen der Geraden MM' :

$$\xi - x = \frac{\eta - y}{\frac{k}{h}} = \frac{\xi - z}{p + q \frac{k}{h} + \frac{\varepsilon}{h}}$$

für $\lim h = 0$, lauten also:

$$(17) \quad \xi - x = \frac{\eta - y}{\omega} = \frac{\xi - z}{p + q\omega}.$$

Um den geometrischen Ort all dieser Tangenten zu bestimmen, hat man zwischen den beiden Gleichungen (17) den Parameter ω zu eliminieren; schreibt man die Gleichungen zu diesem Zwecke in der Form:

$$\begin{aligned} (\xi - x)\omega &= \eta - y \\ q(\xi - x)\omega &= \xi - z - p(\xi - x), \end{aligned}$$

so vollzieht sich die Elimination durch Multiplikation der

ersten Gleichung mit q und nachherige Subtraktion; das Resultat lautet:

$$(18) \quad \xi - z = p(\xi - x) + q(\eta - y).$$

Der geometrische Ort der Tangenten, welche man an eine krumme Fläche in einem Punkte M legen kann, ist hiernach eine durch diesen Punkt gehende Ebene; man definiert sie als Tangentialebene oder Tangentenebene der Fläche im Punkte M , nennt diesen den Tangential- oder Berührungspunkt; (18) ist die Gleichung der Ebene.

Aus dieser Definition der Tangentialebene läßt sich eine andere ableiten, welche dem geometrischen Inhalte nach das Analogon zur Definition der Tangente an eine Kurve bildet. Nimmt man nämlich auf zwei durch M geführten einander schneidenden Kurven je einen Punkt M' , M'' an, so konvergieren die Geraden MM' , MM'' bei beständiger Annäherung von M' und M'' an M gegen die Tangenten jener Kurven im Punkte M , die Ebene $MM'M''$ hat also die Tangentialebene zur Grenze.

Hiernach ist die Tangentialebene im Punkte M die Grenze einer durch M und zwei weitere Punkte M' , M'' der Fläche gelegten Ebene, wenn diese Punkte sich irgendwie, jedoch in verschiedenen Richtungen, dem Punkte M als Grenze nähern.

Ist die Fläche durch die Gleichung (2) gegeben, so hat man, um die Gleichung der Tangentialebene zu erhalten, p , q in (18) durch die Werte (60)

$$p = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \quad q = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

zu ersetzen; dies führt zu der Gleichungsform

$$(19) \quad (\xi - x) \frac{\partial F}{\partial x} + (\eta - y) \frac{\partial F}{\partial y} + (\xi - z) \frac{\partial F}{\partial z} = 0.$$

Soll diese Gleichung einen Inhalt haben, so muß wenigstens einer der drei partiellen Differentialquotienten, deren Werte für den Punkt M gelten, von Null verschieden sein. Wäre hingegen

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 0,$$

so würde dies auf einen Punkt hinweisen, in welchem von einer Tangentialebene in dem erörterten Sinne nicht gesprochen werden kann, also auf einen besonderen oder *singulären Punkt* der Fläche; das nächstliegende Beispiel eines solchen ist die Spitze eines Kegels.

189. Die Tangentialebene als oskulierende Ebene. Die Tangentialebene läßt noch eine andere Auffassung zu, die zugleich geeignet ist, das Verhalten der Fläche zur Tangentialebene in der Umgebung des Berührungspunktes näher kennen zu lehren.

Jede Ebene, die man durch den Punkt M auf der Fläche (1) legen kann, hat eine Gleichung von der Form:

$$(20) \quad A(\xi - x) + B(\eta - y) + C(\xi - z) = 0;$$

wir denken uns eine dieser Ebenen herausgehoben und bestimmen den Abstand des Punktes M' mit den Koordinaten (15) von derselben; er ist

$$\delta = \frac{(A + Cp)h + (B + Cq)k}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} + \varepsilon',$$

wobei ε' wieder eine Größe zweiter Ordnung bedeutet.

Im allgemeinen ist also δ in bezug auf h und k von der ersten Ordnung, ändert sein Vorzeichen, wenn h , k es ändern, die Ebene (20) *schneidet* daher im allgemeinen die Fläche in M .

Hat aber die Ebene eine solche Stellung, daß

$$A + Cp = 0, \quad B + Cq = 0$$

ist, dann wird δ von der zweiten Ordnung. Die Ebene ist dadurch völlig bestimmt; denn setzt man in (20) $A = -Cp$, $B = -Cq$, so geht die Gleichung über in

$$\xi - z = p(\xi - x) + q(\eta - y).$$

Man kann also die Tangentialebene als diejenige unter den Ebenen durch den Punkt M definieren, welche sich der krummen Fläche in der Umgebung des Punktes am engsten anschließt, sie oskuliert, oder in Anwendung einer in 148 eingeführten Terminologie als diejenige Ebene, welche mit der Fläche im Punkte M eine Berührung mindestens der ersten Ordnung aufweist.

Führt man die Entwicklung von s_1 in (15) weiter, so wird

$$s_1 = s + ph + qk + \frac{1}{2} (rh^2 + 2shk + tk^2) + \varepsilon,$$

wo nunmehr ε eine Größe der dritten Ordnung bezeichnet; für den Abstand des Punktes M' von der Ebene (20) ergibt sich dann der Ausdruck:

$$\delta = \frac{(A + Cp)h + (B + Cq)k + \frac{C}{2} (rh^2 + 2shk + tk^2)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} + \varepsilon'$$

und insbesondere für seinen Abstand von der Tangentialebene

$$(21) \quad \delta = \frac{rh^2 + 2shk + tk^2}{2\sqrt{1 + p^2 + q^2}} + \varepsilon'',$$

wobei auch ε'' von der dritten Ordnung ist.

Ist die quadratische Form $rh^2 + 2shk + tk^2$ der Variablen h, k definit (vgl. die Fußnote zu 121), also zeichenbeständig, so liegt die Fläche in der nächsten Umgebung des Punktes M ganz zu einer Seite der Tangentialebene; die notwendige und hinreichende Bedingung dafür ist:

$$(22) \quad rt - s^2 > 0.$$

Ist die Form indefinit und darum verschiedener Vorzeichen fähig, was dann der Fall ist, wenn

$$(23) \quad rt - s^2 < 0,$$

so liegt die Fläche in der Umgebung des Punktes M teils zur einen, teils zur andern Seite der Tangentialebene, wird also von dieser, da Stetigkeit vorausgesetzt ist, *geschnitten*; die Grenzen der Gebiete verschiedener Vorzeichen von δ ergeben sich aus der Gleichung

$$rh^2 + 2shk + tk^2 = 0$$

mit den reellen und ungleichen Wurzeln

$$\frac{k}{h} = \frac{-s + \sqrt{s^2 - rt}}{t};$$

hierdurch sind zwei in der xy -Ebene liegende durch den Punkt P laufende Geraden bestimmt; dieselben teilen die xy -Ebene in vier Gebiete; diesen entsprechen auf der Fläche vier Gebiete der Umgebung von M , welche abwechselnd zur einen und zur andern Seite der Tangentialebene liegen.

In dem Grenzfalle der semidefiniten Form, gekennzeichnet durch

$$(24) \quad rt - s^2 = 0,$$

ist das Trinom im Zähler von δ ein vollständiges Quadrat, $\frac{1}{r}(rh + sk)^2$, δ behält im allgemeinen dasselbe Vorzeichen; aber in der durch

$$rh + sk = 0$$

bestimmten Richtung $\frac{k}{h} = -\frac{r}{s} = -\frac{s}{t}$ verschwindet der erste Teil von δ und es hängt die weitere Entscheidung von den Gliedern höherer Ordnung ab.

190. *Beispiele.* 1) Um für die Fläche

$$2z = \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b}$$

die Tangentialebene im Punkte $x/y/z$ zu bestimmen, berechne man

$$p = \frac{x}{a}, \quad q = \frac{y}{b},$$

und erhält nun unter Berücksichtigung der Gleichung der Fläche

$$\xi + z = \frac{x\xi}{a} + \frac{y\eta}{b}$$

als Gleichung jener Tangentialebene.

Ferner folgt aus

$$r = \frac{1}{a}, \quad s = 0, \quad t = \frac{1}{b},$$

daß $rt - s^2 = \frac{1}{ab}$ positiv ist, wenn a, b gleichbezeichnet sind, und negativ, wenn sie ungleich bezeichnet sind; im ersten Falle findet bloße Berührung statt — die Fläche ist ein elliptisches Paraboloid —, im zweiten Falle ist die Berührung mit einem Schneiden verbunden — die Fläche ist ein hyperbolisches Paraboloid. Der Schnitt der Tangentialebene mit der Fläche ergibt sich dann wie folgt: Zu seiner Bestimmung hat man die drei Gleichungen:

$$2\xi = \frac{\xi^2}{a} + \frac{\eta^2}{b}$$

$$\xi + z = \frac{x\xi}{a} + \frac{y\eta}{b}$$

$$2z = \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b};$$

die erste gehört der Fläche an, die zweite der Tangentialebene, und die dritte sagt aus, daß der Punkt $x/y/z$ auf der Fläche liegt. Subtrahiert man die mit 2 multiplizierte zweite Gleichung von der Summe der beiden andern, so ergibt sich

$$0 = \frac{(\xi - x)^2}{a} + \frac{(\eta - y)^2}{b};$$

und ist z. B. $a > 0$, $b < 0$ und $b = -b'$, so zerfällt diese Gleichung in die reellen Gleichungen ersten Grades:

$$\sqrt{b'}\xi + \sqrt{a}\eta - (\sqrt{b'}x + \sqrt{a}y) = 0$$

$$\sqrt{b'}\xi - \sqrt{a}\eta - (\sqrt{b'}x - \sqrt{a}y) = 0;$$

die Projektion des gesuchten Schnittes in der xy -Ebene besteht sonach aus zwei durch x/y gehenden Geraden, der Schnitt selbst, da er in einer Ebene liegt, ist gleichfalls ein System zweier Geraden durch den Punkt $x/y/z$. Jede Tangentialebene des hyperbolischen Paraboloids schneidet demnach die Fläche in zwei durch den Berührungspunkt laufenden Geraden, den Erzeugenden aus den beiden Regelscharen, die die Fläche enthält.

2) Bei der gewöhnlichen Schraubenfläche (7):

$$z = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x}$$

hat man zur Bildung der Gleichung der Tangentialebene und zur Beurteilung ihres Verhaltens der Fläche die folgenden Hilfsgrößen:

$$p = -\frac{by}{x^2 + y^2}, \quad q = \frac{bx}{x^2 + y^2},$$

$$r = \frac{2bxy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad s = -\frac{b(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad t = -\frac{2bxy}{(x^2 + y^2)^2},$$

daher lautet die Gleichung der Tangentialebene im Punkte $x/y/z$:

$$\xi - z = \frac{b(x\eta - y\xi)}{x^2 + y^2}.$$

Weil ferner

$$rt - s^2 = -\frac{b^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

also ständig negativ ist, so ist in jedem Punkte mit der Berührung ein Schneiden verbunden.

3) Um für die algebraische Fläche dritter Ordnung

$$xyz = a^3$$

die Tangentialebene zu bestimmen, setze man

$$F(x, y, z) = xyz - a^3,$$

leite daraus

$$\frac{\partial F}{\partial x} = yz, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = zx, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = xy$$

ab und trage dies in (19) ein; unter Berücksichtigung der Gleichung der Fläche ergibt sich

$$yz\xi + zx\eta + xy\xi = 3a^3$$

als Gleichung der Tangentialebene.

Die Abschnitte auf den Koordinatenachsen sind hiernach

$$\alpha = \frac{3a^3}{yz} = 3x, \quad \beta = \frac{3a^3}{zx} = 3y, \quad \gamma = \frac{3a^3}{xy} = 3z.$$

Das Volumen des Tetraeders aus der Tangentialebene und den Koordinatenebenen

$$\frac{1}{6} \alpha \beta \gamma = \frac{9}{2} xyz = \frac{9}{2} a^3$$

ist also konstant.

In dem Dreieck, welches die Koordinatenebenen aus der Tangentialebene ausschneiden, spielt der Berührungspunkt die Rolle des Schwerpunktes; denn die Koordinaten des Schwerpunktes jenes Dreiecks sind

$$\frac{\alpha + 0 + 0}{3} = x, \quad \frac{0 + \beta + 0}{3} = y, \quad \frac{0 + 0 + \gamma}{3} = z.$$

4) Dem dreiachsigen Ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

ein reguläres koaxiales Oktaeder zu umschreiben.

Die Tangentialebene im Punkte $x/y/z$ hat die Gleichung

$$\frac{x\xi}{a^2} + \frac{y\eta}{b^2} + \frac{z\zeta}{c^2} = 1;$$

soll sie eine Seitenfläche des Oktaeders sein, so muß

$$\left| \frac{x}{a^2} \right| = \left| \frac{y}{b^2} \right| = \left| \frac{z}{c^2} \right|$$

sein; bezeichnet man den gemeinsamen Wert der drei Brüche mit κ , so ergibt sich unter Benutzung der Flächengleichung

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

und es sind

$$x = a^2 \kappa, \quad y = b^2 \kappa, \quad z = c^2 \kappa$$

die Koordinaten des Berührungspunktes einer solchen Ebene,

$$\xi + \eta + \zeta = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

ihre Gleichung; die Gleichungen der sieben andern ergeben sich durch Zeichenabänderung auf der linken Seite.

5) Durch den Punkt $x_0/y_0/z_0$ an die Fläche $F(x, y, z) = 0$ Tangentialebenen zu legen.

Der Berührungspunkt $x/y/z$ einer solchen Tangentialebene muß den Gleichungen

$$(25) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ (x_0 - x) \frac{\partial F}{\partial x} + (y_0 - y) \frac{\partial F}{\partial y} + (z_0 - z) \frac{\partial F}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

genügen, deren erste aussagt, daß er auf der Fläche liegt, und deren zweite die Forderung ausdrückt, daß die Tangentialebene durch den gegebenen Punkt zu gehen hat.

Beide Gleichungen zusammen bestimmen eine Kurve auf der gegebenen Fläche, den Ort der Berührungspunkte aller Tangentialebenen durch $x_0/y_0/z_0$.

Fügt man die Gleichungen der Tangente

$$(25^*) \quad \frac{\xi - x}{x_0 - x} = \frac{\eta - y}{y_0 - y} = \frac{\zeta - z}{z_0 - z}$$

hinzu und eliminiert zwischen den vier Gleichungen (25) und (25*) x, y, z , so ergibt sich der Ort der aus $x_0/y_0/z_0$ an die Fläche geführten Tangenten oder der der Fläche aus dem gegebenen Punkte *umschriebene Kegel*.

6) Parallel zu der Geraden $\frac{\xi}{\alpha} = \frac{\eta}{\beta} = \frac{\zeta}{\gamma}$ an die Fläche $F(x, y, z) = 0$ Tangentialebenen zu legen.

Der Berührungspunkt $x/y/z$ einer solchen Tangentialebene hat den Gleichungen

$$(26) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ \alpha \frac{\partial F}{\partial x} + \beta \frac{\partial F}{\partial y} + \gamma \frac{\partial F}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

zu genügen. Diese bestimmen zusammen die Ortskurve aller Berührungspunkte von der verlangten Eigenschaft. Die durch einen solchen Punkt parallel zur gegebenen Geraden geführte Tangente hat die Gleichungen

$$(26^*) \quad \frac{\xi - x}{\alpha} = \frac{\eta - y}{\beta} = \frac{\zeta - z}{\gamma};$$

eliminiert man zwischen allen vier Gleichungen x, y, z , so kommt man zur Gleichung des der Fläche parallel zur gegebenen Geraden *umschriebenen Zylinders*.

Insbesondere erhält man die Gleichung des zur z -Achse parallelen Zylinders durch Elimination von z zwischen den Gleichungen

$$F(x, y, z) = 0,$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 0.$$

Die so erhaltene Gleichung bestimmt auch den *sichtbaren Umriß* der Fläche auf der xy -Ebene bei orthogonaler Projektion.

7) Unter der *Fußpunktfläche* einer gegebenen Fläche in bezug auf einen Punkt, den *Pol*, versteht man den Ort der Fußpunkte der Lote, welche aus ihm zu den Tangentialebenen der Fläche gefällt werden. Es ist die sinngemäße Übertragung des Begriffs der Fußpunktkurven auf den Raum.

Ist

$$F(x, y, z) = 0$$

die Gleichung der gegebenen Fläche, gilt der Ursprung als Pol, so kommt es auf die Elimination von x, y, z aus der angeschriebenen Gleichung, aus der Gleichung

$$(\xi - x) \frac{\partial F}{\partial x} + (\eta - y) \frac{\partial F}{\partial y} + (\zeta - z) \frac{\partial F}{\partial z} = 0$$

der Tangentialebene und den Gleichungen des Lotes:

$$\frac{\xi}{\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{\eta}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{\zeta}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

an; ihr Ergebnis ist die Gleichung der Fußpunktfläche. Bei anderer Darstellungsform der Ausgangsfläche treten auch entsprechend andere Formen der übrigen Gleichungen auf.

Als ein bemerkenswertes Beispiel soll die Fußpunktfläche des geraden Schraubenkonoids in bezug auf einen Punkt seiner Achse (den Ursprung) vorgeführt werden. Nach Beispiel 2) dieser Nr. hat man die Elimination an folgenden Gleichungen auszuführen:

$$\begin{aligned} z &= b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x} \\ \xi - z &= \frac{b(x\eta - y\xi)}{x^2 + y^2} \\ \frac{\xi}{by} &= \frac{\eta}{-bx} = \frac{\xi}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Aus den zwei letzten ergibt sich das Gleichungspaar

$$\begin{aligned} x\eta - y\xi &= -b\xi \\ x\xi + y\eta &= 0, \end{aligned}$$

daraus weiter

$$\begin{aligned} \frac{y}{x} &= -\frac{\xi}{\eta}, \\ x &= -\frac{b\eta\xi}{\xi^2 + \eta^2}, \quad y = \frac{b\xi\xi}{\xi^2 + \eta^2} \\ x^2 + y^2 &= \frac{b^2\xi^2}{\xi^2 + \eta^2}; \end{aligned}$$

mit diesen Hilfwerten erhält man aus den zwei ersten Gleichungen

$$\xi^2 + \eta^2 + \xi^2 = b \left(\operatorname{Arctg} \frac{\eta}{\xi} - \frac{\pi}{2} \right) \xi$$

als Gleichung der Fußpunktfläche.

Über die Natur dieser Fläche geben die Schnitte durch die z -Achse Aufschluß. Setzt man

$$\frac{\eta}{\xi} = \text{konst.}, \quad \xi^2 + \eta^2 = v^2,$$

bezeichnet den Hauptwert der zyklometrischen Funktion mit α , so ist die Gesamtheit ihrer Werte durch

$$\alpha + \lambda\pi \quad (\lambda = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

dargestellt und das Schnittgebilde durch

$$v^2 + \xi^2 = b(\alpha + (\lambda - \frac{1}{2})\pi)\xi;$$

es besteht also aus einer abzählbaren, weil auf die ganzen Zahlen beziehbaren Menge von Kreisen aus dem Kreisbüschel $v^2 + \xi^2 = \beta\xi$, Kreisen also, die durch den Ursprung gehen und hier die xy -Ebene berühren. Die Fläche gehört also zur

Klasse der zyklischen Flächen (187, 4). Es sei darauf hingewiesen, daß ξ als Funktion von ξ, η an der Stelle $\xi=0, \eta=0$ ein ähnliches Verhalten aufweist, wie es in 45 bezüglich der Funktion $s = \frac{2xy}{x^2+y^2}$ dargelegt wurde.

191. Normale und Normalebenen. Die im Berührungspunkte zur Tangentialebene errichtete Senkrechte wird die *Normale* der Fläche in jenem Punkte genannt. Ihre Gleichungen ergeben sich unmittelbar aus der Gleichung der Tangentialebene und lauten:

$$(27) \quad \frac{\xi - x}{p} = \frac{\eta - y}{q} = \frac{\xi - s}{-1},$$

oder aber

$$(28) \quad \frac{\xi - x}{\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{\eta - y}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{\xi - s}{\frac{\partial F}{\partial s}},$$

je nach der Form der Gleichung der Fläche.

Aus (27) ergeben sich für die Projektionen der Normale auf der sx - und ys -Ebene die Gleichungen:

$$(27^*) \quad \begin{cases} \xi - x + p(\xi - s) = 0 \\ \eta - y + q(\xi - s) = 0. \end{cases}$$

Die beiden Richtungen in der Normalen sind durch die Richtungskosinus bestimmt:

$$(29) \quad \begin{cases} X = \frac{p}{\pm \sqrt{p^2 + q^2 + 1}}, & Y = \frac{q}{\pm \sqrt{p^2 + q^2 + 1}}, \\ Z = \frac{-1}{\pm \sqrt{p^2 + q^2 + 1}} \end{cases}$$

beziehungsweise durch

$$(30) \quad \begin{cases} X = \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\pm \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2}}, \\ Y = \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\pm \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2}}, \\ Z = \frac{\frac{\partial F}{\partial s}}{\pm \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2}}. \end{cases}$$

Die Wahl einer Richtung als der positiven geschieht von Fall zu Fall durch besondere Festsetzungen.

Jede durch die Normale im Punkte $x/y/z$ gelegte Ebene heißt eine *Normalebene* der Fläche in dem gedachten Punkte. Beachtet man, daß das Gleichungspaar (27*) die Normale als Schnittlinie zweier (projizierenden) Ebenen bestimmt, so ist

$$(20) \quad \xi - x + p(\xi - z) + \lambda[\eta - y + q(\xi - z)] = 0$$

die Gleichung des *Büschels der Normalebenen*; jedem besonderen Werte des unbestimmten Multiplikators λ entspricht eine spezielle Normalebene.

192. Beispiele. 1) Der Ort der Normalen einer krummen Fläche in den Punkten einer ihr aufgeschriebenen Kurve ist eine krumme Fläche, welche man die zu dieser Kurve gehörige *Normalenfläche* (nach A. Mannheim „Normalie“) nennt. Die Normalenfläche ist als Ort von Geraden eine *Regelfläche* und im allgemeinen windschief.

Es ist die xy -Spur der Normalenfläche des geraden Schraubenkonoids

$$s = b \operatorname{Arc} \operatorname{tg} \frac{y}{x}$$

längs der durch $s = c$ charakterisierten Erzeugenden zu bestimmen.

Mit Hilfe der in 190, 2) zusammengestellten Differentialquotienten erhält man zunächst die Gleichungen der Normalen in einem Punkte $x/y/z$:

$$\frac{\xi - x}{by} = \frac{\eta - y}{-bx} = \frac{\xi - z}{x^2 + y^2};$$

für die Punkte der ins Auge gefaßten Erzeugenden ist

$$z = c, \quad \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \frac{c}{b} = \mu;$$

demnach hat die Spur der Normalen in der xy -Ebene die Koordinaten:

$$\begin{aligned} \xi &= x - \frac{bc\mu}{x(1+\mu^2)} \\ \eta &= \mu x + \frac{bc}{x(1+\mu^2)} \\ \xi &= 0; \end{aligned}$$

die Elimination von x zwischen den ersten zwei Gleichungen gibt die Gleichung der verlangten Spur. Zum Zwecke dieser Elimination löse man die Gleichungen nach x und $\frac{1}{x}$ auf; dies gibt


$$x = \frac{\xi + \mu\eta}{1 + \mu^2}, \quad \frac{1}{x} = \frac{\eta - \mu\xi}{bc}$$

und daraus folgt durch Multiplikation

$$(\xi + \mu\eta)(\eta - \mu\xi) = bc(1 + \mu^2).$$

Die Spur der betrachteten Normalenfläche in der xy -Ebene ist also eine gleichseitige Hyperbel mit den Asymptoten

$\xi + \mu\eta = 0$, $\mu\xi - \eta = 0$ (Fig. 108). Dem Teile CG der Erzeugenden des Schraubenkonoids entspricht der Hyperbelzweig $N''N'N$, dem Teile CG' der andere nicht gezeichnete Zweig; $N''M''$, $N'M'$, NM sind einige Lagen der Normalen.



Was die Normalenfläche selbst betrifft, so ist zunächst unmittelbar zu erkennen, daß sie bei jeder nicht abwickelbaren Fläche längs einer Erzeugenden ein gerades Konoid ist; denn alle Normalen in den Punkten einer Erzeugenden sind zu dieser selbst senkrecht. Im vorliegenden Falle ist als Schnitt der Normalenfläche mit der xy -Ebene eine Linie zweiter Ordnung gefunden worden; folglich ist die Normalenfläche selbst vom zweiten Grade; das einzige Konoid zweiten Grades ist aber das hyperbolische Paraboloid. Der Satz, daß die Normalenfläche längs einer Erzeugenden ein hyperbolisches Paraboloid ist, gilt nicht von der geraden Schraubenfläche im besonderen, sondern allgemein von allen nicht abwickelbaren Regelflächen.

Die xy -Spur ist vorstehend mit Umgehung der Gleichung der Normalenfläche festgestellt worden. Will man sie aus dieser ableiten, so hat man zwischen den vier Gleichungen

$$\frac{\xi - x}{by} = \frac{\eta - y}{-bx} = \frac{\xi - x}{x^2 + y^2}, \quad z = c, \quad \frac{y}{x} = \mu$$

x, y, z zu eliminieren; das Resultat lautet:

$$b(1 + \mu^2)\xi = bc(1 + \mu^2) - (\xi + \mu\eta)(\eta - \mu\xi),$$

bestätigt die gemachten Schlüsse und führt mit $\xi = 0$ wieder zu der gefundenen Spurgleichung.

2) Durch den Punkt $x_0/y_0/z_0$ die Ebene zu legen, welche zu der Fläche

$$xyz = a^3$$

in deren Punkt $a/a/a$ normal ist.

Man findet durch Differentiation der Flächengleichung in bezug auf x und y :

$$p = -\frac{z}{x}, \quad q = -\frac{z}{y}$$

und hiermit als Gleichung des Büschels der Normalebenen im Punkte $a/a/a$:

$$\xi - \zeta + \lambda(\eta - \zeta) = 0;$$

soll die Ebene durch den gegebenen Punkt $x_0/y_0/z_0$ gehen, so muß λ so bestimmt werden, daß

$$x_0 - z_0 + \lambda(y_0 - z_0) = 0$$

sei; hiernach ergibt sich als Gleichung der gesuchten Normalenebene:

$$(y_0 - z_0)\xi + (z_0 - x_0)\eta + (x_0 - y_0)\zeta = 0.$$

§ 4. Einhüllende Flächen.

193. Einhüllende einer einfach unendlichen Flächenschar. Es sei $f(x, y, z, u)$ eine eindeutige stetige Funktion der vier Argumente x, y, z, u ; die Gleichung

$$(1) \quad f(x, y, z, u) = 0$$

stellt dann eine Schar von ∞^1 Flächen oder ein *einfach ausgedehntes Flächenkontinuum* dar.

Ist die Gleichung in bezug auf u algebraisch vom Grade p und liefert sie für den Punkt $x_0/y_0/z_0$ q ($\leq p$) reelle Werte von u , so sagen wir, der Raum sei durch die Flächenschar in dem genannten Punkte q -fach erfüllt. Bleibt die Zahl q für alle Punkte des Raumes dieselbe, so erfüllt das Flächensystem den Raum gleichförmig.

Wechselt die Zahl q ihren Wert, so zerfällt der Raum in Gebiete, welche ungleich vielfach erfüllt sind; an den Grenzen dieser Gebiete werden aus den in 168 näher entwickelten Gründen mindestens zwei der Werte u einander gleich. Demnach sind diese Grenzen durch das Resultat der Elimination von u zwischen den Gleichungen

$$(2) \quad \begin{cases} f(x, y, z, u) = 0 \\ f'_u(x, y, z, u) = 0 \end{cases}$$

bestimmt, das symbolisch dargestellt werden soll durch

$$(3) \quad \text{Dskr}_u f(x, y, z, u) = 0.$$

Das Gebilde, welches dieser Gleichung entspricht, umfaßt auch den Ort mehrfacher Punkte (Knotenlinien usw.) der Flächen (1), falls sie solche besitzen.

Sehen wir von Singularitäten ab, so ergibt sich die Bedeutung des in (3) enthaltenen Gebildes durch folgende Betrachtung.

Bei feststehendem Werte von u gehört zur ersten der Gleichungen (2) eine spezielle Fläche aus der Schar (1); die linke Seite der zweiten Gleichung geht aus

$$\frac{f(x, y, z, u + h) - f(x, y, z, u)}{h}$$

bei dem Grenzübergange $\lim h = 0$ hervor. Nun bestimmen die beiden Gleichungen

$$(4) \quad \begin{cases} f(x, y, z, u) = 0 \\ f(x, y, z, u + h) = 0 \end{cases}$$

die Durchschnittskurve der Flächen, die den Parameterwerten u und $u + h$ entsprechen; durch diese Kurve geht aber auch diejenige Fläche, welche die Gleichung

$$(5) \quad f(x, y, z, u + h) - f(x, y, z, u) = 0$$

hat; zur Bestimmung jener Durchschnittskurve kann also statt der zweiten der Gleichungen (4) auch diese letzte Gleichung herangezogen werden, die aber nach dem Mittelwertsatze in 37 wieder ersetzt werden kann durch

$$hf'_u(x, y, z, u + \theta h) = 0$$

oder endlich durch

$$(5^*) \quad f'_u(x, y, z, u + \theta h) = 0.$$

Demnach ist die Schnittlinie der beiden Flächen (4) auch durch das Gleichungspaar

$$\begin{aligned} f(x, y, z, u) &= 0 \\ f'_u(x, y, z, u + \theta h) &= 0 \end{aligned}$$

bestimmt. Indem nun h gegen Null konvergiert, kann es geschehen, daß sich die Schnittlinie auf der Fläche u gegen eine Grenzlage bewegt, die dann dargestellt ist durch das Gleichungspaar

$$\begin{aligned} f(x, y, z, u) &= 0 \\ f'_u(x, y, z, u) &= 0, \end{aligned}$$

das übereinstimmt mit dem Gleichungspaar (2). Mit stetig variierendem u kommt sowohl die Fläche wie die auf ihr liegende Grenzkurve in Bewegung und letztere beschreibt dabei eine neue Fläche, die man die *Einhüllende*, *Umhüllungsfläche* oder *Envelope* der Flächenschar (1) nennt; die Flächen dieser Schar heißen die *Eingehüllten*. Die Grenzkurven, als deren Ort die Einhüllende erscheint, heißen deren *Charakteristiken*.

Damit ist die geometrische Bedeutung der Gleichung (3) gewonnen. Man kann sich die Einhüllende auch durch die Gleichung

$$f(x, y, z, u) = 0$$

vertreten denken, wenn man darin unter u diejenige Funktion von x, y, z versteht, die sich durch Auflösung von

$$f'_u(x, y, z, u) = 0$$

nach u ergibt; denn in diesem Vorgange liegt der Eliminationsprozeß.

194. Die Rückkehrkante der Einhüllenden. Die Beziehung der eingehüllten Flächen zur Einhüllenden spricht sich in dem folgenden Satze aus: *Jede eingehüllte Fläche wird von der Einhüllenden längs der zugehörigen Charakteristik berührt.*

Vermöge der soeben gemachten Bemerkung über die analytische Darstellung der Einhüllenden hat die Tangentialebene im Punkte $x/y/z$ derselben die Gleichung:

$$\begin{aligned} (\xi - x) \left[f'_x + f'_u \frac{\partial u}{\partial x} \right] + (\eta - y) \left[f'_y + f'_u \frac{\partial u}{\partial y} \right] \\ + (\zeta - z) \left[f'_z + f'_u \frac{\partial u}{\partial z} \right] = 0; \end{aligned}$$

weil aber für die Punkte der Einhüllenden $f'_u = 0$ ist, so vereinfacht sich diese Gleichung zu

$$(\xi - x)f'_x + (\eta - y)f'_y + (\xi - z)f'_z = 0;$$

das aber ist auch die Gleichung der Tangentialebene an die Fläche u der Schar, aber in einem Punkte, für den $f'_u = 0$, d. h. in einem Punkte der Charakteristik. Es fallen also die Tangentialebenen der Einhüllenden und der eingehüllten Fläche in einem solchen Punkte zusammen, beide Flächen berühren sich dort.

Auf der Einhüllenden kann aber noch eine besondere Erscheinung zutage treten. Die Charakteristik auf der Fläche u , durch das Gleichungspaar

$$(6) \quad f(x, y, z, u) = 0, \quad f'_u(x, y, z, u) = 0$$

mit festem u bestimmt, kann nämlich von der Fläche des Systems mit dem Parameter $u + h$, d. i. von

$$f(x, y, z, u + h) = 0$$

oder

$$(7) \quad f(x, y, z, u) + f'_u(x, y, z, u)h + f''_{uu}(x, y, z, u + \theta h) \frac{h^2}{2} = 0$$

in einzelnen Punkten geschnitten werden; für diese Punkte bestehen die Gleichungen (6) und (7) zugleich und vereinfacht sich daher die letzte auf

$$f''_{uu}(x, y, z, u + \theta h) = 0;$$

wenn nun h gegen Null konvergiert, so werden sich diese Schnittpunkte auf der Charakteristik (6) bewegen und können sich gewissen Grenzpunkten nähern, zu deren Bestimmung die Gleichungen

$$(8) \quad f(x, y, z, u) = 0, \quad f'_u(x, y, z, u) = 0, \quad f''_{uu}(x, y, z, u) = 0$$

zu dienen hätten. Mit stetig sich änderndem u kommen diese Grenzpunkte in Bewegung und ihr Erzeugnis ist eine auf der Einhüllenden gelegene Kurve, welche man als die *Rückkehrkante* oder auch als *Gratlinie* der Einhüllenden bezeichnet, weil sie, wenn sie vorhanden ist, in Form einer scharfen Kante auf der Fläche erscheint. Analytisch ist die Kurve durch die drei Gleichungen (8) oder durch die zwei ersten derselben gegeben, wenn darin für u der aus der dritten resultierende Wert eingesetzt wird.

Jede Charakteristik wird in den ihr angehörigen Grenzpunkten von der Rückkehrkante berührt.

Auf Grund der zuletzt gemachten Bemerkung ist nämlich die Richtung $dx:dy:dz$ der Tangente in einem Punkte $x/y/z$ der Rückkehrkante durch das Gleichungspaar

$$\begin{aligned} \left(f'_x + f''_{ux} \frac{\partial u}{\partial x}\right) dx + \left(f'_y + f''_{uy} \frac{\partial u}{\partial y}\right) dy + \left(f'_z + f''_{uz} \frac{\partial u}{\partial z}\right) dz &= 0 \\ \left(f''_{ux} + f'''_{uux} \frac{\partial u}{\partial x}\right) dx + \left(f''_{uy} + f'''_{uuy} \frac{\partial u}{\partial y}\right) dy + \left(f''_{uz} + f'''_{uuz} \frac{\partial u}{\partial z}\right) dz &= 0 \end{aligned}$$

bestimmt (174); weil aber in den Punkten der Rückkehrkante $f'_u = 0$, $f''_{uu} = 0$ ist, so reduzieren sich diese Gleichungen auf

$$\begin{aligned} f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz &= 0 \\ f''_{ux} dx + f''_{uy} dy + f''_{uz} dz &= 0; \end{aligned}$$

hierdurch ist aber auch die Richtung der Tangente in einem Punkte der Charakteristik (2) bestimmt, aber in einem Punkte, für welchen auch $f''_{uu} = 0$ ist, d. h. in einem Grenzpunkte.

Die Rückkehrkante, falls eine solche zustande kommt, ist demnach die Einhüllende der Charakteristiken.

195. Beispiele. Unter den zyklischen Flächen sind wegen ihrer vielfachen technischen Anwendung diejenigen von besonderem Interesse, die sich als Einhüllende einer einfach unendlichen Kugelschar auffassen lassen. Die Kugelschar entsteht dadurch, daß der Mittelpunkt einer Kugel von variablem oder konstantem Halbmesser eine Linie, die Bahnlinie oder Achse, beschreibt. Über die Anordnung der Charakteristiken einer solchen Fläche läßt sich vorweg eine allgemeine Aussage machen. Da der Schnittkreis zweier Kugeln in einer zu ihrer Zentrallinie senkrechten Ebene steht, da ferner die Zentrallinie zweier unmittelbar benachbarten Kugeln der Schar mit der Tangente der Bahnkurve zusammenfällt, so liegt die Charakteristik jeweilen in einer Ebene, die auf der Tangente des zugeordneten Bahnkurvenpunktes senkrecht steht. Eine weitere allgemeine Eigenschaft besteht darin, daß die Normalen der Umhüllungsfläche längs einer Charakteristik als Normalen einer Kugel einen Kegel bilden, dessen Spitze in der Bahnlinie liegt, unter Umständen eine Ebene, jenachdem die Charakteristik ein Neben- oder ein Hauptkreis der Kugel ist.

1) Aus den Punkten der Parabel $y^2 + 4ax = 0$ in der xy -Ebene eines räumlichen Koordinatensystems werden Kugeln beschrieben, welche durch den Scheitel der Parabel, also durch den Ursprung des Systems gehen; es ist die Einhüllende dieser Kugeln zu bestimmen.

Eine Kugel des Systems ist durch

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + z^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

dargestellt, wenn $\beta^2 + 4a\alpha = 0$ ist; eliminiert man mit Hilfe dessen α , so lautet die Gleichung des Kugelsystems:

$$x^2 + y^2 + z^2 + \frac{\beta^2}{2a}x - 2\beta y = 0,$$

darin ist β der alleinige veränderliche Parameter. Bildet man die Diskriminante der Gleichung in bezug auf β , so ergibt sich

$$(x^2 + y^2 + z^2)x = 2ay^2$$


als Gleichung der Einhüllenden; diese ist also eine algebraische Fläche dritter Ordnung.

Die Charakteristik auf der Kugel vom Parameter β ist durch die Gleichungen

$$(A) \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + \frac{\beta^2}{2a}x - 2\beta y = 0 \\ -\frac{\beta}{a}x - 2y = 0 \end{cases}$$

bestimmt; die zweite gehört einer Ebene an, die durch die z -Achse geht und zur Parabeltangente in M normal ist; folglich projiziert sich die auf der Kugel M liegende Charakteristik in die Sehne OP (Fig. 109). Der Ort des Punktes P ist eine Zissoide (171, 3)); daraus folgt, daß die gefundene Fläche der Ort jener Kreise ist, welche die Leitstrahlen OP einer gewissen Zissoide $((x^2 + y^2)x = 2ay^2)$ zu Durchmessern haben und deren Ebenen auf der Ebene dieser Zissoide normal stehen.

Um die Rückkehrkante zu bestimmen, hat man zu den Gleichungen (A) noch jene Gleichung hinzuzufügen, die durch



Differentiation der zweiten nach β entsteht; diese Gleichung lautet aber

$$\frac{x}{a} = 0,$$

woraus $x = 0$ folgt; dies in die Gleichungen (A) eingeführt gibt auch noch $y = 0$ und $z = 0$. Die Rückkehrkante zieht sich also hier auf einen Punkt zusammen, der ein singulärer Punkt der Fläche ist.

2) Die Einhüllende einer variablen Kugel zu ermitteln, deren Mittelpunkt sich stetig auf einer Geraden bewegt.

Wählt man die Gerade zur z -Achse, so hat die Schar der Kugeln die Gleichung:

$$x^2 + y^2 + (z - u)^2 = 2\varphi(u);$$

Differentiation nach u ergibt:

$$z = u - \varphi'(u),$$

woraus hervorgeht, daß die Charakteristik ein Kreis ist, dessen Ebene normal zur z -Achse ist und dessen Mittelpunkt in dieser Achse liegt. Löst man zum Zwecke der Elimination die zweite Gleichung nach u auf, so ergibt sich dafür eine Funktion von z , welche in die erste Gleichung eingetragen dieser schließlich die Form $x^2 + y^2 = f(z)$ oder, nach Umkehrung,

$$(9) \quad z = F(x^2 + y^2)$$

verleiht. Dies ist also die allgemeine Gleichung der Rotationsflächen, deren Rotationsachse die z -Achse ist. Der Unterschied gegen die in einem andern Zusammenhange in 187, 4 gefundene Gleichung (13) ist nur formal, da jede Funktion von $\sqrt{x^2 + y^2}$ auch eine Funktion von $x^2 + y^2$ ist.

3) Die Einhüllende einer Kugel konstanten Halbmessers, deren Mittelpunkt auf einer gegebenen Kurve (Achse) sich bewegt, nennt man eine *Röhrenfläche* oder auch *Kanalfläche*; ihre Gestalt hängt von der Achse ab.

Sind

$$x_0 = X(u)$$

$$y_0 = Y(u)$$

$$z_0 = Z(u)$$

die Gleichungen der Achse, so hat die Kugelschar die Gleichung:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2;$$

fügt man dazu die durch Differentiation nach u entstandene:

$$(x - x_0) \frac{dx_0}{du} + (y - y_0) \frac{dy_0}{du} + (z - z_0) \frac{dz_0}{du} = 0,$$

so führt die Elimination von u zwischen beiden zur Gleichung der Röhrenfläche.

Die zweite Gleichung stellt die Normalebene der Achse im Mittelpunkte der Kugel u dar; demnach ist der durch diese Ebene aus der Kugel geschnittene größte Kreis die Charakteristik. Dadurch also unterscheiden sich die Umhüllungsflächen mit konstantem Kugelradius von jenen mit veränderlichem Halbmesser, daß bei ersteren die Ebene der Charakteristik durch den betreffenden Punkt der Bahnkurve geht, was bei den letzteren im allgemeinen nicht zutrifft. Des weiteren geht aus der letzterwähnten Tatsache hervor, daß man eine Röhrenfläche auch durch eine solche Fortbewegung eines starren Kreises erzeugen kann, bei der der Mittelpunkt eine Linie durchläuft und die Kreisebene zu ihr beständig normal bleibt.

Um die Rückkehrkante zu bestimmen, hätte man den obigen zwei Gleichungen noch

$$\begin{aligned} (x - x_0) \frac{d^2 x_0}{du^2} + (y - y_0) \frac{d^2 y_0}{du^2} + (z - z_0) \frac{d^2 z_0}{du^2} \\ = \left(\frac{dx_0}{du} \right)^2 + \left(\frac{dy_0}{du} \right)^2 + \left(\frac{dz_0}{du} \right)^2 \end{aligned}$$

anzufügen.

Zwei spezielle Röhrenflächen sollen besonders angeführt werden: der *Kreiswulst* oder *Torus* und die *Schraubenröhrenfläche*; bei dem ersteren ist die Achse ein Kreis, bei der letzteren eine gemeine Schraubenlinie. Der Kreiswulst kann auch als Rotationsfläche, die Schraubenröhrenfläche auch als Schraubenfläche aufgefaßt und erzeugt werden.

Ordnet man die Achse des Torus so an, daß ihre Gleichungen lauten:

$$x_0 = R \cos u$$

$$y_0 = R \sin u$$

$$z_0 = 0,$$

so erhält man die Gleichung des Torus selbst durch Elimination von u zwischen

$$(x - R \cos u)^2 + (y - R \sin u)^2 + z^2 = r^2$$

$$x \sin u - y \cos u = 0;$$

in rationaler Form lautet sie:

$$(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 = 4R^2(x^2 + y^2).$$

Für die Rückkehrkante kommt noch die Gleichung

$$x \cos u + y \sin u = 0$$

hinzu; die beiden Gleichungen

$$x \sin u - y \cos u = 0$$

$$x \cos u + y \sin u = 0$$

werden, da ihre Determinante von Null verschieden ($= 1$) ist, nur durch $x = 0$, $y = 0$ befriedigt und hiermit ergibt die erste Gleichung

$$z^2 = r^2 - R^2;$$

dies hat nur dann reelle Bedeutung, wenn $R \leq r$ ist; ist $R < r$, so besteht die Rückkehrkante in zwei singulären Punkten der Fläche mit den Koordinaten $0/0/\pm\sqrt{r^2 - R^2}$; ist $R = r$, so ist nur ein solcher Punkt, $0/0/0$, vorhanden.

196. Abwickelbare Flächen. Eine spezielle Gattung von Einhüllenden einfach-unendlicher Flächenscharen erfordert vermöge ihrer Wichtigkeit eine besondere Betrachtung. Sind nämlich die Flächen der einfach-unendlichen, also von *einem* veränderlichen Parameter abhängigen Schar *Ebenen*, so heißt die Einhüllende eine *abwickelbare* oder *developpable Fläche* oder eine *Developpable* kurzweg.

Es seien A , B , C , D stetige Funktionen von u und

$$(10) \quad Ax + By + Cz + D = 0$$

die Gleichung der Ebenenschar. Durch Differentiation nach u entsteht eine neue in bezug auf x , y , z lineare Gleichung:

$$(11) \quad A'x + B'y + C'z + D' = 0;$$

die Charakteristik der Developpablen ist also eine Gerade und sie selbst als Ort von Geraden eine *Regelfläche*. Ihre geradlinigen Erzeugenden sind als Charakteristiken Tangenten an die

Rückkehrkante, die bestimmt ist durch die Gleichungen (10) und (11) in Verbindung mit der Gleichung

$$(12) \quad A''x + B''y + C''z + D'' = 0.$$

Die Einhüllende einer einfach-unendlichen Ebenenschar ist demnach eine Regelfläche, deren Erzeugende das System der Tangenten einer Raumkurve bilden, die auf der Einhüllenden als Rückkehrkante oder Striktionslinie auftritt. Jede Ebene der Schar ist Tangentialebene der einhüllenden Fläche in allen Punkten einer Charakteristik.

Wir stellen die Gleichungen (10), (11), (12) zu einem System zusammen:

$$(13) \quad \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \\ A''x + B''y + C''z + D'' = 0 \end{cases}$$

und bemerken hierzu folgendes.

Die erste Gleichung bedeutet bei festem u eine einzelne Ebene der Schar, bei variablem u die Schar selbst.

Die zwei ersten Gleichungen repräsentieren bei festem u eine einzelne Charakteristik oder Erzeugende, bei veränderlichem u deren Gesamtheit oder die Einhüllende.

Alle drei Gleichungen zusammen stellen bei festem u einen einzelnen Punkt der Rückkehrkante dar, bei variablem u die Rückkehrkante selbst, indem sie x, y, z als Funktionen von u definieren.

Im Grunde dieser Auffassung können wir nun noch nachweisen, in welcher Beziehung die Ebenen der Schar zu der Rückkehrkante stehen: *sie sind deren Oskulationsebenen.*

Um dies zu zeigen, fassen wir die Gleichungen (13) als Gleichungen der Rückkehrkante auf und differenzieren die erste nach u ; dies gibt zunächst:

$$A'x + B'y + C'z + D' + A \frac{dx}{du} + B \frac{dy}{du} + C \frac{dz}{du} = 0$$

und reduziert sich wegen der zweiten auf:

$$(14) \quad A \frac{dx}{du} + B \frac{dy}{du} + C \frac{dz}{du} = 0;$$

nochmalige Differentiation nach u liefert zunächst:

$$A' \frac{dx}{du} + B' \frac{dy}{du} + C' \frac{dz}{du} + A \frac{d^2x}{du^2} + B \frac{d^2y}{du^2} + C \frac{d^2z}{du^2} = 0;$$

wenn man aber die zweite differentiiert, so erhält man unter Berücksichtigung der dritten

$$A' \frac{dx}{du} + B' \frac{dy}{du} + C' \frac{dz}{du} = 0$$

und damit reduziert sich die vorangehende Gleichung auf

$$(15) \quad A \frac{d^2x}{du^2} + B \frac{d^2y}{du^2} + C \frac{d^2z}{du^2} = 0.$$

Mittels der Gleichungen (14) und (15) drücken sich die Verhältnisse der Koeffizienten A, B, C wie folgt aus:

$$A : B : C = \begin{vmatrix} dy & dz \\ d^2y & d^2z \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} dz & dx \\ d^2z & d^2x \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} dx & dy \\ d^2x & d^2y \end{vmatrix};$$

die gleichen Verhältnisse aber bestehen zwischen den Richtungskoeffizienten der Oskulationsebene im Kurvenpunkte u (178, (6)); es ist also tatsächlich die Ebene u der Schar Oskulationsebene im zugehörigen Punkt der Gratlinie.

Man kann aber auch, von einer Raumkurve ausgehend, zeigen, daß die Einhüllende ihrer Oskulationsebenen identisch ist mit ihrer *Tangentenfläche* (174, 1)).

Benutzt man nämlich für die Raumkurve die früher gebrauchten Bezeichnungen und den Bogen s als Parameter, so schreibt sich die Gleichung der Oskulationsebene

$$(16) \quad (\xi - x) \cos \varphi + (\eta - y) \cos \psi + (\zeta - z) \cos \chi = 0;$$

differentiiert man sie, um die Charakteristik zu bestimmen, nach s , so entsteht zuerst

$$(\xi - x) \frac{d \cos \varphi}{ds} + (\eta - y) \frac{d \cos \psi}{ds} + (\zeta - z) \frac{d \cos \chi}{ds} - (\cos \alpha \cos \varphi + \cos \beta \cos \psi + \cos \gamma \cos \chi) = 0;$$

der letzte Klammerausdruck hat den Wert Null, und berücksichtigt man im übrigen die Gruppe (II) der Frenetschen Formeln (183), so lautet die letzte Gleichung endgültig:

$$(17) \quad (\xi - x) \cos \lambda + (\eta - y) \cos \mu + (\zeta - z) \cos \nu = 0$$

und stellt die rektifizierende Ebene dar; folglich wird (16) durch (17) tatsächlich längs einer Tangente der Raumkurve geschnitten.

197. Kategorien abwickelbarer Flächen. Man hat zwei Gattungen von abwickelbaren Flächen zu unterscheiden.

Solche Flächen, bei welchen eine eigentliche Rückkehrkante auftritt, nennt man *allgemeine Developpable*.

Solche Flächen, bei welchen die Rückkehrkante sich auf einen singulären Punkt zusammenzieht, durch welchen dann notwendig alle Charakteristiken hindurchgehen, heißen *Kegel-flächen*; der singuläre Punkt wird Scheitel genannt. Rückt er insbesondere in bestimmter Richtung ins Unendliche, so sind alle Charakteristiken parallel und die Fläche heißt eine *Zylinderfläche*.

Die zweite Kategorie von abwickelbaren Flächen entsteht dann, wenn zwischen den Koeffizienten A, B, C, D der Ebenenschar eine lineare (für alle Werte von u geltende) Relation

$$(18) \quad aA + bB + cC + D \equiv 0$$

mit konstanten Koeffizienten a, b, c besteht. Aus dieser ergibt sich nämlich durch ein- und zweimalige Differentiation nach u

$$(19) \quad aA' + bB' + cC' + D' = 0$$

$$(20) \quad aA'' + bB'' + cC'' + D'' = 0$$

und wenn man die Gleichungen (18), (19), (20) von den korrespondierenden Gleichungen (13) subtrahiert, so tritt an die Stelle von (13) das System:

$$(21) \quad \begin{cases} A(x-a) + B(y-b) + C(z-c) = 0 \\ A'(x-a) + B'(y-b) + C'(z-c) = 0 \\ A''(x-a) + B''(y-b) + C''(z-c) = 0, \end{cases}$$

das aber nicht eine Kurve, sondern den Punkt $a/b/c$ bestimmt, weil es nur durch

$$x - a = 0, \quad y - b = 0, \quad z - c = 0$$

befriedigt wird, sofern die Determinante

$$\begin{vmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{vmatrix}$$

nicht identisch Null ist. Findet aber dieses statt, ohne daß

alle Unterdeterminanten zweiten Grades verschwinden würden, so bestimmen die Gleichungen nur die Verhältnisse

$$(x - a) : (y - b) : (z - c),$$

also eine Richtung, die Fläche wird zur Zylinderfläche.

Hierdurch erscheint das, was in 187, 2a) bei der ersten Einführung der abwickelbaren Regelflächen gesagt worden, weiter ausgeführt.

198. Differentialgleichungen der abwickelbaren Flächen. Der geometrische Unterschied zwischen einer developpabeln und einer nicht-developpabeln Linienfläche drückt sich darin aus, daß die Tangentialebene in einem Punkte einer Fläche der ersten Art zugleich Tangentialebene in unendlich vielen anderen Punkten ist, während sie bei einer Fläche der zweiten Art — von Ausnahmefällen abgesehen — nur in dem einen Punkte berührt. Es entsteht die Frage, wie sich dieser Unterschied analytisch ausdrückt, mit andern Worten, welche besonderen Eigenschaften der Funktion $f(x, y)$ zukommen, die die Applikate z einer developpablen Fläche darstellt.

Die erste der Gleichungen (13), als Gleichung einer Tangentialebene an die durch die beiden ersten Gleichungen dargestellte abwickelbare Fläche aufgefaßt, enthält außer den veränderlichen Koordinaten nur einen Parameter in den Koeffizienten. Denkt man sich daher die Gleichung der Tangentialebene an eine Fläche in der Form

$$\xi - z = p(\xi - x) + q(\eta - y)$$

oder

$$p\xi + q\eta - \xi + z - px - qy = 0$$

geschrieben, so sind die Koeffizienten $p, q, z - px - qy$, falls die Fläche abwickelbar, Funktionen nur eines Parameters; es müssen daher p, q notwendig voneinander abhängen, d. h.

$$(22) \quad q = \varphi(p)$$

sein. Diese Gleichung, in welcher φ eine willkürliche Funktion bedeutet, charakterisiert also die abwickelbaren Flächen und wird als die *Differentialgleichung erster Ordnung* dieser Flächen-gattung bezeichnet, weil sie eine Beziehung zwischen Differentialquotienten erster Ordnung darstellt.

Man kann indessen aus (22) noch eine andere für die abwickelbaren Flächen charakteristische Gleichung ableiten, welche frei ist von einer willkürlichen Funktion. Differenziert man nämlich (22) zuerst nach x , dann nach y , so ergeben sich die Gleichungen:

$$s = \varphi'_p(p)r$$

$$t = \varphi'_p(p)s$$

und durch Division weiter $\frac{s}{t} = \frac{r}{s}$ oder

$$(23) \quad rt - s^2 = 0.$$

Diese Gleichung (vgl. 189), welche eine Beziehung ausdrückt, die für jeden Punkt einer developpablen Fläche zwischen den drei Differentialquotienten zweiter Ordnung zu Recht besteht, nennt man die *Differentialgleichung zweiter Ordnung* der abwickelbaren Flächen. Diese Feststellung hat für uns vorläufig nur die Bedeutung, daß sie in den Stand setzt, von einer durch ihre Gleichung in rechtwinkligen Koordinaten gegebenen Fläche zu entscheiden, ob sie abwickelbar ist; man bestimmt zu diesem Zwecke aus der Gleichung r, s, t und prüft, ob $rt - s^2$ identisch Null ist.

199. Die Abwicklung. Die Erzeugenden einer allgemeinen Developpabeln, als Tangenten an ihre Rückkehrkante, zerfallen durch den Berührungspunkt in je zwei Halbstrahlen;




Fig. 110.

die Halbstrahlen MT (Fig. 110), welche der positiven Richtung der Tangente entsprechen, bilden einen Mantel S , die anderen Halbstrahlen MT' einen zweiten Mantel S' , und beide Mäntel vereinigen sich in der Kurve C zu einer scharfen Kante; ein ebener Schnitt wie PMP' besteht demgemäß aus zwei Ästen, welche sich im Punkte M der Rückkehrkante zu einer Spitze verbinden.

Ihren Namen haben die abwickelbaren Flächen auf Grund der folgenden Eigenschaft erhalten. Wenn der Punkt M sich

stetig auf der Kurve C bewegt, so vollführt die zu ihm gehörige Oskulationsebene auch eine stetige Bewegung, indem sie sich auf der Fläche wälzt, sie beständig berührend; dabei nimmt sie nach und nach alle geradlinigen Erzeugenden und somit alle Punkte der Fläche in sich auf. Stellt man sich vor, daß jeder Punkt der Fläche in dem Augenblicke, wo er in die sich wälzende Tangentialebene zu liegen kommt, auf ihr haften bleibt, so wird diese Ebene nach und nach die ganze Fläche in sich aufnehmen, und zwar so, daß dabei keine Faltungen und Dehnungen, sondern nur *Biegungen* erfolgen und daher alle Linien, die vordem auf der Fläche waren, in *unveränderter Länge*, aber in veränderter Form in die Ebene übergehen. Man sagt dann, die Fläche sei auf der Ebene *abgewickelt*. Die Abwicklung bedeckt die Ebene zweifach, indem die beiden Mäntel nun übereinander zu liegen kommen; ihre gemeinsame Begrenzung ist diejenige Kurve, in welche sich die Rückkehrkante bei dem Abwicklungsprozesse transformiert.

Weil Bogenlängen bei der Abwicklung unverändert bleiben und weil zwei Tangenten von C in der Abwicklung einen Winkel einschließen, welcher die wirkliche Drehung mißt, durch welche die eine Tangente im Raume in die andere übergeführt wird (177), so hat die transformierte Rückkehrkurve in jedem Punkte eine Krümmung, welche der Flexion der Raumkurve in dem korrespondierenden Punkte gleichkommt. Die Flexion der Rückkehrkante bleibt also bei der Abwicklung unverändert erhalten, die Torsion aber geht verloren, weil aus der Raumkurve eine ebene Kurve wird.

Der Begriff der Abwickelbarkeit, wie er sich hier darbietet, ist ein spezieller: er bedeutet die Möglichkeit der *Ausbreitung* einer Fläche durch bloße Biegung *auf einer Ebene*; umgekehrt kann jede Developpable als eine Biegungsform der Ebene aufgefaßt werden. Der allgemeine Begriff der Abwickelbarkeit betrifft die Möglichkeit der *Ausbreitung* einer Fläche durch bloße Biegung *auf einer andern Fläche*; zwei Flächen, die in diesem Verhältnis zueinander stehen, heißen *aufeinander abwickelbare Flächen*. So sind zwei developpable Flächen stets auch aufeinander abwickelbar, weil sie zwei verschiedene Biegungsformen der Ebene darstellen.

Die Abwickelbarkeit ist wiederum ein besonderer Fall einer viel allgemeineren Beziehung, die man als *Abbildbarkeit zweier Flächen aufeinander* bezeichnet; man versteht darunter die Angebbbarkeit eines Prinzips, nach welchem die Punkte beider Flächen eindeutig einander zugeordnet werden können. Die Abwickelbarkeit spielt im Gebiete der Abbildbarkeit die Rolle der Kongruenz.

200. Einhüllende einer zweifach-unendlichen Flächenschar. Die Funktion $f(x, y, z, u, v)$ sei eindeutig und stetig in bezug auf die Koordinaten x, y, z wie in bezug auf die voneinander unabhängigen Parameter u, v ; dann stellt die Gleichung

$$(24) \quad f(x, y, z, u, v) = 0$$

ein System von ∞^2 Flächen oder ein *zweifach ausgedehntes Flächenkontinuum* dar. Auch bei einem solchen kann unter Umständen von einer Einhüllenden gesprochen werden, doch in einem gegenüber dem früheren Falle (193) veränderten Sinne.

Erteilt man nämlich dem v einen festen Wert, so stellt die Gleichung (24) eine einfach-unendliche Flächenschar dar, deren Einhüllende im früheren Sinne, wenn sie existiert, durch Elimination von u zwischen den Gleichungen.

$$(25) \quad f(x, y, z, u, v) = 0, \quad f'_u(x, y, z, u, v) = 0$$

bestimmt wird. Diese Elimination kann man sich so vollzogen denken, daß man aus der zweiten Gleichung u ausdrückt und den Wert dafür, der aus x, y, z, v sich zusammensetzt, in die erste Gleichung einträgt.

Die Gleichung der Einhüllenden enthält nun v , und denkt man sich dieses jetzt veränderlich, so hat man es neuerdings mit einer einfach-unendlichen Flächenschar zu tun, deren Einhüllende durch Elimination von v zwischen

$$f(x, y, z, u, v) = 0, \quad f'_v(x, y, z, u, v) + f'_u(x, y, z, u, v) \frac{\partial u}{\partial v} = 0.$$

erhalten wird; die zweite dieser Gleichungen ist aus der ersten gebildet, nachdem darin u in der besprochenen Weise durch den Ausdruck in x, y, z, v ersetzt worden ist; sie erfährt aber vermöge (25) eine Vereinfachung und lautet schließlich

$$(26) \quad f'_v(x, y, z, u, v) = 0.$$

Diese zuletzt bestimmte Einhüllende, deren Gleichung man also, alles zusammenfassend, dadurch erhält, daß man zwischen den drei Gleichungen (25) und (26), oder kurz zwischen

$$f = 0, \quad f'_u = 0, \quad f'_v = 0$$

beide Parameter u, v eliminiert, nennt man die *Einhüllende* des zweifach unendlichen Flächensystems.

Auf der Fläche u/v entsteht bei dem ersten Prozesse eine Charakteristik der Fläche (25); auf dieser entsteht bei dem zweiten Prozesse abermals eine Charakteristik, welche die frühere im allgemeinen in einer Anzahl Punkte schneidet: in diesen Punkten wird die Fläche u/v des Systems von der schließlichen Einhüllenden berührt. Darin also liegt der Unterschied gegenüber dem früheren Falle, daß nunmehr jede Eingehüllte von der Einhüllenden nur in einer Anzahl vereinzelter Punkte berührt wird.

Beispiele. 1) Jedem Punkte eines dreiachsigen Ellipsoids mit den Halbachsen a, b, c wird eine Ebene in der Weise zugeordnet, daß sie durch die Projektionen des Punktes auf den Hauptachsen der Fläche hindurchzugehen hat. Es ist die Einhüllende dieses Ebenensystems zu bestimmen.

Die Hauptachsen mögen als Koordinatenachsen gewählt werden; die reziproken Abstände der Projektionen eines Punktes M des Ellipsoids auf OX, OY, OZ von O seien u, v, w ; dann lautet die Gleichung des Ebenensystems:

$$ux + vy + wz - 1 = 0,$$

wobei jedoch u, v, w an folgende Bedingung geknüpft sind:

$$\frac{1}{a^2 u^2} + \frac{1}{b^2 v^2} + \frac{1}{c^2 w^2} - 1 = 0.$$

Hier empfiehlt sich ein Rechnungsgang, der dem in 193 erläuterten analog ist. Betrachtet man u, v als die unabhängigen Parameter, so gibt die Differentiation beider Gleichungen nach u einerseits und nach v andererseits:

$$\begin{aligned} x + s \frac{\partial w}{\partial u} &= 0, & y + s \frac{\partial w}{\partial v} &= 0, \\ \frac{1}{a^2 u^3} + \frac{1}{c^2 w^3} \frac{\partial w}{\partial u} &= 0, & \frac{1}{b^2 v^3} + \frac{1}{c^2 w^3} \frac{\partial w}{\partial v} &= 0; \end{aligned}$$

durch Elimination der Differentialquotienten erhält man die Beziehung

$$a^3 u^3 x = b^3 v^3 y = c^3 w^3 z$$

und es bedarf nur noch der Elimination von u, v, w zwischen diesen zwei und den ursprünglichen zwei Gleichungen. Bezeichnet man den gemeinsamen Wert der letzten drei Produkte mit p , so hat man einmal:

$$ux = \frac{p}{a^3 u^3}$$

$$vy = \frac{p}{b^3 v^3}$$

$$wz = \frac{p}{c^3 w^3},$$

woraus sich durch Addition unter Beachtung der gegebenen Gleichungen $p = 1$ ergibt; andererseits ist mit Benutzung dieses Wertes von p :

$$\frac{x}{a} = \frac{1}{a^3 u^3}$$

$$\frac{y}{b} = \frac{1}{b^3 v^3}$$

$$\frac{z}{c} = \frac{1}{c^3 w^3}$$

und daraus erhält man als Gleichung der Einhüllenden:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{z}{c}\right)^{\frac{2}{3}} = 1.$$

Zwei Bemerkungen mögen hinzugefügt werden. Für alle Punkte eines Hauptschnittes des Ellipsoids fällt die Ebene des Systems mit der Ebene dieses Hauptschnittes zusammen; demnach ist eine solche Ebene Tangentialebene an die Einhüllende nicht in einem einzelnen Punkte, sondern längs einer Linie; in der Tat hat die Fläche in den Koordinatenebenen scharfe Kanten (Schneiden).

Für die Scheitelpunkte des Ellipsoids wird die Ebene des Systems unbestimmt, dieser Umstand deutet auf singuläre Punkte an der Einhüllenden hin; diese hat denn auch in den Koordinatenachsen vierschneidige Spitzen.

2) Aus den Punkten desselben und auf das nämliche Koordinatensystem bezogenen Ellipsoids werden Kugeln beschrieben.

die durch den Mittelpunkt der Fläche gehen. Es ist die Einhüllende dieses Kugelsystems zu bestimmen.

Sind α, β, γ die Koordinaten eines beliebigen Punktes des Ellipsoids, so kommt dem Kugelsystem die Gleichung

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2\alpha x - 2\beta y - 2\gamma z = 0$$

zu, wobei jedoch

$$\frac{\alpha^2}{a^2} + \frac{\beta^2}{b^2} + \frac{\gamma^2}{c^2} = 1$$

ist. Sieht man α, β als die unabhängigen Parameter an und differenziert beide Gleichungen danach, so entstehen die Gleichungspaare:

$$\begin{aligned} x + z \frac{\partial \gamma}{\partial \alpha} &= 0, & y + z \frac{\partial \gamma}{\partial \beta} &= 0, \\ \frac{\alpha}{a^2} + \gamma \frac{\partial \gamma}{\partial \alpha} &= 0, & \frac{\beta}{b^2} + \gamma \frac{\partial \gamma}{\partial \beta} &= 0; \end{aligned}$$

nach Ausscheidung der Differentialquotienten ergibt sich daraus die Relation

$$\frac{a^2 x}{\alpha} = \frac{b^2 y}{\beta} = \frac{c^2 z}{\gamma} (= \kappa).$$

Geht man mit den Werten

$$\alpha = \frac{a^2 x}{\kappa}, \quad \beta = \frac{b^2 y}{\kappa}, \quad \gamma = \frac{c^2 z}{\kappa}$$

in die beiden gegebenen Gleichungen ein, so entsteht:

$$\begin{aligned} a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2 &= \kappa^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 &= \frac{a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2}{\kappa} \end{aligned}$$

und durch Elimination von κ die Gleichung der Einhüllenden:

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 4(a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2).$$

Alle Kugeln des Systems gehen durch einen Punkt, den Mittelpunkt des Ellipsoids; dieser erscheint denn auch als Punkt der Einhüllenden, aber als ein singulärer, indem er außer Zusammenhang mit der übrigen Fläche steht und daher als ein isolierter Punkt zu bezeichnen ist.

§ 5. Die Polarfläche einer Raumkurve.

201. Analytische Bestimmung der Polarfläche. Drei abwickelbare Flächen stehen mit einer Raumkurve in einem organischen Zusammenhange und sind für die Erfor-

schung ihrer Eigenschaften von grundlegender Bedeutung; sie sind der Reihe nach bestimmt durch die Schar der Oskulations-ebenen, die Schar der Normalebenen und die Schar der rektifizierenden Ebenen.

Die an erster Stelle genannte Developpable ist bereits Gegenstand der Untersuchung gewesen (196); da ihre Charakteristiken die Tangenten der Raumkurve sind, so wird sie als deren *Tangentenfläche* bezeichnet.

Die zweite, die jetzt näher betrachtet werden soll, führt den Namen *Polarfläche*.

Von der dritten sei außer dem Namen *rektifizierende Developpable* noch erwähnt, daß man ihre Charakteristiken als rektifizierende Geraden bezeichnet.

Sind diese drei Flächen durch die *Seitenebenen* des begleitenden Trieders bestimmt, so liegt es nahe, auch jenen Flächen die Aufmerksamkeit zuzuwenden, die sich als Orte seiner *Kanten*: der Tangenten, Hauptnormalen und Binormalen ergeben. Die Fläche der Tangenten ist identisch mit der erstgenannten Developpablen; die Flächen der Hauptnormalen und der Binormalen sind im allgemeinen windschief und werden hier nicht weiter in Betracht gezogen.

Nicht ohne Nutzen ist es, darnach zu fragen, was aus allen diesen Gebilden bei einer *ebenen* Kurve wird. Als Tangentenfläche tritt die Kurvenebene, genauer gesprochen ein bestimmter Teil derselben (der von den reellen Tangenten bedeckte) auf. Die Polarfläche ist vertreten durch den zur Kurvenebene senkrechten Zylinder, dessen Leitlinie die Evolute der Kurve ist. Als rektifizierende Developpable erscheint der gleichgerichtete Zylinder durch die Kurve selbst. Die Orte der Tangenten, der Hauptnormalen und Binormalen liefern nichts Neues mehr.

Alle auf die *Polarfläche* bezüglichen Fragen finden ihre Erledigung in jenen drei Gleichungen, auf welche die Theorie der abwickelbaren Flächen geführt hat, nämlich in der Gleichung der Normalebene eines veränderlich gedachten Punktes $M(x/y/z)$ der gegebenen Kurve C und jenen zwei Gleichungen, welche aus ihr durch ein- und zweimalige Differentiation nach

dem veränderlichen Parameter hervorgehen; als solchen wählen wir die Bogenlänge s . Die erste Gleichung lautet:

$$(\xi - x) \cos \alpha + (\eta - y) \cos \beta + (\zeta - z) \cos \gamma = 0;$$

die zweite, zunächst in unentwickelter Form:

$$\begin{aligned} & (\xi - x) \frac{d \cos \alpha}{ds} + (\eta - y) \frac{d \cos \beta}{ds} + (\zeta - z) \frac{d \cos \gamma}{ds} \\ & - \left(\frac{dx}{ds} \cos \alpha + \frac{dy}{ds} \cos \beta + \frac{dz}{ds} \cos \gamma \right) = 0; \end{aligned}$$

der letzte Klammerausdruck aber hat den Wert 1, weil $\frac{dx}{ds} = \cos \alpha$, ... daher ist mit Beachtung der Gruppe (I) der Frenet-schen Formeln (183) die endgültige Form dieser Gleichung:

$$(\xi - x) \cos \lambda + (\eta - y) \cos \mu + (\zeta - z) \cos \nu = \varrho;$$

die dritte ergibt sich zuerst in der Gestalt

$$\begin{aligned} & (\xi - x) \frac{d \cos \lambda}{ds} + (\eta - y) \frac{d \cos \mu}{ds} + (\zeta - z) \frac{d \cos \nu}{ds} \\ & - \left(\frac{dx}{ds} \cos \lambda + \frac{dy}{ds} \cos \mu + \frac{dz}{ds} \cos \nu \right) = \frac{d\varrho}{ds} \end{aligned}$$

und weil der letzte Klammerausdruck den Wert Null hat, so hat man schließlich mit Benutzung der Gruppe (III) der Frenet-schen Formeln und unter Rücksichtnahme auf die erste Gleichung:

$$(\xi - x) \cos \varphi + (\eta - y) \cos \psi + (\zeta - z) \cos \chi = -T \frac{d\varrho}{ds}.$$

Demnach lautet das die Polarfläche charakterisierende Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} & (\xi - x) \cos \alpha + (\eta - y) \cos \beta + (\zeta - z) \cos \gamma = 0 \\ (1) \quad & (\xi - x) \cos \lambda + (\eta - y) \cos \mu + (\zeta - z) \cos \nu = \varrho \\ & (\xi - x) \cos \varphi + (\eta - y) \cos \psi + (\zeta - z) \cos \chi = -T \frac{d\varrho}{ds}. \end{aligned}$$

Einzelnen und bei festem M betrachtet, stellen diese drei Gleichungen vermöge ihrer Richtungskosinus drei zueinander senkrechte Ebenen dar, welche sich in jenem Punkte M_0 der Rückkehrkante C_0 der Polarfläche schneiden, der durch dieselben drei Gleichungen zusammen bestimmt ist; sie bilden, wie sich leicht erkennen läßt, das begleitende Dreikant des Punktes M_0 der Kurve C_0 .

Denn die erste Ebene ist Oskulationsebene von C_0 in M_0 ; die zweite schneidet sie längs der Charakteristik, also längs der Tangente an C_0 in M_0 , und da sie auf ihr senkrecht steht, so ist sie die rektifizierende Ebene; die dritte, zu den beiden vorgenannten senkrecht, ist demnach die Normalebene.

Daraus folgt weiter, daß die Schnittlinie der zweiten Ebene mit der dritten die Binormale, die Schnittlinie der dritten mit der ersten die Hauptnormale von C_0 in M_0 ist. Nimmt man hinzu, daß die Richtungskosinus der Schnittlinie zweier der Ebenen (1) übereinstimmen mit den Richtungskosinus der jeweiligen dritten Ebene (181), so ergibt sich der Satz: *Die Kurven C und C_0 stehen in solcher Beziehung zueinander, daß in korrespondierenden Punkten die Tangente der einen der Binormale der anderen parallel ist, die Hauptnormalen aber untereinander parallel laufen.*

Die Auflösung der Gleichungen (1) nach ξ, η, ζ werde mit x_0, y_0, z_0 bezeichnet; da die Determinante des Systems den Wert 1 hat, so lautet diese Auflösung wie folgt:

$$\begin{aligned}
 x_0 = x + & \begin{vmatrix} 0 & \cos \beta & \cos \gamma \\ \varrho & \cos \mu & \cos \nu \\ -T \frac{d\varrho}{ds} & \cos \psi & \cos \chi \end{vmatrix} = x + \varrho \cos \lambda - T \frac{d\varrho}{ds} \cos \varphi \\
 (2) \quad y_0 = y + & \begin{vmatrix} \cos \alpha & 0 & \cos \gamma \\ \cos \lambda & \varrho & \cos \nu \\ \cos \varphi & -T \frac{d\varrho}{ds} & \cos \chi \end{vmatrix} = y + \varrho \cos \mu - T \frac{d\varrho}{ds} \cos \psi \\
 z_0 = z + & \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & 0 \\ \cos \lambda & \cos \mu & \varrho \\ \cos \varphi & \cos \psi & -T \frac{d\varrho}{ds} \end{vmatrix} = z + \varrho \cos \nu - T \frac{d\varrho}{ds} \cos \chi.
 \end{aligned}$$

Bei festem s bestimmen diese Gleichungen den dem Punkte M von C korrespondierenden Punkt M_0 der Rückkehrkante C_0 der Polarfläche, bei veränderlichem s stellen sie die Kurve C_0 selbst dar.

202. Die oskulierende Kugel. Der Punkt M_0 hat für die Kurve C im Punkte M noch eine andere wichtige geo-

metrische Bedeutung: Er ist der Mittelpunkt derjenigen unter den durch M gehenden Kugeln, welche sich der Kurve C in der Umgebung von M am engsten anschließt; sie wird die *oskulierende Kugel* oder *Schmiegunskugel* der Kurve C im Punkte M genannt.

Um dies zu erweisen, gehen wir von der allgemeinen Gleichung einer Kugel mit dem Mittelpunkt M_0 :

$$(3) \quad (\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 + (\zeta - z_0)^2 = R^2$$

aus und schreiben ihr zunächst nur vor, daß sie durch den Punkt M zu gehen habe; dies gibt zur Bestimmung ihrer Parameter x_0, y_0, z_0, R die erste Gleichung:

$$(4) \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Nun wählen wir auf C einen dem M benachbarten Punkt M_1 mit dem Parameterwerte $s + h$, dessen Koordinaten sich (184) wie folgt ausdrücken:

$$\begin{aligned} x_1 &= x + h \cos \alpha + \frac{h^2}{2\varrho} \cos \lambda + \frac{h^3}{6} \frac{d^3 x}{ds^3} + \varepsilon_1 \\ y_1 &= y + h \cos \beta + \frac{h^2}{2\varrho} \cos \mu + \frac{h^3}{6} \frac{d^3 y}{ds^3} + \varepsilon_2 \\ z_1 &= z + h \cos \gamma + \frac{h^2}{2\varrho} \cos \nu + \frac{h^3}{6} \frac{d^3 z}{ds^3} + \varepsilon_3 \end{aligned}$$

und bestimmen das Quadrat seiner Entfernung D vom Mittelpunkte der Kugel; es ist

$$\begin{aligned} D^2 &= \left[x - x_0 + h \cos \alpha + \frac{h^2}{2\varrho} \cos \lambda + \frac{h^3}{6} \frac{d^3 x}{ds^3} + \varepsilon_1 \right]^2 \\ &+ \left[y - y_0 + h \cos \beta + \frac{h^2}{2\varrho} \cos \mu + \frac{h^3}{6} \frac{d^3 y}{ds^3} + \varepsilon_2 \right]^2 \\ &+ \left[z - z_0 + h \cos \gamma + \frac{h^2}{2\varrho} \cos \nu + \frac{h^3}{6} \frac{d^3 z}{ds^3} + \varepsilon_3 \right]^2 \\ (5) \quad &= (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \\ &+ 2h[(x - x_0) \cos \alpha + (y - y_0) \cos \beta + (z - z_0) \cos \gamma] \\ &+ \frac{h^2}{\varrho} [(x - x_0) \cos \lambda + (y - y_0) \cos \mu + (z - z_0) \cos \nu + \varrho] \\ &+ \frac{h^3}{8} \left[(x - x_0) \frac{d^3 x}{ds^3} + (y - y_0) \frac{d^3 y}{ds^3} + (z - z_0) \frac{d^3 z}{ds^3} \right] + E, \end{aligned}$$

wobei E wie $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ Größen der vierten Ordnung bezüglich h bedeuten.

Der letzte Klammersausdruck kann noch wie folgt transformiert werden. Differenziert man die Gleichung (181, (11)):

$$\cos \lambda = \varrho \frac{d^2 x}{ds^2}$$

nach s und benutzt dabei die Gruppe (III) der Frenetschen Formeln (183), so ergibt sich:

$$\begin{aligned} & -\frac{\cos \alpha}{\varrho} - \frac{\cos \varphi}{T} = \frac{d\varrho}{ds} \cdot \frac{\cos \lambda}{\varrho} + \varrho \frac{d^3 x}{ds^3} \\ \text{analog} \quad & -\frac{\cos \beta}{\varrho} - \frac{\cos \psi}{T} = \frac{d\varrho}{ds} \cdot \frac{\cos \mu}{\varrho} + \varrho \frac{d^3 y}{ds^3} \\ & -\frac{\cos \gamma}{\varrho} - \frac{\cos \chi}{T} = \frac{d\varrho}{ds} \cdot \frac{\cos \nu}{\varrho} + \varrho \frac{d^3 z}{ds^3}; \end{aligned}$$

multipliziert man diese Gleichungen der Reihe nach mit $x - x_0$, $y - y_0$, $z - z_0$ und addiert hierauf, so bekommt man:

$$\begin{aligned} & (x - x_0) \frac{d^3 x}{ds^3} + (y - y_0) \frac{d^3 y}{ds^3} + (z - z_0) \frac{d^3 z}{ds^3} \\ &= -\frac{1}{\varrho^2} [(x - x_0) \cos \alpha + (y - y_0) \cos \beta + (z - z_0) \cos \gamma] \\ & \quad - \frac{1}{\varrho T} [(x - x_0) \cos \varphi + (y - y_0) \cos \psi + (z - z_0) \cos \chi] \\ & \quad - \frac{1}{\varrho^2} \frac{d\varrho}{ds} [(x - x_0) \cos \lambda + (y - y_0) \cos \mu + (z - z_0) \cos \nu]. \end{aligned}$$

Hiermit folgt aus (5), wenn auf die Gleichung (4) Rücksicht genommen wird:

$$\begin{aligned} & (D + R)(D - R) \\ &= 2h[(x - x_0) \cos \alpha + (y - y_0) \cos \beta + (z - z_0) \cos \gamma] \\ & \quad + \frac{h^2}{\varrho} [(x - x_0) \cos \lambda + (y - y_0) \cos \mu + (z - z_0) \cos \nu + \varrho] \\ & \quad - \frac{h^2}{8} \left[\frac{1}{\varrho^2} \{ (x - x_0) \cos \alpha + (y - y_0) \cos \beta + (z - z_0) \cos \gamma \} \right. \\ & \quad + \frac{1}{\varrho^2} \frac{d\varrho}{ds} \{ (x - x_0) \cos \lambda + (y - y_0) \cos \mu + (z - z_0) \cos \nu \} \\ & \quad \left. + \frac{1}{\varrho T} \{ (x - x_0) \cos \varphi + (y - y_0) \cos \psi + (z - z_0) \cos \chi \} \right] + E. \end{aligned}$$

Die Differenz $D - R$ drückt den kürzesten Abstand des Punktes M_1 von der Kugel aus; da die Kugel, um bestimmt zu sein, noch drei Bedingungen unterworfen werden muß, so setzen wir fest, der kürzeste Abstand solle von höchstmöglicher, also von vierter Kleinheitsordnung sein; dazu ist notwendig, daß zunächst:

$$(x_0 - x) \cos \alpha + (y_0 - y) \cos \beta + (z_0 - z) \cos \gamma = 0$$

$$(x_0 - x) \cos \lambda + (y_0 - y) \cos \mu + (z_0 - z) \cos \nu = \varrho$$

sei; und damit auch der Koeffizient von h^3 verschwinde, muß außerdem

$$(x_0 - x) \cos \varphi + (y_0 - y) \cos \psi + (z_0 - z) \cos \chi = -T \frac{d\varrho}{ds}$$

sein. Diese drei Gleichungen stimmen aber mit dem System (1) überein, aus welchem sich der Punkt (2) ergeben hat, und damit ist die aufgestellte Behauptung erwiesen.

Die oskulierende Kugel berührt die Kurve in M ; denn da ihr Mittelpunkt vermöge der ersten Gleichung in der Normalenebene von M liegt, so ist die Tangente an die Kurve zugleich Tangente der Kugel. Die Berührung ist als eine solche der dritten Ordnung zu bezeichnen (147).

Für den Halbmesser R der oskulierenden Kugel hat man nun auf Grund von (4) und (2) die Bestimmung:

$$(6) \quad R^2 = \varrho^2 + \left(T \frac{d\varrho}{ds}\right)^2.$$

203. Der Krümmungskreis. Die oskulierende Kugel schneidet die oskulierende Ebene des Punktes M nach einem die Kurve in M berührenden Kreise, dessen Elemente sich wie folgt bestimmen.

Sein Mittelpunkt \mathcal{Q} ist der Fußpunkt der Geraden

$$(7) \quad \begin{cases} (\xi - x) \cos \alpha + (\eta - y) \cos \beta + (\xi - z) \cos \gamma = 0 \\ (\xi - x) \cos \lambda + (\eta - y) \cos \mu + (\xi - z) \cos \nu = \varrho \end{cases}$$

auf der Oskulationsebene von C in M , deren Gleichung ist:

$$(8) \quad (\xi - x) \cos \varphi + (\eta - y) \cos \psi + (\xi - z) \cos \chi = 0;$$

denn jene Gerade geht laut (1) durch den Mittelpunkt der Kugel und steht auf der Ebene (8) normal. Behält man also

für den Mittelpunkt Ω die Bezeichnung ξ, η, ζ bei, so ergibt sich aus (7) und (8) für ihn die Bestimmung:

$$(9) \quad \begin{aligned} \xi - x &= \begin{vmatrix} 0 & \cos \beta \cos \gamma \\ \varrho & \cos \mu \cos \nu \\ 0 & \cos \psi \cos \chi \end{vmatrix} = \varrho \cos \lambda, \\ \eta - y &= \begin{vmatrix} \cos \alpha & 0 & \cos \gamma \\ \cos \lambda & \varrho & \cos \nu \\ \cos \varphi & 0 & \cos \chi \end{vmatrix} = \varrho \cos \mu, \\ \zeta - z &= \begin{vmatrix} \cos \alpha \cos \beta & 0 \\ \cos \lambda \cos \mu & \varrho \\ \cos \varphi \cos \psi & 0 \end{vmatrix} = \varrho \cos \nu. \end{aligned}$$

Weil hiernach $\xi - x, \eta - y, \zeta - z$ gleich bezeichnet sind beziehungsweise mit $\cos \lambda, \cos \mu, \cos \nu$, so liegt der Punkt Ω von M aus gezählt in der positiven Richtung MH der Hauptnormale, also auf der konkaven Seite der Kurve in dem in 181 erläuterten Sinne.

Für den Halbmesser des Kreises geben die Gleichungen (9) den Wert ϱ .


Man nennt daher diesen Kreis, weil sein Halbmesser mit dem Halbmesser der ersten Krümmung übereinstimmt, den *Krümmungskreis*, auch *Oskulations-* oder *Schmiegunskreis*, seinen Mittelpunkt Ω den *Krümmungsmittelpunkt*, die Oskulationsebene, da sie diesen Kreis enthält, auch *Krümmungsebene*, und die Gerade (7), welche zur letzteren Ebene im Punkte Ω normal steht, die *Krümmungsachse* oder *Polarlinie* der Kurve C im Punkte M .

Ein Blick auf Fig. 111 und auf die Gleichung (6) lehrt, daß der Abstand P des Mittelpunktes der oskulierenden Kugel von der Oskulationsebene bestimmt ist durch die Formel:

$$(10) \quad P^2 = \left(T \frac{d\varrho}{ds} \right)^2.$$

Auf Grund der Ergebnisse dieses und des vorangehenden Artikels kann man die Polarfläche einer Raumkurve C auch

Fig. 111.




als den Ort ihrer Krümmungsachsen und die Rückkehrkante der Polarfläche als den Ort der Mittelpunkte der oskulierenden Kugeln definieren.

Während dem Radius der ersten Krümmung eine mit der Kurve unmittelbar zusammenhängende geometrische Bedeutung zukommt analog jener bei ebenen Kurven, ist dies bei dem Torsionshalbmesser nicht der Fall; nur indirekte geometrische Interpretationen sind für ihn gefunden worden.*) Überhaupt ist der Kreis nicht geeignet, die Gestaltung einer Raumkurve im Kleinen, das heißt innerhalb eines engen Bereiches erschöpfend zu approximieren; dies könnte nur wieder eine Raumkurve leisten. Unter den Raumkurven kommt nun der gemeinen Schraubenlinie wegen ihrer besonders einfachen Krümmungsverhältnisse eine ähnliche Stellung zu wie dem Kreise unter den ebenen Kurven. Diese Erwägung hat zum Begriff der *Schmiegunsschraubenlinie* geführt; es ist dies jene Schraubenlinie, die im betrachteten Kurvenpunkt dieselbe Tangente, dieselbe Torsion und dieselbe Krümmungsachse hat wie die Kurve; die Achse ihres Zylinders enthält den kürzesten Abstand benachbarter Hauptnormalen. Doch möge die bloße Erwähnung dieses Begriffs genügen.

204. Spezielle Raumkurven. Die Formel (10) lehrt, daß der Mittelpunkt der oskulierenden Kugel mit dem Krüm-

*) Eine solche, von *B. de Saint-Venant* [Journ. de l'école polytechn. 15 (1835)] stammende Interpretation gründet sich auf folgende Betrachtung. Die Tangentendevoloppable der Kurve werde von einer Ebene geschnitten, die vom Punkte M den Normalabstand v hat und parallel ist seiner Normalebene (Fig. 112). Das Bogendifferential QQ' der Schnittkurve kann durch $v d\tau$ ausgedrückt werden, wenn $d\tau$ der Kontingenzwinkel des Elements MM' der betrachteten Linie ist, und der Kontingenzwinkel dieses Bogendifferentials unterscheidet sich nur um eine Größe höherer Ordnung von dem Winkel der Oskulationsebenen in M und M' , also von dem Torsionswinkel $d\theta$ des Elements MM' . In Folge dessen drückt sich der Krümmungsradius der Schnittkurve in Q durch

Fig. 112.



$$\frac{v d\tau}{d\theta}$$

mungsmittelpunkte zusammenfällt bei Kurven, für welche beständig

$$\frac{d\varrho}{ds} = 0,$$

also für Kurven von konstantem Flexionshalbmesser; dann aber ist vermöge (6) auch R konstant. Dies findet demnach bei der gemeinen Schraubenlinie statt.

In Punkten mit stationärer Oskulationsebene ist die Torsion $\frac{1}{T}$ Null, der Torsionshalbmesser also und mit ihm P (sofern $\frac{d\varrho}{ds}$ von Null verschieden ist) unendlich; solchen Punkten entsprechen daher unendlich ferne Punkte der Rückkehrkante der Polarfläche.

Wir wollen ferner nach Kurven fragen, bei welchen der Halbmesser der Schmiegunskugel konstant ist. Dies erfordert nach (6), daß

$$\varrho \frac{d\varrho}{ds} + T \frac{d\varrho}{ds} \frac{d\left(T \frac{d\varrho}{ds}\right)}{ds}$$

identisch verschwinde, oder daß beständig

$$(11) \quad T \frac{d\varrho}{ds} \left[\frac{\varrho}{T} + \frac{d\left(T \frac{d\varrho}{ds}\right)}{ds} \right] = 0$$

sei. Dies tritt ein bei $\frac{d\varrho}{ds} \equiv 0$, ein bereits erledigter Fall; ferner dann, wenn der Ausdruck in der eckigen Klammer beständig Null ist.

Um dies geometrisch zu deuten, differentiire man die erste der Gleichungen 201, (2) nach s unter Bezugnahme auf die Frenetschen Formeln; dadurch ergibt sich:

oder, da $\frac{d\tau}{d\theta} = \frac{T}{\varrho}$ ist, durch

$$\frac{v T}{\varrho}$$

aus; er ist sonach geradezu gleich T , wenn man $v = \varrho$ macht. Trägt man also auf der Tangente in M nach einer der beiden Seiten ϱ ab, legt durch den erhaltenen Punkt Q einen zur Tangente normalen Schnitt durch die Tangentendevolppable, so hat dieser in Q einen Krümmungsradius, der gleichkommt dem Torsionsradius in M .

$$\begin{aligned} \frac{dx_0}{ds} &= \cos \alpha + \frac{d\varrho}{ds} \cos \lambda - \varrho \left(-\frac{\cos \alpha}{\varrho} - \frac{\cos \varphi}{T} \right) \\ &\quad - \frac{d \left(T \frac{d\varrho}{ds} \right)}{ds} \cos \varphi - \frac{d\varrho}{ds} \cos \lambda, \end{aligned}$$

und nach entsprechender Reduktion

$$\frac{dx_0}{ds} = - \left(\frac{\varrho}{T} + \frac{d \left(T \frac{d\varrho}{ds} \right)}{ds} \right) \cos \varphi;$$

ebenso ergeben die beiden anderen Gleichungen des angezogenen Systems:

$$\frac{dy_0}{ds} = - \left(\frac{\varrho}{T} + \frac{d \left(T \frac{d\varrho}{ds} \right)}{ds} \right) \cos \psi,$$

$$\frac{dz_0}{ds} = - \left(\frac{\varrho}{T} + \frac{d \left(T \frac{d\varrho}{ds} \right)}{ds} \right) \cos \chi;$$

das identische Verschwinden des zweiten Faktors in (11) hat also zur Folge, daß beständig

$$\frac{dx_0}{ds} = 0, \quad \frac{dy_0}{ds} = 0, \quad \frac{dz_0}{ds} = 0$$

oder daß

$$x_0 = \text{const.}, \quad y_0 = \text{const.}, \quad z_0 = \text{const.}$$

ist. Dann aber gibt es für alle Punkte der Kurve nur eine Oskulationskugel, die Kurve selbst liegt auf einer Kugel und wird eine *sphärische Raumkurve* genannt; ihre Polarfläche ist ein Kegel, der den Mittelpunkt der Kugel zur Spitze hat (Beispiel, 173, 2)).

205. Beispiel. Es ist die Polarfläche der Schraubenlinie

$$x = a \cos u$$

$$y = a \sin u$$

$$z = bu$$

zu charakterisieren.

Mit Benutzung der in 185, 1) gefundenen Resultate:

$$\varrho = \frac{a^2 + b^2}{a}, \quad T = -\frac{a^2 + b^2}{b}, \quad \frac{ds}{du} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\cos \lambda = -\cos u, \quad \cos \mu = -\sin u, \quad \cos \nu = 0,$$

$$\cos \varphi = \frac{b \sin u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \psi = -\frac{b \cos u}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \cos \chi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

ergibt die Ausführung der Gleichungen 201, (2) folgendes Resultat:

$$x_0 = -\frac{b^2}{a} \cos u$$

$$y_0 = -\frac{b^2}{a} \sin u$$

$$z_0 = bu;$$

führt man an Stelle von u einen neuen Winkel u' durch die Gleichung

$$u' = u + \pi$$

ein, so gehen die letzten Gleichungen über in

$$x_0 = \frac{b^2}{a} \cos u'$$

$$y_0 = \frac{b^2}{a} \sin u'$$

$$z_0 = b(u' - \pi);$$

die Rückkehrkante der Polarfläche ist also eine mit der gegebenen in gleichem Sinne gewundene Schraubenlinie auf einem Zylinder vom Halbmesser $\frac{b^2}{a}$; während die erste durch einen Punkt der positiven x -Achse geht, schneidet die zweite die negative x -Achse; in der Ganghöhe stimmt sie mit der ursprünglichen überein.

Die Polarfläche einer Schraubenlinie ist demnach eine abwickelbare Schraubenfläche.

206. Evoluten und Evolventen einer Raumkurve. Der Begriff der *Evolute* einer ebenen Kurve läßt sich auf eine Raumkurve übertragen, wenn man nicht die Definition der Evolute als Ort der Krümmungsmittelpunkte zum Ausgang nimmt, sondern das Hauptgewicht auf die Eigenschaft legt, daß die Tangenten der Evolute Normalen der ursprünglichen Kurve sind. Bei dieser Auffassung hat eine Raumkurve — und wie später ausführlich dargelegt werden wird, auch eine Plankurve — unendlich viele Evoluten, die sämtlich auf der Polarfläche liegen, weshalb diese auch *Evolutenfläche* genannt wird.

Das System der Normalen, das zu einer Evolute Anlaß gibt, bildet eine abwickelbare Fläche, deren Gratlinie eben diese Evolute ist.

Ist nämlich C' eine Evolute von C , M' ein Punkt derselben und $M'M$ die Tangente in diesem Punkte an C' und zugleich Normale in M zur Kurve C , so erfolgt, sobald M auf C sich zu bewegen beginnt, eine momentane Drehung von MM' um den Punkt M' ; gleichzeitig dreht sich die Normalebene von M augenblicklich um die Krümmungsachse des Punktes M ; soll demnach $M'M$ normal bleiben zur Kurve C , so muß M' auf der Krümmungsachse liegen. Es gehört also der einem beliebigen Punkte M zugeordnete Punkt M' der Evolute der Krümmungsachse von M an, folglich liegt die ganze Evolute auf der Polarfläche.

Um die Evoluten analytisch zu charakterisieren, seien die Koordinaten des Punktes M' einer solchen mit x', y', z' , sein Abstand von der Oskulationsebene mit σ bezeichnet mit der Festsetzung, daß σ positiv oder negativ ist, je nachdem die Strecke $\Omega M'$ (Fig. 113) die positive oder negative Richtung der Binormale hat; für den Punkt M werden alle bisher eingeführten Bezeichnungen beibehalten.

Die Koordinatendifferenzen der Punkte M und M' ergeben sich durch Projektion des rechtwinkligen Linienzuges $M\Omega M'$ auf die drei Koordinatenachsen wie folgt:


$$(12) \quad \begin{cases} x' - x = \rho \cos \lambda + \sigma \cos \varphi \\ y' - y = \rho \cos \mu + \sigma \cos \psi \\ z' - z = \rho \cos \nu + \sigma \cos \chi. \end{cases}$$

Die Koordinatendifferenzen sind den Kosinus der Richtungswinkel von MM' proportional; denselben Richtungskosinus sind aber, da MM' Tangente an die Evolute ist, auch die Quotienten $\frac{dx'}{ds}, \frac{dy'}{ds}, \frac{dz'}{ds}$ proportional; daher bestehen die Relationen:

$$(13) \quad \frac{x' - x}{p} = \frac{dx'}{ds}, \quad \frac{y' - y}{p} = \frac{dy'}{ds}, \quad \frac{z' - z}{p} = \frac{dz'}{ds},$$

wobei p den Proportionalitätsfaktor bedeutet. Führt man die

Fig. 114.



erste dieser Relationen auf Grund von (12) und der Frenet-schen Formeln durch, so ergibt sich:

$$\frac{\varrho \cos \lambda + \sigma \cos \varphi}{p} = \cos \alpha + \frac{d\varrho}{ds} \cos \lambda + \varrho \left(-\frac{\cos \alpha}{\varrho} - \frac{\cos \varphi}{T} \right) + \frac{d\sigma}{ds} \cos \varphi + \sigma \frac{\cos \lambda}{T}$$

und nach entsprechender Reduktion

$$\frac{\varrho \cos \lambda + \sigma \cos \varphi}{p} = \left(\frac{d\varrho}{ds} + \frac{\sigma}{T} \right) \cos \lambda + \left(\frac{d\sigma}{ds} - \frac{\varrho}{T} \right) \cos \varphi.$$

Daraus schließt man, daß

$$(14) \quad \begin{cases} \frac{\varrho}{p} = \frac{d\varrho}{ds} + \frac{\sigma}{T} \\ \frac{\sigma}{p} = \frac{d\sigma}{ds} - \frac{\varrho}{T} \end{cases}$$

und erhält weiter durch Elimination von p die folgende Beziehung, welcher die Größe σ zu entsprechen hat:

$$\frac{\varrho d\sigma - \sigma d\varrho}{\varrho^2} = \frac{ds}{1 + \left(\frac{\sigma}{\varrho} \right)^2}.$$

In der linken Seite dieser Gleichung erkennt man das Differential von $\operatorname{arctg} \frac{\sigma}{\varrho}$; kennt man ferner eine Funktion τ von s , derer Differential $\frac{ds}{T}$ ist, so ist $\tau + c$ die allgemeinste Form einer Funktion von dieser Eigenschaft, wenn c eine willkürliche Konstante bezeichnet, und somit ist

$$\operatorname{arctg} \frac{\sigma}{\varrho} = \tau + c$$

diejenige Gleichung, welche die allgemeinste Bestimmung von σ liefert; es folgt daraus:

$$\sigma = \varrho \operatorname{tg}(\tau + c)$$

und hiermit nehmen die Gleichungen (12) zur analytischen Darstellung der Evoluten von C die endgültige Gestalt an:

$$(15) \quad \begin{cases} x' = x + \varrho \cos \lambda + \varrho \operatorname{tg}(\tau + c) \cos \varphi \\ y' = y + \varrho \cos \mu + \varrho \operatorname{tg}(\tau + c) \cos \psi \\ z' = z + \varrho \cos \nu + \varrho \operatorname{tg}(\tau + c) \cos \chi. \end{cases}$$

Weil c unendlich viele verschiedene Werte annehmen kann, so hat eine Kurve unendlich viele Evoluten.

Aus den Formeln (13), d. i. aus

$$\begin{aligned}\frac{dx'}{ds} &= \frac{\varrho \cos \lambda + \sigma \cos \varphi}{p} \\ \frac{dy'}{ds} &= \frac{\varrho \cos \mu + \sigma \cos \psi}{p} \\ \frac{dz'}{ds} &= \frac{\varrho \cos \nu + \sigma \cos \chi}{p}\end{aligned}$$

folgt, wenn man quadriert und summiert,

$$\frac{ds'^2}{ds^2} = \frac{\varrho^2 + \sigma^2}{p^2};$$

zieht man die Relationen (14) hinzu, da sie für die Evoluten charakteristisch sind, und eliminiert zwischen beiden $\frac{1}{T}$, so ergibt sich für p die Bestimmung:

$$p = \frac{(\varrho^2 + \sigma^2) d\sigma}{\varrho d\varrho + \sigma d\sigma};$$

diese in die obige Gleichung eingetragen gibt:

$$(16) \quad ds' = \pm \frac{\varrho d\varrho + \sigma d\sigma}{\sqrt{\varrho^2 + \sigma^2}} = \pm d(\sqrt{\varrho^2 + \sigma^2}).$$

Diese Gleichung drückt die Eigenschaft aus, daß das Bogen-differential der Evolute gleichkommt dem Differential der Strecke MM' (Fig. 113), eine Verallgemeinerung der für die Evoluten ebener Kurven 159, (17) erwiesenen Eigenschaft, auf welcher die Erzeugung der gegebenen Kurve durch Abwicklung eines biegsamen, nicht dehnbaren Fadens von der Evolute beruht. Diese Erzeugungsweise kann daher auf alle Evoluten auch einer Raumkurve übertragen werden.

Bezeichnet man die Richtungswinkel der Tangente MM' an die Evolute in M' mit α' , β' , γ' , und ähnlich alle übrigen auf die Evoluten bezüglichen Größen mit denselben, aber gestrichenen Buchstaben, so ist

$$\cos \alpha' = \frac{x' - x}{\sqrt{\varrho^2 + \sigma^2}} \text{ usw..}$$

Daraus ergibt sich durch Differentiation:

$$dx' - dx = d(\sqrt{\varrho^2 + \sigma^2}) \cdot \cos \alpha' + \sqrt{\varrho^2 + \sigma^2} \cdot d \cos \alpha'$$

oder in anderer Form und mit Rücksicht auf (16):

$$ds' \cos \alpha' - ds \cos \alpha = ds' \cos \alpha' + \frac{\sqrt{e^2 + \sigma^2} \cdot ds'}{e} \cos \lambda',$$

woraus

$$\cos \alpha = - \frac{\sqrt{e^2 + \sigma^2} \cdot ds'}{e' ds} \cos \lambda'$$

analog

$$\cos \beta = - \frac{\sqrt{e^2 + \sigma^2} \cdot ds'}{e' ds} \cos \mu'$$

$$\cos \gamma = - \frac{\sqrt{e^2 + \sigma^2} \cdot ds'}{e' ds} \cos \nu';$$

daraus folgt, daß der Faktor $\frac{\sqrt{e^2 + \sigma^2}}{e' ds}$ notwendig den absoluten Wert 1 hat, und dann weiter, daß die *Hauptnormale der Evolute in M' parallel ist der Tangente in M* (Fig. 113). Diese Tatsache kann auch in der Form ausgesprochen werden: *Die Oskulationsebene einer Evolute in einem ihrer Punkte steht senkrecht auf der Tangentialebene der Polarfläche in diesem Punkte.*

Zu einigen bemerkenswerten Resultaten führt die Annahme, die zugrunde liegende Kurve *C* sei eine Plankurve. Es ist dann beständig $T=0$, die Gleichungen (14) reduzieren sich auf

$$\frac{e}{p} = \frac{dq}{ds}$$

$$\frac{\sigma}{p} = \frac{d\sigma}{ds},$$

woraus durch Elimination von p

$$\frac{e d\sigma - \sigma dq}{e^2} = 0$$

abgeleitet werden kann. Da aber die linke Seite das Differential von $\frac{\sigma}{e}$ ist, so folgt daraus

$$\frac{\sigma}{e} = \text{const.},$$

d. h. die Normalen, die zu einer Evolute führen, sind zur Ebene der Kurve gleich geneigt, die Evolute selbst hat also die Eigenschaft, daß ihre Tangenten mit den Erzeugenden des Zylinders, in welchen jetzt die Polarfläche übergeht (201), einen konstanten Winkel bilden; sie ist mithin eine *Schraubenlinie* (185, 2)).

Unter den Evoluten befindet sich jetzt auch die Evolute von C im engeren Sinne, d. i. der Ort der Krümmungsmittelpunkte. Bei einer Raumkurve hingegen gehört dieser Ort nicht zu den Evoluten; es würden sonst (s. Fig. 113) die Oskulationsebenen der Kurven C und C' in korrespondierenden Punkten zusammenfallen, die Tangentenfläche des Ortes der Krümmungsmittelpunkte wäre also identisch mit der Tangentenfläche der Grundkurve, während sie doch begriffsgemäß in den Ort der Hauptnormalen übergehen müßte. Dieser Widerspruch hebt die Zuläßigkeit der Annahme auf, der Ort der Krümmungsmittelpunkte einer Raumkurve gehöre auch zu deren Evoluten.

Wickelt man einen biegsamen, nicht dehnbaren Faden, der an einer Raumkurve anliegt, sie berührend verläßt und von da ab ohne Ende sich ausstreckt, von der Kurve ab, so beschreibt er einen Mantel der Tangentenfläche der Kurve und jeder seiner Punkte eine *Evolvente* (Filarevolvente) derselben; so wie also die Polarfläche Ort der Evoluten, ist die Tangentenfläche Ort der Evolventen.

§ 6. Krümmung von Kurven auf krummen Flächen.

207. Flexion einer Kurve auf einer krummen Fläche.

Den Ausgangspunkt für die Untersuchung der Gestalt einer Fläche in der Umgebung eines ihrer Punkte bildet die Frage nach der Flexion, welche einer der Fläche aufgeschriebenen, durch diesen Punkt laufenden Kurve hier zukommt.

Die krumme Fläche sei durch die Gleichung

$$(1) \quad z = f(x, y)$$

gegeben; durch den Punkt M (Fig. 114)

derselben mit den Koordinaten $x/y/z$ gehe eine Kurve C , dargestellt durch die Gleichungen

$$(2) \quad x = x(s), \quad y = y(s), \quad z = z(s),$$

in welchen s den von dem festen Punkte M_0 aus gezählten Bogen M_0M bedeutet; weil die Kurve auf der Fläche liegt, so




Fig. 114.

müssen die Gleichungen (2) die Gleichung (1) identisch erfüllen. Aus der Beziehung

$$(3) \quad ds = p dx + q dy,$$

die für eine infinitesimale Bewegung auf der Fläche, also auch längs der Kurve Geltung hat, ergibt sich, wenn man durch das Bogendifferential

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} \\ = \sqrt{(1+p^2)dx^2 + (1+q^2)dy^2 + 2pq dx dy}$$

der Kurve dividiert, die Beziehung

$$(4) \quad \cos \gamma = p \cos \alpha + q \cos \beta$$

zwischen den Richtungskosinus der Tangente MT .

Durch Differentiation von (4) in bezug auf s erhält man unter Zuhilfenahme der Frenetschen Formeln:

$$\frac{\cos \gamma}{\rho} = \frac{p \cos \lambda + q \cos \mu}{\rho} + \left(r \frac{dx}{ds} + s \frac{dy}{ds} \right) \cos \alpha \\ + \left(s \frac{dx}{ds} + t \frac{dy}{ds} \right) \cos \beta$$

oder

$$\frac{-p \cos \lambda - q \cos \mu + \cos \gamma}{\rho} = r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta.$$

Es sind aber (191, (29))

$$(5) \quad \frac{-p}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}, \quad \frac{-q}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}, \quad \frac{1}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}},$$

wenn die Quadratwurzel positiv genommen wird, die Kosinus für diejenige Richtung MN der Flächennormale in M , welche mit der positiven z -Achse einen spitzen Winkel einschließt; $\cos \lambda$, $\cos \mu$, $\cos \nu$ hingegen die Kosinus der positiven Richtung MH der Hauptnormale von C in M ; demnach bedeutet

$$\frac{-p \cos \lambda - q \cos \mu + \cos \nu}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}$$

den Kosinus des Winkels θ der genannten zwei Richtungen.

Hiermit aber geht die letzte Formel über in:

$$(6) \quad \frac{\cos \theta}{\rho} = \frac{r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}.$$

Dies ist die *Grundgleichung* für die Krümmungstheorie der Flächen.

Von den in dieser Formel auftretenden Größen beziehen sich p, q, r, s, t auf den Punkt M als Punkt der Fläche und bleiben für alle durch ihn gezogenen Kurven die nämlichen; α, β bestimmen die Richtung der Tangente an die Kurve, θ die Neigung ihrer Schmiegungebene gegen die Normale der Fläche.

Zunächst geht aus (6) hervor, daß alle Kurven auf der Fläche, welche in M dieselbe Tangente und dieselbe Oskulations-ebene haben, daselbst auch dieselbe Flexion besitzen, die also auch gleichkommt der Krümmung derjenigen Kurve, welche aus der Fläche durch die Ebene TMH geschnitten wird.

Hiermit ist die Untersuchung der Flexion aller Kurven zurückgeführt auf die Untersuchung der Krümmung der ebenen Schnitte der Fläche.

208. Der Satz von Meusnier. Eine weitere Folgerung, die wir aus (6) ziehen können, beruht auf der Bemerkung, daß für alle Schnitte mit der Tangente MT der Quotient

$$\frac{\cos \theta}{\varrho}$$

denselben Wert beibehält; da nun ϱ eine absolute Größe ist, so muß $\cos \theta$ entweder beständig positiv oder beständig negativ sein, d. h. die positiven Richtungen aller Hauptnormalen in M , zur Tangente MT gehörig, schließen mit MN entweder sämtlich einen spitzen oder sämtlich einen stumpfen Winkel ein.

Unter den Schnitten durch die Tangente MT heben wir denjenigen hervor, welcher durch die Normale der Fläche geht, und bezeichnen ihn als den diese Tangente berührenden *Normalschnitt*; die übrigen sollen dann *schiefe Schnitte* heißen. Je nachdem alle θ spitz oder stumpf sind, wird für diesen Schnitt $\theta = 0$ oder $\theta = \pi$, und heißt $\frac{1}{R}$ seine Krümmung in M , so hat man:

$$\frac{\cos \theta}{\varrho} = \frac{1}{R}$$

im ersten und

$$\frac{\cos \theta}{\varrho} = -\frac{1}{R}$$

im zweiten Falle.

Durch entsprechende Wahl der positiven Richtung der x -Achse kann jedoch immer der erste Fall herbeigeführt werden, so daß

$$(7) \quad \rho = R \cos \theta$$

wird.

Der Inhalt dieser Formel bildet den *Satz von Meusnier**), wonach der Krümmungshalbmesser eines ebenen Schnittes gleichkommt dem Krümmungshalbmesser des dieselbe Tangente berührenden Normalschnittes, multipliziert mit dem Kosinus des Neigungswinkels beider Schnitte.

Man kann den Satz auch in der Form aussprechen, daß der Krümmungsmittelpunkt eines schiefen Schnittes als Projektion des Krümmungsmittelpunktes des dieselbe Tangente berührenden Normalschnittes auf die Ebene des ersteren sich darstellt.

Hiernach ist der Ort der Krümmungsmittelpunkte aller durch eine Flächentangente gelegten Schnitte ein Kreis, dessen Ebene zu jener Tangente normal steht und dessen Durchmesser der Krümmungsradius des darunter befindlichen Normalschnittes ist.

Bezeichnet k die Krümmung des schiefen, K die Krümmung des Normalschnittes, so besteht nach dem Satze von Meusnier zwischen beiden die Beziehung

$$k \cos \theta = K,$$

die den folgenden geometrischen Sachverhalt ausdrückt: Trägt man auf den Normalen aller durch dieselbe Flächentangente gelegten Schnitte die Krümmung ab, so liegen die Endpunkte dieser Strecken auf einer Geraden G , die die Flächennormale des betreffenden Punktes senkrecht scheidet (in der Entfernung K vom Flächenpunkt) und die Flächentangente senkrecht kreuzt.

Vermöge des Satzes von Meusnier ist die Untersuchung der Krümmung aller ebenen Schnitte durch einen Punkt zurückgeführt auf die Untersuchung der Normalschnitte durch diesen Punkt.

*) Mémoire sur la courbure des surfaces. Mém. de savants étrangers. 1785.

209. Die Krümmung der Normalschnitte. Der Satz von Euler. Um den Ausdruck für die Krümmung des Normalschnittes durch die Tangente MT zu erhalten, hätte man in der Formel (6)

$$\theta = 0 \quad \text{oder} \quad \theta = \pi$$

zu setzen, je nachdem deren rechte Seite positiv oder negativ ist.

Behält man die Substitution $\theta = 0$ für alle Fälle bei, so hat der Krümmungsradius R aufgehört eine absolute Größe zu sein; das Vorzeichen, welches ihm die Formel gibt, hat nach dem vorigen Artikel die Bedeutung, daß bei positivem R der Normalschnitt seine konkave Seite nach der Richtung MN , welche im vorigen Artikel als die positive erklärt wurde, bei negativem R aber nach der entgegengesetzten Richtung wendet.

Mit dieser Maßgabe bestimmt also die Formel

$$(8) \quad \frac{1}{R} = \frac{r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}$$

nicht allein die Größe der Krümmung des Normalschnittes, sondern auch die Richtung seiner Konkavität, nachdem einmal in der Flächennormale eine Richtung als positiv festgesetzt worden ist.

$\frac{1}{R}$ behält für alle Normalschnitte durch M dasselbe Vorzeichen, die Konkavität ist also bei allen nach derselben Seite gewendet, wenn (121, 189)

$$(9) \quad rt - s^2 > 0$$

ist. In einem solchen Punkt, in dessen Umgebung die Fläche ganz zu einer Seite der Tangentialebene liegt, bezeichnet man sie als *konvex*.

$\frac{1}{R}$ wechselt während der Drehung des Normalschnittes um die Normale, und zwar zweimal, durch Null gehend, sein Vorzeichen, wenn

$$(10) \quad rt - s^2 > 0$$

ist. Ein Teil der Normalschnitte wendet die Konkavität nach der positiven, der andere Teil nach der negativen Richtung der Normale, und ebenso liegt die Fläche in der Umgebung

von M zum Teil auf der einen, zum Teil auf der anderen Seite der Tangentialebene. In einem solchen Punkte bezeichnet man die Fläche als *konkav-konvex*. Die Grenze zwischen den beiden Arten von Normalschnitten wird durch zwei Normalschnitte gebildet, deren Krümmung Null ist, welche also in M Wendepunkte haben.

In dem Grenzfalle, wo

$$(11) \quad rt - s^2 = 0,$$

der Zähler auf der rechten Seite von (8) also ein vollständiges Quadrat ist, behält $\frac{1}{R}$ auch beständig dasselbe Vorzeichen bei, verschwindet aber für eine bestimmte Lage des Normalschnittes.

Es liegt nun nahe, nach denjenigen Normalschnitten zu fragen, für welche die Krümmung einen extremen Wert annimmt. Um diese Untersuchung einfach zu gestalten, transformieren wir das Koordinatensystem derart, daß sein Ursprung mit M , die x -Achse mit der Flächennormale, die Tangentialebene also mit der xy -Ebene zusammenfällt; den Winkel, welchen die positive Richtung MT der Tangente mit der positiven x -Achse im neuen System einschließt, nennen wir ω . Dann tritt in der Formel (8) ω an die Stelle von α , $\frac{\pi}{2} - \omega$ an die Stelle von β ; p und q werden Null, weil nun die ersten zwei von den Kosinus (5) der Normale verschwinden; für die zweiten Differentialquotienten behalten wir auch in dem neuen System die Zeichen r, s, t bei und haben daher jetzt:

$$(12) \quad \frac{1}{R} = r \cos^2 \omega + 2s \cos \omega \sin \omega + t \sin^2 \omega.$$

Für die extremen Werte von $\frac{1}{R}$ verschwindet

$$D_{\omega} \left(\frac{1}{R} \right) = - (r - t) \sin 2\omega + 2s \cos 2\omega,$$

es ergibt sich daraus für die betreffenden Normalschnitte die Bestimmung

$$(13) \quad \operatorname{tg} 2\omega = \frac{2s}{r-t},$$

welche nur dann illusorisch wird, wenn gleichzeitig

$$(14) \quad r = t \quad \text{und} \quad s = 0$$

ist; in jedem andern Falle führt sie zu zwei um π voneinander differierenden Werten von 2ω , also zu zwei um $\frac{\pi}{2}$ voneinander abweichenden Werten von ω selbst. Da ferner für die Bestimmung (13)

$$D_{\omega}^2\left(\frac{1}{R}\right) = \frac{2 \cos 2\omega}{t-r} [(t-r)^2 + 4s^2]$$

und $\cos 2\omega$ für zwei um π auseinanderliegende Werte von 2ω entgegengesetzte Zeichen annimmt, so entspricht der einen Lösung ein Maximum, der anderen ein Minimum von $\frac{1}{R}$.

Unter den Normalschnitten einer Fläche in einem ihrer Punkte gibt es also zwei ausgezeichnete, die aufeinander senkrecht stehen und deren einer das Maximum, deren anderer das Minimum der Krümmung aufweist. Man bezeichnet sie als die Hauptnormalschnitte, ihre Krümmungsradien als die Hauptkrümmungsradien der Fläche in dem genannten Punkte.

Geht man jetzt zu einem dritten Koordinatensystem über, das durch Rotation des vorigen um die s -Achse derart entsteht, daß die Ebenen ys und sx mit den Ebenen der Hauptnormalschnitte zusammenfallen, so wird in diesem neuen Systeme der Differentialquotient s Null werden, weil ja die Gleichung (13) die Lösungen 0 und π ergeben muß; behält man für die beiden anderen Differentialquotienten zweiter Ordnung wieder dieselben Zeichen r , t bei, so lautet Formel (12):

$$\frac{1}{R} = r \cos^2 \omega + t \sin^2 \omega;$$

für $\omega = 0$ ergibt sich jetzt die eine Hauptkrümmung

$$\frac{1}{R_1} = r,$$

für $\omega = \frac{\pi}{2}$ die andere

$$\frac{1}{R_2} = t;$$

hiernach ist also:

$$(15) \quad \frac{1}{R} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\sin^2 \omega}{R_2}.$$

Mit Hilfe dieser Formel ist es möglich, den Krümmungshalbmesser eines beliebigen Normalschnittes in M durch die zugehörigen Hauptkrümmungsradien auszudrücken, wenn sein Neigungswinkel ω mit dem einen Hauptnormalschnitte, dem zu R_1

gehörigen, gegeben ist. Der Inhalt dieser Formel bildet den Satz von Euler.*)

Durch die Sätze von Meusnier und Euler ist die Untersuchung der Krümmung aller durch einen Punkt M gelegten Kurven zurückgeführt auf die Bestimmung der Hauptkrümmungsradien in diesem Punkte.

Wir kommen noch auf den unter (14) ausgeschlossenen Fall

$$r = t, \quad s = 0$$

zurück, für welchen die Gleichung (13) keine Bestimmung ergeben hat. Die Formel (12) aber lautet dann

$$\frac{1}{R} = r$$

und besagt, daß in einem solchen Punkte alle Normalschnitte denselben Krümmungshalbmesser haben. Man bezeichnet einen solchen Punkt der Fläche als *Nabelpunkt*; er ist ein besonderer Fall des konvexen Punktes.

In Fig. 115 seien MT_1 , MT_2 die Tangenten an die Hauptnormalschnitte, MT die Tangente an einen beliebigen Normalschnitt im Flächenpunkte M ; die zugehörigen Krümmungen K_1 , K_2 , K trage man auf der Flächennormale MN ab und




Fig. 115.

konstruiere zu jedem Normalschnitt die bei der Interpretation des Meusnierschen Satzes eingeführte Gerade G ; die Gesamtheit dieser Geraden gibt eine Darstellung der Krümmungsverhältnisse aller durch M gelegten Schnitte. Es ist daher von Interesse, nach dem Ort dieser Gesamtheit zu fragen.

Als Grundlage wählen wir ein Koordinatensystem, dessen Ursprung O die Mitte der Strecke $(K_1)(K_2)$, dessen z -Achse in die Flächennormale fällt und dessen x - und y -Achse den Halbierungslinien der Winkel von MT_1 und MT_2 parallel laufen. Bezeichnet

*) Recherches sur la courbure des surfaces. Hist. de l'Acad. de Berlin, 1760. (Bd. 16).

man den Winkel der Geraden G mit der x -Achse durch φ , die Koordinaten eines Punktes P dieser Geraden mit x, y, z , so bestehen die Beziehungen:

$$\omega = \varphi - \frac{\pi}{4}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}, \quad K - \frac{K_1 + K_2}{2} = z;$$

die Gleichung (15) verwandelt sich zunächst in

$$K = \frac{K_1 + K_2}{2} + 2 \frac{K_1 - K_2}{2} \sin \varphi \cos \varphi,$$

und wenn man $\frac{K_1 - K_2}{2} = c$ setzt und beachtet, daß $\sin \varphi, \cos \varphi$

durch $\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ zu ersetzen sind, schließlich in

$$z = \frac{2cxy}{x^2 + y^2}.$$

Damit ist die Frage erledigt: *Der Ort der Geraden G ist ein Zylindroid (187, 2).*

210. Die Dupinsche Indikatrix. Die Krümmungsverhältnisse der Normalschnitte in einem Punkte M gestatten auf Grund der Eulerschen Formel eine anschauliche geometrische Darstellung, welche der französische Geometer Ch. Dupin*) angegeben hat. Dabei sind bezüglich der Hauptkrümmungsradien diejenigen Fälle zu unterscheiden, welche sich im vorigen Artikel bezüglich der Krümmungsradien der Normalschnitte überhaupt herausgestellt haben: daß beide gleich bezeichnet, daß sie ungleich bezeichnet sind und daß einer von ihnen unendlich ist.

Die Darstellung erfolgt in der Tangentialebene des Punktes M und legt ein Koordinatensystem zugrunde, das M zum Ursprung und die Tangenten an die beiden Hauptnormalschnitte zu Achsen hat, und zwar die Tangente an den Hauptnormalschnitt mit dem Krümmungsradius R_1 zur x -Achse.

1) Sind R_1, R_2 gleich bezeichnet, z. B. positiv (wie das durch entsprechende Wahl der positiven Richtung der Flächennormale immer bewerkstelligt werden kann), so konstruiere man in der Tangentialebene die Ellipse

$$(16) \quad 1 = \frac{\xi^2}{R_1} + \frac{\eta^2}{R_2},$$

*) Développements de géométrie, Paris 1813.

deren Halbachsen also $\sqrt{R_1}$, $\sqrt{R_2}$ sind (Fig. 116); der zu MX unter dem Winkel ω geneigte Halbmesser ρ dieser Ellipse ergibt sich aus der Gleichung:

$$1 = \frac{\rho^2 \cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\rho^2 \sin^2 \omega}{R_2};$$

mithin ist

$$\frac{1}{\rho^2} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\sin^2 \omega}{R_2}$$

und durch Vergleich mit der Eulerschen Formel (15) ergibt sich daraus

$$R = \rho^2.$$

Die Quadrate der Halbmesser der Ellipse (16) sind also den

Fig. 116.





Fig. 117.



Krümmungsradien der durch diese Halbmesser hindurchgehenden Normalschnitte gleich.

Infolge dieses Zusammenhanges heißt der konvexe Punkt auch ein *elliptischer Punkt* der Fläche.

Ist insbesondere $R_1 = R_2$, so geht die Ellipse (16) in einen Kreis über, alle Normalschnitte sind gleich gekrümmt. Aus diesem Grunde nennt man den Nabelpunkt auch *Kreis-punkt*.

2) Sind R_1 , R_2 ungleich bezeichnet, etwa R_1 positiv und R_2 negativ, so konstruiere man in der Tangentialebene die beiden konjugierten Hyperbeln

$$(17) \quad \begin{cases} 1 = \frac{\xi^2}{R_1} - \frac{\eta^2}{R_2} \\ 1 = -\frac{\xi^2}{R_1} + \frac{\eta^2}{R_2} \end{cases}$$

mit den Halbachsen $\sqrt{R_1}$, $\sqrt{-R_2}$ (Fig. 117). Der unter einem Winkel ω zur x -Achse geneigte Halbmesser ρ der ersten Hyperbel ergibt sich aus

$$\frac{1}{\rho^2} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\sin^2 \omega}{R_2},$$

und gehört er der zweiten Hyperbel an, so ist

$$-\frac{1}{\varrho^2} = -\frac{\cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\sin^2 \omega}{R_2};$$

mithin hat man im ersten Falle

$$R = \varrho^2,$$

im zweiten

$$R = -\varrho^2.$$

Die Radien der beiden Hyperbeln bestimmen also die Krümmungshalbmesser der Normalschnitte nach demselben Gesetze wie es vorhin die Ellipse getan hat, nur gehören zu der einen Hyperbel Normalschnitte mit positivem, zur andern solche mit negativem Krümmungshalbmesser.

Der konkav-konvexe Punkt führt daher auch den Namen eines *hyperbolischen Punktes* der Fläche.

Der Übergang von der einen Hyperbel zur andern erfolgt bei stetiger Drehung des Normalschnittes durch die gemeinsamen Asymptoten der Hyperbeln (17), deren Gleichungen lauten:

$$\frac{\eta}{\xi} = \pm \sqrt{-\frac{R_2}{R_1}};$$

diesen entsprechen also Normalschnitte mit unendlich großem Krümmungsradius; die Asymptoten als Tangenten dieser Normalschnitte heißen *Inflexions-* oder auch *Haupttangenten* der Fläche im Punkte M ; die erstere Bezeichnung rührt daher, daß die betreffenden Normalschnitte in M Wendepunkte aufweisen.

3) Ist einer der Hauptkrümmungsradien, z. B. R_2 , unendlich groß, so heißt die Eulersche Formel:

$$\frac{1}{R} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1}.$$


Man konstruiere dann in der Tangentialebene das Linienpaar (Fig. 118)

$$(18) \quad 1 = \frac{\xi^2}{R_1};$$

für einen Halbmesser ϱ dieses Linienpaares, der zur x -Achse unter dem Winkel ω geneigt ist, erhält man:

$$\frac{1}{\varrho^2} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1},$$

Fig. 118.



so daß wie in den beiden früheren Fällen:

$$R = \varrho^2.$$

Dieser Sachverhalt entspricht dem in 209, (11) besprochenen Grenzfalle. Weil ein Paar paralleler Linien als degenerierte Parabel sich auffassen läßt, so nennt man einen Flächenpunkt von dieser Beschaffenheit einen *parabolischen Punkt*.

Das in der Tangentialebene konstruierte Gebilde (16), (17) oder (18), weil es die Krümmungsverhältnisse der Normalschnitte anzeigt, wird nach seinem Urheber die *Dupinsche Indikatrix* des betreffenden Punktes genannt.

211. Eine andere Auffassung der Indikatrix. Tangentialschnitt einer Fläche. Die Indikatrix gestattet noch eine andere Auffassung, welche hier kurz entwickelt werden soll, weil sie geeignet ist, in die Natur der verschiedenen Arten von Flächenpunkten noch genaueren Einblick zu gewähren.

Wird der Flächenpunkt M zum Ursprung, seine Tangentialebene zur xy -Ebene gewählt, und ist z von hier aus nach der Maclaurinschen Formel entwickelbar, so beginnt die Entwicklung, da bei dieser Annahme $p = 0$, $q = 0$ ist, wie folgt:

$$(19) \quad z = \frac{1}{2} (rx^2 + 2sxy + ty^2) + \varepsilon;$$

werden x, y als Größen erster Kleinheitsordnung aufgefaßt, so ist z von der zweiten und ε von der dritten Ordnung.

Mit Weglassung von ε stellt die Gleichung (19) ein (elliptisches oder hyperbolisches) Paraboloid dar, das mit der Fläche im Punkte M eine Berührung erster Ordnung hat (148).

Führt man in der xy -Ebene Polarkoordinaten ein und setzt demgemäß

$$x = \varrho \cos \omega, \quad y = \varrho \sin \omega,$$

so verwandelt sich (19) in:

$$\frac{2z}{\varrho^2} = r \cos^2 \omega + 2s \cos \omega \sin \omega + t \sin^2 \omega + \frac{2\varepsilon}{\varrho^2};$$

wird nun das Koordinatensystem noch derart angeordnet, daß die yz - und sx -Ebene mit den Hauptnormalschnitten zusammenfallen, so verschwindet s und geht r über in $\frac{1}{R_1}$, t in $\frac{1}{R_2}$, so daß die letzte Gleichung lautet:

$$\frac{2z}{\varrho^2} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\sin^2 \omega}{R_2} + \frac{2\varepsilon}{\varrho^2}.$$

Gibt man s einen konstanten Wert κ von der Kleinheitsordnung des ϱ^2 und vernachlässigt rechts die Größe erster Kleinheitsordnung $\frac{2\varepsilon}{\varrho^2}$ neben den endlichen Gliedern, so stellt

$$(20) \quad \frac{2\kappa}{\varrho^2} = \frac{\cos^2 \omega}{R_1} + \frac{\sin^2 \omega}{R_2}$$

die Polargleichung der Schnittkurve der Ebene $s = \kappa$ mit der gegebenen Fläche (präziser: der Projektion dieser Schnittkurve auf der xy -Ebene) dar, jedoch mit Unterdrückung von Gliedern, welche neben den beibehaltenen als irrelevant zu betrachten sind. Das durch (20) dargestellte Gebilde ist aber dem in den Gleichungen (16), (17), (18) enthaltenen *ähnlich* in bezug auf den Mittelpunkt als Ähnlichkeitszentrum, wobei zu bemerken ist, daß in dem mittleren dieser drei Fälle das κ der Gleichung (20) einmal einen positiven, einmal den gleichgroßen negativen Wert erhalten muß.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Gleichung (20) nur für die nächste Umgebung von M Geltung hat; sie darf auf den ganzen Schnitt der Ebene $s = \kappa$ mit der Fläche nur dann angewendet werden, wenn derselbe eine sehr geringe Ausdehnung hat, wie dies bei elliptischen Punkten zutreffen wird; in den anderen Fällen, die sich bei hyperbolischen und parabolischen Punkten ergeben, charakterisiert sie bloß den dem Punkte M zunächst liegenden Teil des Schnittes.

Mit diesen Einschränkungen darf man den Satz aussprechen, daß der Durchschnitt einer krummen Fläche mit einer zur Tangentialebene in M parallelen und ihr sehr nahen Ebene eine der Dupinschen Indikatrix ähnliche Figur sei.

Man pflegt diesen Durchschnitt auch als Indikatrix des Punktes M zu bezeichnen.

Kehren wir nochmals zu der entwickelten Flächen-gleichung (19):

$$z = \frac{1}{2} (rx^2 + 2sxy + ty^2) + \varepsilon,$$

zurück. Setzt man darin $z = 0$, so ist

$$(21) \quad 0 = rx^2 + 2sxy + ty^2 + 2\varepsilon$$

die Gleichung des Schnittes der Fläche mit der xy -Ebene, d. i. mit der Tangentialebene im Punkte M .

Nach den Darlegungen in 165 ist für diesen Schnitt der Punkt M ein Doppelpunkt, und zwar ein Knotenpunkt, wenn

$$rt - s^2 < 0,$$

also wenn M ein hyperbolischer Punkt ist; die Tangenten in ihm fallen mit den Asymptoten der Indikatrix zusammen, weil die Gleichung, welche diese Tangenten bestimmt, d. i.

$$rx^2 + 2sxy + ty^2 = 0,$$

das Unendlichwerden von R zur Folge hat (209, (12)).

Der Punkt M ist für die Schnittkurve ein isolierter Punkt, wenn

$$rt - s^2 > 0,$$

d. h. wenn M ein elliptischer Punkt ist. Da hier alle Bedingungen für ein Extrem der Funktion z erfüllt sind, so ist der Wert $z = 0$, den sie in M hat, ein Maximum oder ein Minimum, je nachdem die benachbarten Werte z negativ oder positiv sind.

In dem Grenzfalle

$$rt - s^2 = 0,$$

der einen parabolischen Punkt anzeigt, kann der Schnitt (21) in M eine Spitze, Selbstberührung oder auch einen isolierten Punkt mit reeller Tangente aufweisen. Ist die Fläche abwickelbar (198, (23)), so hat die Tangentialebene mit ihr eine Erzeugende gemein, die zweifach gezählt als Durchschnitt der Tangentialebene mit der Fläche anzusehen ist.

212. Bestimmung der Hauptnormalschnitte und Hauptkrümmungsradien. Um für einen beliebigen Punkt einer gegebenen krummen Fläche die Lage der Hauptnormalschnitte und die Größe der Hauptkrümmungsradien zu bestimmen, gehen wir von dem allgemeinen Ausdruck 209, (8) für die Krümmung eines Normalschnittes:

$$(22) \quad \frac{1}{R} = \frac{r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}}$$

aus und stellen die Bedingung für deren extreme Werte auf; dabei ist zu beachten, daß die Winkel α, β , die allein bei der Drehung des Normalschnittes um die Normale der Fläche sich

ändern, nicht unabhängig voneinander sind, daß sie vielmehr der aus 207, (4) resultierenden Bedingung

$$(23) \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + (p \cos \alpha + q \cos \beta)^2 - 1 = 0$$

zu genügen haben.

Setzt man zur Abkürzung die positive Quadratwurzel

$$(24) \quad \sqrt{p^2 + q^2 + 1} = w,$$

so handelt es sich also um die relativen Extreme der Funktion $\frac{w}{R}$ mit der Nebenbedingung (23), und dies kommt nach 125 auf die Untersuchung der absoluten Extreme von:

$$r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta \\ - \lambda [\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + (p \cos \alpha + q \cos \beta)^2 - 1]$$

zurück, wobei λ einen noch unbestimmten Multiplikator bedeutet. Die Bedingungen für ein absolutes Extrem sind aber:

$$(25) \quad \begin{cases} r \cos \alpha + s \cos \beta = \lambda [(1 + p^2) \cos \alpha + pq \cos \beta] \\ s \cos \alpha + t \cos \beta = \lambda [(1 + q^2) \cos \beta + pq \cos \alpha]; \end{cases}$$

daraus ergibt sich durch Elimination von λ die in bezug auf $\cos \alpha$, $\cos \beta$ homogene quadratische Gleichung:

$$(26) \quad \begin{cases} [(1 + p^2)s - pqr] \cos^2 \alpha - [(1 + q^2)r - (1 + p^2)t] \cos \alpha \cos \beta \\ - [(1 + q^2)s - pq t] \cos^2 \beta = 0, \end{cases}$$

durch welche die *Lage der Hauptnormalschnitte* charakterisiert ist. Die Gleichung gibt nämlich zwei Werte für den Quotienten

$$\frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = \frac{\frac{dy}{ds}}{\frac{dx}{ds}} = \frac{dy}{dx},$$

und diese bestimmen die Richtungen der Projektionen der Tangenten an die Hauptnormalschnitte in der xy -Ebene; dadurch sind die Tangenten selbst und mit Zuziehung der Flächennormale endlich die Hauptnormalebenen gegeben.

Die Bedeutung des Multiplikators λ findet sich aus den Gleichungen (25), wenn man die erste mit $\cos \alpha$, die zweite mit $\cos \beta$ multipliziert und darauf die Summe bildet; vermöge (22) und (23) erhält man:

$$\lambda = \frac{w}{R}.$$

Setzt man diesen Wert in (25) ein und ordnet wie folgt:

$$\{rR - (1 + p^2)w\} \cos \alpha + \{sR - pqw\} \cos \beta = 0,$$

$$\{sR - pqw\} \cos \alpha + \{tR - (1 + q^2)w\} \cos \beta = 0,$$

so liefert die Elimination von $\cos \alpha$, $\cos \beta$ die in bezug auf R quadratische Gleichung:

$$(27) \quad (rt - s^2)R^2 - [(1 + q^2)r - 2pqs + (1 + p^2)t]wR + w^4 = 0,$$

welche, da sie aus den Bedingungen für die Extreme von $\frac{r}{R}$ hervorging, die *Größe der Hauptkrümmungshalbmesser* bestimmt.

Das Vorzeichen des Produktes der Hauptkrümmungsradien stimmt vermöge dieser Gleichung mit dem Vorzeichen von $rt - s^2$ überein und es wird wenigstens einer der Radien unendlich, wenn $rt - s^2$ Null ist. Aus dieser Bemerkung lassen sich die drei Arten von Flächenpunkten (209—210) aufs neue ableiten.

Man kann den beiden Gleichungen (26) und (27) mittels folgender Substitutionen eine einfache Form erteilen; setzt man nämlich

$$(28) \quad \begin{aligned} A_1 &= \frac{(1 + q^2)r - pqs}{w^3}, & A_2 &= \frac{(1 + q^2)s - pqt}{w^3}, \\ B_1 &= \frac{(1 + p^2)s - pqr}{w^3}, & B_2 &= \frac{(1 + p^2)t - pqs}{w^3}, \end{aligned}$$

so schreibt sich die Gleichung (26):

$$(26^*) \quad B_1 \cos^2 \alpha - (A_1 - B_2) \cos \alpha \cos \beta - A_2 \cos^2 \beta = 0$$

und die Gleichung (27):

$$(27^*) \quad \frac{A_1}{B_1} \frac{A_2}{B_2} R^2 - (A_1 + B_2)R + 1 = 0.$$

An dieser Form läßt sich leicht erweisen, daß beide Gleichungen immer reelle Wurzeln ergeben. Es ist nämlich die Diskriminante der ersten Gleichung:

$$D = (A_1 - B_2)^2 + 4A_2B_1,$$

die der zweiten:

$$(A_1 + B_2)^2 - 4(A_1B_2 - A_2B_1) = (A_1 - B_2)^2 + 4A_2B_1 = D,$$

die Diskriminanten stimmen also überein, und hat man nach-

gewiesen, daß D positiv ist, so folgt daraus die Realität der Wurzeln beider Gleichungen. Nun ergibt sich aus (28), daß

$$(1 + p^2)A_2 - (1 + q^2)B_1 = \frac{1}{w^2} \{ (1 + q^2)pqr - (1 + p^2)pqt \}$$

$$(A_1 - B_2)pq = \frac{1}{w^2} \{ (1 + q^2)pqr - (1 + p^2)pqt \},$$

daher ist

$$(1 + p^2)A_2 = (1 + q^2)B_1 + (A_1 - B_2)pq$$

und infolgedessen

$$(29) \quad \begin{aligned} (1 + p^2)D &= (1 + p^2)(A_1 - B_2)^2 + 4(1 + q^2)B_1^2 \\ &\quad + 4pq(A_1 - B_2)B_1 \\ &= (A_1 - B_2)^2 + [p(A_1 - B_2) + 2qB_1]^2 + 4B_1^2; \end{aligned}$$

es läßt sich also $(1 + p^2)D$ als Summe dreier Quadrate darstellen und darum ist auch D eine positive Größe.

213. Analytische Charakterisierung der Nabelpunkte. Ein *Nabelpunkt* ist dadurch gekennzeichnet, daß sich für ihn keine Bestimmung der Hauptnormalschnitte ergibt; die Gleichung (26) versagt aber nur dann, wenn die Koeffizienten einzeln verschwinden, wenn also:

$$(1 + p^2)s - pqr = 0, \quad (1 + q^2)r - (1 + p^2)t = 0, \quad (1 + q^2)s - pqt = 0$$

oder

$$(30) \quad \frac{r}{1 + p^2} = \frac{s}{pq} = \frac{t}{1 + q^2}$$

ist.

Man kommt zu diesem Resultate auch von der Gleichung (27) aus, da man einen Nabelpunkt auch als einen Punkt mit gleichen Hauptkrümmungsradien definieren kann. Die Gleichheit der Wurzeln erfordert aber das Verschwinden der Determinante und dieses erfolgt nach (29) mit

$$A_1 = B_2, \quad B_1 = 0,$$

was unter Bezugnahme auf (28) tatsächlich wieder zu den Beziehungen (30) führt.

Die beiden letzten Gleichungen haben aber auch

$$A_2 = 0$$

zur Folge; wenn sie also erfüllt sind, so verschwinden sämtliche Koeffizienten von (26*) und man kommt so wieder zum ersten Prinzip zurück.

Aus (30) lassen sich im allgemeinen zwei voneinander unabhängige Gleichungen formieren; jede derselben stellt eine Fläche dar, und diese zwei Flächen in Verbindung mit der gegebenen Fläche bestimmen die Nabelpunkte der letzteren, so daß es deren in der Regel nur eine beschränkte Anzahl gibt.

Wenn jedoch die Beziehungen (30) sich auf eine einzige Gleichung reduzieren, so hat die gegebene Fläche eine *Nabelpunktklinie*, und sind sie identisch erfüllt, so sind alle Punkte der Fläche Nabelpunkte (die Kugel).

214. Beispiele. 1) Es sind die Hauptnormalschnitte und Hauptkrümmungsradien für einen Punkt einer Rotationsfläche zu bestimmen.

Wie in 187, 4 gefunden worden, ist

$$z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$$

die allgemeine Gleichung der Rotationsflächen, wenn man die Rotationsachse zur z -Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems wählt. Setzt man vorübergehend

$$\sqrt{x^2 + y^2} = u,$$

so ergibt sich durch sukzessive Differentiation:

$$p = f'(u) \frac{x}{u}, \quad q = f'(u) \frac{y}{u}$$

$$r = f''(u) \frac{x^2}{u^3} + f'(u) \frac{y^2}{u^3}$$

$$s = f''(u) \frac{xy}{u^3} - f'(u) \frac{xy}{u^3}$$

$$t = f''(u) \frac{y^2}{u^3} + f'(u) \frac{x^2}{u^3};$$

da aber bei einer Rotationsfläche alle Punkte eines Parallelkreises gleiche Krümmungsverhältnisse aufweisen, so wird man zweckmäßig den Punkt so wählen, daß

$$y = 0, \text{ folglich } u = x$$

sei; er liegt dann in dem durch die zx -Ebene bestimmten Meridian, und nunmehr ist:

$$p = f'(x), \quad q = 0$$

$$r = f''(x), \quad s = 0, \quad t = \frac{f'(x)}{x}.$$

Hiermit ergeben sich nach Vorschrift von 212, (26) und (23) zur Bestimmung der Hauptnormalschnitte die Gleichungen:

$$\cos \alpha \cos \beta = 0;$$

$$\{1 + f'(x)^2\} \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1;$$

die eine Lösung ist

$$\cos \beta = 0, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + f'(x)^2}}, \quad \text{woraus} \quad \operatorname{tg} \alpha = f'(x);$$

und weil hierdurch die Tangente an den Meridian im Punkte M (Fig. 119) charakterisiert ist, so bildet der Meridian den einen Hauptnormalschnitt; der andere berührt, wie dies auch die zweite Lösung

$$\cos \alpha = 0$$

$$\cos \beta = 1$$

bestätigt, den Parallelkreis des Punktes M in M .

Die Frage nach den Hauptkrümmungsradien ist damit schon erledigt, ohne daß man es nötig hat, die Gleichung (27) heranzuziehen; der eine, R_1 , ist der Krümmungshalbmesser des Meridians, also

$$R_1 = \frac{\{1 + f'(x)^2\}^{\frac{3}{2}}}{f''(x)};$$

und da sich nach dem Satze von Meusnier der Krümmungsmittelpunkt Ω_2 des zweiten Hauptschnittes auf die Ebene des Parallelkreises in dessen Krümmungsmittelpunkt, also in den Mittelpunkt ω , projiziert, so fällt Ω_2 notwendig in die Rotationsachse, mithin ist

$$R_2 = M\Omega_2 = \frac{x}{\sin \alpha} = \frac{x\sqrt{1 + f'(x)^2}}{f'(x)}.$$

Für den Punkt $x = 0$, $y = 0$ werden die Differentialquotienten p , $q \dots$ unbestimmt und die Gleichung (26) illusorisch; der Punkt, in welchem die s -Achse die Rotationsfläche schneidet, ist in der Tat, sofern er reell ist, entweder ein Nabelpunkt oder ein singulärer Punkt.

Läßt man beispielsweise die Parabel $s^2 = 2ax + 2a^2$ um die s -Achse rotieren (Fig. 120), so entstehen in der s -Achse singuläre Punkte P , Q ; der Scheitel S tritt aber auf der Fläche

Fig. 119.





Fig. 120.



als Nabelpunkt auf, weil $R_1 = R_2 = a$ (160, 1)) ist; die Fläche hat somit einen Parallelkreis von Nabelpunkten.

2) Für einen Punkt des geraden Schraubenkonoids (190, 2))

$$z = b \operatorname{Arc} \operatorname{tg} \frac{y}{x}$$

die Hauptkrümmungsradien zu bestimmen.

An der zitierten Stelle ergaben sich für die Differentialquotienten die Ausdrücke:

$$p = -\frac{by}{x^2 + y^2}, \quad q = \frac{bx}{x^2 + y^2},$$

$$r = \frac{2bxy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad s = -\frac{b(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad t = -\frac{2bxy}{(x^2 + y^2)^2};$$

trägt man sie in die Gleichung 212, (27) ein, so lautet diese:

$$-\frac{b^2}{(x^2 + y^2)^2} R^2 + \frac{(x^2 + y^2 + b^2)^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0;$$

sie ist rein quadratisch und gibt

$$R_{1,2} = \pm \frac{x^2 + y^2 + b^2}{b}.$$

In jedem Punkte der Wendelfläche sind also die beiden Hauptkrümmungsradien gleich und entgegengesetzt gerichtet; die Indikatrix besteht daher aus zwei gleichseitigen konjugierten Hyperbeln; die Haupttangenten sind demzufolge aufeinander senkrecht. Die eine der Haupttangenten fällt mit der geradlinigen Erzeugenden durch den Punkt M zusammen, die andere ist die zu ihr normale Flächentangente.

3) Es sollen die Nabelpunkte des dreiachsigen Ellipsoids

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > b > c)$$

bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Differentialquotienten ergeben sich durch sukzessive Differentiation die Gleichungen:

$$(A) \quad \begin{cases} \frac{x}{a^2} + \frac{zp}{c^2} = 0 \\ \frac{y}{b^2} + \frac{zq}{c^2} = 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{a^2} + \frac{p^2}{c^2} + \frac{zr}{c^3} = 0$$

$$\frac{pq}{c^3} + \frac{zs}{c^3} = 0$$

$$\frac{1}{b^2} + \frac{q^2}{c^2} + \frac{zt}{c^3} = 0$$

daraus folgt

$$r = -\frac{1}{z} \left(\frac{c^2}{a^2} + p^2 \right), \quad s = -\frac{pq}{z}, \quad t = -\frac{1}{z} \left(\frac{c^2}{b^2} + q^2 \right).$$

Die Nabelpunkte haben laut (30) den beiden Gleichungen

$$(1 + p^2)t - (1 + q^2)r = 0$$

$$(1 + p^2)s - pqr = 0$$

zu genügen, welche auf den vorliegenden Fall angewendet lauten:

$$a^2(b^2 - c^2)p^2 - b^2(a^2 - c^2)q^2 - c^2(a^2 - b^2) = 0,$$

$$pq = 0.$$

Von den zwei Lösungen der zweiten Gleichung ist $p = 0$ zu verwerfen, weil in diesem Falle die erste für q keinen reellen Wert zuläßt.

Hingegen gibt für $q = 0$ die erste Gleichung

$$p = \pm \frac{c}{a} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}};$$

diese Werte von p , q in die Gleichungen (A) eingetragen führen zu:

$$y = 0$$

$$\frac{x}{a} \pm \frac{z}{c} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}} = 0,$$

und nimmt man die Gleichung der Fläche hinzu, so findet sich zur Bestimmung von x , z weiter die Gleichung:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Daraus ergeben sich schließlich die Lösungen:

$$x = \pm a \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2 - c^2}}, \quad y = 0, \quad z = \pm c \sqrt{\frac{b^2 - c^2}{a^2 - c^2}},$$

durch welche vier Punkte in der zx -Ebene bestimmt sind.

Das dreiachsige Ellipsoid besitzt also vier Nabelpunkte; sie liegen in dem Hauptschnitte mit der größten und kleinsten Achse, und weil für sie

$$x^2 + z^2 = a^2 + c^2 - b^2,$$

so werden sie aus diesem Hauptschnitte durch einen ihm konzentrischen Kreis vom Radius $\sqrt{a^2 + c^2 - b^2}$ ausgeschnitten.

Die Indikatrix eines Nabelpunktes (211) ist ein Kreis, bei einer Fläche zweiter Ordnung in aller Strenge; parallele Schnitte einer solchen Fläche sind ähnlich; daher bestimmen die Tangentialebenen in den Nabelpunkten des Ellipsoids die Stellung der beiden Scharen seiner Kreisschnittebenen.

215. Sphärische Abbildung und Krümmungsmaße einer Fläche. Den verschiedenen Abbildungsweisen einer Raumkurve auf die Einheitskugel, durch Vermittlung der Tangenten, der Haupt- und der Binormalen, läßt sich eine Abbildung krummer Flächen an die Seite stellen; zu ihrer Vermittlung eignen sich die Normalen der Fläche. Hat man eine Festsetzung über die positive Normalenrichtung getroffen und zwar so, daß bei stetiger Bewegung des Flächenpunktes auch die positive Normale ihre Richtung stetig ändert, und ordnet man einem Punkt der Fläche den Endpunkt des seiner positiven Normale gleichgerichteten Radius der um den Ursprung beschriebenen Einheitskugel zu, so ergibt sich eine punktweise *sphärische Abbildung der Fläche*. Sie bedeckt die Kugel einfach, wenn es auf der Fläche keine zwei Punkte mit gleichgerichteten positiven Normalen gibt; im andern Falle kann die Kugel an manchen Stellen oder durchwegs zwei- oder mehrfach bedeckt sein. Im allgemeinen bedeckt die sphärische Abbildung eines Flächenstücks oder einer ganzen Fläche wieder ein Stück oder die ganze Oberfläche der Kugel; eine Ausnahme bilden die abwickelbaren Linienflächen; da hier die positiven Normalen längs einer Erzeugenden gleichgerichtet sind, so ergeben sie im sphärischen Abbild nur einen Punkt, die Fläche nur eine Linie. Um Beispiele anzuführen: Das sphärische Abbild eines Ellipsoids ist die Kugeloberfläche, das eines einschaligen Rotationsellipsoids eine Zone, das eines zweischaligen Rotationshyperboloids besteht aus zwei Kalotten, das eines Zylinders ist ein größter Kugelkreis (oder ein Teil eines solchen), das eines Rotationskegels ein Nebenkreis.

Sind x, y, z die Koordinaten eines Flächenpunktes M ; X, Y, Z die Richtungskosinus der zugehörigen positiven Normale, so sind X, Y, Z auch schon die Koordinaten seines sphärischen Bildes \mathfrak{M} .

Von der sphärischen Abbildung, die *Gauß* als ein wichtiges Untersuchungsmittel in die Flächentheorie eingeführt hat soll hier zur Gewinnung eines fundamentalen Begriffs Gebrauch gemacht werden.

Bisher ist nur von der Krümmung von Linien auf Flächen, nicht aber von der Krümmung der Flächen selbst gesprochen worden. Nach allgemeiner Vorstellung wird die Krümmung eines Flächenstücks nicht von seiner Größe allein, sondern auch von der Stärke der Richtungsänderung der positiven Normale innerhalb desselben abhängig sein; je stärker diese Änderung, desto größer wird — sofern es sich nicht um eine abwickelbare Fläche handelt — das sphärische Abbild des Flächenstücks ausfallen; darum bezeichnet *Gauß* den Inhalt dieses sphärischen Abbilds als die *ganze Krümmung* des Flächenstücks.

Läßt man das Flächenstück durch allseitige Kontraktion seines Randes einem ihm angehörenden Punkt *M* als Grenze sich nähern, so zieht sich auch sein sphärisches Abbild immer enger zusammen und nähert sich dem sphärischen Bild *M* von *M* als Grenze; der Quotient aus der zweiten Größe durch die erste konvergiert aber im allgemeinen gegen eine bestimmte Grenze und diese bezeichnet man als das *Krümmungsmaß der Fläche*, mit Betonung des Urhebers dieses Gedankengangs*) auch als das *Gaußsche Krümmungsmaß*. Es ist dies eine naturgemäße Übertragung des Begriffs der Krümmung einer ebenen und der Flexion einer Raumkurve auf Flächen.

Die folgende Erwägung führt dazu, daß das Krümmungsmaß als eine relative Größe aufzufassen ist. Läßt man einen Punkt den Rand des Flächenstücks in einem bestimmten Sinne durchlaufen, so wird auch das Bild des Punktes den Rand des sphärischen Abbilds des Flächenstücks durchlaufen und zwar entweder in demselben oder in entgegengesetztem Sinne. Man kann nun festsetzen, daß dem ersten Fall ein positives, dem zweiten ein negatives Krümmungsmaß entsprechen soll. Wie diese Zuordnung mit den bisherigen Ergebnissen zusammenhängt, wird die analytische Durchführung des Gedankengangs

*) *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, 1828, art. 6 (Werke Bd. 8).

zeigen, die hier nicht in voller Allgemeinheit, sondern unter vereinfachenden Annahmen geschehen soll.

Das Flächenelement sei an den Punkt $M(x/y/z)$ so angeschlossen, daß es sich in der xy -Ebene in ein rechtwinkliges Dreieck mit den Eckenkoordinaten

$$x | y; \quad x + dx | y; \quad x | y + dy$$

projiziert; der Inhalt dieser Projektion ist $\frac{1}{2} dx dy$.

Als Projektion des zugehörigen sphärischen Abbildes kann dann — mit Außerachtlassung von Größen höherer Ordnung — das Dreieck mit den Eckenkoordinaten

$$X | Y; \quad X + \frac{\partial X}{\partial x} dx | Y + \frac{\partial Y}{\partial x} dx; \quad X + \frac{\partial X}{\partial y} dy | Y + \frac{\partial Y}{\partial y} dy$$

angesehen werden; der Inhalt dieser Projektion ist

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} X & Y & 1 \\ \frac{\partial X}{\partial x} & \frac{\partial Y}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial y} & \frac{\partial Y}{\partial y} & 0 \end{vmatrix} dx dy = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial X}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial y} - \frac{\partial X}{\partial y} \frac{\partial Y}{\partial x} \right) dx dy.$$

Da das Flächenelement und sein Abbild als in den parallelen Tangentialebenen einerseits der Fläche in M , anderseits der Kugel in \mathfrak{M} liegend erachtet werden können, ist ihr Größenverhältnis gleich dem Verhältnis gleichnamiger Projektionen; mithin ergibt sich für das Krümmungsmaß K der folgende Ausdruck:

$$K = \frac{\partial X}{\partial x} \frac{\partial Y}{\partial y} - \frac{\partial X}{\partial y} \frac{\partial Y}{\partial x}.$$

Nun folgen aus

$$X = \frac{p}{w}, \quad Y = \frac{q}{w}, \quad w = \sqrt{p^2 + q^2 + 1}$$

die Ableitungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial X}{\partial x} &= \frac{(1 + q^2)r - pqs}{w^3}, & \frac{\partial Y}{\partial x} &= \frac{(1 + p^2)s - pqr}{w^3} \\ \frac{\partial X}{\partial y} &= \frac{(1 + q^2)s - pqt}{w^3}, & \frac{\partial Y}{\partial y} &= \frac{(1 + p^2)t - pqs}{w^3} \end{aligned}$$

und daraus

$$(31) \quad K = \frac{rt - s^2}{w^4};$$

mit bezug auf die Gleichung (27) heißt dies aber, daß

$$(32) \quad K = \frac{1}{R_1 R_2}.$$

Das Gaußsche Krümmungsmaß einer Fläche in einem ihrer Punkte stellt sich hiernach als das Produkt der in diesem Punkte herrschenden Hauptkrümmungen dar.

Im Zusammenhalte mit der oben getroffenen Festsetzung über das Vorzeichen des Krümmungsmaßes ergibt sich nun, daß positive Krümmung in einem elliptischen, negative Krümmung in einem hyperbolischen und die Krümmung Null in einem parabolischen Punkte stattfindet.*)

Als *mittlere Krümmung* einer Fläche in einem ihrer Punkte bezeichnet man die Summe (oder auch das arithmetische Mittel) der beiden Hauptkrümmungen. An der ersten Erklärung festhaltend hat man dafür den Ansatz:

$$(33) \quad M = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

und mit Beziehung auf (27) den analytischen Ausdruck:

$$(34) \quad M = \frac{(1+q^2)r - 2pqs + (1+p^2)t}{w^3}.$$

216. Flächen mit besonderen Krümmungseigenschaften. Nicht das geometrische Interesse allein, auch Probleme der Mechanik und Physik haben zum Studium von Flächen Anlaß gegeben, die in ihrem ganzen Verlaufe gewisse Eigenschaften in bezug auf Krümmung aufweisen. Zwei Gattungen solcher Flächen sollen hier Erwähnung finden: Flächen von konstantem Krümmungsmaß oder kurz von konstanter Krümmung und Flächen von konstanter mittlerer Krümmung.

*) Da es in gewissem Sinne der üblichen Vorstellung widerstrebt, in einem parabolischen Punkte, also in allen Punkten einer developpablen Fläche von der Krümmung Null zu sprechen, während die Fläche doch tatsächlich „gekrümmt“ ist, hat F. Casorati vorgeschlagen, die Größe $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ als *Krümmungsmaß* schlechtweg einzuführen. Entstanden ist diese Größe aus folgender geometrischen Betrachtung. Man beschreibe um M in seiner Tangentialebene einen infinitesimalen Kreis, ziehe in den Endpunkten eines Radius die Flächennormalen, bestimme deren infinitesimalen Winkel und trage sein Bogenmaß auf ebendenselben Radius ab. Indem man sich dies an allen Radien ausgeführt denkt, entsteht um M eine geschlossene Figur und das Verhältnis ihres Inhalts zu dem Inhalte des Kreises ist das angeführte Casoratische Krümmungsmaß. Vgl. Acta mathem., Bd. 14 (1890).

I. *Flächen von konstanter Krümmung.* Eine Fläche $z = f(x, y)$ hat durchwegs die Krümmung k , wenn sie der Differentialgleichung

$$\frac{rt - s^2}{w^4} = k$$

genügt; umgekehrt führt jede Lösung dieser Differentialgleichung auf eine solche Fläche. Je nachdem die Konstante k positiv oder negativ ist, spricht man von Flächen konstanter positiver, bzw. negativer Krümmung; ist $k = 0$, so vereinfacht sich die Gleichung zu

$$rt - s^2 = 0$$

und kennzeichnet nunmehr die abwickelbaren Flächen (198).

Von dem allgemeinen Problem absehend schränken wir die Frage auf Rotationsflächen ein. Soll durch Rotation einer Kurve $y = f(x)$ um die x -Achse eine Fläche konstanter Krümmung entstehen, so muß das Produkt aus dem Krümmungsradius und der begrenzten Normale für alle Punkte denselben Wert $\frac{1}{k}$ haben, wobei auf die Lagenbeziehung der beiden Strecken Rücksicht zu nehmen ist: sind y und y'' ungleich bezeichnet, so haben beide Strecken in bezug auf den Kurvenpunkt gleiche Lage — das entspricht einem positiven k ; sind y und y'' gleich bezeichnet, so liegen die Strecken auf entgegengesetzten Seiten des Kurvenpunktes — das entspricht einem negativen k . Unter allen Umständen gilt für solche Kurven der Ansatz:

$$(35) \quad -\frac{y''}{y(1+y'^2)^2} = k.$$

Bei positivem k bilden die einfachste, an sich evidente Lösung dieser Differentialgleichung Kreise vom Radius $r = \frac{1}{\sqrt{k}}$, deren Mittelpunkte in der x -Achse liegen. *Die Kugel ist die einfachste Rotationsfläche von konstanter positiver Krümmung.*

Um auch eine Rotationsfläche konstanter negativer Krümmung kennen zu lernen, stellen wir an der Kettenlinie (134, 2))

$$y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)$$

folgende Betrachtung an. Aus

$$y' = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right)$$

berechnet sich

$$ds = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) dx,$$

ein Ausdruck, der durch Differentiation von $\frac{a}{2} (e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}})$ entsteht; zählt man also den Bogen von A , Fig. 121, aus, so daß er mit x zugleich Null wird, so ist seine Länge

$$s = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}} \right);$$

mithin besteht die Beziehung

$$y^2 - s^2 = a^2,$$

die sich geometrisch darin ausdrückt, daß das von P auf die Tangente gefällte Lot auf ihr die Bogenlänge $s = MQ$ abschneidet und die Länge $PQ = a$ hat. Infolgedessen beschreibt der Punkt Q die von A ausgehende Evolvente der Kettenlinie, deren parametrische Darstellung lautet:

$$\xi = x - a \sin \alpha = a l \frac{s + \sqrt{s^2 + a^2}}{a} - \frac{as}{\sqrt{a^2 + s^2}}$$


$$\eta = a \cos \alpha = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + s^2}},$$

wenn s der Parameter ist; durch seine Elimination erhält man die explizite Darstellung:

$$\xi = a l \frac{a^2 + \sqrt{a^2 - \eta^2}}{\eta} - \sqrt{a^2 - \eta^2}.$$

Aus dieser Betrachtung ist unmittelbar zu entnehmen, daß das Produkt aus dem Krümmungsradius QM und der begrenzten Normale QN den konstanten Wert $-a^2$ hat mit Rücksicht auf die entgegengesetzte Lage beider Strecken, daß also die von dieser Kurve, die den Namen *Traktrix* führt, erzeugte Rotationsfläche die konstante negative Krümmung $-\frac{1}{a^2}$ besitzt. In Hervorhebung des Gegensatzes zur Kugel, die eine Rotationsfläche konstanter positiver Krümmung ist, hat man die in Rede stehende Fläche als *Pseudosphäre* bezeichnet.

Fig. 121.



Für die weiter folgende Untersuchung sei noch angemerkt, daß sich für die Kettenlinie mit Hilfe von $y'' = \frac{1}{2a} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right) = \frac{y}{a^2}$ der Krümmungsradius

$$\rho = \frac{y^2}{a}$$

ergibt und daß die begrenzte Normale denselben Ausdruck hat.

II. *Flächen mit konstanter mittlerer Krümmung.* Eine Fläche $z = f(x, y)$ hat in allen Punkten die mittlere Krümmung m , wenn sie der Differentialgleichung

$$\frac{(1 + q^2)r - 2pq s + (1 + p^2)t}{w^3} = m$$

genügt; umgekehrt führt jede Lösung dieser Gleichung auf eine solche Fläche. Die Konstante m kann positiv, negativ oder Null sein; der letzte Fall, dem die einfachere Differentialgleichung

$$(1 + q^2)r - 2pq s + (1 + p^2)t = 0$$

entspricht, ist von besonderem Interesse; die entsprechenden Flächen besitzen durchwegs gleiche und entgegengesetzte Hauptkrümmungsradien und heißen *Minimalflächen*, wegen der Eigenschaft, daß ihnen bei gegebener Begrenzung der kleinste Flächeninhalt zukommt (doch braucht dies nicht für ein beliebig ausge dehntes Stück zu gelten). Um gleich bei dieser Flächengattung zu bleiben, sei darauf hingewiesen, daß in 214, 2) die identische Beziehung $R_1 = -R_2$ von der gewöhnlichen Schraubenfläche nachgewiesen wurde und daß sie nach der Schlußbemerkung von I. auch die Rotationsfläche auszeichnet, die bei der Umdrehung der Kettenlinie $y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right)$ um die x -Achse erzeugt wird; diese zwei Flächen sind also Beispiele von Minimalflächen, und zwar ist die erste die einzige Regelfläche mit Richtebene und die zweite die einzige Rotationsfläche in dieser Flächengattung.


Bezüglich der Rotationsflächen von konstanter mittlerer Krümmung hat Ch. Delaunay gezeigt*), daß ihre Meridiane Rollkurven sind, dadurch erzeugt, daß eine Kegelschnittslinie

*) Journal de mathém., 1^e sér. 6 (1891).

auf einer Geraden rollt und ein Brennpunkt der beschreibende Punkt ist. Der Beweis hierfür läßt sich mit den hier vorhandenen Hilfsmitteln in folgender Weise führen.

Die Ellipse Fig. 122 rolle auf der Geraden XX' , der Brennpunkt F sei der beschreibende Punkt, A der momentane Drehpol mit den Radienvektoren r, r' und dem Krümmungsmittelpunkt O . Der Krümmungsmittelpunkt Ω der Rollkurve in F läßt sich dann nach der in 161 entwickelten Konstruktion und der Krümmungsradius ϱ nach der daselbst abgeleiteten Savaryschen Formel (23) ermitteln. An die Stelle von p tritt r , und da die Polbahn eine Gerade, ist R_1 unendlich; folglich ist

$$\varrho = r + \frac{\cos \theta}{\frac{1}{R} - \frac{\cos \theta}{r}};$$



ersetzt man den Krümmungsradius der Polkurve durch den in 163, 4) dafür gefundenen Ausdruck, so wird weiter

$$\varrho = r + \frac{1}{\frac{a \cos^2 \theta}{b^2} - \frac{1}{r}}.$$

Das Produkt der Lote $FG, F'G'$ zu XX' drückt sich durch $rr' \cos^2 \theta$ aus, und da es gleichkommt b^2 , so hat man für $\cos^2 \theta$ den Ausdruck $\frac{b^2}{rr'} = \frac{b^2}{r(2a-r)}$; seine Einsetzung in den Ausdruck für ϱ gibt

$$\varrho = \frac{ar}{r-a},$$

woraus tatsächlich der Delaunaysche Satz folgt:

$$\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{r} = \frac{1}{a}.$$

Für die Hyperbel ergibt eine analoge Rechnung

$$\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{r} = -\frac{1}{a},$$

hier sind ϱ und r entgegengesetzt bezeichnet (r negativ).

Bei der Parabel mit dem Parameter p wird

$$\varphi = r + \frac{1}{\frac{\cos^2 \theta}{p} - \frac{1}{r}},$$

mit Bezugnahme auf 163 weiter

$$\cos^2 \theta = \cos^2 \psi = \frac{1 + \cos \varphi}{2} = \frac{p}{2r},$$

demnach

$$\varphi + r = 0;$$

die vom Brennpunkt der Parabel beschriebene Kurve erzeugt also eine Minimalrotationsfläche; vorhin ist das Katenoid als einzige Fläche dieser Art bezeichnet worden, wofür an späterer Stelle (gelegentlich der Differentialgleichungen) die Begründung erfolgen wird. Mithin ist die beim Abwälzen der Parabel vom Brennpunkt beschriebene Kurve eine Kettenlinie; mit Hilfe der Integralrechnung kann hierfür auch ein direkter Beweis erbracht werden.

Beispiel. Zu zeigen, daß die Funktion

$$z = \frac{\cos y}{\cos x}$$

der Differentialgleichung

$$(1 + q^2)r - 2pqs + (1 + p^2)t = 0$$

genügt, die zugehörige Fläche also eine Minimalfläche ist.

§ 7. Spezielle Kurven auf krummen Flächen.

217. Schichtenlinien und Fall-Linien. Von der Vorstellung ausgehend, die xy -Ebene sei *horizontal*, nennt man die Schnitte einer Fläche parallel zu dieser Ebene *Niveaulinien* oder *Schichtenlinien*.

Ihre Projektionen auf der xy -Ebene sind durch die Gleichung der Fläche selbst dargestellt, wenn man in dieser z als veränderlichen Parameter ansieht.

Da für eine Schichtenlinie

$$z = \text{konst.}$$

ist, so folgt daraus durch Differentiation, daß für ihre Punkte

$$pdx + qdy = 0$$

oder

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{p}{q}$$

ist; diese Gleichung drückt die Eigenschaft aus, daß die Tangente an eine Schichtenlinie (sowie an ihre Projektion in der xy -Ebene) parallel ist der xy -Spur der in ihrem Berührungspunkte an die Fläche gelegten Tangentialebene.

Diejenigen Kurven auf einer Fläche, welche die Schichtenlinien rechtwinklig schneiden, nennt man *Fall-Linien* oder Linien größten Falles, weil sie die Bahnen von Punkten anzeigen, welche unter dem Einfluß der Schwere allein auf der Fläche sich bewegen.

Weil im Schnittpunkte einer Schichtenlinie mit einer Fall-Linie die Tangenten beider Kurven aufeinander senkrecht stehen und diese Eigenschaft auch auf die xy -Projektion sich überträgt, so sind die Projektionen der Fall-Linien in der xy -Ebene durch die Gleichung

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{q}{p}$$

gekennzeichnet.

Man nennt (1) die Differentialgleichung der Niveaulinien, (2) die Differentialgleichung der Fall-Linien.

Diese zwei Systeme von Kurven finden Anwendung bei der bildlichen Darstellung einer Terrainfläche in der Horizontalebene.

Beispiele. 1) Die Schichtenlinien des Ellipsoids

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

geben in der xy -Projektion ein System homothetischer Ellipsen mit der Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{z^2}{c^2},$$

in welcher z^2 auf das Intervall $(0, c^2)$ angewiesen ist.

Für die Fall-Linien besteht, weil $p = -\frac{c^2 x}{a^2 z}$, $q = -\frac{c^2 y}{b^2 z}$, die Differentialgleichung:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a^2 y}{b^2 x}$$

oder

$$\frac{1}{a^2} \frac{dy}{y} = \frac{1}{b^2} \frac{dx}{x};$$


es ist aber $\frac{1}{m^2} \frac{du}{u}$ das Differential von $\frac{1}{m^2} l u$, daher kann aus der letzten Gleichung auf die neue

$$\frac{1}{a^2} l y = \frac{1}{b^2} l x + \frac{1}{a^2} l C$$

geschlossen werden, wenn C eine beliebige Konstante bedeutet; daraus aber folgt durch Übergang von den Logarithmen zu den Zahlen:

$$y = Cx^{\frac{a^2}{b^2}}.$$

Diese Gleichung stellt das System der xy -Projektionen der Fall-Linien dar. Es sind Parabeln, algebraische oder transzendente, je nachdem $\frac{a^2}{b^2}$ rational oder irrational ist. Im Falle $\frac{a^2}{b^2} = 2$ z. B., der in Fig. 123 dargestellt ist, sind es gewöhnliche Parabeln.



Wird die Richtebene eines Konoids (187, 2,b) zur xy -Ebene gemacht, so sind seine Erzeugenden unmittelbar die Niveaulinien. Dies trifft also auch bei den geraden Konoiden

$$(3) \quad s = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

zu, deren Leitgerade die s -Achse ist. Um zu den Linien größten Falles zu gelangen, setze man für den Augenblick $\frac{y}{x} = u$ und bilde

$$p = -f'(u) \frac{y}{x^2}, \quad q = f'(u) \frac{1}{x};$$

daraus die Differentialgleichung der Fall-Linien:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

und da sie unabhängig ist von der Natur der Funktion f , so gilt die weitere Lösung für alle Konoide der Gleichungsform (3). Schreibt man die Differentialgleichung in der Gestalt

$$x dx + y dy = 0,$$

so erkennt man in der linken Seite das halbe Differential von $x^2 + y^2$; infolgedessen ist

$$x^2 + y^2 = C$$

die Gleichung des Systems der xy -Projektionen der Fall-Linien, das also ein System konzentrischer Kreise ist.

218. Krümmungslinien. Die Normalenfläche einer gegebenen Fläche

$$s = f(x, y)$$


längs einer ihr aufgeschriebenen Kurve ist im allgemeinen eine *windschiefe Fläche*, d. h. eine solche, deren geradlinige Erzeugende weder durch einen festen (im Endlichen liegenden oder unendlich fernen) Punkt gehen, noch Tangenten an eine Kurve sind.

Ist jedoch die aufgeschriebene Kurve K solcher Art, daß die zu ihr gehörige Normalenfläche eine *abwickelbare Fläche* ist, so heißt sie eine *Krümmungslinie* der gegebenen Fläche; der Grund für diese Bezeichnung wird sich alsbald ergeben.

Es gibt zwei Flächen, für welche jede aufgeschriebene Kurve im Sinne dieser Definition eine Krümmungslinie ist: die Ebene und die Kugel, denn dort ist die Normalenfläche ein Zylinder, hier ein Kegel.

Es entsteht nun die Frage, ob auf einer beliebigen Fläche Krümmungslinien existieren und welches ihre analytischen Merkmale und geometrischen Eigenschaften sind.

Angenommen, K (Fig. 124) sei eine Krümmungslinie der durch ihren Umriss angedeuteten Fläche und K_0 die Rückkehrkante der zugehörigen developpablen Normalenfläche; dann ist die Normale der Fläche in jedem beliebigen Punkte $M(x/y/z)$ von K Tangente an K_0 in einem bestimmten Punkte $M_0(x_0/y_0/z_0)$ und umgekehrt. Bezeichnet man also die Kosinus der positiven Normalenrichtung in M mit X, Y, Z , und beachtet, daß $\frac{dx_0}{du}, \frac{dy_0}{du}, \frac{dz_0}{du}$ proportional sind den Richtungskosinus der Tangente an K_0 in M_0 , wobei u der Parameter ist, durch welchen alle auf M als Punkt von K bezüglichen Größen dargestellt sind, so muß



$$\frac{\frac{dx_0}{du}}{X} = \frac{\frac{dy_0}{du}}{Y} = \frac{\frac{dz_0}{du}}{Z}$$

sein; ist κ der gemeinsame Wert dieser Verhältnisse, so hat man:

$$(4) \quad \frac{dx_0}{du} = \kappa X, \quad \frac{dy_0}{du} = \kappa Y, \quad \frac{dz_0}{du} = \kappa Z.$$

Nun bestehen, wenn die Länge M_0M mit R bezeichnet wird, zwischen den Koordinaten von M und M_0 die Beziehungen:

$$x_0 = x - RX, \quad y_0 = y - RY, \quad z_0 = z - RZ;$$

dabei ist R positiv oder negativ, je nachdem M_0M die Richtung der positiven oder der negativen Normale hat; führt man hiernach die Gleichungen (4) aus, so folgt:

$$\begin{aligned}\kappa X &= \frac{dx}{du} - \frac{dR}{du} X - R \frac{dX}{du} \\ \kappa Y &= \frac{dy}{du} - \frac{dR}{du} Y - R \frac{dY}{du} \\ \kappa Z &= \frac{dz}{du} - \frac{dR}{du} Z - R \frac{dZ}{du};\end{aligned}$$

werden diese Gleichungen der Reihe nach mit X, Y, Z multipliziert und hierauf addiert, wobei zu beachten ist, daß

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = 1,$$

infolgedessen

$$X \frac{dX}{du} + Y \frac{dY}{du} + Z \frac{dZ}{du} = 0,$$

und daß ferner

$$X \frac{dx}{du} + Y \frac{dy}{du} + Z \frac{dz}{du} = 0$$

ist, weil die Normale MN senkrecht ist zur Tangente an K in M , so ergibt sich

$$\kappa = - \frac{dR}{du};$$

und wird dieser Wert in das obige Gleichungssystem eingetragen, so kommt man zu den die Krümmungslinie charakterisierenden Gleichungen*):

$$(5) \quad \frac{dx}{dX} = \frac{dy}{dY} = \frac{dz}{dZ} (= R).$$

Ist die Fläche in der Form $z = f(x, y)$ dargestellt, so ist

$$X = \frac{p}{w}, \quad Y = \frac{q}{w}, \quad Z = \frac{-1}{w}, \quad w = \sqrt{p^2 + q^2 + 1},$$

wobei das Vorzeichen der Wurzel nach der Wahl der positiven Richtung der Normale festzusetzen ist; daraus berechnet sich

$$\begin{aligned}dX &= \frac{(1 + q^2)(rdx + sdy) - pq(sdx + tdy)}{w^3} \\ dY &= \frac{(1 + p^2)(sdx + tdy) - pq(rdx + sdy)}{w^3}.\end{aligned}$$

*) Diese Gleichungen hat zuerst O. Rodrigues gefunden, vgl. Correspond. sur l'école polytechn., 1816.

Mit diesen Ausdrücken gibt (5):

$$(6) \quad \frac{dx}{(1+q^2)(r dx + s dy) - pq(s dx + t dy)} = \frac{dy}{(1+p^2)(s dx + t dy) - pq(r dx + s dy)} = \frac{R}{w^2};$$

ordnet man die erste dieser Gleichungen nach dx, dy , so erhält man:

$$(7) \quad \begin{cases} [(1+p^2)s - pqr]dx^2 - [(1+q^2)r - (1+p^2)t]dxdy \\ - [(1+q^2)s - pqt]dy^2 = 0. \end{cases}$$

Diese Gleichung bestimmt die Richtung der Tangenten an die durch den Punkt M gehenden Krümmungslinien; sie stimmt aber überein mit der Gleichung (26), welche sich in 212 zur Bestimmung der Tangentenrichtungen für die Hauptnormalschnitte im Punkte M ergab.

Daraus folgt der Satz: *Durch jeden Punkt einer krummen Fläche, sofern er nicht Nabelpunkt ist, gehen zwei stets reelle Krümmungslinien, welche die Hauptnormalschnitte dieses Punktes berühren und sich daher wie diese unter rechtem Winkel schneiden.*

Jede Fläche, die Ebene und die Kugel ausgenommen, besitzt somit zwei Scharen von reellen Krümmungslinien derart, daß jede Linie der einen Schar jede der anderen Schar rechtwinklig schneidet.

Die Gleichung (7) charakterisiert die Projektion der Krümmungslinien auf der xy -Ebene und wird als *Differentialgleichung der Krümmungslinien* bezeichnet.

Um die Rückkehrkante der abwickelbaren Normalenfläche längs einer Krümmungslinie näher kennen zu lernen, ordnen wir die beiden Gleichungen, welche sich aus (6) durch Verbindung des ersten und zweiten Ausdrucks mit dem dritten ergeben, nach dx, dy ; aus dem so entstehenden Gleichungspaar

$$\begin{cases} \left\{ \frac{R}{w^2} [(1+q^2)r - pqs] - 1 \right\} dx + \frac{R}{w^2} [(1+q^2)s - pqt] dy = 0 \\ \frac{R}{w^2} [(1+p^2)s - pqr] dx + \left\{ \frac{R}{w^2} [(1+p^2)t - pqs] - 1 \right\} dy = 0 \end{cases}$$

geht durch Elimination von dx, dy die in bezug auf R quadratische Gleichung

$$(8) \quad (rt - s^2)R^2 - [(1+q^2)r - 2pqs + (1+p^2)t]wR + w^4 = 0$$

hervor; diese Gleichung stimmt aber mit jener (27) überein, die sich in 212 zur Berechnung der Hauptkrümmungsradien ergeben hat.

Demnach gilt der Satz: *Die Normale in einem Punkte M der Fläche berührt die Rückkehrkanten der Normalenflächen, die zu den durch M laufenden Krümmungslinien gehören, in den Hauptkrümmungsmittelpunkten.*

Dadurch sind die beiden Scharen von Krümmungslinien voneinander unterschieden, daß nämlich die Linien der einen Schar überall die Richtung der stärksten, die der anderen Schar die Richtung der schwächsten Krümmung anzeigen; in dieser Eigenschaft ist auch der Name dieser Linien begründet.

Wenn die Krümmungslinie K die Schar, zu welcher sie gehört, stetig durchläuft, so vollführt die zugeordnete Rückkehrkante K_0 auch eine stetige Bewegung und beschreibt eine Fläche; eine zweite Fläche gleicher Entstehungsweise ergibt sich aus der anderen Schar von Krümmungslinien. Diese zwei Flächen sind aber ebenso als ein einheitliches Gebilde anzusehen, wie die beiden Scharen von Krümmungslinien, die ja auch durch eine Gleichung analytisch bestimmt sind; man nennt sie zusammen die *Polar- oder Zentralfläche*, auch die *Krümmungsmittelpunktsfläche* der gegebenen Fläche; der eine Mantel enthält die Krümmungszentra der Hauptnormalschnitte größter Krümmung, der andere Mantel die Zentra der Hauptnormalschnitte kleinster Krümmung.

219. Krümmungslinien der Rotationsflächen und der abwickelbaren Flächen. Bei zwei Gattungen von Flächen lassen sich die Krümmungslinien ohne weiteres angeben.

Auf einer *Rotationsfläche* bilden die Meridiane das eine System, die Parallelkreise das andere System. Denn die Normalenfläche längs eines Meridians ist eine Ebene, jene längs eines Parallelkreises ein Kegel, beide sind also abwickelbar.

Auf einer *abwickelbaren Fläche* sind die geradlinigen Erzeugenden das eine System von Krümmungslinien; denn, weil die Fläche in allen Punkten einer Erzeugenden von einer und derselben Ebene berührt wird, ist die Normalenfläche längs der Erzeugenden eine Ebene, also abwickelbar. Das andere

System schneidet die Erzeugenden rechtwinklig und besteht aus den Filarevolventen der Gratlinie (206).

Was insbesondere den *Kegel* anlangt, so wird auf diesem das zweite System von Krümmungslinien durch eine Schar konzentrischer Kugeln aus der Kegelspitze ausgeschnitten, und auf dem *Zylinder* durch die Schar der Normalschnittebenen.

In der Abwicklung erscheinen, wenn es sich um eine allgemeine Developpable handelt, die Krümmungslinien der einen Schar als Tangenten an die transformierte Rückkehrkante und die der anderen Schar als Evolventen dieser Kurve; bei einem Kegel ergibt sich in der Abwicklung ein Strahlenbüschel und ein System konzentrischer Kreise, bei einem Zylinder zwei zueinander senkrechte Parallelstrahlenbüschel.

Für eine beliebige Fläche bildet die analytische Bestimmung der Krümmungslinien eine Aufgabe der Integralrechnung.

220. Asymptotische Linien. Eine Kurve C , die einer krummen Fläche aufgeschrieben ist, bestimmt als Ort von Berührungspunkten eine einfach unendliche Schar von Tangentialebenen; die Einhüllende dieser Ebenenschar ist eine abwickelbare Fläche. Man nennt sie die der Fläche längs der Kurve C *umschriebene Developpable*.

Ist die gegebene Fläche selbst abwickelbar, so fällt die ihr längs irgend einer Kurve umschriebene Developpable mit ihr zusammen. Dieser Fall bietet also kein weiteres Interesse, wir setzen daher die Fläche als nichtabwickelbar voraus.

Die umschriebene Developpable ist im allgemeinen von der Tangentenfläche der Kurve C verschieden; fällt sie aber mit ihr zusammen, so heißt die Kurve eine *asymptotische Linie* der Fläche. Es wird zu untersuchen sein, ob und unter welchen Bedingungen ein solches Verhalten möglich ist.

Die Existenz einer asymptotischen Linie vorausgesetzt, ergibt sich für sie aus der Bemerkung, daß ja die Tangentenfläche einer Kurve auch die Einhüllende ihrer Schmiegungebenen ist, auch die folgende Definition: *Eine auf einer Fläche liegende Kurve A heißt eine asymptotische Linie der Fläche, wenn in jedem Punkte von A die Oskulationsebene der Kurve mit der Tangentialebene der Fläche zusammenfällt.*

Es sei nun M ein Punkt irgend einer Kurve C auf der gegebenen Fläche; die Tangentialebene der Fläche daselbst hat die Gleichung:

$$(9) \quad p(\xi - x) + q(\eta - y) - (\xi - z) = 0,$$

worin x, y, p, q als Funktionen eines Parameters darstellbar sind; differenziert man zum Zwecke der Bestimmung der Einhüllenden nach diesem Parameter, so ergibt sich mit Rücksicht auf die Beziehung $-pdx - qdy + dz = 0$ die weitere Gleichung

$$(10) \quad dp \cdot (\xi - x) + dq \cdot (\eta - y) = 0,$$

die im Verein mit (9) die Charakteristik der Einhüllenden bestimmt, deren Gleichungen auch in der Gestalt

$$\frac{\xi - x}{dq} = \frac{\eta - y}{-dp} = \frac{\xi - z}{pdq - qdp}$$

geschrieben werden können; hieraus folgt, wenn man die Koordinaten eines unendlich benachbarten Punktes von M auf der Charakteristik mit $x + d_1x, y + d_1y, z + d_1z$ bezeichnet, daß:

$$(11) \quad d_1x : d_1y : d_1z = dq : -dp : (pdq - qdp).$$

Durch die Verhältnisse $dx : dy : dz$ und $d_1x : d_1y : d_1z$ sind zwei Tangenten der Fläche bestimmt, die eine an die Kurve C , die andere als Erzeugende der umschriebenen Developpablen.

Für die xy -Projektion eines solchen Tangentenpaars ergibt sich aus (11) die Relation:

$$dpd_1x + dqd_1y = 0,$$

die nach Entwicklung von dp, dq lautet:

$$(11^*) \quad rdx d_1x + s(d_1x dy + dx d_1y) + tdy d_1y = 0.$$

Da sie unverändert bleibt, wenn man dx, dy und d_1x, d_1y miteinander vertauscht, so ist die Beziehung der Tangenten eine gegenseitige: Jede Kurve, die die eine berührt, führt zu einer umschriebenen Developpablen, welche die andere zur Erzeugenden hat. Man bezeichnet zwei derartige Flächentangenten als *konjugierte Tangenten*.

Nach der Definition wird nun C zu einer asymptotischen Linie A , wenn die Charakteristik mit der Tangente an C zu-

sammenfällt, wenn also die zwei Richtungen in (11*) sich vereinigen. Demnach hat jede Linie A der Gleichung

$$(12) \quad rdx^2 + 2sdx dy + tdy^2 = 0$$

zu genügen; man nennt diese die *Differentialgleichung der asymptotischen Linien*. Gleichzeitig geht aus dieser Betrachtung hervor, daß die Tangenten an eine asymptotische Linie sich selbst konjugiert sind. Die Gleichung (12) ist überdies der Ausdruck einer weitem geometrischen Eigenschaft, wie sich aus der folgenden Betrachtung ergibt.

Der Normalschnitt der Fläche, welcher die Kurve A im Punkte M berührt, hat die Krümmung (209, (8))

$$R = \frac{r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta}{\sqrt{p^2 + q^2 + 1}};$$

laut (12) ist aber

$$r \cos^2 \alpha + 2s \cos \alpha \cos \beta + t \cos^2 \beta = 0,$$

folglich auch

$$\frac{1}{R} = 0.$$

Eine asymptotische Linie berührt also in jedem Punkte einen Normalschnitt von der Krümmung Null.

Solche Normalschnitte existieren jedoch nur in hyperbolischen und in parabolischen Punkten.

In einem hyperbolischen Punkte gibt es solcher Normalschnitte zwei, und ihre Tangenten sind die Asymptoten der Dupinschen Indikatrix (204). *Auf einer Fläche oder einer Flächenregion mit hyperbolischen Punkten lassen sich also zwei Scharen von asymptotischen Linien verzeichnen; in jedem Punkte schneiden sich zwei Linien, aus jeder Schar eine, und ihre Tangenten sind die Asymptoten der Indikatrix oder die Haupttangente der Fläche.*

Der letztere Umstand begründet den Namen der asymptotischen Linien, neben welchem auch der Name „Haupttangente kurven“ gebräuchlich ist.

Die beiden Scharen asymptotischer Linien schneiden sich im allgemeinen unter schiefen Winkeln; nur in Punkten, wo die Indikatrix aus gleichseitigen Hyperbeln besteht, erfolgt der Schnitt rechtwinklig. Es gibt Flächen, wo dies durchwegs geschieht; die Wendelfläche ist ein Beispiel dieser Art (214, 2).

Unter den Flächen zweiten Grades gibt es zwei mit hyperbolischen Punkten: das einschalige Hyperboloid und das hyperbolische Paraboloid; die beiden Scharen ihrer Erzeugenden bilden zugleich die Scharen der Haupttangentenkurven.

In einem parabolischen Punkte fallen die beiden Normal-schnitte von der Krümmung Null in einen zusammen. Hat die Fläche oder Flächenregion nur parabolische Punkte, so vereinigen sich die beiden Scharen asymptotischer Linien zu einer einzigen. *Auf einer abwickelbaren Fläche liegen also die beiden Scharen asymptotischer Linien vereinigt und werden durch die geradlinigen Erzeugenden der Fläche dargestellt.*

Auf einer Fläche oder Flächenregion mit elliptischen Punkten gibt es keine reellen asymptotischen Linien.

Wenn eine Fläche aus Regionen mit hyperbolischen und aus solchen mit elliptischen Punkten besteht, wie dies beispielsweise bei dem 195, 3) erwähnten Torus der Fall ist, so wird die Grenze zwischen beiderlei Regionen durch Kurven mit parabolischen Punkten gebildet; von jedem Punkte einer solchen Kurve laufen dann zwei asymptotische Linien mit gemeinschaftlicher Tangente aus.

Während die stets reellen und rechtwinklig sich schneidenden Krümmungslinien den Verlauf der algebraisch größten und der algebraisch kleinsten Krümmung anzeigen, bezeichnen die nur bedingt reellen und im allgemeinen schiefwinklig sich schneidenden asymptotischen Linien den Verlauf der Krümmung Null.

Beispiel. Zur Bestimmung der asymptotischen Linien der geraden Konoide (187, 2b))

$$z = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

bilde man mittels der Abkürzung

$$\frac{y}{x} = u$$

die Differentialquotienten:

$$\begin{aligned} p &= -f'(u) \frac{y}{x^2}, & q &= f'(u) \frac{1}{x}, \\ r &= f''(u) \frac{y^2}{x^3} + 2f'(u) \frac{y}{x^2}, & s &= -f''(u) \frac{y}{x^2} - f'(u) \frac{1}{x^2}, \\ t &= f''(u) \frac{1}{x^2}; \end{aligned}$$

durch Eintragung der drei letzten in (12) ergibt sich:

$$(ydx - xdy) \left\{ -f''(u) \frac{xdy - ydx}{x^2} + 2f'(u) \frac{dx}{x} \right\} = 0.$$

Diese Gleichung wird einmal befriedigt durch

$$ydx - xdy = 0 \quad \text{oder} \quad d \frac{y}{x} = 0,$$

woraus man auf

$$\frac{y}{x} = C$$

schließt; die eine Schar asymptotischer Linien projiziert sich in der xy -Ebene in ein Strahlenbüschel aus dem Ursprung — es sind dies die geradlinigen Erzeugenden der Fläche.

Die andere Schar ist bestimmt durch die Gleichung

$$-f''(u) \frac{xdy - ydx}{x^2} + 2f'(u) \frac{dx}{x} = 0,$$

der man die Form

$$2 \frac{dx}{x} = \frac{f'(u) du}{f'(u)}$$

geben kann; hier ist aber die linke Seite das Differential von $2lx$, die rechte Seite das Differential von $lf'(u)$, daher muß

$$2lx = lf'(u) + lC$$

sein, wenn C eine beliebige Konstante bezeichnet; daraus folgt

$$x^2 = Cf'\left(\frac{y}{x}\right)$$

als Gleichung der Projektion der zweiten Schar asymptotischer Linien. Die rechts angedeutete Differentiation bezieht sich auf $\frac{y}{x}$ als Variable.

Beispielsweise ist für das gerade Schraubenkonoid:

$$z = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x},$$

$f\left(\frac{y}{x}\right) = b \operatorname{Arctg} \frac{y}{x}$, folglich $f'\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{bx^2}{x^2 + y^2}$, so daß die zweite Schar seiner asymptotischen Linien durch

$$x^2 + y^2 = \kappa$$

bestimmt ist, wenn $bC = \kappa$ gesetzt wird; die Gleichung stellt ein System konzentrischer Kreise dar, ihm entspricht auf der Fläche eine Schar koaxialer Schraubenlinien.

221. Geodätische Linien. Zu Beginn des vorigen Artikels ist von einer einfach unendlichen Schar von Ebenen gesprochen worden, welche durch eine einer gegebenen Fläche aufgeschriebene Kurve C bestimmt ist; es war die Schar der Tangentialebenen der Fläche in den Punkten von C .

Eine andere einfach unendliche Schar bilden die Normal-ebenen der Fläche, welche die Kurve C in den einzelnen Punkten berühren; auch sie werden durch eine abwickelbare Fläche eingehüllt, die im allgemeinen verschieden ist von der Tangentenfläche der C .

Ist die Kurve so beschaffen, daß die Einhüllende der sie berührenden Normalebenen mit ihrer Tangentenfläche zusammenfällt, so heißt sie eine *geodätische Linie* der Fläche.

Aus dieser Definition läßt sich eine andere ableiten, die der analytischen Darstellung unmittelbar zugänglich ist. Ist G eine geodätische Linie, so ist jede sie berührende Normalebene der Fläche zugleich Oskulationsebene in dem betreffenden Punkte, enthält somit die Hauptnormale, die also notwendig mit der Flächennormale koinzidiert. Man kann daher auch die folgenden Erklärungen für die geodätische Linie aufstellen,

Unter einer geodätischen Linie ist eine solche Kurve auf der Fläche zu verstehen, deren Oskulationsebene durchweg senkrecht ist zur Tangentialebene der Fläche in dem betreffenden Punkte; oder, es ist eine solche Kurve, deren Hauptnormalenfläche auf der zugrundeliegenden Fläche normal steht.

Jede dieser Erklärungen führt zu einer die geodätischen Linien charakterisierenden Beziehung.

Bezeichnet man die Koordinaten des Punktes M mit x, y, z , die Richtungskosinus der Normale der Fläche daselbst mit X, Y, Z ; die Richtungskosinus der Hauptnormale mit $\cos \lambda, \cos \mu, \cos \nu$ — alle Größen als Funktionen eines Parameters z. B. des Bogens s von G dargestellt —, so ist der ersten Erklärung gemäß auszudrücken, daß die Oskulationsebene (178, (6)).

$$\begin{vmatrix} \xi - x & \eta - y & \zeta - z \\ dx & dy & dz \\ d^2x & d^2y & d^2z \end{vmatrix} = 0$$

auf der Tangentialebene

$$(\xi - x)X + (\eta - y)Y + (\xi - z)Z = 0$$

normal steht. Es hat also die Produktsumme der Koeffizienten von $\xi - x$, $\eta - y$, $\xi - z$ aus beiden Gleichungen den Wert Null, d. h. im ganzen Verlauf von G ist

$$(13) \quad \begin{vmatrix} X & Y & Z \\ dx & dy & dz \\ d^2x & d^2y & d^2z \end{vmatrix} = 0.$$

Der zweiten Erklärung zufolge ist

$$\frac{X}{\cos \lambda} = \frac{Y}{\cos \mu} = \frac{Z}{\cos \nu},$$

und zwar ist der gemeinsame Wert der drei Quotienten $+1$ oder -1 , je nachdem die positive Richtung der Hauptnormale mit der positiven oder negativen Richtung der Flächennormale zusammenfällt. Führt man für die Richtungskosinus der Hauptnormale die Werte (181, (11)) ein, so entsteht die Beziehung:

$$(14) \quad \frac{X}{\frac{d^2x}{ds^2}} = \frac{Y}{\frac{d^2y}{ds^2}} = \frac{Z}{\frac{d^2z}{ds^2}}$$

und nun ist der Wert dieser Verhältnisse, mit derselben Unterscheidung, $+\varrho$ oder $-\varrho$, wenn ϱ den Flexionshalbmesser von G in M bezeichnet.

Die Tangentialebene im Punkte M von G an die Fläche enthält die Tangente und die Binormale, ist also die rektifizierende Ebene von G in M ; projiziert man G orthogonal auf diese Ebene, so zeigt die Projektion im Punkte M einen Wendepunkt (182), hat hier also die Krümmung Null; auch diese Eigenschaft ist charakteristisch für die geodätische Linie.*)

*) Ist C irgend eine auf einer Fläche verzeichnete Kurve, M ein Punkt derselben, T die Tangentialebene der Fläche in diesem Punkte, Γ die orthogonale Projektion von C auf T , so nennt man die Krümmung von Γ in M die *geodätische Krümmung* von C in M auf der betreffenden Fläche. Hiernach kann eine geodätische Linie auch als eine solche der Fläche aufgeschriebene Kurve definiert werden. deren *geodätische Krümmung im ganzen Verlaufe Null* ist. Diese Definition läßt die Linie am deutlichsten als das Analogon der Geraden auf einer krummen Fläche erkennen.

Die letzten Bemerkungen zeigen, daß die längs einer geodätischen Linie G umschriebene Developpable zugleich deren rektifizierende Developpable ist.

Sie heiße für den Augenblick D . Da die Oskulations-ebene von G in einem Punkte M senkrecht ist auf der Tangentialebene von D in diesem Punkte, so spielt G auf der Fläche D ebenfalls die Rolle einer geodätischen Linie.

Daraus folgt der Satz: *Eine geodätische Linie G auf einer Fläche F ist auch geodätische Linie auf jener Developpabeln, welche F längs G umschrieben ist.*

Zur Erläuterung diene das folgende einfache Beispiel. Auf einer Kugel ist jeder größte Kreis eine geodätische Linie; denn die (Haupt-)Normalen eines solchen sind zugleich Normalen der Kugel. Die der Kugel längs eines solchen Kreises umschriebene Developpable ist der die Kugel in diesem Kreise berührende Zylinder; und auch für diesen Zylinder ist der Kreis geodätische Linie, weil seine Normalen zugleich Normalen des Zylinders sind.

222. Kürzeste Linien. *Die kürzeste Verbindungslinie zweier Punkte auf einer krummen Fläche ist eine geodätische Linie dieser Fläche.*

Um dies zu erweisen*), nehmen wir an, zwei Punkte A, B auf der Fläche seien durch eine in der Fläche verlaufende Linie verbunden, welche unter allen genügend benachbarten die kürzeste ist. M sei ein Punkt dieser Linie, MT die zugehörige Tangente; durch diese legen wir einen beliebigen Schnitt; sein Neigungswinkel gegen die Normale der Fläche in M sei θ . Auf dem Schnitte mögen nun zu beiden Seiten von M und sehr nahe daran zwei Punkte, M', M'' , angenommen werden derart, daß die Sehnen MM' und MM'' gleiche Länge c haben; dann können auch die Bögen MM', MM'' als gleich und als einem Kreise angehörend betrachtet werden, der den Krümmungshalbmesser ρ des betreffenden Schnittes in M zum Radius hat; bezeichnet schließlich τ den Zentriwinkel,

*) Ein zweiter Beweis dieses Satzes wird in der Variationsrechnung gegeben werden.

welcher in diesem Kreise der Sehne c zugehört, so hat man einerseits

$$\text{arc } M'MM'' = 2\rho\tau$$

und andererseits

$$c = 2\rho \sin \frac{\tau}{2}.$$

Aus der zweiten Gleichung ergibt sich

$$\tau = 2 \arcsin \frac{c}{2\rho}$$

und durch Entwicklung (99, 2) bis zu dem Gliede dritter Ordnung in c :

$$\tau = 2 \left(\frac{c}{2\rho} + \frac{c^3}{48\rho^3} \right).$$

Hiermit ist dann

$$\text{arc } M'MM'' = 2c + \frac{c^3}{12\rho^2};$$

bezeichnet aber R den Krümmungshalbmesser des die Tangente MT berührenden Normalschnittes, so ist dem Satze von Meusnier zufolge (208)

$$\rho = R \cos \theta;$$

daher hat man schließlich

$$\text{arc } M'MM'' = 2c + \frac{c^3}{12R^2 \cos^2 \theta}.$$

Der Bogen $M'MM''$ wird am kleinsten, wenn $\theta = 0$ ist, wenn er also dem durch die Tangente MT gelegten Normalschnitte angehört. Dies bleibt fortbestehen, wie klein auch die Sehne c , wie nahe auch die Punkte M' , M'' an M liegen; da nun die auf der Fläche verzeichnete Linie als die kürzeste vorausgesetzt worden ist, so folgt daraus, daß die Grenzlage der Ebene, welche durch M und zwei benachbarte Punkte dieser Linie gelegt wird, die durch die Tangente in M gehende Normalebene ist. Diese Grenzlage ist aber die Oskulationsebene der Kurve in M ; mithin geht bei der kürzesten Linie die Oskulationsebene in jedem Punkte durch die Normale der Fläche, und damit ist sie als eine geodätische Linie erwiesen.

Daraus können mehrere wichtige Folgerungen gezogen werden.

Enthält eine Fläche gerade Linien, so gehören sie zu den geodätischen Linien der Fläche, weil sie kürzeste Linien zwischen je zweien ihrer Punkte sind. Bei einer Regelfläche gehören also die geradlinigen Erzeugenden zu den geodätischen Linien.

Jede geodätische Linie einer abwickelbaren Fläche erscheint in der Abwicklung als gerade Linie.

In 221 ist die Tatsache festgestellt worden, daß einer Raumkurve auf ihrer *rektifizierenden* Developpabeln, d. i. auf jener Fläche, welche die Ebenen durch Tangente und Binormale einhüllt, die Rolle einer geodätischen Linie zukommt; daher erscheint die Raumkurve in der Abwicklung dieser Developpabeln als Gerade, und hierin liegt der Grund für die Namen „rektifizierende Ebene“ und „rektifizierende Developpable“.

Die Umkehrung des an der Spitze dieses Artikels stehenden Satzes ist aber nicht immer zutreffend; eine geodätische Linie zwischen zwei Punkten A, B braucht nicht auch die kürzeste Linie zwischen diesen Punkten zu sein. Einfache Beispiele hierfür bieten die Kugel und der Zylinder. Die beiden Bögen, in welche der durch A, B gelegte Hauptkreis der Kugel zerfällt, sind geodätische Verbindungen der beiden Punkte; aber nur einer von ihnen ist auch die kürzeste Linie (sofern A, B nicht diametral gegenüberliegen). Jede Schraubenlinie, die man durch zwei Punkte A, B eines Zylinders führt, ist eine geodätische Verbindung; aber unter den unendlich vielen links und rechts gewundenen Schraubenlinien ist nur eine die kürzeste Linie zwischen A und B , diejenige nämlich, welche von A bis B nicht mehr als einen halben Gang zurücklegt.

Der Name der geodätischen Linie stammt daher, daß eine Linie, die auf der mathematischen Erdoberfläche (dem abgeplatteten Rotationsellipsoid) nach dem üblichen Verfahren in relativ kurzen Absätzen abgesteckt würde, die Eigenschaften aufwiese, welche das Wesen einer geodätischen Linie in mathematischem Sinne ausmachen. Die geodätischen, d. i. von geodätischen Linien begrenzten Dreiecke auf dem Erdellipsoid entsprechen den sphärischen Dreiecken auf der Kugel und den geradlinigen in der Ebene.

223. Geodätische Linien auf Rotationsflächen. Die Gleichung einer Rotationsfläche, deren Achse die z -Achse ist, kann in der Form (187, 4)

$$z = f(u), \text{ wenn } u = \sqrt{x^2 + y^2},$$

geschrieben werden. Aus ihr ergibt sich:

$$p = f'(u) \frac{x}{u}, \quad q = f'(u) \frac{y}{u},$$

$$X = \frac{xf'(u)}{u\sqrt{1+f'(u)^2}}, \quad Y = \frac{yf'(u)}{u\sqrt{1+f'(u)^2}}, \quad Z = -\frac{1}{\sqrt{1+f'(u)^2}}$$

und in Ausführung der Gleichungen (14):

$$\frac{x f'(u)}{\frac{d^2 x}{ds^2}} = \frac{y f'(u)}{\frac{d^2 y}{ds^2}} = \frac{-u}{\frac{d^2 z}{ds^2}}.$$

Hieraus folgt die von f , also von der speziellen Form der Fläche unabhängige Gleichung:

$$x \frac{d^2 y}{ds^2} - y \frac{d^2 x}{ds^2} = 0,$$

die in der Form

$$\frac{d}{ds} \left(x \frac{dy}{ds} - y \frac{dx}{ds} \right) = 0$$

geschrieben die Beziehung

$$x \frac{dy}{ds} - y \frac{dx}{ds} = \text{konst.}$$

zur Folge hat. Führt man in dieser Relation, die sich auf die xy -Projektion bezieht, Polarkoordinaten ein und bezeichnet die Konstante mit r_0 , so kommt die Gleichung

$$r \frac{rd\varphi}{ds} = r_0$$

zustande. Darin bedeutet r den Radius des Parallelkreises, auf welchem der betrachtete Punkt liegt, $r d\varphi$ das Bogenelement des Parallelkreises und ds das Bogendifferential der geodätischen Linie an der betreffenden Stelle, der Quotient also den Kosinus des Winkels, den diese Linie mit dem Parallelkreise oder den Sinus jenes Winkels α , den sie mit dem Meridian einschließt. Hiernach ist

$$(15) \quad r \sin \alpha = r_0$$

d. h. *das Produkt aus dem Radius des Parallelkreises mit dem Sinus des Neigungswinkels der geodätischen Linie gegen den Meridian ist in deren ganzem Verlaufe konstant.*

Dieser Satz ist geeignet, über den Verlauf einer geodätischen Linie auf einer Rotationsfläche Aufschluß zu geben.

Da für $\alpha < \frac{\pi}{2}$ notwendig $r > r_0$, so verlaufen die zu r_0 gehörigen geodätischen Linien nur in derjenigen Region der Rotationsfläche, in welcher die Parallelkreisradien nicht unter r_0 liegen.

224. Loxodromen. Mit diesem Namen belegt man Kurven auf Rotationsflächen, welche die Meridiane unter einem konstanten Winkel schneiden. Zu den Loxodromen gehören also auch die Parallelkreise, mit dem Schnittwinkel $\frac{\pi}{2}$, und die Meridiane, mit dem Schnittwinkel 0. Als neue Kurven treten die Loxodromen mit einem von diesen Grenzen verschiedenen Schnittwinkel ω auf.

Legt man in einem Punkte der Loxodrome an die Fläche die Tangentialebene, so enthält diese die Tangente an den Parallelkreis, die Tangente an die Loxodrome und die Tangente an den Meridian; die beiden letzten bestimmen zugleich den Winkel, unter welchem die Loxodrome die Meridianebene schneidet, seine Größe ist eben ω . Die Loxodrome schneidet somit auch die Meridianebenen unter einem konstanten Winkel. Man kann diese Eigenschaft zum Ausgangspunkt einer Definition machen, die unabhängig ist von dem Begriff der Rotationsfläche und die Loxodromen als selbständige Kurven hinstellt von solcher Art, daß sie die Ebenen eines Ebenenbüschels unter konstantem Winkel schneiden.*) Diese Definition ist derjenigen der logarithmischen Spiralen in der Ebene an die Seite zu stellen, welche diese als diejenigen Kurven erklärt, die die Strahlen eines Büschels unter konstantem Winkel schneiden (136, 3)).

Eine Klasse von Loxodromen ist bereits aus dem früheren bekannt; es sind diejenigen, die aus einem Büschel paralleler Ebenen hervorgehen, nämlich die zylindrischen Schraubenlinien (185, 2)).

*) Diese Bemerkung hat zuerst G. Scheffers gemacht. Vgl. Enzykl. d. mathem. Wissensch., III 8, p. 247—248.

In Fig. 125 sei L eine Loxodrome auf der zugrunde gelegten Rotationsfläche, MM' ein Element derselben, eingeschlossen zwischen den Meridianen PM und PM' , deren Ebenen mit der zx -Ebene die Winkel λ und $\lambda + d\lambda$ bilden mögen. Die rechtwinkligen Koordinaten x, y, z eines Punktes M von L drücken sich durch seinen Abstand $CM = r$ von der Rotationsachse und dem eben eingeführten Winkel λ wie folgt aus:

$$(16) \quad \begin{aligned} x &= r \cos \lambda, \\ y &= r \sin \lambda, \\ z &= f(r); \end{aligned}$$

die Funktion f ist durch die Gestalt der Rotationsfläche bedingt. Legt man durch M den Parallelkreis, so besteht zwischen seinem Element MM'' und dem der Loxo-

drome die Beziehung $\frac{MM''}{MM'} = \sin \omega$, die sich, wenn man MM'' durch $r d\lambda$ und MM' durch das aus (16) abgeleitete Bogen-

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\lambda^2 + f'(r)^2 dr^2}$$

ersetzt, in der Gestalt

$$r^2 d\lambda^2 = \sin^2 \omega (dr^2 + r^2 d\lambda^2 + f'(r)^2 dr^2)$$

schreiben läßt, woraus


$$(17) \quad d\lambda = \operatorname{tg} \omega \sqrt{1 + f'(r)^2} \frac{dr}{r}.$$

Durch diese Differentialgleichung ist für jede einzelne Rotationsfläche eine Beziehung zwischen r und λ bestimmt, mit deren Hilfe die Gleichungen (16) auf bloß einen Parameter zurückgeführt werden können.

Den Ausgangspunkt der Untersuchung haben die Loxodromen auf der Kugel wegen ihrer Bedeutung für die Seeschifffahrt als Linien konstanten Kurses gebildet. Wählt man den Radius der Kugel als Längeneinheit und die Breite φ von M als zweiten Parameter, so treten an die Stelle von (16) die Gleichungen

$$(16^*) \quad x = \cos \varphi \cos \lambda, \quad y = \cos \varphi \sin \lambda, \quad z = \sin \varphi$$

Fig. 125.



und nach gleichem Rechnungsgange ergibt sich statt (17)

$$(17^*) \quad d\lambda = \operatorname{tg} \omega \frac{d\varphi}{\cos \varphi}.$$

Formt man den Bruch $\frac{d\varphi}{\cos \varphi}$ um in $-\frac{d\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)} = -\frac{d \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)}$, wonach unmittelbar zu erkennen ist, daß er das negative Differential von $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)$ ist, so schließt man aus (17*) auf

$$(18) \quad \lambda - \lambda_0 = \operatorname{tg} \omega \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right),$$

wenn λ_0 sich auf jenen Punkt der Loxodrome bezieht, dem die Breite $\varphi = 0$ zukommt (Äquatorpunkt).

Die beste Vorstellung von dem Verlauf einer sphärischen Loxodrome gibt deren Projektion aus dem Pol (Nordpol) P auf die Äquatorebene (xy -Ebene). Bezeichnet \mathcal{M} das Bild von M , ϱ seinen Radiusvektor, so besteht die Gleichung:

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{s}{\varrho - r} = \frac{\sin \varphi}{\varrho - \cos \varphi}$$

aus der sich

$$\varrho = \frac{\cos \varphi}{1 - \sin \varphi} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right)$$

ergibt. Im Hinblick auf (18) ist hiernach

$$\lambda - \lambda_0 = \operatorname{tg} \omega \cdot l\varrho$$

oder mit der Abkürzung $e^{-\frac{\lambda_0}{\operatorname{tg} \omega}} = A:$

$$\varrho = A e^{\frac{\lambda}{\operatorname{tg} \omega}}$$

die Gleichung der Projektion der Loxodrome. Die Projektion ist also eine logarithmische Spirale (136, 3), welche die Leitstrahlen (als Projektionen der Meridiane) unter demselben Winkel schneidet wie die Loxodrome die Meridiane selbst. Der innerhalb des Äquatorkreises liegende Teil der Spirale entspricht dem auf der südlichen Halbkugel verlaufenden Teil der Loxodrome, der sich also dem Südpol asymptotisch nähert; der außerhalb des Äquatorkreises liegende Teil der Spirale

stammt von dem auf der nördlichen Halbkugel befindlichen Teil der Loxodrome, der sich dem Nordpol asymptotisch nähert.

Bildet man die Kugel derart auf die Ebene $\xi\eta$ ab, daß dem Punkte λ/φ der Punkt

$$\xi = \lambda - \lambda_0, \quad \eta = l \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)$$

entspricht, so bilden sich die Meridiane als Gerade parallel zur η -Achse, die Parallelkreise als Gerade parallel zur ξ -Achse ab, die Loxodrome hat aber in der Abbildung die Gleichung

$$(19) \quad \xi = \operatorname{tg} \omega \cdot \eta,$$

erscheint also als *gerade Linie*. Hierin liegt das Wesen der von G. Mercator ersonnenen Kartenprojektion, nach welcher er seine Seekarte von 1569 konstruierte, daß in dieser die Linien konstanten Schiffskurses als gerade Linien einzutragen sind (vgl. 34), die den wahren Kurs erkennen lassen.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.

Von **Emanuel Czuber**

erschienen ferner im gleichen Verlage:

Einführung in die höhere Mathematik

Mit 114 Fig. [X u. 382 S.] gr. 8. 1909. In Leinwand geb. \mathcal{M} 12.—

In Ausführung eines lang gehegten Planes hat der Verfasser in diesem Buche vornehmlich jene Materien zur Darstellung gebracht, die über den Rahmen des Inhaltes seiner „Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung“ hinausgehend zum Vortrag gebracht werden. Es wurde aber die Anlage und Gestaltung so gewählt, daß das Buch auch seine selbständige Stellung behaupten könne, als Einführung in das Studium der höheren Gebiete der Mathematik; darum sind auch die Elemente der Differentialrechnung aufgenommen worden, um ihre organische Verbindung mit den anderen behandelten Gebieten herstellen zu können.

Das Buch umfaßt eine recht eingehende Entwicklung des Zahlbegriffs, die Darstellung von Zahlen durch unendliche arithmetische Prozesse, eine Einführung in die Funktionentheorie, im Anschlusse daran die Elemente der Differentialrechnung nebst den ersten Anwendungen der Differentialquotienten, weiter die Determinantentheorie, die zur Geltung kommt bei der sich anschließenden Gleichungslehre, endlich die analytische Geometrie der Ebene und des Raumes in jenem Ausmaße und solcher Form, wie es namentlich als Vorbereitung für das Studium der Mechanik erforderlich erscheint. Im übrigen ist der Verfasser denselben Grundsätzen gefolgt, die ihn bei der Abfassung der „Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung“ geleitet haben.

Wahrscheinlichkeitsrechnung

und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Lebensversicherung

2. sorgfältig durchgesehene und erweiterte Auflage. In 2 Bänden.

I. Band: **Wahrscheinlichkeitstheorie, Fehlerausgleichung, Kollektivmaßlehre.**
Mit 18 Figuren. [X u. 410 S.] gr. 8. 1908. In Leinwand geb.
 \mathcal{M} 12.—

II. Band: **Mathematische Statistik. Mathematische Grundlagen der Lebensversicherung.** Mit 34 Figuren. [X u. 470 S.] gr. 8. 1910. In Leinwand geb. \mathcal{M} 14.—

Bei der Bearbeitung dieser Neuauflage sind mancherlei förderlich erscheinende Neuerungen im einzelnen getroffen worden, so die Darstellung der Wahrscheinlichkeitsätze in Form von Funktionalgleichungen, die Heranziehung des Begriffs der relativen Wahrscheinlichkeit, der Mengenlehre. Des weiteren war der Verfasser darauf bedacht, die Grundlagen, welche die philosophische Seite des Gegenstandes betreffen, tiefer zu fassen. Ein Kapitel über die Kollektivmaßlehre, die, von G. Th. Fechner begründet, durch die neueren Arbeiten von G. F. Lipps und H. Bruns wesentlich gefördert wurde, durfte nicht mehr fehlen; die theoretischen Grundlagen dieses jüngsten Zweiges wurden so knapp als möglich dargestellt, hingegen auf die praktische Anwendung durch Vorführung mehrerer, darunter auch größerer Beispiele vorzubereiten gesucht.

Der zweite Band umfaßt die im Titel genannten Kapitel in einer, wie schon der Umfang zeigt, ziemlich eingreifenden Neubearbeitung. In der mathematischen Statistik wurde auf die Darlegung der leitenden Gedanken bei der Bildung und Beurteilung statistischer Maßzahlen größerer Nachdruck gelegt; die neueren, von englischen Statistikern ausgebildeten Methoden zur analytischen Darstellung statistischer Reihen sind einbezogen worden. Eine erhebliche Erweiterung erfuhr die Behandlung der Sterblichkeitsmessung unter Heranziehung der neueren großen Arbeiten auf diesem Gebiete. Ebenso sind die Tafelausgleichung und die Invalidität ausführlicher behandelt. Noch eingreifender sind die Änderungen in dem die mathematischen Grundlagen der Lebensversicherung betreffenden Teile. Den allgemeinen Erwägungen über die Voraussetzungen bei der Durchführung versicherungstechnischer Probleme ist ein breiter Raum gewidmet. Des weiteren sei insbesondere hingewiesen auf die Entwicklung der Versicherungswerte, die von Invalidität abhängen; auf die Einbeziehung der Durchschnittsprämien der Sozialversicherung; auf die Erörterung der umstrittenen Frage der Bemessung des Deckungskapitals; auf die Ausführungen betreffend das Risikoproblem. Selbstverständlich haben auch zweifach abgestufte Sterbetafeln Berücksichtigung gefunden.

Emanuel Czuber

Geometrische Wahrscheinlichkeiten und Mittelwerte

Mit 115 Figuren. [VII u. 244 S.] gr. 8. 1884. Geh. M 6.80

Das vorliegende Buch ist der erste Versuch einer systematischen Darstellung der geometrischen Wahrscheinlichkeiten und der damit eng zusammenhängenden geometrischen Mittelwerte. Der erste Teil, „Geometrische Wahrscheinlichkeiten“, zerfällt in drei Abschnitte, welche der Reihe nach willkürlich angenommene Punkte (in Linien, in Flächen, im Raume), willkürlich gezogene Geraden (in der Ebene, im Raume) und willkürlich gelegte Ebenen zum Gegenstande haben. Im zweiten Teile, „Geometrische Mittelwerte“ bezieht, ist von einer weiteren Gliederung des Stoffes Abstand genommen worden; die Probleme sind hier nach den zu ihrer Lösung verwendeten Methoden geordnet.

Theorie der Beobachtungsfehler

Mit 7 Figuren. [XIV u. 418 S.] gr. 8. 1891. Geh. M 8.—

Eine zusammenfassende Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen der Fehlertheorie und der auf sie begründeten Ausgleichungsrechnung, wie sie dieses Buch zu geben versucht, soll einem doppelten Zwecke dienen: den Mathematiker in dieses durch Metaphysik und Analyse gleich interessante Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung einführen und demjenigen, den praktische Probleme mit der Ausgleichsrechnung, diesem unerlässlich gewordenen Bindeglied zwischen Beobachtungen einerseits und den aus ihnen gefolgerten Resultaten andererseits, zusammenführen, ein möglichst umfassendes Bild ihrer Entwicklung nach der theoretischen Seite bieten. Die technische Ausführung der Rechnungen bei Lösung spezieller Aufgaben aus verschiedenen Gebieten der Anwendung fällt hiernach nicht in den Rahmen des Buches.

Die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung

[VII u. 279 S.] gr. 8. 1899. Geh. M 8.—

Die Schrift stellt sich die Aufgabe, den Entwicklungsgang der Wahrscheinlichkeitstheorie bis zu ihrem heutigen Stande in knappen Zügen zu zeichnen und auf die Anwendungsgebiete so weit einzugehen, als es sich dabei um theoretische Fragen handelt. Der philosophischen Seite des Gegenstandes wird mehr Aufmerksamkeit zugewendet, als dies sonst in mathematischen Schriften zu geschehen pflegt. Es werden in sachlicher Gliederung der Reihe nach die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie; ihre Anwendung auf die Ergebnisse wiederholter Versuche; die Wahrscheinlichkeit der Ursachen beobachteter Ereignisse und das Schließen auf zukünftige Ereignisse; die Beurteilung vom Zufall abhängiger Vor- und Nachteile; die Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie auf Zeugenaussagen und Entscheidungen von Gerichtshöfen, auf die Resultate von Messungen, endlich auf die Statistik behandelt.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

- Ahrens, Dr. W.**, mathematische Unterhaltungen und Spiele.
2., vermehrte und verbesserte Auflage. In 2 Bänden. gr. 8. In
Leinwand geb.
I. Band: Mit 200 Figuren. [IX u. 400 S.] 1910. \mathcal{M} 7.50. II. Band. [In Vorbereitung.]
— Scherz und Ernst in der Mathematik. Geflügelte und unge-
flügelte Worte. [X u. 522 S.] gr. 8. 1904. In Leinwand geb. \mathcal{M} 8.—
- Bauer, Dr. Gustav**, weil. Professor an der Universität München, Vor-
lesungen über Algebra. Im Auftrage des Mathematischen
Vereins München herausgegeben von Dr. Karl Doehlemann, a. o.
Professor an der Universität München. Mit dem Bildnis Gustav
Bauers und 11 Figuren. 2. Auflage. [VI u. 366 S.] gr. 8. 1910.
Geh. \mathcal{M} 11.—, in Leinwand geb. \mathcal{M} 12.—
- Bolza, Dr. O.**, Professor an der Universität Chicago, Vorlesungen
über Variationsrechnung. Umgearbeitete und stark vermehrte
deutsche Ausgabe der „Lectures on the Calculus of Variations“
desselben Verfassers. Mit 117 Figuren. [IX, 705 u. 10 S. Anhang.]
gr. 8. 1909. Geh. \mathcal{M} 19.—, in Leinwand geb. \mathcal{M} 20.—
- Broggi, Dr. Hugo**, Professor an den Universitäten Buenos-Aires und
La Plata, Versicherungsmathematik. Deutsche Ausgabe. [VIII
u. 360 S.] gr. 8. 1911. Geh. \mathcal{M} 7.—, in Leinwand geb. \mathcal{M} 8.—
- Burkhardt, Dr. H.**, Professor an der Technischen Hochschule München,
Vorlesungen über die Elemente der Differential- und
Integralrechnung und ihre Anwendung zur Beschreibung
von Naturerscheinungen. Mit 38 Figuren. [XII u. 252 S.]
gr. 8. 1907. In Leinwand geb. \mathcal{M} 6.—
- Dingeldey, Geheimer Hofrat Dr. Friedrich**, Professor an der Techn. Hoch-
schule zu Darmstadt, Sammlung von Aufgaben zur Anwendung
der Differential- und Integralrechnung. In 2 Teilen. gr. 8.
In Leinwand geb.
I. Teil: Aufgaben zur Anwendung der Differentialrechnung. Mit
99 Figuren. [V u. 202 S.] 1910. \mathcal{M} 6.—
II. — [In Vorbereitung.]
- Dziobek, Dr. O.**, Professor an der Militärtechn. Akademie und Dozent
an der Techn. Hochschule zu Charlottenburg, Vorlesungen über
Differential- und Integralrechnung. Mit 150 Figuren. [X
u. 648 S.] gr. 8. 1910. In Leinwand geb. \mathcal{M} 16.—
- Grundlehren der Mathematik.** Für Studierende und Lehrer.
In 2 Teilen. Mit vielen Figuren. gr. 8. In Leinwand geb.
I. Teil: Die Grundlehren der Arithmetik und Algebra. Bearbeitet von
E. Netto und C. Färber. 2 Bände.
1. Band: Arithmetik. Bearbeitet von Dr. C. Färber, Professor an der
Luisestädtschen Oberrealschule in Berlin. Mit 9 Figuren. [XV
u. 410 S.] 1911. Geh. \mathcal{M} 9.—
2. — Algebra. Von E. Netto in Gießen. [In Vorbereitung.]
II. — Die Grundlehren der Geometrie. Bearbeitet von W. Frs. Meyer
und H. Thieme. 2 Bände.
1. Band: Die Elemente der Geometrie. Bearbeitet von Professor
Dr. H. Thieme, Direktor des Realgymnasiums zu Bromberg.
Mit 523 Figuren. [XII u. 394 S.] 1909. \mathcal{M} 9.—
2. — Von W. Frs. Meyer in Königsberg. [In Vorbereitung.]
- Kowalewski, Dr. Gerhard**, Professor an der Deutschen Technischen
Hochschule zu Prag, Grundzüge der Differential- und Integralrechnung.
Mit 31 Figuren. [VI u. 452 S.] gr. 8. 1909.
In Leinwand geb. \mathcal{M} 12.—
— die komplexen Veränderlichen und ihre Funktionen.
Fortsetzung der Grundzüge der Differential- und Integralrechnung,
zugleich eine Einführung in die Funktionentheorie. Mit 124 Figuren.
[IV u. 455 S.] gr. 8. 1911. Geh. \mathcal{M} 12.—, in Leinwand geb. \mathcal{M} 13.—

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

- Markoff, A. A.**, Professor an der Kaiserl. Universität St. Petersburg, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nach der 2. Auflage des russischen Originals übersetzt von H. Liebmann. [ca. 320 S.] gr. 8. [Erscheint im Frühjahr 1912.]
- Müller, Dr. E.**, Professor an der k. k. Technischen Hochschule zu Wien. Lehrbuch der darstellenden Geometrie für technische Hochschulen. In 2 Bänden. In Leinwand geb.
 I. Band: Mit 373 Figuren und 3 Tafeln. [XIV u. 368 S.] gr. 8. 1908. *M* 13.—
 II. — [In Vorbereitung]
- Nielsen, Dr. Niels**, ord. Professor an der Universität Kopenhagen, Elemente der Funktionentheorie. [X u. 520 S.] gr. 8. 1911. In Leinwand geb. *M* 15.—
- Pascals Repertorium der höheren Mathematik**. 2., völlig umgearbeitete Auflage der deutschen Ausgabe. Unter Mitwirkung zahlreicher Mathematiker herausgegeben von P. Epstein und H. E. Timerding. 2 Bände in 4 Teilen mit zahlreichen Figuren. gr. 8. In Leinwand geb.
 I. Band: Analysis. Unter Mitwirkung von B. Fricke, Ph. Furtwängler, A. Guldberg, H. Hahn, E. Jahnke, H. Jung, A. Loewy, E. Pascal, H. E. Timerding herausg. von P. Epstein. I. Hälfte: Algebra, Differential- und Integralrechnung. [XV u. 537 S.] 1910. *M* 10.— [Die II. Hälfte folgt im Frühjahr 1912.]
 II. — Geometrie. Unter Mitwirkung von L. Bersolari, R. Bonola, E. Ciani, M. Dehn, F. Dingeldey, F. Enriques, G. Giraud, G. Guareschi, L. Heffter, W. Jacobsthal, H. Liebmann, J. Möllerup, J. Neuberger, U. Perazzo, O. Staude, E. Steinitz, H. Wieleitner und K. Zindler herausgegeben von H. E. Timerding. I. Hälfte: Grundlagen und ebene Geometrie. Mit 54 Figuren. [XVI u. 534 S.] 1910. *M* 10.— [Die II. Hälfte folgt im Frühjahr 1912.]
- Serret-Scheffers**, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Nach Axel Harnacks Übersetzung neu bearbeitet von G. Scheffers. In 3 Bänden. gr. 8. In Leinwand geb.
 I. Band. Differentialrechnung. 4. u. 5. Auflage. Mit 70 Figuren. [XVI u. 626 S.] 1908. *M* 13.—
 II. — Integralrechnung. 4. u. 5. Auflage. Mit 108 Figuren. [XIV u. 639 S.] 1911. *M* 13.—
 III. — Differentialgleichungen und Variationsrechnung. 3. Auflage. Mit 63 Figuren. [XII u. 658 S.] 1909. *M* 13.—
- Taschenbuch für Mathematiker und Physiker**. II. Jahrgang 1911. Unter Mitwirkung von zahlreichen Fachgenossen herausgegeben von F. Auerbach und R. Rothe. Mit einem Bildnis H. Minkowskis. [IX u. 567 S.] 8. 1911. In Leinwand geb. *M* 7.—
- Voß, Dr. A.**, Professor an der Universität München, über das Wesen der Mathematik. [98 S.] 8. 1908. Steif geb. *M* 3.60.
- Wallenberg, Georg**, Dozent an der Techn. Hochschule Charlottenburg, Theorie der linearen Differentialgleichungen. Unter Mitwirkung von Professor Dr. Alf Guldberg in Kristiania. Mit 5 Figuren. [XIV u. 288 S.] gr. 8. 1911. Geh. *M* 10.—, in Leinwand geb. *M* 11.—
- Weber, Dr. H.**, und Dr. J. Wellstein, Professoren an der Universität Straßburg i. E., Enzyklopädie der Elementar-Mathematik. Ein Handbuch für Lehrer und Studierende. In 3 Bänden. gr. 8. In Leinwand geb.
 I. Band: Elementare Algebra und Analysis. Bearbeitet von H. Weber. 3. Auflage. Mit 40 Figuren. [XVIII u. 533 S.] 1910. *M* 10.—
 II. — Elemente der Geometrie. Bearbeitet von H. Weber, J. Wellstein und W. Jacobsthal. 2. Auflage. Mit 251 Figuren. [XII u. 596 S.] 1907. *M* 13.—
 III. — Angewandte Elementar-Mathematik. In 2 Teilen. 2. Auflage. I. Teil: Mathematische Physik. Mit einem Buch über Maxima und Minima von H. Weber und J. Wellstein. Bearbeitet von R. H. Weber, Professor in Rostock. Mit 254 Figuren. [XII u. 536 S.] 1910. *M* 13.—
 II. Teil: Angewandte Mathematik und Astronomie. [Erscheint Anfang 1912.]

QA303.
C95
v.1
C.2



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has also become an important employer of women, with 60% of public sector employees being women in 1995, compared with 55% in 1980.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. First, the public sector has a high proportion of female employees in a number of key areas, such as health care, education and social services. Second, the public sector has a high proportion of part-time employees, which is attractive to women who are balancing work and family commitments. Third, the public sector has a high proportion of employees who are working in the service sector, which is also attractive to women. Fourth, the public sector has a high proportion of employees who are working in the public sector, which is also attractive to women. Finally, the public sector has a high proportion of employees who are working in the public sector, which is also attractive to women.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services. The demand for public services has increased significantly in the 1990s, and this has led to a corresponding increase in the number of public sector employees. The demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the service sector. The demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the public sector. Finally, the demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services. The demand for public services has increased significantly in the 1990s, and this has led to a corresponding increase in the number of public sector employees. The demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the service sector. The demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the public sector. Finally, the demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the public sector.

The public sector has also become an important employer of women because of the increasing demand for public services. The demand for public services has increased significantly in the 1990s, and this has led to a corresponding increase in the number of public sector employees. The demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the service sector. The demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the public sector. Finally, the demand for public services has also led to a corresponding increase in the number of public sector employees who are working in the public sector.



Technische Wissenschaften nebst Mechanik und Physik

aus dem Verlage von B. G. Teubner in Leipzig.

Der vorgesetzte Stern * bedeutet die seit dem Jahre 1904 neuerschienenen bzw. unter der Presse oder in Vorbereitung befindlichen Werke. Die Seitensahlen sind die des Großen Mathematischen Katalogs von B. G. Teubner in Leipzig

I. Allgemeines — Angewandte Mechanik — Elektrotechnik.

a) Allgemeines.

	Seite
*Dyck, v., über die Errichtung eines Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in München	68
Encyklopädie d. math. Wissensch. m. Einschl. ihrer Anw. Bd. IV—VI	74
Encyclopédie des scienc. mathémat. pures et appliquées. tom. IV—VI	79
*Hagenbach, die Stellung der Physik zu den Naturwissenschaften und der Technik	120
*Hausner, Repertorium der angewandten Mathematik	132
*Hering, das 200jährige Jubiläum der Dampfmaschine 1706—1906 . .	142
Kultur, die, der Gegenwart. Teil III u. IV	195
Launhardt, am sausenenden Webstuhl der Zeit.	200
Merckel, Bilder aus der Ingenieurtechnik.	221
* — Schöpfungen der Ingenieurtechnik der Neuzeit.	221
Mitteilungen der Kgl. Sächs. Polytechnischen Schule zu Dresden .	226
*Müller, S., technische Hochschulen in Nordamerika	239
*Museum, deutsches, Führer durch Sammlungen	240
* — Bibliothek-Katalog	240
*Naturwissenschaft und Technik in Lehre und Forschung	243
*Schriften, mathematisch-physikalische, für Ingenieure und Studierende	309
*Technik und Schule, hrsg. von Girndt.	342
Teubners Handbücher für Handel und Gewerbe	343
*Tidy, das Feuerzeug.	348
*Unger, wie entsteht ein Buch?	351

b) Angewandte Mechanik.

*Alt, Grundlagen des Schiffbaues	11
*Blochmann, Neudeck u. Schulz, der moderne Schiffbau.	30
Cranz, Compendium der theoretischen äußeren Ballistik	57
— Ballistik	74
*Ebner, Leitfaden der technisch wichtigsten Kurven	69
Eddy, neue Konstruktionen aus der graphischen Statik.	69
*Encyklopädie der mathem. Wissenschaften IV. Bd., in 4 Teilbänden	73
*Felgenträger, Theorie, Konstruktion u. Gebrauch d. feineren Hebelwage	85
Finsterwalder, Aerodynamik	74
Fischer, O., theoret. Grundlagen f. eine Mechanik der lebenden Körper	91
— physiologische Mechanik	74
Föppl, das Fachwerk im Raume	93
* — Vorlesungen über technische Mechanik. In 6 Bänden	93
*Forchheimer, Hydraulik	74
— Hydraulik	94
Freytag, statische Bestimmung elastischer Balkenträger	98
Furtwängler, die Mechanik der einfachsten physikalischen Apparate	
und Versuchsanordnungen	102
— d. Mechanik d. einfach. physik. Apparate u. Versuchsanordnungen	74
Groß, die Berechnung der Schußtafeln	114
*Gräßler, Theorie der hydraulischen Motoren und Pumpen	74
* — Lehrbuch der hydraulischen Motoren	115
*Grüneisen, Schwingungsprobleme	116

	Seite
*Hahn, H., hydraulique, 2 ^e partie: moteurs et pompes	79
*Hamel, elementare Mechanik	121
Heun, die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik . . .	146
— dynamische Probleme der Maschinentechnik	74
*— u. v. Mises, die kinetischen Probleme der mod. Maschinenlehre	147
Holzmüller, die Ingenieurmathematik in elementarer Behandlung .	156
Ihering, v., Wasserkraftmaschinen	168
Jellett, die Theorie der Reibung, deutsch bearb. von Lüroth u. Schepp	166
*Krilloff u. C. H. Müller, Theorie des Schiffes	74
Lorenz, Dynamik der Kurbelgetriebe mit besonderer Berücksichtigung	209
der Schiffsmaschinen	80
*Marchis, aérodynamique	226
*Mises, v., technische Hydromechanik	147
— siehe auch: Heun u. v. Mises	257
Ostenfeld, technische Statik, deutsch von Skonge	263
Perry, höhere Analysis für Ingenieure, deutsch von Fricke und Süchting	263
*— angewandte Mechanik, deutsch von Schick	74
*Prandtl, Elastizität u. Festigkeit mit bes. Berücks. d. Maschinenbaus	271
— Vorlesungen über Hydrodynamik und Gasdynamik	74
*Reißner, Theorie der Baukonstruktionen	271
*Poeschel, die Luftschiffahrt	319
Schwend, Berechnung und Konstruktion von Hängebrücken	303
*Schlink, Statik der Raumbauwerke	334
*Stephan, die technische Mechanik	80
*Vallier, balistique extérieure	356
Vater, Hebezeuge	74
Walker, Spiel und Sport	374
Weyrauch, Theorie und Berechnung der Träger	374
— Festigkeitseigenschaften von Eisen- und Stahlkonstruktionen .	375
— Theorie elastischer Körper	375
— Aufgaben dazu	375
— Theorie der statisch bestimmten Träger	375
— Aufgaben dazu	375

c) Elektrotechnik.

*Abraham, Theorie der Elektrizität	9
Blochmann, die drahtlose Telegraphie in ihrer Verwendung für	30
nautische Zwecke	30
*— Grundlage der Elektrotechnik	41
*Brick, die Entwicklung der Telegraphen- und Fernsprechtechnik . .	42
*Brion, elektrotechnisches Praktikum	45
*Bruns, J., die Telegraphie in ihrer Entwicklung und Bedeutung . .	45
Brüsch, Leitfaden der Elektrizität im Bergbau	45
— Grundriß der Elektrotechnik für technische Lehranstalten . . .	46
*— die Beleuchtungsarten der Gegenwart	86
Ferraris, wissenschaftl. Grundlagen der Elektrotechnik, dtsh. v. Finzi	92
*Flemming, elektrische Wellen-Telegraphie, deutsch von Aschkinaß .	165
*Janet, Vorlesungen über allgemeine Elektrotechnik, dtsh. v. Süchting	257
*Orlich, die Grundlagen der Wechselstromtechnik	283
*Rinkel, R., Einführung in die Elektrotechnik	287
*Rüdenberg, elektromagnetische Schwingungen	294
*Schäfer, Maxwellsche Theorie	299
Schenk, J., Festigkeitsberechnung größerer Drehstrommaschinen . .	319
*Schwaiger, das Regulierungsproblem in der Elektrotechnik . . .	348
*Thurn, die Funkentelegraphie	364
*Wagner, K. W., elektromagn. Ausgleichsvorg. in Freileitgn. u. Kabeln	367
Weber, H., der Rotationsinduktor	367

II. Bau- und Maschinentechnik.

a) Bautechnik.

	Seite
*Biedermann, die technische Entwicklung der Eisenbahnen	28
Dambrowski, v., Theorie der Inhaltsberechnung bei Erdbauten	60
Kröhnke, Handbuch zum Abstecken von Kurven	191
*Haberstroh, Weidlich usw., Anlage von Fabriken	120
*Hahn, die Eisenbahnen, ihre Entstehung und Verbreitung	120
*Haimovici, Tabellen usw. zur Dimensionierung von Eisenbeton- Plattendecken usw.	121
*Jeep, Verwendung des Eisens beim Hochbau	166
*Liebmann, A., Die Klein- und Straßenbahnen	204
Matthaei, deutsche Baukunst im Mittelalter	217
*Ostendorf, Geschichte des Dachwerkes	257
*Reißner, Theorie der Baukonstruktionen	74
*Schmid, H., die natürlichen Bau- und Dekorationsgesteine	305

b) Maschinentechnik.

*Blau, das Automobil	30
Czap u. Mayer, siehe: Mayer u. Czap	219
Hartig, Versuche über den Arbeitsverbrauch der Werkzeugmaschinen	129
*Hering, das 200jährige Jubiläum der Dampfmaschine	142
Kohl, Elemente der Maschinen	180
Heun, die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik	146
* — dynamische Probleme der Maschinentechnik	74
* — u. E. v. Mises, die kinetischen Probleme d. mod. Maschinenlehre	147
Hartig, die Dampfkessel-Explosionen	130
— Versuche über den Kraftbedarf der Spinnereimaschinen usw.	129
— Versuche über den Arbeitsverbrauch der Werkzeugmaschinen	129
Kohl, Elemente von Maschinen	180
Kübler, die Berechnung der Kessel- und Gefäßwandungen	194
*Mayer u. Czap, d. prakt. Wartung d. Dampfkessel u. Dampfmaschinen	219
Musil, Bau der Dampfturbinen	241
— Grundlagen der Theorie und des Baues der Wärmekraftmaschinen	241
*Perry, die Dampfmaschinen, einschl. der Dampfturbine	263
*Prandtl, Elastizität und Festigkeit mit besonderer Berücksichtigung des Maschinenbaus	74
*Schreiber, die Kraftmaschinen	309
— die Theorie der Mehrstoffdampfmaschinen	309
Schroeter u. Prandtl, technische Wärmetheorie	76
Schulze-Pillot, Maschinenelemente	316
*Vater, Einführ. in d. Theorie u. d. Bau d. neueren Wärmekraftmaschinen	356
* — Dampf und Dampfmaschine	356
* — neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Wärmekraftmaschinen	356

III. Technologie — Handel und Gewerbe.

a) Mechanische Technologie.

*Kinzer, Technologie der Handweberei	172
Schmidt, C. H., Lehrbuch der Spinnereimechanik	305
Stamm, Studien über den Selfaktor	330

b) Chemische Technologie.

*Heusler, chemische Technologie	147
*Müller, A., Bilder aus der chemischen Technik	238
Müller, G., chemische Industrie	231

	Seite
*Partheil, Einleitung in die Chemie	259
*Sachße, R., Einführung in die chemische Technik	289
Wedding, das Eisenhüttenwesen	369

c) Handel und Gewerbe.

*Claaßen, Bartz und Pilet, die Zuckerindustrie	53
*Eckert, Einführung in die Volkswirtschaft	69
*Haberstroh, Weidlich usw., Anlage von Fabriken	120
*Heller, Organisation und Technik des internationalen Getreidehandels	137
*Manes, A., Versicherungswesen	214
*Paasche, die Zuckerproduktion der Welt	258
*Schuhmacher, Johs., Geld-, Bank- und Börsenwesen	316
*Simmersbach, die Eisenindustrie	324
*Stier-Somlo, Staats und Verwaltungs-Recht	335
*Thieß, deutsche Schifffahrt und Schifffahrtspolitik der Gegenwart	346
*Tolksdorf, der gewerbliche Rechtsschutz in Deutschland	349
*Überschaer, Zollwesen	351
*Weltwirtschaft, die, hrsg. von E. v. Halle	372
*Wiedenfeld, Verkehrswesen	376
*Wirringhaus, Einführung in die wirtschaftliche Statistik	379
*Wygodzinski, Genossenschaftswesen	385
*Zimmermann, Johanning usw., Betrieb von Fabriken	391
*Zwiedineck-Südenhorst, Sozialpolitik	392

IV. Zum Unterricht in den technischen Wissenschaften.

*Benzel, Grundbau	23
Brüsch, Grundriß der Elektrotechnik für technische Lehranstalten	45
Föppl, Leitfaden und Aufgabensammlung für den Unterricht in der angewandten Mechanik	93
*Fresow, der Wasserbau	98
*Friedrichs, das Feldmessen des Tiefbautechnikers	99
*Gebhardt, Umbauten und Wiederherstellungsarbeiten	105
— die Bauführung	105
*Girndt, Raumlehre für Baugewerkschulen und verwandte gewerbliche Lehranstalten	108
— Leitfaden der bautechnischen Chemie	109
*Gürschner u. Benzel, städtischer Tiefbau	118
*Hempel, Schattenkonstruktionen	139
*Himmel, bautechnische Physik	149
*Jessen u. Girndt, Leitfaden der Baustofflehre	166
*Kinzer, Technologie der Handweberei	172
*Knauer, Erd- und Straßenbau	179
Kohl, Elemente von Maschinen	180
*Mayer, J. W., Lehrbuch der Motorenkunde	219
*Mensing, Rechenbuch für Baugewerkschulen und verwandte gewerbliche Lehranstalten	221
— Antwortenheft dazu	221
*Pfeiffer, physikalisches Praktikum für Anfänger	265
*Preuß, Konstruktion und Ausführung der Eisenbetonbauten	271
*Sachße, Einführung in die chemische Technik	289
*Schau, Brückenbau. I. u. II. Teil	295
— Eisenbahnbau. I. u. II. Teil	295
*Schubert, A., Leitfaden der landwirtschaftlichen Baukunde	312

	Seite
*Selle u. Hederich, Berechnung der Bauverbände	321
*Stephan, die technische Mechanik	334
*Volquards, Feldmessen und Nivellieren	362
*Weiske, die Berechnung von Eisenbetonbauten	371

Anhang: Mechanik und Physik.

a) Mechanik.

1. Prinzipien.

*Cosserrat, E. et F., principes de la mécanique rationnelle	79
*Ehrenfest, P. u. T., Mechanik der aus sehr zahlr. disk. Teilen bestehenden Systeme (das Eingreifen der Wahrscheinlichkeitsrechnung Klein, H., Prinzipien der Mechanik historisch und kritisch dargestellt Koenigsberger, L., Helmholtzs Untersuchungen über die Grundlagen der Mathematik und Mechanik	74 178 184
— die Prinzipien der Mechanik	184
Lindt, das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten	206
Neumann, C., Prinzipien der Galilei-Newtonschen Theorie	247
*Poincaré, notes sur les principes de la mécanique	79
Streintz, die physikalischen Grundlagen der Mechanik	337
Volkman, Einführung in das Studium der theoretischen Physik, insbesondere in das der analytischen Mechanik	361
Voß, die Prinzipien der rationalen Mechanik	74
* — Prinzipien der rationalen Mechanik	368

2. Geometrische Grundlagen, Massengeometrie und Kinematik.

*Carvallo, géométrie des masses	79
Delaunay, die Tschebyschefschen Arbeiten in der Theorie der Gelenkmechanismen	366
Dingeldey, Erzeugung von Kurven 4. O. durch Bewegungemechanismen Holzmüller, d. Ingenieur-Mathematik in elementarer Behandlung I.	62 156
*Jung, G., Geometrie der Massen	168
— die Geometrie der Massen	74
*Koenigs, cinématique	79
*Lévy, L., géométrie des vecteurs	79
Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte. I. Band	298
Schlömilch, über die Bestimmung d. Massen u. d. Trägheitsmomente Schoenflies, Geometrie der Bewegung	304 307
— u. Grubler, Kinematik	74
Somoff, theoretische Mechanik, deutsch von Ziwet. I. Band	327
Study, Geometrie der Dynamen	338
*Timerding, Theorie der Streckensysteme und Schrauben	348
— geometrische Grundlegung der Mechanik eines starren Körpers	74

3. Graphische Statik.

Eddy, neue Konstruktionen aus der graphischen Statik	69
Föppl, das Fachwerk im Raum	93
— Vorlesungen über technische Mechanik. II. Band	97
*Henneberg, Lehrbuch der graphischen Statik	139
— graphische Statik	74
Hollender, neue graph. Methode der Zusammensetzung von Kräften Holzmüller, die Ingenieur-Mathematik in elementarer Behandlung	154 156

	Seite
*Lévy, M., et L. Lévy, statique graphique	79
Ostendorf, technische Statik	257
*Schlink, Statik der Raumbachwerke	303
*Weber, H., u. Wellstein, Encyklop. d. Elementar-Mathematik. Bd. III	367
Weyrauch, über die graphische Statik	375

4. Umfassende Darstellungen der Mechanik, sowie insbesondere Mechanik des starren Körpers.

(Vgl. auch I b: Angewandte Mechanik.)

*Appell, dynamique élémentaire	79
Duhamel, Lehrbuch der analytischen Mechanik	67
Fischer, O., über die Bewegungsgleichungen räumlicher Gelenksysteme	91
*Encyklopädie d. mathematischen Wissenschaften. IV. Bd. 1. u. 2. Teilbd.	74
*Föppl, Vorlesungen über technische Mechanik. Bd. I—VI	93
Fuhrmann, A., Aufgaben aus der analytischen Mechanik	101
Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke, hrsg. von Engel. II, 2	112
Hamel, die Lagrange-Eulerschen Gleichungen der Mechanik	121
*— elementare Mechanik	121
Heun, die kinetischen Probleme der wissenschaftlichen Technik	146
*— dynamische Probleme der Maschinentechnik	78
*— u. v. Mises, die kinet. Probleme der modernen Maschinenlehre	147
Jellet, die Theorie der Reibung, deutsch bearb. von Lüroth und Schepp	166
*Kelvin, Vorlesungen über Molekulardynamik und die Wellentheorie des Lichtes	172
Kirchhoff, Vorlesungen über mathematische Physik. I. Mechanik	176
Klein, F., u. Sommerfeld, über die Theorie des Kreisels	209
Lorenz, Dynamik des Kurbelgetriebes	216
*Marcolongo, rationelle Mechanik, deutsch von Roehm	242
Narr, Einleitung in die theoretische Mechanik	253
Neumann, F., Vorlesungen über mathematische Physik. II. Einleitung in die theoretische Physik, hrsg. von Pape	263
Perry, Drehkeisel, deutsch von Walzel	276
Rausenberger, Lehrbuch der analytischen Mechanik	286
Routh, Dynamik der Systeme starrer Körper, deutsch von Schepp	296
Scheffler, imaginäre Arbeit	298
Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte	327
Somoff, theoretische Mechanik, deutsch von Ziwet	328
*Stäckel, Lehrbuch der allgemeinen Dynamik	74
*— die elementare Dynamik der Punktsysteme und starren Körper	74
*— analytische Mechanik: Entwicklung allgem. Methoden. — Spezial- diskussion dynam. Probl. — Rotation starrer Körper u. Verwandtes	334
*Stephan, die technische Mechanik	365
Waltenhofen, Grundriß der allgemeinen mechanischen Physik	396
Webster, the Dynamics of Particles, of Rigid, Elastic and Fluid Bodies	396

5. Elastizität und Hydrodynamik.

(Vgl. auch I b: Angewandte Mechanik.)

*Appell, principes physiques de l'hydrodynamique	80
*— développements théoriques concernant l'hydrodynamique	22
Beer, Einleitg. in die mathem. Theorie der Elastizität und Kapillarität	42
*Brill, v., Vorlesungen z. Einführ. i. d. Mechanik raumerfüllender Massen	47
Burkhardt, Entwicklungen nach oszillierenden Funktionen	53
Clebsch, Theorie der Elastizität fester Körper	74
Encyklopädie der mathem. Wissenschaften. IV. Bd. 3. u. 4. Teilbd.	74
Finsterwalder, Aërodynamik	74

	Seite
*Föppl, Festigkeitslehre — Vorlesungen über techn. Mechanik. Bd. III	93
* — die wichtigst. Lehren d. höh. Elastizitätstheorie — Vorlesgn. Bd. V	98
Freitag, statische Bestimmung elastischer Balkenträger	98
*Hadamard, mouvement dans un milieu homogène	80
Kühler, Beitrag zur Knick-Elastizität und -Festigkeit	194
— die Theorie der Knick-Elastizität und -Festigkeit	194
*Lamb, Lehrbuch der Hydrodynamik, deutsch von Friedel	197
* — Schwingungen elastischer Körper	74
Lorentz, H. A., Abhandlungen über theoretische Physik. Band I.	208
*Love, Lehrbuch der Elastizität, deutsch von Tümpke	211
* — physikalische Grundlegung der Hydrodynamik	74
* — theoretische Ausführungen zur Hydrodynamik	74
*Marchis, aérodynamique	80
*Mises, v., technische Hydromechanik	226
*Müller, C. H., u. Timpe, die Grundgleichungen der mathematischen Elastizitätslehre	74
Neumann, C., hydrodynamische Untersuchungen	248
— Beiträge zu einzelnen Teilen der mathematischen Physik	248
Neumann, F., Theorie der Elastizität, hrgb. von O. E. Meyer	253
*Prandtl, Vorlesungen über Hydrodynamik und Gasdynamik	271
* — Elastizität und Festigkeit	74
Saalschütz, der belastete Stab	288
Seebeck, über die Querschwingungen elastischer Stäbe	321
*Tedone, Integrationstheorie der mathematischen Elastizitätstheorie	74
* — u. Timpe, Statik elastischer Körper	74
Weyrauch, Theorie elastischer Körper	375
— Aufgaben dazu	375
*Zemplén, unsteady Bewegungen in Flüssigkeiten	74

b) Physik.

1. Allgemeine Darstellungen.

*Auerbach, Physik in graphischen Darstellungen	14
*Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften. Band V	75
Graßmann, physikalische Werke, hrgb. von Engel u. a.	112
Hagenbach, siehe: Wüllner u. Hagenbach	383
Holzmüller, die Ingenieurmathematik in elementarer Behandlung II.	156
Kirchhoff, Vorlesungen über mathematische Physik. I. Mechanik	172
— — II. Optik, hrgb. von Hensel	173
— — III. Elektrizität und Magnetismus, hrgb. von Planck	173
— — IV. Theorie der Wärme, hrgb. von Planck	173
*Kohlrausch, Fr., Lehrbuch der praktischen Physik	181
* — kleiner Leitfadens der praktischen Physik	181
*Lorentz, H. A., Abhandlungen über theoretische Physik	208
*Münch, Physikalisches aus dem Alltagsleben	240
Neumann, F., Vorlesungen über mathematische Physik. I. Magnetismus	251
— — II. Einleitung in die theoretische Physik, hrgb. von Pape	252
— — III. Elektrische Ströme, hrgb. von Von der Mühl	252
— — IV. Theoretische Optik, hrgb. von Dorn	252
— — V. Elastizität, hrgb. von O. E. Meyer	253
— — VI. Potential und Kugelfunktionen, hrgb. von C. Neumann	253
— — VII. Kapillarität, hrgb. von A. Wangerin	254
* — — VIII. Wärme, hrgb. von J. Pernet	254
Pfeiffer, physikalisches Praktikum für Anfänger	265
Plücker, physikalische Abhandlungen, hrgb. von Pockels	268
*Repertorium der Physik, siehe: Weber, R. H. u. Gans	368

	Seite
*Taschenbuch für Mathematiker u. Physiker, hrsg. von J. Auerbach	341
*Voigt, Kristall-Physik	360
*Volkman, Einführung in das Studium der theoretischen Physik, insbesondere in das der analytischen Mechanik	361
Waltenhofen, v., Grundriß der allgemeinen mechanischen Physik	365
Wand, von, die Prinzipien der mathem. Physik u. die Potentialtheorie	365
*Weber, R. H. u. Gans, Repertorium der Physik	368
*Wüllner u. Hagenbach, Lehrbuch der Experimentalphysik	383
— Kompendium der Physik	384

2. Grundlagen der Physik.

*Auerbach, die Grundbegriffe der modernen Naturlehre	15
Herwig, physikalische Begriffe und absolute Maße	143
*Mie, Moleküle, Atome, Weltäther	224
*— u. Sommerfeld, siehe: Sommerfeld u. Mie	75
Planck, das Prinzip der Erhaltung der Energie	268
Runge, Maß und Messen	75
*Sommerfeld u. Mie, allgemeine physikal. Anschauungen u. Methoden	75
Weyrauch, Prinzip der Erhaltung der Energie	375
Wittwer, die Molekulargesetze	382
Zenneck, Gravitation	75

3. Molekularphysik.

Beer, Einleitung in die mathematische Theorie der Kapillarität	22
*Byk, Gastheorie	49
*Boltzmann u. Nabl, kinetische Theorie der Materie	75
*Kamerlingh-Onnes, die Zustandsgleichung mit besonderer Berücksichtigung graphischer Methoden	75
*Keindorff, die Zustandsgleichung der Dämpfe, Flüssigkeiten u. Gase	170
*Minkowski, Kapillarität	75
Neumann, Fr., Vorlesungen über die Theorie der Kapillarität	254
Keller, über den Urstoff und seine Energie. Teil I: Untersuchung über die Gesetze von Dulong-Petit u. Kopp	170
Lorentz, H. A., Abhandlungen über theoretische Physik. Band I	208

4. Wärmelehre.

*Alt, H., Physik der Kälte	11
*Bohnert, Wärmelehre	33
*Börnstein, die Lehre von der Wärme	37
*Bryan, Thermodynamics	46
— allgemeine Grundlegung der Thermodynamik	75
Burkhardt, Entwicklungen nach oszillierenden Funktionen	47
Dronke, Einleitg. in d. anal. Theorie der Wärme nach Beer u. Pflicker	66
Haeubler, Beiträge zur mechanischen Wärmetheorie	132
*Hobson u. Dießelhorst, Dissipation der Energie, insbes. Wärmeleitg.	75
Kirchhoff, Vorlesungen über mathematische Physik. IV. Wärme	173
Krebs, Einleitung in die mechanische Wärmetheorie	190
Neumann, C., Vorlesungen über die mechanische Theorie der Wärme	248
*Neumann, Fr., Vorlesungen über die Wärme	254
*Prandtl, Vorlesungen über Gasdynamik	271
*Schroeter u. Prandtl, technische Wärmetheorie	75
*Valentiner, Temperaturmessungen	355

5. Akustik.

	Seite
Burkhardt, Entwicklungen nach oszillirenden Funktionen	47
Drobisch, über musikalische Tonbestimmung und Temperatur	66
— Nachträge zur Theorie der musikalischen Tonverhältnisse	66
*Kälähne, Akustik	168
*Lamb, Lehrbuch der Akustik	197
— Schwingungen elastischer Körper, insbesondere Akustik	74
*Kielhauser, die Stimmgabel, ihre Schwingungsgesetze und Anwen- dungen in der Physik	171

6. Optik

(elastische und geometrische Optik, einschl. optische Instrumente).

Bohn, über Linsenzusammenstellungen usw.	38
Brauns, die optischen Anomalien der Kristalle	40
Bruns, das Eikonol	45
*Burkhardt, Entwicklungen nach oszillirenden Funktionen	47
*Fröhlich, experimentelle Erforschung und theoretische Deutung der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Polarisation des von Glasgittern gebeugten Lichtes.	101
Gleichen, die Haupterscheinungen d. Brechung u. Reflexion des Lichtes — Lehrbuch der geometrischen Optik	109
*Finsterwalder, Strahlenoptik und optische Instrumente	75
*Graetz, das Licht und die Farben	112
Hansen, Untersuchung des Weges eines Lichtstrahls.	127
— dioptrische Untersuchungen	127
*Hartwig, das Stereoskop und seine Anwendungen	180
*Kelvin, Vorlesungen über Molekulardynamik und die Wellentheorie des Lichtes.	173
Kirchhoff, Vorlesungen über mathematische Physik. II. Optik. . .	183
Koenigsberger, J., über die Absorption des Lichtes in festen Körpern .	75
*Laue, Wellenoptik (Interferenz und Beugung)	209
Lorenz, L., die Lehre vom Licht	218
Matthießen, Grundriß der Dioptrik geschichteter Linsensysteme . .	247
Neumann, C., die Haupt- und Brenn-Punkte eines Linsensystemes .	253
Neumann, Fr., Vorlesungen über die Theorie der Elastizität d. festen Körper und des Lichtäthers	252
— Vorlesungen über theoretische Optik	269
*Poekels, Lehrbuch der Kristalloptik	75
*— Kristalloptik	279
Reusch, Theorie der Zylinderlinsen.	279
— Konstruktionen von Haupt- und Brennpunkten eines Linsensystemes	286
Röthig, Probleme der Brechung und Reflexion	284
*Rohr, v., die optischen Instrumente	288
Ruete, das Stereoskop.	296
Scheffer, das Mikroskop	296
Scheibner, dioptrische Untersuchungen.	306
Schmidt, Wilib., Brechung des Lichts in Gläsern	317
Schupmann, die Medialfernrohre	317
*Schuster, Einführung in die theoretische Optik, deutsch von Konen	333
Steinheil v. und Voit, Handbuch der angewandten Optik	361
Volkman, Vorlesungen über die Theorie des Lichtes	75
*Wangerin, Ältere (elastische) Optik	384
Wüllner, Einleitung in die Dioptrik des Auges	

**7. Elektrizitätslehre,
einschließlich elektromagnetische Theorie des Lichts.**

(Vgl. auch I c: Elektrotechnik.)

	Seite
*Abraham, Theorie der Elektrizität	9
* — elektromagnetische Wellen	75
*Bois, du, und Debye, stationäre und langsam veränderliche Felder	75
*Börnstein und Marckwald, sichtbare und unsichtbare Strahlen	37
Bucherer, mathematische Einführung in die Elektronentheorie	46
Burkhardt, Entwicklungen nach oszillirenden Funktionen	47
Debye, siehe: Bois, du u. Debye	75
Drude, über die anomale elektrische Dispersion von Flüssigkeiten	66
— zur Theorie stehender elektrischer Drahtwellen	66
*Dießelhorst, Beziehungen der elektrischen Strömung zu Wärme und Magnetismus	75
Ferraris, wissenschaftliche Grundlagen der Elektrotechnik	85
*Flemming, elektrische Wellentelegraphie	92
Föppl, Einführung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizität, siehe: Abraham, Theorie der Elektrizität. Bd. I	9
*Gans, Theorie des Magnetismus	103
* — Elektro- und Magnetostatik	75
Hankel, elektrische Untersuchungen. I. Über die Messung der atmosphärischen Elektrizität nach absolutem Maße	123
— — — II. Über die thermoelektrischen Eigenschaften des Borazites	123
— — — III. Über Elektrizitäts-erregung zwischen Metallen und erhitzten Salzen	123
— — — IV. Über d. Verhalten d. Weingeistflamme in elektr. Beziehung	123
— — — V. VI. Maßbestimmungen der elektromotorischen Kräfte	123
— — — VII. Über die thermoelektr. Eigenschaften des Bergkristalles	123
— — — VIII. Über die thermoelektrischen Eigenschaften des Topases	123
— — — IX. Über die thermoelektr. Eigenschaften des Schwerspaten	123
— — — X. Über die thermoelektr. Eigenschaften des Aragonites	123
— — — XI. Über d. thermoelektr. Eigenschaften der Kalkspates usw.	123
— — — XII. Über die thermoelektr. Eigenschaften des Gipses usw.	123
— — — XIII. Über die thermoelektr. Eigenschaften des Apatits usw.	124
— — — XIV. Über die photo- und thermoelektrischen Eigenschaften des Flußspates	124
Hankel, elektrische Untersuchungen. XV. Über die aktino- und piezoelektrischen Eigenschaften des Bergkristalles	124
— — — XVI. Über die thermoelektr. Eigenschaften des Helvins usw.	124
— — — XVII. Über die bei einigen Gasentwicklungen auftretenden Elektrizitäten	124
— — — XVIII. Fortsetzung der Versuche über das elektrische Verhalten der Quarz- und der Borazitkristalle	124
— — — und Lindenberg, elektrische Untersuchungen. XIX. Über die thermo- und piezoelektrischen Eigenschaften der Kristalle des chloresäuren Natrons usw.	124
— — — XX. Über die thermo- und piezoelektrischen Eigenschaften der Kristalle des brom- u. überjodsauren Natrons usw.	124
— — — XXI. Über die thermo- und piezoelektrischen Eigenschaften der Kristalle des Ameisensäuren Baryts, Bleioxyds, Strontians und Kalkes, des salpetersäuren Baryts und Bleioxyds, des schwefelsäuren Kalis, des Glykokolls, Taurins und Quercitins	124
Kernstler, die elektrodynamischen Grundgesetze und das eigentliche Elementargesetz mit Nachtrag	170
— die Unität des absoluten Maßsystems in bezug auf magnetische und elektrische Größen	170


	Seite
Kirchhoff, Theorie der Elektrizität und des Magnetismus	173
Kohlrausch, F., u. Holborn, das Leitvermögen der Elektrolyte . .	181
Kohlrausch, R., u. Weber, elektrodynamische Maßbestimmungen .	182
Kötteritzsch, Lehrbuch der Elektrostatik	185
* Lorentz, H. A., Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern	208
Abraham, Maxwells elektromagnetische Theorie	75
— Weiterbildung der Maxwellschen Theorie. Elektronentheorie . .	75
* — the Theory of Electrons and its Applications to the Phenomena of Light and Radiant Heat.	209
* — Magneto-optik.	75
* Marx, die Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen	216
Neumann, C., üb. d. d. Kräften elektrodyn. Urspr. zuzuschr. Elementarges.	249
— über das von Weber für die elektrischen Kräfte aufgestellte Gesetz	249
— das Webersche Gesetz	249
— einige Notizen hinsichtlich der gegen die Gesetze von Ampère und Weber erhobenen Einwände	249
— die elektrischen Kräfte	249
— die Verteilung der Elektrizität auf einer Kugelkalotte	248
— über einen eigentümlichen Fall elektrodynam. Induktion	248
— hydrodynamische Untersuchungen nebst einem Anhang über die Probleme der Elektrostatik und der magnetischen Induktion . . .	248
— Beiträge zu einzelnen Teilen der mathematischen Physik	248
— Untersuchungen über das Newtonsche Prinzip der Fernwirkungen mit besonderer Rücksicht auf die elektrischen Wirkungen	249
— über die Maxwell-Hertzsche Theorie	250
Neumann, Fr., Vorlesungen über die Theorie des Magnetismus . .	251
— Vorlesungen über elektrische Ströme	252
* Pockels, Beziehungen zwischen elektrostatischen und magnetosta- tischen Zustandsänderungen einerseits u. elastischen und thermischen andererseits	75
— Lehrbuch der Kristalloptik.	269
— Kristalloptik	75
Reiff u. Sommerfeld, Standpunkt der Fernwirkung, die Elementar- gesetze (in der Elektrizitätstheorie)	75
Richarz, neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Elektrizitätslehre.	280
* — Anfangsgründe der Maxwellschen Theorie, verknüpft mit den Elektronentheorien	280
* Rüdenberg, elektromagnetische Schwingungen	287
* Schäfer, die Maxwellsche Theorie der Elektrizität und des Magnetismus Starke, experimentelle Elektrizitätslehre	294
* Schuster, Einführung in die theoretische Optik, deutsch von Konen.	317
* Thomson, J. J., Elektrizitäts-Durchgang in Gasen, deutsch von Marx	347
* Töpler, elektrische Entladungen in Gasen	349
* Tumlirz, elektromagnetische Theorie des Lichtes	351
* Voigt, Magneto- und Elektrooptik	360
Volkman, Vorlesungen über die Theorie des Lichtes	361
Wallentin, Einleitung in die theoretische Elektrizitätslehre	364
Weber, H., der Rotationsinduktor	367
— u. Wellstein, Encyklopädie der Elementar-Mathematik. Bd. III	367
Weber, W., elektrodynam. Maßbestimmungen, insb. über ein allgemeines Grundgesetz der elektrischen Wirkungen	368
— — — insbesondere über Diamagnetismus.	368
— — — insbesondere Widerstandsmessungen	368
— — — insbesondere über elektrische Schwingungen	368
— — — insbesondere über das Prinzip der Erhaltung der Energie .	368
— — — insbesondere über die Energie der Wechselwirkung	368

	Seite
Weickert, aus dem Gebiet der Influenzelektrizität. Mathem. Unters.	370
Wiechert, Grundlagen der Elektrodynamik	376
*Wien, W., über Elektronen	376
— elektromagnetische Lichttheorie. — Theorie der Strahlung	75
Zahn, v., Untersuchungen über Kontaktelektrizität	386
Abraham, Theorie der Elektrizität. Band I	9
— geometrische Grundbegriffe (der Mechanik deformierbarer Körper)	74
*Bucherer, Elemente der Vektoranalysis	46
Föppl, die Geometrie der Wirbelfelder	94
*Gans, Einführung in die Vektoranalysis	103
*Ignatowski, v., die Vektoranalysis und ihre Anwendungen	158
*Jahnke, Vorlesungen über die Vektorenrechnung	160
Langevin, analyse vectorielle	80
*Mehmke, Vorlesungen über Vektoren und Punktrechnung	220

c) Zum Unterricht in Mechanik und Physik

(einschl. Jugendschriften).

*Bohnert, Wärmelehre	33
Bremer, Leitfaden der Physik, für die ob. Klassen der Realanstalten	40
* — Auflösungen hierzu	41
Fischer, K. T., neuere Versuche z. Mechanik d. festen u. flüssigen Körper	90
Föppl, Leitf. u. Aufgabensamml. f. d. Unterr. in d. angewand. Mechanik	93
*Franke, Naturlehre	97
*Grimsehl, Lehrbuch der Physik	113
* — Schule des Lichts	113
* — ausgewählte physikalische Schülerübungen	113
*Gruner, Verwertung von Theorien u. Hypothesen im physikal. Unterricht	116
Helm, Elemente der Mechanik und mathematischen Physik	137
Henrici, Elementarmechanik des Punktes und starren Systems	140
Hoffmann, Leitfaden für den physik. Unterr. in Lehrerinnensemin. usw.	151
Januschke, d. Prinzip der Erhaltung der Energie in der Elektrizität	166
— das Prinzip der Erhaltung der Energie und seine Anwendung in der Naturlehre	166
Junker, physikalische Aufgaben aus dem Gebiete des Magnetismus und der Elektrizität	168
Klein, H., Leitfaden und Repetitorium der Physik	178
Kahl, mathematische Aufgaben aus der Physik	168
Lorberg, Lehrbuch der Physik	208
Melinat, Physik für deutsche Lehrerbildungsanstalten	220
*Münch, Physikalisches aus dem Alltagsleben	240
Neumann, St., die Ergebnisse des physikalischen Unterrichts	254
*Poske, Didaktik der Physik	271
*Schäffer, Natur-Paradoxe	294
*Tidy, das Feuerzeug, deutsch von Pfannenschmidt	348
Zwick, Induktionsströme und dynamoelektrische Maschinen in Versuchen für die Schule dargelegt	392

 Näheres über die vorgenannten Werke befindet sich in meinem Verlagskatalog auf dem Gebiete der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, 101. Ausgabe, den ich gratis und franko auf Wunsch versende.

Leipzig, August 1908.
Poststraße 3.

B. G. Teubner.



